

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第四六冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB63/12

四庫全書存目叢書·子部四六

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 54 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四六冊目次

子部·醫家類

醫學六要十九卷(二)

〔明〕張三錫撰
中國科學院圖書館藏明萬曆刻崇禎十七年張維藩等補修白下青照堂印本

一

刪補頤生微論四卷

〔明〕李中梓撰
中國科學院圖書館藏明崇禎十五年刻本

五一三

鐫補雷公炮製藥性解六卷

〔明〕李中梓輯
中國中醫研究院圖書館藏明天啓二年刻本

六五六

新刊魯府祕方四卷

〔明〕劉應泰輯
北京圖書館藏明鈔本

七五八

醫學六要十九卷(二)

〔明〕張三錫撰

中國科學院圖書館藏明萬曆刻崇禎十七
年張維藩等補修白下青照堂印本

附《四庫全書總目·醫學六要
十九卷》提要

治法彙序

張三錫曰用藥如用兵紀律稍乖吉凶立判况
乎熬膏梁腸胃不同老幼鯁氣血迥異氣
候有炎涼居處有高下古今方藥各有所長敢
因衆腋用足一衷曰治法彙

序



治法彙目錄

○一卷

總要

補法

渴法

汗法

吐法

下法

五臟渴法

正法從治

五臟五味補瀉

引經報使

臟腑標本虛實用藥式

十劑

氣味陰陽

五味宜忌

五微 五宜 五禁 五走 五遠

五味偏勝

標本陰陽

治法彙

目錄

升降浮沉

四時用藥例

妊娠服禁

引經藥報使

六陳

十八反

十九畏

氣門

清氣

濁氣

鬱氣

虛氣

諸經氣

肥人氣滯

瘦人氣滯

婦人諸氣

氣不歸元

氣不升降

胎前產後一切氣證

血門

衄血

吐血

咳血

唾血

咯血

舌衄

齒衄

溺血

下血

九竅出血

毛孔出血

脾胃門

兩傷

胃火

胃弱

胃中痰

血鬱

脾傷

食滯

脾久病

脾胃忌

胃中濕痰

瘦人健脾養血

健脾大義

平土

虛則補母

內傷

倦怠

身重

治法彙

目錄

○二卷

虛損門

陰虛

陽虛

中氣虛

諸臟腑虛

勞瘵發熱咳嗽

心勞

肺勞

脾勞

肝勞

發熱門

外感熱

內傷熱

陰虛熱

傷食熱

小兒諸熱

婦人諸熱

腫毒熱

虛弱潮熱

骨蒸發熱

惡寒門		傷食		內傷		瘡腫	
外感		火鬱		產後		小兒	
傷食門		宿食不化		傷食惡食			
胸膈飽悶		膈間脹痛		不能食			
傷諸食菌		傷酒		痰門			
治法彙		目錄		三			
熱痰		濕痰		風痰		鬱痰	
寒痰		痰分五色		脾虛			
痰挾瘀血		痰在胃					
痰在膈間		痰在腸胃					
痰飲流入四肢		血虛有痰					
痰分新舊輕重		酒痰		墜痰			
導痰		化痰					
○三卷							
咳嗽門							

傷風		外感		火		鬱火	
痰		陰虛		乾咳		肺脹	
氣虛		咳血		食積痰嗽			
脇痛嗽		咳而嘔		早晨嗽		上半日嗽	
黃昏嗽		久嗽		勞嗽		肺氣虛	
酒多傷肺		傷力		肺寒		食積作嗽	
肝咳		膽咳		心咳		小腸咳	
肺臟發咳		大腸咳		腎咳			
治法彙		目錄		四			
膀胱咳		肺痿		暴失音		妊娠嗽	
產後嗽		喘門					
哮喘		肺實		實喘		虛喘	
邪喘		陰虛		病後產後		瘡瘍後喘	
濕痰壅盛		喘不得臥					
產後諸喘		又		短氣			
鬱門							
氣鬱		痰鬱		濕鬱		熱鬱	

血鬱	食鬱	噎塞
項脛臂結痰	濕痰流注	
瘰癧		
嘔吐門		
寒吐	火吐	食積吐
痰飲		
氣鬱	蟲積	酒毒
痰火	乾嘔	漏氣
走嘯		
惡心		
咳逆門		
治法彙	目錄	五
痰火	胃虛	伏陰
陰火		
痰血	痰滯	氣鬱
產後咳逆		
霍亂門		
夏月霍亂吐瀉	春秋冬三月霍亂吐瀉	
轉筋	妊娠霍亂	
瀉門		
火	濕	暑
痰		
脾虛	傷食	積
寒		
腎虛	婦人	老人

陰虛	鬱結	傷酒
痢門		
紅	白	初起
久痢		
勞痢	後重	噤口
小兒		
瘡門		
風瘡	溫瘡	寒瘡
暑瘡		
濕瘡	牝瘡	食瘡
氣瘡		
瘡癰	初起	久不止
捷法		
○四卷		
治法彙	目錄	六
中風門		
類中風	氣虛	血虛
痰		
挾火	濕	瘦人
肥人		
遺尿	口噤	左癱
右癱		
口眼喎邪	言語塞澀	
真中風	表中風	裏中風
臟腑兼中		
預防中風		
產後中風		
火門		
實火	虛火	鬱火
陰火		

痺腹

肩稜痛 眼眶痛 肥人 瘦人

頭痛門	氣虛	陰虛	瘀血
肝火	痰飲	氣鬱	食積
腸痛門			
肉積			
痰積	癖積	水積	血積
食積	酒積	氣積	涎積
積聚門			
酒	腸鳴		
治法彙	目錄	九	
食	血	蟲	虛
寒	火	氣	痰
腹痛門			
瘀血	氣滯	蟲積	中氣虛
寒痛	火痛	痰積	食積
胃脘痛門			
頸項痛			
雷頭風	頭重	頭搖	面痛
頭風	瘡毒	產後頭痛	

火	濕	濕熱	血虛
瘀血	肢節痛	上部痛	下部痛
產後胎前	手臂痛		
婦人胸背脇走痛	環跳穴痛	膝眼	
肩背痛			
脚氣門			
濕氣	瘦人腿痛	肥人腿痛	
脚氣衝心	脚氣上氣		
脚氣發熱	鶴膝風		
治法彙	目錄	十	
附骨疽	酒毒濕氣	脚心痛	
腿酸痛	火症痛	足跟痛	
腿痛門	與前參看		
血虛	濕	濕熱	濕痰流注
陰虛	陽虛	筋骨痛	附癰瘰
顫振	寧		
○六卷			
三消門			
上消肺	下消腎	中消胃	脾胃虛弱

諸失血後渴	胎前渴	產後渴	無病忽渴	酒渴	黃疸門	酒疸	穀疸	乾黃	濕黃	淋秘	陰虛火盛	色白氣虛	不渴	二便俱秘	老人氣虛	久血作淋	淋秘有血	陰莖痛	淋痛	病後產後	小便數	妊娠淋	產後小便不通	子淋	小便赤澀	小便	遺溺	咳而遺溺	孕婦遺尿	產後遺尿	秘結門	血虛兼有熱	脾虛不能運化	熱秘	老人氣血弱	產後
-------	-----	-----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	------	----	------	------	------	------	-----	----	------	-----	-----	--------	----	------	----	----	------	------	------	-----	-------	--------	----	-------	----

附陽痿	陰痿陰汗陰冷陰臭陰痒陰	陰縱	陰瘡門	便濁門	夢遺精滑門	疝門	脫肛門	附穀道癢痛	汗門	自汗	盜汗	汗多	無汗	頭汗	黃汗	不眠門	病後	汗下後	癰瘍	痰火	心煩	多鬱	膽虛	煩躁門	表症	裏實	火客心胞	病後年高	素弱	產後	法	關格
-----	-------------	----	-----	-----	-------	----	-----	-------	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	------	------	----	----	---	----

諸虛煩

○七卷

婦人門

經水

血崩

帶下

胎前

產後

乳

廣嗣門

附男精

女血

驗胎法

怔忡驚悸恐健忘門

癲狂癰門

治法彙

六目錄

十三

瘰癧門

痺門

癰風門

厥症門

陽厥

陰厥

氣厥

痰厥

熱厥

寒厥

虵厥

筋病門

嘈雜噁氣門

胃風門

耳門

耳聾

耳鳴

痰

火

氣虛

陰虛

肝火

氣閉

痰火

風熱

大病後及勞碌

耳腫

凍耳

停耳

耳瘡

蟲入耳

耳痒

目門

暴發赤腫

昏赤

婦人久鬱內脹昏暗

治法彙

六目錄

十四

陰虛火盛日久病

體瘦目赤

目昧不明

外障

內障

羞明

童子散大

目分五臟

迎風流淚

眼生倒睫拳毛

能遠視不能近視

眼管初生小泡

能近視不能遠視

目珠痛

疳眼

雀眼

目熱生翳

爛眼眶

飛絲入眼

稻芒入目

塵物眯眼

歧視亂見

諸醫		小兒諸眼病	
口門			
口甘	口淡	口苦	口瘡
口乾	唇裂	口疳臭爛	
口臭	齒唇		
舌門			
舌瘡破不愈	舌腫脹	舌乾	
舌破	舌上出血	舌暴腫	
舌出不收			
治法彙		目錄	
鼻門			
鼻塞	多涕	酒齶鼻	面鼻紫黑
鼻淵	鼻中息肉	鼻鼽	
鼻赤	鼻痛	鼻瘡	鼻疳蟲
齒門			
齦腫痛	生蟲	上下牙痛	
牙根疳蟲		蟲蛀空牙	
牙根癰			
咽喉門			

肺癰	喉乾	瘡	喉痺
乳蛾	雙乳蛾	喉痺傳染	
纏喉風	喉閉	咽痛	
面門			
面熱	面寒	面黃	面黧黑
浮腫	面青	面上細瘡	即黃水瘡
指爪傷破	腮腫	疔癩	
髮門			
蟲門			
治法彙		目錄	
跌撲損傷門			
附筋斷	捷耳鼻法	肩破	破傷風
諸哽門			
祝由科			
湯火瘡門			
竹木刺肉			
循衣摸床			
邪祟			
關格			
目錄終			

肝江 張三錫

金壇 王肯堂 校

補法

虛則補之、正氣奪則虛人參 黃芪 白朮

甘草補氣藥也、歸芍地黃補血藥也、二門知栢

歸地、補陰藥也、附子 茯苓 鹿膠 兔絲

補陽藥也、精不足者補之以味、乃天地生成之

味、非烹飪調和之味也、如羊肉黑豆之類、黑

治法彙編 卷一 藥

瘦人腸胃時燥、口乾渴、髮鬚枯槁、饑膚不澤、筋

骨疼、夜甚、是陰血虛、津液不足、當用潤劑、燥藥

宜禁、四物二冬、花粉為主、肥白人、行則氣促

腠理不密、自汗時出、四肢倦怠、屬氣虛、有濕痰

宜燥劑、忌潤劑、必以參朮芪草益氣為主、產

後氣血大虧、大補為主、須分氣血、今人止以四

物增減、倘脾胃弱而氣不足者、雖不戕人、老

人亦以補養為主、有外感、補中益氣加芍藥、

防等解散、邪去熱淨而止、內傷飲食參朮

脾兼以消導、痰火咳嗽、加化痰藥、冬月先發

一切病後、瘡疽後、有外感及內傷者、悉從此

法、助正伐邪、不傷氣血、可保無虞、稟賦怯弱人

脉弱無力、年高產後、胎前同法、五虛 脾虛

者、心腹飽脹、不能運化飲食、四肢痿弱、怠惰嗜

臥、九竅不利、面黑痿黃、補中益氣增減、以甘補

之是也、大忌尅伐、心虛者、兩寸微洪、善悲怔

忡、口乾煩悶不寧、古用澤瀉炒鹽以鹹補之、不

若人參、茯神、柏子仁、菖蒲為佳、補心丹最的一

治法彙編 卷一 藥

說虛則補其母、陳皮生薑、肝虛者、目眊眊無

所見、耳無所聞、善恐、如人將捕之、筋痿不用、陰

痿面青白、脉弦細無力、古方用陳皮生薑、以苦

補之、大抵肝氣常有餘、肝血常不足、古方補母

用熟地黃、黃柏及錢氏地黃丸是滋陰血也、

肺虛者、鼻塞不利、少氣自汗、喘咳面色淡白、毛

焦落、久病產後、及瘡腫出膿後、發喘是也、必用

人參、麥冬、五味、甘益氣、酸補肺也、錢氏補肺阿

膠散中、有甘草、芫花、糯米正合此義、第不若生

脉散多効爾 腎有二水中有火枯藁秘結小便淋瀝相火上炎兩尺洪大夢遺盜汗耳鳴天乙真水不足當滋陰六味地黃丸之類 兩尺微弱而濇四肢痿厥腰膝痠食少及不消化腰似折小腹痛是元陽虛憊真火微也人參枸杞兔絲桂附鹿茸鹿膠之類 曰氣曰血曰精曰津液一或不足當先理脾胃若脾胃不和食少不能生化精血縱加峻補不能成功味者但知四物養血謂參朮不可用庸之甚矣大抵邪之所湊其氣必虛本必先腐而後蟲生牆壁堅固賊自難入醫家若不審脾胃元氣精血妄加剋伐涉虛之人鮮有不致于危者余家世業醫目擊其弊特為拈出明哲幸諒之

瀉法

實則瀉之邪氣盛則實六淫客邪外感七情飲食內傷為痰為火為癰為積或汗而散或吐而達或下而條或刺以決之或灸以劫之使邪氣早退正氣得復是瀉法不得妄談也謹錄于左

內經曰辛甘發散為陽凡味辛藥則散桂枝麻黃乾薑生附辛熱發汗藥也大寒濕客于表者用之羌獨芷朴蒼朮芍藥辛溫藥也感冒輕者用之石膏薄荷黃芩升麻葛根辛涼藥也內外熱盛者用之

汗法

薰蒸漂洗熨烙針刺砭射導引按摩諸解表者皆汗法也

風寒客于人體人毫毛畢直皮膚閉而為熱頭痛惡寒四肢拘急脉浮而緊是為表症宜辛以散之得汗而解冬月麻黃湯他時大羌活湯增

減 咳嗽寒包熱者同法 濕流關節身痛脉

沉當取微汗 風濕相搏一身盡痛不可大汗

胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土之中蒸蒸

發熱升陽散火湯火鬱發之也 風熱拂鬱于

表或成疹班或生瘡疥一切咽痛齒痛風腿

痛濕痰流注瘡疽初起四肢拘急惡寒發熱悉

宜取汗敗毒散加減最穩小兒痘疹痧同 中

酒當出汗古方用葛花解醒是也

此人胃寒頭痛寒熱用有力人將病者兩手極

力按按至千指尖以針或磁石砭去惡血即愈

即前砭針取汗法也

傷寒過經熱不止或發汗不微用紫蘇煎湯取一大壺置被中接汗內服辛涼藥即出

不可汗

左脈微弱小便淋不可汗汗之必便血諸

失血家腹中有動氣產後潰瘍年高

諸病久氣虛血虛人誤汗即發喘或筋惕肉瞤

手足振掉等危症咽痛奪血者無汗奪汗

治法彙一卷要

五

者無血瘡家不可汗陰虛脈細數遺精咳嗽

勞瘵夏暑時汗多亡陽不當汗而汗之

津液枯槁而歾月水三禁不可汗吐下

吐法

引涎

涎取噴迫

凡上行者皆吐

在上者因而越之尺脈有力強健者宜吐食

滯中脘脹悶惡心頭痛身熱有如傷寒寸口脈

滑盛急以鹽湯探吐中風痰涎壅盛不能言

語不遺尿脈滑實有力者稀涎散吐之小水

不通痰滯胸膈不得下降升柴二陳二水湯探

吐氣虛秘者補中益氣湯先服後吐姪媛

轉胞小水不通參芪朮煎服探吐肝氣鬱結

心下中脘痛悶脈細結不下食者羅荷子煎湯

探吐濕痰痛風用杉木煎湯吐癰癰痰涎

上潮小兒驚風脈滑人健而實者三聖散吐之

傷寒三四日邪傳胸膈懊憹不得眠是實煩

也瓜蒂散或梔子豆豉湯吐之風痰頭痛百

法不應久之則傷目瓜蒂散或青黛散搐鼻吐

之暴嗽風涎上湧咽塞不利茶調散吐之

治法彙一卷要

六

瘧久不止心中脹悶脈滑實者四獸飲吐之

膏梁人多食生鱸因而生蟲脹痛發嘔面上白

斑時作時止藜蘆散吐之久患脇痛胸膈不

快噎食不下獨聖散加蝎稍半錢吐之筋攣

急痛體厚濕痰盛者神應散吐之偏枯痰盛

追風散吐之頭風後有目疾有半明可救者

防風散吐之胸膈滿背痛或臂疼可用祛風

湯吐之後服烏藥散癰風瘡癰惡瘡三聖散

吐之後服苦參丸一切暴厥中氣中風脈沉

實清熱有神不省人事不遺尿者用神聖散
內灌之吐出涎立醒破傷風牙關緊急角弓
反張亦用神聖散吐之

豆豉穉子芽茶苦參不連瓜蒂吐胸中之熱痰

礬鹽酸酖吐膈上之頑痰輕粉鬱金桔梗

吐胸中之鬱結痰烏頭尖附子尖吐胸中之

寒痰皂角蠅稍吐胸中之風痰

丹溪取吐法先以布搭膊勒肚腹於不通風

處行之探吐將鷺翎桐油浸二三日却以皂

角洗淨曬乾待用逆流水和藥取吐佳凡

藥升上者皆可吐如防風桔梗芽茶山梔川芎

蘿蔔子以薑汁醋少許瓜蒂散少許入薑汁溫

服以鷺翎于喉中探即吐

吐食積痰用蘿蔔子五合油炒插入漿水濾汁

入桐油白蜜少許旋旋半溫服下以鷺翎探

蝦汁引涎法見中風門肥人濕痰盛益氣散薑

汁調吐

子和稀涎散

猪牙皂角不鮮者去皮洗一兩絲礬五錢藜蘆

右爲細末每服半錢或一二錢幹開口發

調灌之

吐藥

桔梗蘆人參蘆虛人用此艾葉末茶瓜蒂

附子尖藜蘆砒

此數味皆自吐不用探法

三聖散

防風二兩瓜蒂揀淨炒微黃三兩藜蘆一兩

治法藥一茶匙要

右爲粗末每服約半兩以薑汁三茶盞煎三

五沸去薑汁次入水一盞煎三沸將薑二盞

同一處熬二沸去渣澄清放溫服以吐爲度

丹溪方用鬱金半兩藜蘆一錢苦參一錢

右爲末薑汁調吐如吐不止嚼丁香一粒即

止又不止葱白湯呷之

仲景瓜蒂散

凡用瓜蒂良久涎未出者含砂糖一塊下咽

即引涎吐出瓜蒂即甜瓜蒂也用近皮半

寸許暴乾用一法每用一二錢加膩粉一錢水調之吐風痰佳

二仙散

瓜蒂

好茶

各等分

右爲細末每服二錢薑汁調下空心用之

吐劑用瓜蒂等藥不透者必用熱藥攻之後方碧霞丹

右綠

細研飛

附子尖

川烏尖

錫稍

各七

右爲末入石綠和勻糊丸鷄頭大每服薄荷

治法藥一茶匙

九

汁半盞下一丸再用半盞須臾大吐

獨聖散 用砒不以多少研細每服一錢以新

汲水調下

經驗吐哮喘方 用砒一錢煆二兩清水和捏

餅香油煎黃爲末用一錢江茶末三錢調勻

五更井水下如不吐可添半錢次日服

凡服吐藥不吐以薑汁投之不動續續投之無

不吐者 吐後昏憤切勿驚疑如頭眩難忍

飲童便或自便或凉水一口佳

凡服草木藜蘆瓜蒂等吐不止者飲麝香湯即

止 葱白湯止藜蘆吐 石藥吐不止甘草

貫衆湯止之 服砒不止地漿水解之冷茶

豆湯新汲水俱佳

不可吐

尺中脉微弱兩寸不滑胸膈不悶不可吐 脾

胃素虛面色痿黃右寸大而無力不可吐 中

氣虛而眩暈不能運化不可認爲實誤吐禍不

旋踵大都邪在上焦痰涎積滯中脘阻礙升降

治法藥一茶匙

十

脉實有神者非吐不可若吐而不吐是養病以

防身也涉虛者禁之

吐後惟忌飽食酸醃硬物乾物油膩之物吐後

心火既降陰道必強太禁房室悲憂病人既不

自責必歸罪于吐法也不可吐者有八性剛暴

好怒喜淫者病勢已危老弱氣衰者 吐不止

者陽敗血虛者吐血咯血衄血嗽血崩血溺血

者病人粗知醫書不辨邪正者病人無正性反

復不定者左右多嘈雜之言者皆不可吐吐則

轉生他病反起謗端雖懇切求之不可強從也

下者惟生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也

內經曰中滿者瀉之于內又曰土鬱奪之謂下之令其疎泄也積滯痰飲鬱于腸胃流于四肢爲痛爲腫爲痞爲塊便溺阻塞氣血凝滯須下以通其塞惟脉滑弦數有力症兼脹痛不得已而行乃可須審輕重虛實寒熱若一槩妄治是殺人速于刃爾

下熱實

治法彙一卷

十一

傷寒表邪傳裏腸胃燥結三焦俱傷腹中痞滿大腸燥實七八日不大便繞臍硬痛外見口乾舌燥舌上邊黃中黑脉沉數有力爲裏症卽大實結胸大承氣湯主之邪在上焦則爲痞實小承氣湯邪在中焦則有燥口乾實腹中堅按之三症調胃承氣湯主之邪熱結于血分硬痛三症調胃承氣湯主之邪熱結于血分其血必結在男子則爲下血譫語小腹硬痛小水自利桃仁承氣湯主之女人則經水適來適斷日晡如狂小柴胡加芍歸桃仁泥消導滯

血忌汗下表熱未靜裏症又急謂舌乾口燥硬痛也不得

不下大柴胡湯通表裏而緩治之虛結年高

病久產後切忌大下內傷元氣不足有食停滯

當補瀉兼施補中益氣加大黃潤之血少腸

胃乾燥多日不大便左脉濡小口乾者導滯通

幽湯倍麻仁甚者加熱大黃或間服潤腸丸妙

下寒實結

寒痰鬱于中脘或過食寒涼肉食糝粽心下硬痛手不可近必用巴豆丸或備急丸通之斬關

治法彙一卷

十二

奪門之將不可不用也傷寒寒實結胸仲景三

物白散用貝母桔梗巴豆

下水結

傷寒飲水過多水停心下或脾中濕痰鬱而爲水脹滿喘腫面浮脉實數有力者十棗湯瀉之中滿腹脹喘嗽淋閉積飲拂鬱不得宣通二便阻塞脉弦數有力及肢體腫痛走注舟車神祐丸最捷中病卽止不必盡劑也濕痰伏于肌肉爲腫爲痛津液不得宣通二便秘結大聖瀉

川散主之

下積痰

食積痰飲膠固于腸胃為痛為痞吞酸滿悶阻礙升降脉滑實弦數有力者木香枳榔丸下之腸胃秘而不通津液不能流布也神芎丸下之

下蟲積

心腹築痛唇紅能食面小白斑或偏嗜一物生米燒酒之類是蟲積萬應丸下之 大抵下法止可施于初起胃氣未傷元氣尚壯脉實有力

治法彙一卷

十三

之人稍虛者即當扶助正氣消息推蕩之所謂養正積自除也慎勿猛浪戕人天年

木香枳榔丸 流濕潤燥推陳致新兼下食積

木香 枳榔 青皮 廣茂 枳殼 黃連

各五錢 黃栢兩一大黃兩半黑牽牛

水丸量輕重分兩

神芎導水丸導濕熱通腸胃大便不實者忌之

黃芩 黃連兩半大黃兩川芎兩半黑牽牛頭末

滑石四薄荷五錢

舟車神祐丸 洩水濕痰飲

甘遂醋炒一兩 大戟醋炒一兩 芫花醋炒一兩 大黃二兩

輕粉一錢 青皮 陳皮 木香

枳榔各半 用水丸

不可下

下多亡陰 不當下而下之令人開腸洞泄便溺不禁而殞 年高產乳 表邪未淨 亡血

家 潰瘍 動氣 惡心 宿滯未熱

五臟瀉法

治法彙一卷

十四

五志過極五味過傷則火動而偏勝宜分經瀉之 大怒則火起于肝肝盛則夢山林樹木兩

脇痛引少腹脉弦數古方瀉青丸為對症藥或

以柴胡醋炒青皮梔子龍膽草煎服佳甚者當

歸龍薈丸肝家濕熱盛者龍膽瀉肝湯以酸瀉

之白芍藥 多喜則心實胸中痛脇滿咲不休

口舌乾燥狂亂不眠夢見丘山煙火古方以甘

瀉之用甘草如無他症錢氏方中重則瀉心湯

輕則導赤散 思慮不節厚味不謹則脾盛脾

盛則夢歌樂身重不舉痞塞氣不利古方以
實瀉之或錢氏瀉黃散實者瀉其子用桑皮瀉
肺積熱痰涎客子肺則肺盛肺盛則夢哭喘
咳右脇脹痛古方桑白皮瀉之或瀉白散實則
瀉其子用澤瀉五臟惟腎無瀉法以腎常不
足也古方澤瀉瀉腎是引下焦濁火從小便洩
去非瀉腎也不可不知

瀉青丸

龍膽草

酒炒

羌活

防風

梔子

川芎

治法彙一卷

要

十五

當歸

大黃

酒炒各等分

右為細末蜜丸雞頭大每服一九竹葉砂糖
湯下海藏云東垣先生治癰後風熱毒攻
目翳膜遮睛用此瀉之大効

瀉心湯

黃連一味為細末每服二分至五分甚者一

錢臨睡溫水下

導赤散

引火從小腸出也

生地

甘草稍

木通

各等分為末每服

三錢竹葉湯煎服

瀉黃散

海藏云此劑瀉脾熱

藿香

錢七

山梔子

兩一

石膏

兩半

甘草

兩二

防風

兩四

右剉蜜酒微炒香為細末每服二錢水煎清
汁服

瀉白散

桑白皮

一兩

地骨皮

兩一

甘草

兩半

炒

右為細末每服二錢水一盞入粳米百粒同
煎食後服易老加黃連海藏云肺熱骨蒸

治法彙一卷

要

十六

宜此余意骨蒸多屬陰虛若肺風熱伏鬱固
宜瀉之肺火盛須枯茶梔子骨蒸肺家氣盛
者乃可用

正治從治

治寒以熱治熱以寒此正治也熱病而反用熱
攻寒病而反用涼劑乃從治也且聲不同不相
應氣不同不相合大寒大熱之病必能與異氣
相拒善治者乃反其法以同其氣復令寒熱參
合使其始同終異也如熱在下而上有寒邪拒

格則寒藥中入熱藥為佐內經曰若調寒熱之
逆冷熱必刑則熱藥冷服下膈之後冷體既消
熱性隨發寒在上而上有浮火拒格則熱藥中
入寒藥為佐下膈之後熱氣既散寒性隨發情
且不違而致大益病氣隨愈嘔煩皆除正內經
所謂寒因熱用熱因寒用必伏其所主而先其
所因其始則同其終則異之義如伏寒在胃嘔
吐不納是虛火泛上古方用炮薑理中湯水浸
冷服又如傷寒少陰症瀉不止厥逆無脈乾嘔
煩悶不內藥白通湯加猪膽汁之類是也先賢
譬之人間之火可以濕伏可以水滅病之小者
似之大者則若龍雷之火逢濕則發見水益熾
太陽一照火即尋滅亦此理也

五臟五味補瀉

肝苦急急食甘以緩之玉莖中痛用甘草稍是
緩之也欲散急食辛以散之以酸瀉之藥赤芍以
辛補之補辛實者瀉其子肝實則補其母地黃
心苦緩急食酸以收之五味欲更急食鹹以更

之苦以甘瀉之甘草以鹹補之澤瀉實則瀉
其子甘草虛則補其母生薑
脾苦濕急食苦以燥之白朮欲緩急食甘以緩
之炙甘草以苦瀉之黃連以甘補之以參實則瀉
其子桑白皮虛則補其母炒鹽
肺苦氣上逆急食苦以泄之訶子欲收急食酸
以收之白芍以辛瀉之桑白皮以酸補之五味實
則瀉其子澤瀉虛則補其母五味
腎苦燥急食辛以潤之黃柏欲堅急食苦以堅
之知母以鹹瀉之澤瀉以苦補之黃柏實則瀉
其子白芍虛則補其母五味
張元素曰凡藥之五味隨五臟所入而為補瀉
亦不過因其性而調之酸入肝苦入心甘入脾
辛入肺鹹入腎辛散酸收苦燥甘緩鹹與淡滲
五味之本性一定而不可變者其或補或瀉則
因五臟四時而迭相施用者也溫涼寒熱四氣
之本性也其于五臟補瀉亦迭相施用也此特
繫古因素問飲食補瀉之義舉數藥以為例也

學者宜因意而究之

引經報使

手少陰心黃連 手太陽小腸黃蘗 足少陰腎黃蘗

肉桂知母 足太陽膀胱羌活 手太陰肺桔梗

細辛 足陽明大腸石膏 足太陰脾升麻

足陽明胃石膏 足厥陰肝青皮 手少陽三焦柴胡

陽膽柴胡 足厥陰肝青皮 手少陽三焦柴胡

連翹柴胡 皮中青皮 下附子

臟腑標本虛實用藥式

治法彙一卷 肝藏血屬木 膽火寄于中 主血 主目 主筋 主呼

主怒

本病諸風眩暈 僵仆強直 驚癇 兩脇腫痛 胸肋

滿痛 嘔血 小腹疝痛 疝瘕 女人經病

標病寒熱瘧 頭痛吐涎 目赤面青 多怒耳閉 頰

腫 筋攣 卵縮 丈夫癰疝 女人少腹腫痛 陰病

有餘瀉之

瀉子甘草

行氣香附 芎藭 瞿麥 牽牛 青橘皮

行血紅花 鱉甲 桃仁 莢迷 京

穿山甲 大黃 水蛭 蜜蟲 蘇木

牡丹皮

鎮驚雄黃 鐵落 珍珠 代赭石

夜明砂 胡 銀薄 鉛丹 龍骨

石決明

搜風羌活 荊芥 遠志 槐子 蔓荊子

白花蛇 獨活 防風 皂莢 烏頭

白附子 僵蠶 蟬蛻

不足補之

補母枸杞 杜仲 狗脊 苦參 熟地黃

兔絲子 草解 阿膠

補血當歸 牛膝 續斷 血竭 白芍藥

沒藥 芎藭

補氣天麻 白朮 葱花 細辛 密蒙花

栝子仁 決明 生薑 穀精草

本熱寒之

瀉木芍藥 烏藥 澤瀉

瀉火黃連 黃芩 苦茶 猪膽 龍膽

攻裏大黃

標熱發之

和解柴胡 半夏 解肌桂枝 麻黃

心藏神為君火包絡為相火代君行令主血主

言主汗主笑

本病諸熱脅癰驚惑譫妄煩亂啼笑罵怔忡健

忘自汗諸瘁瘡瘍

標病汎熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黃手心

煩熱胸脇滿痛引腰背肩肘肘臂

火實瀉之

瀉子黃連 大黃

氣甘草 人參 木通 黃蘗 赤茯苓

血丹參 牡丹 生地 玄參

鎮驚硃砂 牛黃 紫石英

神虛補之

補母細辛 烏梅 生薑 陳皮 酸棗仁

氣桂心 澤瀉 茯神 遠志 白茯苓

石菖蒲

血當歸 乳香 熟地 沒藥

本熱寒之

瀉火黃芩 竹葉 芒硝 炒鹽 麥門冬

涼血地黃 卮子 天竺黃

標熱發之

散火甘草 獨活 麻黃 柴胡 龍腦

脾藏智屬土為萬物之母主營衛主味主肌肉

主四肢

本病諸濕腫脹痞滿噫氣大小便閉黃疸痰飲

吐瀉霍亂心腹痛飲食不化

標病身體胕腫重困嗜臥四肢不舉舌本強痛

足大趾不用九竅不通諸瘕項強

土實瀉之

瀉子訶子 防風 葶藶 桑白皮

吐豆豉 卮子 常山 瓜蒂 蘿蔔子

鬱金 薑汁 藜汁 苦參 赤小豆

鹽湯 苦茶

下 大黃 芒硝 大戟 甘遂 青礞石

續斷子 芫花

上虛補之

補母桂心 茯苓

氣 人參 黃耆 升麻 葛根 甘草

陳橘皮 藿香 葳蕤 縮砂 木香

扁豆

血 白朮 蒼朮 白芍 膠飴 大棗

乾薑 木瓜 烏梅 蜂蜜

治法彙一卷

本濕除之

燥中宮 白朮 蒼朮 橘皮 吳茱萸

半夏 南星 芥子 草豆蔻

潔淨府 木通 猪苓 藿香 赤茯苓

標濕滲之

開鬼門 葛根 蒼朮 麻黃 獨活

肺藏魄屬金總攝一身元氣主聞主哭主皮毛
本病諸氣臑鬱諸痿喘嘔氣短欬嗽上逆欬吐
腹血不得臥小便數而欠遺失不禁

標邪滲漸寒熱傷風自汗肩背痛冷臑臂前麻

氣實瀉之

瀉子澤瀉 葶藶 桑白皮 地骨皮

除濕半夏 白礬 白茯苓 薏苡仁

木瓜 橘皮

瀉火糯米 石膏 寒水石 知母 訶子

通滯枳殼 薄荷 乾生薑 木香 厚朴

杏仁 皂莢 紫蘇梗 桔梗

治法彙一卷

氣虛補之

補母甘草 人參 升麻 黃耆 山藥

潤燥蛤蚧 阿膠 貝母 百合 麥門冬

天花粉 天門冬

欬肺烏梅 粟殼 芍藥 倍子 五味子

本熱清之

清金黃芩 知母 梔子 沙參 麥門冬

天門冬 紫苑

本寒溫之

溫肺丁香 藿香 欬冬花 白豆蔻

檀香 益智 宿砂 糯米 百部

標宜散之解表麻黃 葱白 紫蘇

腎藏志屬水為天一之源主聽主骨主二陰

本病諸寒厥逆骨疼腰痛腰冷如水足腫胕寒

少腹滿急疝瘕大便閉泄吐利穢水液澄澈清

冷不禁消渴引飲

標病發熱不惡熱頭眩頭痛咽痛舌燥脊股後

廉痛

治法集一卷

水瀉瀉之瀉干大戟 牽牛

瀉腑瀉瀉 猪苓 防風 車前子 茯苓

水弱補之補母人參 山藥

氣 知母 玄參 砂仁 補骨脂 苦參

血 黃蘗 利杞 瑣陽 肉苁蓉 阿膠

山茱萸 五味子

本熱攻之下傷寒少陰證口燥咽乾大承氣湯

本寒溫之

溫裏附子 乾薑 官桂 蜀椒 白朮

標宜散之解表獨活 桂枝 麻黃 細辛

標熱涼之清熱玄參 連翹 甘草 猪鬃

命門為相火之源天地之始藏精生血降則為

漏升則為鈐至三焦元氣

本病前後癰閉氣逆裏急疝瘕奔豚消渴淋

精漏精寒赤白濁溺血崩中帶漏

火瀉瀉之瀉相火黃蘗 知母 茯苓 玄參

牡丹皮 地骨皮 生地黄 寒水石

火弱補之

治法集一卷

益陽附子 肉桂 益智子 沉香 硫黃

破故紙 天雄 川烏頭 烏藥 胡桃

陽起石 丹砂 舶茴香 當歸 蛤蚧

巴戟天 覆盆子

精脫固之滋滑牡蠣 芡實 金縷子 遠志

山茱萸 蛤粉 五味子

三焦為相火之用分部命門元氣主升降出入

遊行天地之間總領五臟六腑營衛經絡內外

上下左右之氣號中清之府上主納中主化下

主出

本病諸熱、脊疼、暴病、暴死、暴瘡、躁擾、狂越、譫妄、驚駭、諸血溢、血泄、諸氣逆、衝上、諸瘡瘍、痘疹、癰核、

上熱則喘滿、諸嘔吐、酸胸、痞脇痛、食飲不消、頭上出汗、

中熱則善饑而瘦、解體中滿、諸脹腹大、諸病有聲鼓之如鼓、上下關格不通、霍亂吐利、

下熱則暴注下迫、水液渾濁、下部腫滿、小便淋

治法集一卷

瀝或不通、大便閉結、下痢、

上寒則吐、飲食痰水、胸痺、前後引痛、食已還出、

中寒則飲食不化、寒脹反胃、吐水、濕瀉、不渴、

下寒則二便不禁、臍腹冷、疝痛、

標病惡寒、戰慄如喪神守、耳鳴、耳聾、噤腫、喉痺、

諸病、胸腫、疼酸、驚駭、手小指次指不用、

實火瀉之、汗麻黃、柴胡、葛根、荊芥、

升麻、薄荷、羌活、石膏、

吐瓜蒂、滄鹽、麤汁、下人黃、芒硝、

虛火補之、上人參、天雄、桂心、

中人參、黃耆、丁香、木香、草果、

下附子、桂心、硫黃、人參、沉香、

烏藥、破故紙、

本熱寒之、上黃芩、連翹、梔子、知母、

玄參、石膏、生地黃、

中黃連、連翹、生苳、石膏、

下黃蘗、知母、生苳、石膏、地骨皮、

牡丹皮、

治法集一卷

標熱散之、解表柴胡、細辛、荊芥、羌活、

葛根、石膏、

膽屬木、為少陽相火、發生萬物、為決斷之官、十

二臟之主、主同肝、

本病、口苦、嘔苦汁、善太息、澹澹如人將捕之狀、

目昏不眠、

標病、寒熱往來、痞瘧、胸脇痛、頭額痛、耳痛、鳴聾、

癰癰、結核、馬刀、足小指次指不用、

實火瀉之、瀉膽龍膽、牛膽、猪膽、生熟仁、

生酸棗仁 黃連 苦茶

虛火補之溫膽人參 細辛 半夏 炒麤仁

當歸 酸棗仁炒 地黃

本熱平之

降火黃芩 黃連 芍藥 連翹 甘草

鎮驚黑鉛 水銀

標熱和之

和解柴胡 芍藥 黃芩 半夏 甘草

胃屬土主容受為水穀之海土同

治法彙一卷 要 二十九

本病噎膈反胃中滿腫脹吐瀉瀉利霍亂腹痛

消中善饑不消食傷飲食胃管當心痛支兩脇

標病發熱蒸蒸身前熱身前寒發狂譫語咽痺

上齒痛口眼歪斜鼻痛軌衄赤瘡

胃實瀉之濕熱大黃 芒硝

飲食巴豆 神麴 山查 阿魏 硃砂

鬱金 三稜 輕粉

胃虛補之濕熱蒼朮 白朮 半夏 茯苓

橘皮 生薑

寒濕乾薑 附子 草果 官桂 丁香

肉豆蔻 人參 黃耆

本熱寒之降火石膏 地黃 犀角 黃連

標熱解之解肌升麻 葛根 豆豉

大腸屬金主變化為傳送之官

本病大便閉結泄痢下血裏急後重疽痔脫肛

腸鳴而痛

標病齒痛喉痺頸腫口乾咽中如核軌衄目黃

手大指次指痛宿食發熱寒慄

治法彙一卷 要 三十

腸實瀉之熱 大黃 芒硝 桃花 牽牛

巴豆 石膏 郁李仁

氣 枳殼 木香 橘皮 檳榔

腸虛補之氣 皂莢

燥 桃仁 麻黃 杏仁 地黃 乳香

松子 當歸 肉苁蓉

濕 白朮 蒼朮 半夏 礞黃

陷 升麻 葛根

龍骨 白朮 訶子 栗殼 烏梅

白礬 赤石脂 禹余糧 石榴皮

本熱寒之清熱秦朮 槐角 地黃 黃芩

本寒溫之溫裏乾薑 附子 肉豆蔻

標熱散之解肌石膏 白芷 升麻 葛根

小腸主分泌水穀爲受盛之官

本病大便水穀不利小便短小便閉小便血小便

便自利大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止

標病身熱惡寒噤痛頰腫口糜耳聾

實熱瀉之氣 木通 猪苓 滑石 瞿麥

治法彙一卷

三十一

澤瀉 燈草

血 地黃 蒲黃 赤茯苓 梔子 丹皮

虛寒補之氣 白朮 棟實 茴香 砂仁

神曲 扁豆

血 桂心 玄胡索

本熱寒之

降火黃蘗 黃芩 黃連 連翹 梔子

標熱散之解肌藁本 羌活 防風 蔓荊子

膀胱主津液爲胞之府氣化乃能出號州都之

官諸病皆干之

本病小便淋瀝或短數或黃赤或白或遺失或

氣痛

標病發熱惡寒頭痛腰脊強鼻塞足小指不用

實熱瀉之泄火滑石 猪苓 澤瀉 茯苓

下虛補之熱 黃蘗 知母

寒 桔梗 升麻 益智 烏藥 山茱萸

本熱利之降火地黃 梔子 茵陳 牡丹皮

黃蘗 地骨皮

治法彙一卷

三十二

標寒發之發表麻黃 桂枝 羌活 蒼朮

防已 黃耆 木賊

七方

岐伯曰氣有多少形有盛衰治有緩急方有大

小又曰病有遠近症有中外治有輕重近者奇

之遠者偶之汗不以奇下不以偶補上治上制

以緩補下治下制以急近而奇偶制小其服遠

而奇偶制大其服大則數少小則數多多則九

之少則一之奇之不去則偶之偶之不去則反

佐以從之。所謂寒熱溫涼反從其病也。○王冰曰：臟位有高下，腑氣有遠近，病症有表裏，用藥有輕重。單方為奇，復方為偶。心肺為近，腎肝為遠。脾胃居中，腸膀胱膽亦有遠近。識見高遠，權以合宜。方奇而分量偶，方偶而分量奇，近而奇偶，制多數服之；遠而奇偶，制少數服之。則肺服九，心服七，脾服五，肝服三，腎服一，為常制也。方與其重也，寧輕；與其毒也，寧善；與其大也，寧小。是以奇方不去，偶方主之；偶方不去，則反佐以

治法彙一卷

三十三

同病之氣而取之，如口瘡服涼藥不効，反噤官桂，服理中湯之類是也。完素曰：流變在乎病，主病在乎方，制方在乎人，方有大小，緩急奇偶，複也。制方之體，本乎氣味，寒熱溫涼四氣生于天，酸苦辛鹹甘淡六味成于地，是有形為味，無形為氣。氣為陽，味為陰。辛甘發散為陽，酸苦湧泄為陰。鹹味湧泄為陰，淡味滲泄為陽。或收或散，或緩或急，或燥或潤，或硬或堅，各隨臟腑之症而施藥之品味，乃分七方之制也。故奇偶複三

方也。大小緩急者，四制之法也。故曰：治有緩急，方有大小。

大方岐伯曰：君一臣二，佐九，制之大也；君一臣三，佐五，制之中也；君一臣二，佐三，制之小也。又曰：遠而奇偶，制大其服；近而奇偶，制小其服。大則數少，小則數多。多則九之，少則二之。完素曰：身表為遠，裏為近。大小者，制奇偶之法也。假如小承氣湯，調胃承氣湯，奇之小方也；大承氣湯，抵當湯，奇之大方也。因其攻裏而用之也，桂枝

治法彙一卷

三十四

麻黃偶之小方也。葛根青龍偶之大方也。因其發表而用之也，故曰：汗不以奇，下不以偶。張從正大方有二：有君一臣二佐九之大方，病有兼症而邪不一，不可以三味治者宜之；有分量大而頓服之大方，肝腎及下部之病，道遠者宜之。王太僕以心肺為近，腎肝為遠，脾胃為中，則河間以身表為遠，身裏為近，以予觀之，身半以上其氣上天之分也，身半以下其氣下地之分也。中皖人之分也。

小方從正曰小方有二有君一臣二之小方病無禁症邪氣專一可以一二味治者宜之有分兩少而頓服之小方心肺及在上之病者宜之徐徐細呷是也完素曰肝腎位遠數多則氣緩且牽制不能速達于下必大劑而數少取其迅急下走也心肺位近數多則氣急下走不能升發于上必小劑而數多取其易散而上行也王氏所謂肺服九心服七脾五肝三乃五臟生成之數也

治法集一卷要

三十五

緩方岐伯曰補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄適其病所遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也王冰曰假如病在腎而心氣不足服藥宜急過之不以氣味飼心腎藥凌心心復益衰矣餘上下遠近例同完素曰聖人治上不犯下治下不犯上治中上下俱無犯故曰誅伐無過命曰大惑好古曰治上必妨下治表必違裏用黃芩以治肺必妨脾用茯苓以治腎必妨心服乾姜以治中必

僭上服附子以補火必涸水從正曰緩方有五有甘以緩之之方甘草糖蜜之屬是也病在胸膈取其畱戀也有丸以緩之之方比之湯散其行遲慢也有品味件多之緩方藥衆則遞相拘制不得各騁其性也有無毒治病之緩方無毒則性純功緩也有氣味俱薄之緩方氣味薄則長于補上治上比至其下藥力已衰矣

急方完素曰味厚者為陰味薄為陰中之陽故味厚則下泄味薄則通氣味厚者為陽氣薄為陽中之陰故氣厚則發熱氣薄發泄是也好古曰治主宜緩緩則治其本也治客宜急急則治其標也表裏汗下皆有所當緩有所當急從正曰急方有四有急病急攻之急方中風關格之病是也有湯散蕩滌之急方下因易散而行速也

有毒藥之急方毒性能上涌下泄以奪病勢也有氣味俱厚之急方氣味俱厚直趨于下而力不衰也

奇方王冰曰單方也從正曰奇方有二有獨用

一藥之奇方病在上而近者宜之有藥合陽
一三五七九之奇方宜下不宜汗完素曰假如
小承氣湯奇之小方也大承氣抵當湯奇之大
方也所謂因其攻下而爲之也桂枝麻黃偶之
小方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發散
而用之也

偶方偶方有三有兩味相配之偶方有古方相
合之偶方古謂複方病在下而遠者宜之有藥
合陰數二四六八十之偶方宜汗不宜下王太

治法彙一卷

三十

僕言汗藥不以偶則陽氣不足以外發下不以
奇則藥毒攻而致過意者下本易行故單則力
孤而微汗或難出故併行則力齊而大乎而仲
景制方桂枝汗藥反以五味爲奇大承氣湯下
藥反以四味爲偶豈臨事制宜復有增損乎
複方奇之不去則偶方是謂重方好古曰奇之
不去複以偶偶之不去複以奇故曰複複者再
也重也所謂十補一瀉數瀉一補也又傷寒見
風脉傷風見寒脉爲脉症不相應宜以複方主

之正曰複方有三有二方或三方或數方
合之複方如桂枝二越疑一湯五積散之屬是
也有本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹
薄荷黃芩梔子爲涼膈散之類是也有分量均
齊之複方如胃風湯各等分之屬是也王太僕
以偶爲複方今七方中有偶又有複豈非偶乃
二方相合複乃數方相合之謂乎

十劑

徐之才曰藥有宣通補洩輕重潤滑燥濕十種
治法彙一卷

三十

是用藥之大體而本經不言後人未述凡用藥
者審而詳之則靡所遺失矣

宣劑之才曰宣可去壅生薑橘皮之類也梟曰
外感六淫之邪欲傳入裏三陰實而不受逆于
胸中天分氣分窒塞不通而或噦或嘔所謂壅
也三陰者脾也故必破氣藥如薑橘霍枳半夏
之類瀉其壅塞從正曰但人以宣爲瀉又以宣
爲通不如十劑之中已有瀉與通矣仲景曰春
病在頭大法宜吐是宣劑卽涌劑也經曰高者

因而越之。水鬱達之。宜者升而上也。以爲
曰宜是矣。凡風癰中風胸中諸實痰飲寒結胸
中熱鬱上而不下。久則咳喘滿脹水腫之病生
焉。非宣劑莫能愈也。吐中有汗。如引涎追淚嚏
鼻。凡上行者之類。皆吐法也。完素曰。鬱而不散
爲壅。必宣以散之。如痞滿不通之類。是矣。攻其
裏則宜者。上也。泄者。下也。涌劑則瓜蒂。卮子之
屬是矣。發汗通表亦同時。珍曰。壅者塞也。宣者
布也。散也。鬱塞之病。不升不降。傳化失常。或鬱
治法彙一卷 要 三九

通利。才曰。通可去滯。通草防已之屬是也。
素曰。留而不去。必通以行之。如水病痰澀之類。
以木通防已之屬。攻其滯。則留者行也。滑石茯
苓。羌花甘遂。大戟。牽牛之類是也。從正曰。通者
流通也。前後不得洩便。宜木通海金沙。琥珀。大
黃之屬。通之。痺痛鬱滯。經隧不利。亦宜通之。時
珍曰。滯留滯也。濕熱之邪。留于氣分。而爲痛痺。
癰閉者。宜淡滲之劑。上助肺氣下降。通其小便。
而洩氣中之滯。木通猪苓之類是也。濕熱之邪。
留于血分。而爲痛痺腫注。二便不通者。宜苦寒
之藥。下引通其前後。而洩血中之滯。防已之類
是也。經曰。味薄者通。故淡味之藥。謂之通劑。
補劑之才曰。補可去弱。人參羊肉之屬是也。果
曰。人參甘溫。能補氣虛。羊肉甘熱。能補血虛。羊
肉補形。人參補氣。凡氣味與二藥同者。皆是也。
從正曰。五臟各有補瀉。五味各補其臟。有表虛
裏虛。上虛下虛。陰虛陽虛。氣虛血虛。經曰。精不
足者。補之以味。形不足者。溫之以氣。五穀。五菜

五男五肉皆補養之物也時珍曰經云不足者補之又云虛者補之又云虛則補其母生薑之辛補肝炒塩之鹹補心甘草之甘補脾五味子之酸補肺黃栢之苦補腎又如茯神之補心氣生地黃之補心血人參之補脾氣白芍藥之補脾血黃芪之補肺氣阿膠之補肺血杜仲之補腎氣熟地黃之補腎血芎藭之補肝氣當歸之補肝血之類皆補劑不特人參羊肉爲補也洩劑之才曰洩可去閉葶藶大黃之屬是也果

治法彙一卷

要

四十一

曰葶藶苦寒氣味俱厚能洩肺之閉又泄大腸大黃走而不守一能洩血閉腸胃渣穢之物一洩氣閉利小便一洩血閉利大便凡與二藥同者皆然從正曰實則瀉之諸痛爲實痛隨利減砒硝大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也其催生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也時珍曰去閉當作去實經云實者瀉之實者瀉其子是矣五臟五味皆有瀉不獨葶藶大黃也肝實瀉以芍藥之酸心實瀉以甘草之甘脾

實瀉以黃連之苦肺實瀉以澤瀉之鹹是矣

輕劑之才曰輕可去實麻黃桂枝之屬是也從正曰風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜解其表內經所謂輕而揚之也癰瘡疥癩俱宜解表汗以泄之毒以薰之皆輕劑也凡薰洗蒸灸熨烙刺破導引按摩皆汗法也時珍曰當作輕可去閉有表閉有裏閉上閉下閉表閉風寒傷營腠理閉密陽氣拂鬱不能外出而爲發熱惡寒頭痛脊強諸病宜輕揚之劑發其汗而表自解也

治法彙一卷

要

四十二

裏閉者火熱鬱抑津液不行皮膚乾閉而爲肌熱煩熱頭痛目腫昏瞶瘡瘍諸病宜輕揚之劑解其肌而火自散也上閉有二一則外寒內熱上焦氣閉發爲咽喉閉痛之症宜辛涼之劑以揚散之則閉自開一則飲食寒冷抑遏揚氣在下發爲胸膈痞滿閉塞之證宜揚其清而抑其濁則痞自泰也下閉有二有陽氣陷下發爲裏急後重數至圊而不便之症但升其陽而大便自順所謂下者舉之也有燥熱傷肺金其臍鬱

閉于上而膀胱閉于下爲小便不利之症以升
麻之類探而吐之上竅通而小便自利矣所謂
病在取之上也

重劑之才曰重可去怯磁石鐵粉之屬是也從
正曰重者鎮絀之謂也怯則氣浮如喪神守而
驚悸氣上硃砂水銀沉香黃丹寒水石之類皆
體重也久病咳嗽涎潮于上形羸不可攻者以
此絀之經云重者因而減之貴其漸也時珍曰
重則凡四有驚氣亂而魂氣飛揚如喪神守者

治法彙一卷

四手

有怒則氣逆而肝火激烈病狂善怒者并鐵粉
雄黃之類以平其肝有神不守舍而多驚健忘
迷惑不寧者宜硃砂紫石英之類以鎮其心有
恐則氣下精志失守而畏人如將捕之者宜磁
石沉香之類以安其腎大抵重劑壓浮火而墜
痰涎不獨治怯也故諸風掉眩及驚癇痰喘之
病吐逆不止及反胃之病皆浮火痰涎爲害俱
宜重劑以墜之

滑劑之才曰滑可去著冬葵子榆白皮之屬是

故利也從正曰大便秘結麻仁郁李之類小
便滑澀宜葵子滑石之類前後不通而陰俱閉
也名曰三焦約約者束也宜先以滑劑潤其燥
然後攻之時珍曰著者有形之邪留著于經
絡臟腑之間也便溺濁帶痰涎胞胎癰瘡之類
是也皆宜滑藥以引去其留著之物此與木通
猪苓通以去滯相類而不同木通猪苓淡滲之
性去濕熱無形之邪葵子榆皮甘滑之性去濕
熱有形之邪故彼曰滯此曰著也大便秘者波
稜牽牛之屬小便澀者車前榆皮之屬精澀
者黃蘗葵子之屬胞絡胎澀者黃葵子王不留
行之屬引痰涎白小便去者半夏茯苓之屬引
瘡毒自小便去者五葉藤萱草根之屬皆滑劑
也半夏南星皆辛而涎滑能洩濕氣通大便蓋
辛能潤能走氣能化液也或以爲燥藥謬矣濕
去上燥非二物性燥也

澀劑之才曰澀可去脫牡蠣龍骨之屬是也完

素曰滑則氣脫如開腸洞泄便溺遺失之類
澀劑以收斂之從正曰寢汗不禁澀以麻黃根
防風滑泄不已澀以豆蔻枯礬木賊罌粟殼喘
嗽上奔澀以烏梅訶子凡酸味同乎澀者收斂
之義也然此種皆先攻其邪而後收之可也時
珍曰脫者氣脫也血脫也精脫也神脫也脫則
散而不收故用酸澀溫平之藥以斂其耗散汗
出亡陽精滑不禁瀉利不止大便不固小便自
遺久嗽亡津皆氣脫也下血不已崩中暴下諸

治法彙一卷

四十五

大失血皆血脫也龍骨牡蠣海螵蛸五味子五
倍子烏梅樗皮阿膠勒罌粟殼蓮房樸灰赤石
脂麻黃根之類皆澀藥也氣脫兼以補氣藥血
脫兼以補血藥及兼氣藥氣者血之帥也脫陽
者見鬼脫陰者目盲此神脫也非澀藥所能收
也

燥劑之才曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是
也土氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以除之桑皮之
屬濕勝于上以苦吐之以淡滲之是也從正曰

積寒久冷吐利腥穢上下所出水液澄澈清冷
此大寒之病宜姜附胡椒輩以燥之脾病濕氣
則白朮陳皮木香蒼朮之屬除之亦燥劑也而
黃連黃柏梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥
濕此內經之本旨也豈獨薑附之儔爲燥劑乎
時珍曰濕有外感有內傷外感之濕雨露嵐霧
地氣水濕襲于皮肉筋骨經絡之間內傷之濕
生于水飲酒食及脾弱固不可執一論也故風
藥可以勝濕燥藥可以除濕淡藥可以滲濕洩

治法彙一卷

四十六

小便可以引濕利大便可以逐濕吐痰涎可以
祛濕濕而有熱苦寒之劑燥之濕而有寒辛熱
之劑燥之不獨桑皮赤小豆爲燥劑也濕去則
燥故謂之燥

潤劑之才曰濕可去枯白石英紫石英之屬是
也從正曰濕者潤濕也雖與滑類又有不同經
曰辛以潤之辛能走氣能化液故也鹽硝味鹹
屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皴揭
之病非獨金化蓋有火以乘之故非潤劑不能

素曰津液一枯五臟痿弱榮衛涸流必濕

神

時珍曰枯者燥也陽明燥金之化秋

令也風熱拂甚則血液枯涸而為燥上燥則渴下燥則結筋燥則強皮燥則揭肉燥則裂骨燥則枯通燥則痿腎燥則消凡麻仁阿膠膏潤之屬皆潤劑也養血則當歸地黃生津則麥冬知母花粉之屬益精則茯苓枸杞之屬若但以石莢為潤劑則偏矣古人以服石為滋補故爾

三錫曰凡診病者必察原由新久胃氣飲食

治法彙一卷

要

四十七

久病有胃氣藥乃驗否則危山野農人晝則力作勞形者多貧賤衣食不足志氣鬱悒傭人僕夫多勞傷僧尼寡婦多鬱結陰陽不和富貴家厚味生痰飲酒動火縱情恣慾多內虛少者血氣旺病易愈老年血氣衰忌尅伐胎產同法嬰兒腸胃脆薄少藥為佳

劉完素曰制方之體欲成七方十劑之用者必本乎氣味也寒熱溫涼四氣生于天酸苦辛鹹甘淡六味成乎地是以有形為味無形為氣氣

為陽味為陰陽氣出上竅陰味出下竅氣化則

精生味化則形長故地產養形形不足者溫之以氣天產養精精不足者補之以味辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲洩為陽辛散酸收甘緩苦堅鹹軟各隨五臟之病而制藥性之品味故方有七劑有十方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用方不對症非方也劑不蠲疾非劑也此乃太古先師設繩墨而取曲直叔世方士乃出規矩以為方

治法彙一卷

要

四十八

圓夫物各有性而制用之變而通之施于品劑其功用豈有窮哉如有因其性為用者有因其所勝而為制者有氣同則相求者有氣相尅則相制者有氣有餘而補不足者有氣相感則以意使者有質同而性異者有名異而實同者故蛇之性上竅而引藥蟬之性外脫而退翳車飲血而用以治血鼠善穿而用以治漏所謂因其性而為用者如此弩牙速產以機發而不括也杵糠下噎以杵築下也所謂因其用而為使

者如此浮萍不沉水可以勝水獨活不搖風可以治風所謂因其所勝而為制也如此麻木穀而治風豆水穀而治水所謂氣相同則相求者如此牛土畜乳可以止渴疾豕水畜心可以鎮恍惚所謂因其氣相尅則相制也如此熊肉振羸兔肝明視所謂其氣有餘補不足也如此鯉之制水驚之利水所謂因其氣相感則以意使者如此蜜成於蜂蜜溫而蜂寒油生於麻麻溫而油寒茲同質而異性也蘼蕪生於芎藭蓬蘽

治法彙一卷

四九

生於覆盆茲名異而實同者也所以如此之類不可勝舉故天地賦形不離陰陽形色自然皆有法象毛羽之類生於陽而屬於陰鱗甲之類生於陰而屬於陽空青法木色青而主肝丹砂法火色赤而主心雲母法金色白而主肺磁石法水色黑而主腎黃石脂法土色黃而主脾故觸類而長之莫不有自然之理也欲為醫者上知天文下知地理中知人事三者俱明然後可以語人之疾病不然則如無目遊談耳是矣

動致顛隕而欲愈疾者未之有也

雷敷炮製叙曰若夫世人使藥豈知自有君臣

既辨君臣寧分相制祇如欸毛今臨雷溺立銷

班腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚挿樹

立便乾枯用狗塗之以大膽灌之插却當榮盛

無名無名異形似玉抑止楚截指而似去甲毛

聖石開盲明目如雲離日當歸止血破血頭尾

效各不同是破血麋子熟生足睡不眠立據弊

單淡鹵常使者鹽中如酒露交即交鐵遇神砂

如泥似粉石經鶴糞化作塵飛杳見橘花似髓

斷絃拆劍遇鸞血而如初以鸞血燒作膠粘海

竭江枯投游波是也而立泛令鈇拒火須伏修

天今呼為如要形堅豈忘紫背有紫背天葵如

紫背青面能留砒住鴨全賴宗心別有宗心草

堅其鈴形雌著芹花其草名為立起

是食者恐誤其草雌著芹花其草名為立起

色青可長三尺已來葉上黃斑立便成瘦礪遇

赤鬚其草名赤鬚草今呼為虎水留金鼎水中

生火非猾髓而莫能油中有獸名曰猾以髓入

可救之用酒噴之長齒生牙賴雄鼠之骨末
即止勿以屋下收生如故髮眉墮落金半夏
若年多不生者取雄鼠脊骨

而立生目辟眼花有五花而自正脚生肉枕程
紫若根生肉軟者取若其根於囊皺旋多夜

煎竹木多小便者夜煎草解體寒腹大全賴鷓
鴒若患腹大如鼓米飲調血泛經過飲調瓜子

甜瓜子仁搗作末咳逆數數酒服熟雄過天雄炮

去山飲之立絕調一錢服遍身瘳風冷調生側附子旁生者為

服之立定也差腸虛瀉痢須假草零提五倍子作末以久渴

治法彙一卷要五十一

心煩宜投竹瀝除癥去塊全伏硝礪硝礪即硝

味於乳鉢中研作粉益食加觴須須盧朴者不食

同吸了酒服神效也飲酒少者煎逆水蘆根并厚強筋健骨須是從

村二味煎湯服之立效也鯉汁九服之可力倍于常也駐色延年精蒸

神錦黃精自然汁件細研神錦于柳木甕中蒸

也知瘡所在口點陰膠許于口中可知臟腑所

起痛乃可產後肌浮甘皮酒服口瘡舌析立

愈黃蘇口瘡舌析以根黃塗腦痛欲亡鼻投硝

蘇蘇炙作末含之立差心痛欲死速覓延胡延胡

蘇蘇炙作末含之立差心痛欲死速覓延胡延胡

如斯百種是藥之功其泰遇明時認看醫
理雖尋法難可窮微略陳藥餌之功能豈溺仙
人之妙術其制藥炮熬煮炙不能記年月哉

氣味陰陽

陰陽應象論曰積陽為天積陰為地陰靜陽躁
陽生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形陽為氣陰
為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形
食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣
氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅清陽發奏

治法彙一卷要五十二

理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑味厚
者為陰薄者為陰中之陽氣厚者為陽薄者為
陽中之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則
發熱辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄
為陰淡味滲洩為陽六者或收或散或緩或急
或潤或燥或更或堅以所利而行之調其氣使
之平也

元素曰清之清者發腠理清之濁者實四肢
濁之濁者歸六腑濁之清者走五臟附于氣

厚爲陽中之陽，大黃味厚，爲陰中之陰，茯苓氣薄，爲陽中之陰，所以利小便，入手太陽不離陽之體也。麻黃味薄，爲陰中之陽，所以發汗，入手太陰，不離陰之體也。凡同氣之物，必有諸味，同味之物，必有諸氣，氣味各有厚薄，故性用不等。梟曰：味之薄者，則通，酸苦鹹平是也。味之厚者，則泄，鹹苦酸寒是也。氣之厚者，發熱，辛甘溫熱是也。氣之薄者，滲泄，甘淡平涼是也。滲謂出汗，泄謂利小便也。宗奭曰：天地既判，生萬物者五氣耳。五氣定位，則五味生。故曰：生物者，氣也。成之者，味也。以奇生則成，而耦以耦生，則成而奇。寒氣堅，故其味可用以與熱氣，與故其味可用以堅。風氣散，故其味可用以收。燥氣收，故其味可用以散。土者，冲氣之所生，冲氣則無所不和，故其味可用以緩。氣堅則壯，故苦可以養氣。脉與則和，故鹹可以養脉。骨收則強，故酸可以養骨。筋散則不攣，故辛可以養筋。肉緩則

甘可以養肉，堅之而後可以與收之而後可以散。欲緩則用甘，不欲則不必用之，不可太過，太過亦病矣。治疾者，必先通乎此，否則能已人之疾者，蓋寡矣。

李杲曰：夫藥有溫涼寒熱之氣，辛甘淡酸苦鹹之味，升降浮沉之相互，厚薄陰陽之不同，一物之內，氣味兼有，一藥之中，理性具焉。或氣一而味殊，或味同而氣異。氣象天溫熱者，天之陽，涼寒者，天之陰。天有陰陽，風寒暑濕燥火，三陰三陽上奉之也。味象地，辛甘淡者，地之陽，酸苦鹹者，地之陰。地有陰陽，金木水火土生長收藏，下應之。氣味薄者，輕清成象，本乎天者，親上也。氣味厚者，重濁成形，本乎地者，親下也。好古曰：本草之味有五，氣有四，然一味之中，有四氣，如辛味則石膏寒，桂附熱，半夏溫，薄荷涼，之類是也。夫氣者，天也。溫熱，天之陽，寒涼，天之陰。陽則升，陰則降。味者，地也。辛甘淡，地之陽，酸苦鹹，地之陰。陽則浮，陰則沉。有使

氣者使味者氣味俱使者先使氣而後使味者先使味而後使氣一物一味者一物三味者一物一氣者一物二氣者或生熟異氣味或根苗異氣味或溫多而成熱或涼多而成寒或寒熱各半而成溫或熱者多寒者少寒不爲之寒或寒者多熱者少熱不爲之熱不可一途而取也或寒熱各半晝服則從熱之屬而升夜服則從寒之屬而降或晴則從熱陰則從寒變化不一如此况四時六位不同

治法第一卷要

五十五

五運六氣各異可以輕用爲哉

六節臟象論曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味

王冰曰五氣者臊氣奏肝焦氣奏心香氣奏脾腥氣奏肺腐氣奏腎也心榮色肺主音故氣藏於肺而明也彰聲也氣爲水之母故味

藏于腸胃而養五氣孫思邈曰精以食氣氣養精以榮色形以食味味養形以生力精順五氣以靈形受五味以成若食氣相反則傷精食味不調則損形是以聖人先用食禁以存生後制藥物以防命氣味溫補以存精形

五味宜忌

岐伯曰水生酸火生苦土生甘金生辛水生鹹辛散酸收甘緩苦堅鹹潤毒藥攻邪五穀爲養五果爲助五畜爲益五菜爲充氣合而服之以

治法第一卷要

五十六

補精益氣此五味各有所利四時五臟病隨所宜也又曰陰之所生本在五味陰之五官傷在五味骨正筋柔氣血以流腠理以密骨氣以清長有天命又曰聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根二氣常存春食涼夏食寒以養陽秋食溫冬食熱以養陰

五欲

肝欲酸心欲苦脾欲甘肺欲辛腎欲鹹此五味合五臟之氣

五宜

青色宜酸肝病宜食麻犬李韭赤色宜苦心
病宜食麥羊杏薤黃色宜甘脾病宜食粳牛
棗葵白色宜辛肺病宜食黃黍雞桃葱黑色
宜鹹腎病宜食大豆黃卷猪粟藿

五禁

肝病禁辛宜食甘粳牛棗葵心病禁鹹宜食
酸麻犬李韭脾病禁酸宜食鹹大豆豕栗藿
肺病禁苦宜食酸麥羊杏薤腎病禁甘宜食辛
黃黍雞桃葱思邈曰春宜省酸增甘以養脾

治法彙一卷

五七

夏宜省苦增辛以養肺秋宜省辛增酸以養
肝冬宜省鹹增苦以養心四季以省甘增鹹
以養腎時珍曰五欲者五味入胃喜歸本臟
有餘之病宜本味以通之五禁者五臟不足
之病畏其所勝而宜其所不勝也

五走

酸走筋筋病毋多食酸多食令人癰酸氣澁
收胞得酸而縮卷故水道不通也苦走骨骨
病毋多食苦多食令人變嘔苦入下脘三焦

皆閉故變嘔也甘走肉肉病毋多食甘多食
令人悅心甘氣柔閤胃柔則緩緩則蟲動故
悅心也辛走氣氣病毋多食辛多食令人洞
心辛走上焦與氣俱行久留心下故洞心也
鹹走血血病毋多食鹹多食令人渴血與鹹
相得則凝則胃汁注之故咽路焦而舌本乾
○九鍼論作鹹走骨骨病毋多食鹹苦走血
血病毋多食苦

五傷

治法彙一卷

五八

酸傷筋辛勝酸苦傷氣鹹勝苦甘傷肉酸勝
甘辛傷皮毛苦勝辛鹹傷血甘勝鹹

五過

味過于酸肝氣以津脾氣乃絕肉抵傷膠而
唇揭味過于苦脾氣不濡胃氣乃厚皮稿而
毛拔味過于甘心氣喘滿色黑腎氣不平骨
痛而髮落味過于辛筋脉阻弛精神乃央筋
急而爪枯味過于鹹大骨氣勞短肌心氣抑
脉凝澁而變色時珍曰五走五傷者本臟之

味自傷也。卽陰之五官傷在五味也。五過者本臟之味伐其所勝也。卽臟氣偏勝也。

五味偏勝

岐伯曰：五味入胃，各歸所喜。酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，鹹先入腎。久而增氣，物化之常。氣增而久，天之由也。

王冰曰：入肝爲溫，入心爲熱，入肺爲清，入腎爲寒。入脾爲至陰，而四氣兼之，皆爲增其味，而益其氣。故各從本臟之氣，久則從化，故久

治法彙一卷

卷九

服黃連苦參反熱，從苦化也。餘味倣此。氣增不已，則臟氣偏勝，必有偏絕。臟有偏絕，必有暴天。是以藥不具五味，不備四氣，而久服之，雖暫獲勝，久必致天。故絕粒服餌者，不暴亡無五味資助也。果曰：一陰一陽之謂道，偏陰偏陽之謂疾。陽劑剛勝，積若燎原，爲消狂癰疽之屬。則天癸竭而榮涸，陰劑柔勝，積若凝水，爲洞泄寒中之病。則真火微而衛散，故大寒大熱之藥，當從權用之，氣平而止，有所偏

助，令人臟氣不平，天之由也。

標本陰陽

李杲曰：夫治病者，當知標本。以身論之，外爲標，內爲本。陰爲標，陽爲本。故六腑屬陽爲標，五臟屬陰爲本。臟腑在內爲本，十二經絡在外爲標。而臟腑陰陽血氣經絡，又各有標本焉。以病論之，先受爲本，後傳爲標。故百病必先治其本，後治其標。否則邪氣滋甚，其害益蓄。縱先生輕病，後生重病，亦先治其輕，後治其重，則邪氣乃伏。

治法彙一卷

卷十

有中滿及病大小便不利，則無問先後標本，必先治滿及大小便爲其急也。故曰：緩則治其本，急則治其標。又從前來者爲實邪，後來者爲虛邪。實則瀉其子，虛則補其母。假如肝受心火爲前來實邪，當於肝經刺榮穴，以瀉心火爲先治其本。於心經刺榮穴，以瀉心火爲後治其標。用藥則入肝之藥爲引，用瀉心之藥爲君。經曰：本而標之，先治其本，後治其標，是也。又如肝受腎水爲虛邪，當於腎經刺井穴，以補肝木爲先治

其後于肝經刺合穴以瀉腎水為後治其本
用藥則入腎之藥為引補肝之藥為君經云標
而本之先治其標後治其本是也

升降浮沉

李杲曰藥有升降浮沉化生長收藏成以配四
時春升夏浮秋收冬藏土居中化是以味薄者
升而生氣薄者降而收氣厚者浮而長味厚者
沉而藏氣味平者化而成但言補之以辛甘溫
熱及氣味之薄者即助春夏之升浮便是瀉秋

治法彙一卷

要

冬收藏之藥也在人之身肝心是矣但言補之
以酸苦鹹寒及氣味之厚者即助秋冬之降浮
便是瀉春夏生長之藥也在人之身肺腎是矣
淡味之藥滲即為升泄即為降佐使諸藥者也
用藥者循此則生逆此則死縱令不死亦厄困
矣○王好古曰升而使之降須知抑也沉而使
之浮須知載也辛散也而行之也橫甘發也而
行之也上苦泄也而行之也下酸收也其性縮
鹹與也其性舒其不同如此鼓掌成聲添火成

二藥相合象在其間矣五味相制四氣相和
其變可輕用哉本草不言淡味涼氣亦缺文也
味薄者升甘平辛平辛微溫微苦平之藥是
也

氣薄者降甘寒甘涼甘淡寒涼酸溫酸平鹹
平之藥是也

氣厚者浮甘熱辛熱之藥是也

味厚者沉苦寒鹹寒之藥是也

氣味平者兼四氣四味甘平甘溫甘涼甘辛平

治法彙一卷

要

甘微苦平之藥是也

李時珍曰酸鹹無升甘辛無降寒無浮熱無沉
其性然也而升者引之以鹹寒則沉而直達下
焦沉者引之以酒則浮而上至顛頂此非窺天
地之與而達造化之權者不能至此一物之中
有根升稍降生升熟降是升降在物亦在人也

四時用藥例

李時珍曰經曰必先歲氣毋伐天和又曰升降
浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春月宜加辛

濕之藥、薄荷、荆芥之類、以順春升之氣、夏月宜
加辛熱之藥、香薷、生薑之類、以順夏浮之氣、長
夏宜加甘苦辛溫之藥、人參、白朮、蒼朮、黃蘗之
類、以順化成之氣、秋月宜加酸溫之藥、芍藥、烏
梅之類、以順秋降之氣、冬月宜加苦寒之藥、黃
芩、知母之類、以順冬沉之氣、所謂順時氣而養
天和也、經又云、春省酸、增甘、以養脾氣、夏省苦
增辛、以養肺氣、長夏省甘、增鹹、以養腎氣、秋省
辛、增酸、以養肺氣、冬省鹹、增苦、以養腎氣、此則
治法彙一卷要

六

既不伐天和而又防其太過、所以禮天地之大
德也、昧者捨本從標、春用辛涼、以伐木、夏用鹹
寒、以抑火、秋用苦溫、以泄金、冬用辛熱、以涸水、
謂之時藥、殊背素問逆順之理、以夏月伏陰、冬
月伏陽、推之可知矣、雖然、月有四時、日有四時、
或春得秋病、夏得冬病、神而明之、機而行之、變
通權宜、又不可泥一也、王好古曰、四時總以芍
藥為肝劑、蒼朮為胃劑、柴胡為脾劑、十一臟皆
取決於少陽、為發生之始、故也、凡用純寒純熱

之藥、必與藥相雜、並宜用甘草、以調和之、惟中
滿者、禁用甘爾、

妊娠服藥

蛇斑水蛭及蜚蠊、烏頭、附子、配天雄、野葛、水銀、
并巴豆、牛膝、薏苡、與蜈蚣、三稜、代赭、芫花、麝、大
戟、蛇蛻、黃雌雄、牙硝、芒硝、牡丹、桂、槐花、牽牛、皂
角、同半、夏南星、與通草、瞿麥、乾薑、桃仁、通、礪、砂、
乾漆、蟹甲、爪、地膽、茅根、莫用好、

引經藥報使

治法彙一卷要

六

小腸膀胱屬太陽、藥本羌活是本鄉、三焦膽與
肝包絡、少陽厥陰、柴胡、強、大腸陽明、並足胃、葛
根、白芷、升麻、當、太陰肺、脈中焦起、白芷、升麻、葛
根、白鄉、脾經、少與肺、部異、升麻、兼之、白芍、詳、少陰
心經、獨活、主、腎經、獨活、加桂、良、通經、用此、藥為
使、豈有何病、到膏肓、

六陳

藥有六味、陳久者良、狼、萊、半、橘、枳、實、麻、黃、
狼、青、萊、莢、半、夏、橘、皮、也、

十八反

本草名言十八反半萸貝欬芫攻烏

謂半夏瓜蒌貝母白芨白欬與烏頭相反

藻戟遂芫俱戰草

海藻大戟甘遂芫花俱與甘草相反

諸參辛芍叛藜蘆

苦參人參沙參玄參細辛芍藥俱與藜蘆相

反凡湯藥凡散中不可合用也若要令反而

吐者則不忌也

治法彙一卷要

六十五

十九畏

硫黃元是火之精朴硝一見便相爭水銀莫與

砒相見狼毒最怕蜜陀僧巴豆性裂最為上偏

與牽牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京

三稜川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂

善能調冷氣若逢石脂便相欺大凡修合看逆

順炮熅炙燂要精微

卒中暴厥 中風 中氣 中食

中寒 中惡

中痰

世以卒然仆倒昏不知人為中風以卒死者為

中脫痰涎壅盛者為痰厥不知真氣太弱痰火

泛上者十居八九若虛極而陽暴脫則尿出而

尿尖急瀉參耆膏加竹瀝薑汁灌之外用皂角

細辛菖蒲為末吹入鼻取嚏有嚏可治無則不

治以此可驗其淺深凶吉速于臍下大艾灸之

亦有尿出而補接得活者誤用他藥即無生意

中氣有因暴怒而厥者名中氣輕者用烏藥順氣

散重者蘇合香丸竹瀝薑汁調挾開口灌之

治法彙一卷要

六十六

中食忽然仆倒不可遽認為風須仔細推詳詢之

曾動怒否曾用食否如氣口緊盛其人飲食之

際忽因氣惱或惱後吃食或食後胃寒即不能

運化停積胃口塞滯心竅正氣不通則手足無

所措而昏冒卒倒也急以鹽湯探吐吐淨審因

用藥因外邪藹香正氣散氣滯則八味順氣湯

吐後別無他瘥只用平胃二陳加白朮神翹麥

藥調理

痰涎壅盛脈沉滑或洪名痰厥從類中治痰

法

暑月忽厥為暑風從暑治

寒月忽厥為中寒從陰瘡治

素弱人夜行或入神堂古廟吊喪登塚或入

久空房屋為陰邪所逼而昏冒不知人名中惡

急灌蘇合香丸或藿香正氣散不用秦承祖

灸鬼法內服參耆湯

諸中或未甦或已甦或久病忽吐山紫紅色者

灰

治法彙一卷

六十七

傳心方云治男婦涎潮于心卒然暈倒當即時

扶入暖室正坐當面作好醋炭熏之令醋氣衝

入口鼻良久其涎自下而甦唯不可與一滴湯

水入喉涎得湯水繫于心絡不能去必成廢人

西北二方地高風勁真為風所中有之其脉必

浮乃是

治法彙要卷之

終

治法彙

肝江 張三錫 纂

金壇 王肯堂 校

氣一

張三錫曰作脹膈懣痞塞上下刺痛皆濁氣為

患然一元之清氣原中和一或偏傷氣病立見

隨其所應以法治之中病即止如伐強暴稍平

即行安撫庶黎庶遂生不傷元氣善乎古語曰

青皮破滯氣多服損真氣 枳殼瀉滯氣過用

治法彙一卷

六十八

損至高之氣香附散鬱氣須製過 木香調諸

經氣兼瀉肺 橘紅專瀉 陳皮兼補 厚朴

平胃氣 前胡下氣推陳 沉香升降諸氣

烏藥紫蘇川芎俱能散氣使濁氣從汗散 檳

榔大腹能使濁氣下墜後重有積宜之 蘿腹

蘇子杏仁下氣潤燥氣滯有火宿滯不下妙品

豆蔻沉香丁香檀香麝香俱辛熱能散鬱氣

暴得者宜用稍久成火忌之須炒山梔從治

以上皆疎通一切有餘之氣要藥兼痰火兼積

滯氣經血有餘不足各隨加減

又曰調氣用木香木香性溫氣上升如氣鬱而不達固宜用之如陰火衝上阻塞有如氣滯而用之則反助火邪必用黃柏知母少佐木香陰虛氣滯四物加玄參黃柏知母稟壯氣實氣不順而刺痛當用枳殼烏藥不已加木香若肥白人氣刺痛古方用參木枳殼木香愚意爲先用二陳平胃枳殼果氣弱不應脈微弱者卽當用之肥人氣滯必有痰以二陳二木香附

治法彙一

氣門

川芎燥以開之瘦人氣滯必有火且燥宜降以潤之蘇子萊菔子梔子歸芍之類婦女性執多偏屬陰氣易於動如痞悶脹痛上湊心胃或攻築脇肋腹中結塊月水不調或眩暈嘔吐往來寒熱一切氣候正氣天香散或四七湯酌用之如氣不升降痰涎壅塞蘇子降氣湯佳古方木香流氣飲治清濁不分膨脹浮腫二便不利藥雖二十四味無非破氣分利似難執方因時制宜可也

氣本屬陽內榮臟腑外克皮毛生生不息如五志過極七情交攻乖戾失常清者遽變而爲濁行者抑遏而反常表失衛護而不和內失健悍而少降隨其所感疾候應之爲治者須審虛實新久起初稍加辛散後必從治所謂氣有餘便成火者以性屬陽故也

氣不歸元破故紙爲主白朮亦可以其能和胃胃和則氣歸元

氣不升降香附炒半斤橘紅六兩甘草一兩爲

治法彙一

氣門

粗末薑棗煎湯每服四錢大効

四七湯 治喜怒悲思憂恐之氣結成痰

涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此鬱悒所致也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上下喘急或因痰飲中阻嘔逆惡心並宜服

半夏 茯苓 厚朴 蘇

右薑七片棗一枚煎服

若思慮過度小便白濁此 下青州白丸子

治惡阻大効

分心氣飲 治一切氣病

紫蘇葉 半夏 青皮 陳皮 大腹皮

赤茯苓 桑皮 芍藥 甘草 木通

古方有羌活肉桂薑棗隨時加減或加越鞠

三味

蘇子降氣湯 治陽虛上攻氣不升降痰涎壅

盛

蘇子錢半 厚朴 陳皮 半夏 前胡

和法藥一卷氣門 七十一

肉桂各一錢 甘草五分

右薑三片煎服

流氣飲子 治男婦五臟三焦氣壅心腎痞悶

咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘

急喘嗽痰盛面目四肢浮腫二便秘塞及

治憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成

疾又治脚氣腫痛上喘作脹大便不通及

氣攻肩背臂脇走注疼痛

蘇葉 青皮 當歸 芍藥 烏藥

茯苓 桔梗 半夏 川芎 黃蘗

枳實各七分 防風 甘草 陳皮

木香 連皮大腹子各五分

右薑三片棗一枚水煎服

橘皮一物湯 治諸氣攻刺及感風寒暑濕初

症通用凡酒食所傷中脘痞塞防悶嘔吐

吞酸

橘皮洗淨

右用新汲水煎服

和法藥一卷氣門 七十二

解五臟結氣益少陰經血用梔子炒令黑爲末

以薑汁入湯同煎飲其効如神氣有餘便

是火此方得之矣

治實熱在內有如氣滯

知母 黃連 黃栢 黃芩 枳殼各等分

右水煎服

鹽煎散 治一切冷氣攻冲膏腹刺痛不已及

脾胃虛冷嘔吐瀉泄

砂仁 甘草 茯苓 草果 肉豆蔻

川芎 茴香 澄茄 麥蘖 檳榔

良薑 枳殼 厚朴 陳皮 羌活

蒼木 各等分

右入鹽少許煎服

正氣天香散

烏藥 錢半 香附 六錢 陳皮 紫蘇

乾薑 各

右白水煎服

青木香丸 治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲

治法藥一卷 氣門 七十三

嘔吐痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛 二十四兩 炒香 取頭末十二兩 木香 三兩 補骨脂 炒

萸澄茄 各四兩 檳榔 酸漿米

右末入牽末令勻以清水和為丸菜豆大每

服三十丸茶湯下氣滯濕痰盛者八効

三因七氣湯 治七氣鬱結五臟之間互相刑

尅陰陽不和揮霍變亂吐利交作

半夏 厚朴 白芍藥 茯苓 各錢

桂心 紫蘇 橘紅 人參 各錢

右水二鍾薑七片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

丹溪曰凡氣在胃臆而為痞滿刺痛伏梁等症者二陳加枳桔黃連木香瓜蒌之類在下而為奔豚七疝等病本方加桃仁山查梔子枳核茴香川棟荔枝之類在兩脇攻築作痛本方加醋製青皮柴胡芍藥膽草之類在中焦而痞滿脹急者本方加木香厚朴檳榔枳殼或用平胃散以平其土氣救阜惟婦人胎前產後一切氣症治法藥一卷 氣門 七十四

須兼四物一二味養血為主兼疎利

脉結澁或沉弦急疾收斂四肢腹脇腰膝牽引

疼痛不能轉側皆由七情鬱滯挫閃傷損謹察

其原隨症疎導

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

五味子 去核 桑皮 茯苓 甘草 炙

草果 大腹皮 陳皮 桔梗

右薑三片水煎服

紫蘇子湯 治思慮過度邪傷脾肺心腹膨脹

及喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲二便不利肺脉虛數而澁

橘半 枳木加人參大腹皮蘇子草果厚

朴木香木通甘草

四炒枳殼丸 治氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼四兩去穢切指頭大分四處一分爲四
枳實四兩去穢切指頭大分四處一分爲四
分難服于同炒一分乾漆同炒止用枳殼爲末將原炒四味煎汁打糊丸桐子大每服五十丸

氣病用氣藥不効者氣之所藏者無以收也蓋

治法彙一卷 氣門

七十五

肺主氣腎藏氣古方木香順氣丸用木香枳殼

陳皮香附牽牛大腹皮蘿藦子青木香丸用牽

牛木香葶澄茄檳榔俱有破故紙皆取其壯腎

氣以收濁氣下歸膀胱使施化而出也

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急胃膈脹痛神

効

人參 檳榔 沉香 天臺烏藥

右四味各磨濃汁小半盞頓溫服本草云四

味磨作湯治胃膈殊効加木香枳殼爲六磨

方氣飲 治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面

目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏三片 青皮去白 厚朴去蘖 紫蘇去梗 香附去毛

甘草各二片 陳皮去白 肉桂不見 蓬木煨 丁香不見

檳榔 麥冬去心 木香不見 草菓各六兩 木通八兩

藿香 白芷 赤茯苓 白朮 木瓜

人參蘆 石菖蒲 大腹皮製各四兩

葛棗煎每服四錢熱服

養正丹 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣

治法彙一卷 氣門

七十六

短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛

自汗唇青婦人血海久冷

水銀 黑錫去滓淨秤與水銀結砂子 硫黃研 硃砂研細

各壹兩

右用黑盞壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀

以柳條攪次下硃砂攪令不見星放下少時

方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸以醋酒

之候冷取出研極細煮糯米糊丸菜豆大每

服叁拾丸鹽湯棗湯任下

三錫曰氣鬱久則中氣傷不宜尅伐神中益氣
佐舒鬱川芎香附枳殼之類胎產後同法

三錫曰難經云血主濡之氣主煦之一切氣病
用氣藥不効少佐芎歸血藥血氣流通而愈乃
屢驗者

二陳湯見痰門 平胃散見脾門
四物湯見血門

血

張三錫曰榮血之行各有常道爲火所迫則錯
亂沸騰而吐衄唾溺等血症作矣有如火急
湯沸勢不可遏火去斯止善乎丹溪之論曰口

治法彙一

血

七七

鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越
出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經矣乃論
血證三脉語

陽明之脉絡鼻是經火盛迫血妄行從鼻出者
曰衄方書言從肺來非也從口湧出者曰吐血
初起洪大犀角地黃湯按犀角性升散能散一
切有餘之火乃陽明經藥故曰如無犀角以升
麻代之今人不知泥於犀角解乎心熱一句不
分輒與四物同用若是實火固爲得宜

陰虛者寧免飛揚之禍歟

原病式曰衄者陽熱拂鬱於足陽明而上蒸
血妄行故鼻衄也

丹溪曰衄血宜涼血行血爲主

犀角地黃湯加鬱金山茶花薑汁童便酒調下
傷寒家得衄爲欲解謂熱隨血去俗曰紅汗是
也詳見本門

一方人中白新瓦上焙乾入麝香少許細酒調
下卽止

治法彙一

血

七八

服犀角不止兼用降藥岑連梔栢丹皮生地玄
參側栢葉赤芍之類選用

衄血後半月一月每洗面卽發是經尚未歸四

物加石菖蒲阿膠蒲黃各半錢煎熟調煨石膏

一錢兼進養正丹

見氣門

失血家須用下劑破血蓋施之于蓄妄之初亡

血家不可下蓋戒之于亡失之後

一應上溢之證若脾胃氣壯不瀉能食者皆當

以大黃醋製和生地黃汁及桃仁泥牡丹皮之

屬引入血分使血下行轉逆為順也最妙法不知此而徒事涼藥四物等脾胃反傷今人治此無一生者此也

捷法

用頭髮皂角水洗淨燒灰竹管吹入鼻內或以酒調服亦可梔子燒灰亦佳○龍骨細研吹入鼻竅血皆効○百草霜吹鼻亦妙○千葉石榴花末吹亦可○蘿蔔上半段杵汁服又以汁注鼻中○薑汁磨墨滴亦効○萱草根洗淨

治法彙一

七九

取汁加薑汁細細呷之治大熱衄血良出本草新義

麝香散

白礬

枯者

白龍骨

枯者

麝香

五分

右三味和勻每用一字先以冷水洗淨鼻中

血涕吹之

白芨散

用白芨不拘多少為末以水調貼鼻梁上

用童便服亦可

按方治衄血往來久不愈

熟地 地骨皮 枸杞子

末每服三錢蜜湯調下日三服

黃湯 治榮中有熱及肺壅鼻衄一切丹

毒

用歸芎生地赤芍白朮煎服衄加蒲黃瘡加黃芩丹毒加防風

伏龍肝半升以新大碗水淘取汁和蜜頓服芎附散 治服諸藥衄不止用茶調下二錢

治法彙一

八十九

川芎

和血通

香附

開鬱行氣使火

散經絡四兩

右共為末

寸金散 治鼻衄不止

土馬踪

即靖頭

甘草

各二錢

黃藥

半兩

右為末每服二錢新汲水下不止再服

又方以井水濕紙搭頂上

治衄不止用緋繩隨左右衄扎中指齊衄俱扎

大衄不止刺少商出血良

冒雨着湯氣所薰或入浴室致衄者及吐者攻

清道則吐、用腎着湯、加川芎妙最
止浴室中、腎着湯 見黑門

傷寒熱極而衄、爲欲愈、以熱隨血去矣、不可遽
止、升麻葛根湯、仲景曰、以桂枝湯治衄、非治衄
也、欲散其榮中熱也、

有負重爲物所壓、或持重遠行、忽心口痛、口鼻
出血、俗名傷力、乃內膜及肺胃係傷損、掙破也、

世人緊用涼藥、愈止愈出、卒至胃損咳嗽而歎
良可嘆息、考古方中、急宜人參末、飛羅麩、童便
治法彙一卷 四吐血 八十一

調下最佳、或以白芨末、童便調下亦可、但不可
用涼藥、爾褚澄曰、飲涼藥則百不一生、服溲溺
則百不一死、信哉、

吐血 屬陽明胃與厥陰肝

初起脉洪大、用犀角地黄湯、調鬱金、黑梔子灰、
或荊芥穗灰、不已、三黃補血湯、

心口脹懣、口中血腥、氣用韭汁、童便、薑汁
飲、其血自清、勢微者、因物用生地、加炒
汗童便、竹瀝、

勢盛脉洪大、吐、用十灰散遏之、次用花蕊石散
消之、後用清血藥、鬱金丹、皮赤芍之類、加降火
凡吐血、胃中覺氣塞滯、吐紫者、挑仁承氣湯下
之以隔有瘀也、

又方童便二分、酒一分、搗側柏葉溫飲之、胃弱
者、陰乾爲末、米飲下、

吐血有因怒而得者、經曰、怒則氣逆、甚則嘔血、
宜平肝降火、炒梔子、青皮、芩連、柴胡、

一切上焦血症、余以四生丸易爲五生飲、大獲
治法彙一卷 吐血 八十一

奇驗、用生韭生藕、或用鮮荷葉、京墨、側柏、生地、
各取汁一盃、對童便、其生地側柏研爛、以童便
和方得汁、

一方髮灰三錢、白湯化、阿膠二錢、入童便生藕
汁、刺薊汁、生地汁、各一盃、好墨汁數匙、頓溫服、
色白人好色、或過勞、氣虛不能攝血、用人參一
味爲末、雞子清投新汲水調下一錢服之、

諸失血後、倦怠昏憤、面失色、懶于言動、濃煎獨
參湯、所謂血脫補氣也、最妙、

大吐血、瀕審病因、不可遽投涼藥、如用方、
撲、嗽、吐、內傷脈絡、口鼻出血、是肺胃上脘有
破、必以白芨或飛羅麵、米飲調、先填注損處、次
用大補氣血、兼消瘀、若誤治必不救、

消瘀用韭汁、桃仁、赤芍、芎歸、牡丹皮、紫金藤、大
黃、滑石、紅花、煎湯、調降香末、白芨末服、

傷酒吐後、有血是酒毒、如胃間作痛、是嘔破胃
管、童便調白芨末、脈數急、心不痛、只作火治、

內損吐血、下血、或飲酒太過、勞傷于內、其血妄
治法彙一卷 吐血 全三

行、出如湧泉、口鼻皆流、須臾不救、即死、用側柏
葉、蒸焙兩半、荆芥穗、燒灰、人參各一兩、為末、加

飛羅麵一錢、新汲水調、如稀糊、不拘時、啜服、

千金方云、吐血有三、有內衄、有肺疽、有傷胃、內

衄者、出血如鼻衄、但不從鼻孔出、是近從心肺

間津液出、流入胃中、如豆羹汁、或如切齧血、凝

停胃中、因積滿悶、便吐、或去數斗、或至一石者、

是也、宜清涼、得之於勞倦、飲食過常也、

肺疽者、或飲酒之後、酒毒滿悶、吐之時、血從吐

止、一合半、升一升是也、宜解毒涼胃、

傷胃者、因飲食太過、寒涼停滯、不能消化、便

悶、於吐所傷之物、與氣衝上、賊破胃脘、吐血鮮

色、小腹中絞痛、自汗出、脈沉伏者、可治、緊數多

疾、急以理中湯散寒邪、和陰陽、此則寒為主、而

血為輕、先從急者、理中湯主之、理治中脘、分利

陰陽、方見霍亂門、

吐血屬寒者、果身受寒氣、口受冷物、邪入血分、

血得冷而凝、不歸經絡、而妄行、其血必黑黯、面

治法彙一卷 吐血 全四

色必白、天其脈必微遲、其身必清冷、不用姜桂

而用涼血之劑、始矣、

吐血勢不可遏、胃中氣塞、上吐紫黑血、此瘀血

內熱盛也、桃仁承氣湯、加減下之、打撲內損、有

瘀血者、必用、方見傷寒門、

吐血、衄血、下血、雖去多、以從胃與大腸肝來也、

是經氣血俱多、身涼、脈微、不妨咳血、咯血、最是

惡症、其初甚微、漸至不救、以從心肺來也、

暴吐紫血、或塊、脈洪大者、屬血熱、用生地四物

於解毒壯丹皮調之不止加熟大黃

脉洪實有力精神不倦或覺胃中滿痛或血是
紫血塊者用生地赤芍當歸牡丹皮荆芥阿膠
滑石大黃玄明粉桃仁泥之屬從大便導之此
釜底抽薪法也今人不知徒事苓連梔枳輔四
物使氣血兩傷脾胃俱敗百不一生悲哉
大吐不止諸藥不効用乾薑炒黑爲末童便調
服此從治之法也

吐血一方用好墨爲末以白湯化阿膠清調稀
治法彙一卷 吐血 全五

稠得所頻服熱多者尤宜

諸失血脉微弱昏憤氣息厭厭欲絕濃煎獨參
湯徐投之每每因生非他藥可比者

血既從大便去後用薏苡仁多用百合麥冬鮮
地骨皮嗽渴加枇杷葉五味子桑根白皮有痰
加貝母皆氣薄味淡西方兌金之藥因其衰而
減之自不再發于虛症尤宜

氣虛不能攝血吐血不止身涼脉微弱丹溪法
用人參一味爲末雞子清投新汲水調下一錢

肝効一法四君子加芎歸

先惡心血雜痰出嘔多至升許者爲嘔血有怒
而得者有過飲得者鬱悒人久之氣血凝滯中
焦運化失常亦作嘔痰帶血出宜分治之因怒
者肝脉必旺或兩手俱弦數宜平肝降火黃連
炒梔子青皮香附柴胡甘草歸芍甚者龍薈丸
或用赤茯苓心湯乃實者瀉其子也

過飲酒脉必弦細而滑右寸口脉必洪滑或數
解酒毒降火和中二陳加苓連山梔牡丹皮選
治法彙一卷 吐血 全六

用 鬱結脉必沉結或弦數宜舒鬱越鞠去蒼朮加

牡丹皮赤芍歸尾主之或加韭汁亦妙

嘔血脉大發熱喉中痛者屬氣虛此方主之

人參 黃芪 黃柏 荆芥 當歸

生地黃

又方用韭汁童便磨鬱金飲之其血自清如無
鬱金以山茶花代之

因怒嘔血服梔子等平肝不應用瓜隻子當歸

生地桔梗通草牡丹皮煎服

脾統血肺主氣勞神多言脾肺致傷血妄行忌
涼劑必用肺中益氣加減遇勞即發心脾受傷
其血必散肺中益氣湯加麥冬五味山藥熟地
茯神遠志佳有多言神勞用此

內虛挾熱吐血不止厚黃柏以蜜塗炙乾爲末
麥門冬煎湯調下二錢立止

思慮傷脾不能統攝心血因而妄行或吐或下
歸脾湯主之及治神不歸舍不眠方用參朮芪

治法彙一

卷之七

草酸棗茯神龍眼木香少許薑棗煎服

因醉飽低頭掬重損傷血從口鼻中湧出忌涼
藥急以百草霜研細三錢米飲調下衄不止以
少許吹鼻中妙不可殫即鄉間鍋底煤也一切
皮肉破處炙瘡血百法不應慘少許即止
血見黑即止墨末及汁百草霜炮薑諸灰是也

咳血

咳血熱壅於肺者易治不過涼之而已損於肺
者難治漸以成勞也

因咳而出多從肺胃二經急早治久即成勞
血未止五汁飲最妙多飲童便爲上

初起肺實宜酒芩黃連梔子生地牡丹皮歸芍
橘紅貝母花粉童便薑汁茅根之類清之或加
犀角亦可多用舟楫之劑

瘦人有此脉細數多成勞宜二母二門紫苑花
粉四物用生地牡丹皮竹瀝童便薑汁選用

勞傷脾經咳嗽有血鷄蘇散最驗功在阿膠炒
蒲黃勞嗽服阿膠不止無藥用矣詳見咳嗽門

治法彙一

卷之八

一方服藥血不止是肺上有竅也用白芨末猪
肺煮熟蘸食日三四次妙不可言余常治回回
人用牛羊肺殊驗喉有竅則咳自殺人薏米爲
末蘸食亦可

試血法 吐在水碗內浮者肺血也沉者肝血

也半浮半沉者心血也各隨所見以羊肺羊肝
羊心煮熟蘸白芨末日日食之

肥盛或酒客輩痰中有血滾痰丸佳

方見痰門

咳血痰盛身熱多是血虛用青黛瓜蒌仁柯子

貝母海石山梔爲末薑汁蜜丸噙化嗽多加杏仁後用八物調理

痰涎中有血不嗽或時喉中吐出古方謂出于脾用葛根黃耆黃連芍藥當歸甘草沉香末主之竊以爲必胃熱所致者多莫若四物用生地牡丹皮黃連梔子花粉之類加重便竹瀝似當實者滾痰丸

肺家有熱稍實者白部膏妙虛人清化膏

咳血非靜養絕慾不可與治諸病皆然此尤當治法彙一卷咳血

慎者

先咳嗽後見紅多是積熱痰盛清痰降火爲急先見紅後痰盛多是陰虛火逆痰不下降四物加滋陰化痰藥

咳血腎間脹是肺家火盛諸藥不効用生蘿蔔汁半盞入鹽少許服之立効如無蘿蔔用子一錢蘇葉一錢同煎服次用雞蘇散加阿膠

咳血胸中痛腥臭異常肺脉數而虛是肺痿見本門

亦有黃藥子白藥子乳沒血竭等亦是清肺熱活血行氣之意或因負重勞傷咳嗽痰血大獲奇功不可忽畧

七傷散 治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子 本單言治肺 各藥半錢 知母

玄胡索 各兩半 鬱金 半錢 當歸 半兩 山藥

乳香 沒藥 血竭 各二錢 赤芍 半錢

共爲末每服二錢茶湯調下

虛勞久嗽咳血咯血五倍子一味爲末每服一錢用溫茶一大口調勻食遠米飲下乃歛而降

治法彙一卷咳血

之法也

花蕊散 見虛損門 十灰散 見虛損門

龍膏丸 見腸痛門 赤茯苓心湯 見火門

補中益氣湯 見內傷門 升麻葛根湯 見傷寒門

百部膏 以百部壹味煎膏 花蓋石散 見虛損門

清化膏 見咳嗽門

諸失血過多體倦食少及血不止扶正氣爲急人參一錢黃耆二錢五味子三粒芍藥麥門

冬主草歸身各五分加鬱金不亦可

唾血

平時津唾中有血爲唾血一屬腎虛有熱一屬上焦實火有餘則瀉加減涼膈加牡丹皮藕節之類不足則補滋腎坎離或以四物加鹽酒炒梔子黃柏肉桂一分許瀉腎火或加二門二母

咯血

咯血不嗽而咳出血也咯與唾少異唾出于氣上無所阻咯出于痰氣鬱于喉嚨之下滯不得

治法其一卷

卷一

出咯而乃出求其所屬咯唾同出于腎也治咯血之方宜用童便青黛以瀉手足少陽三焦膽經之相火而薑汁爲佐用四物地黃牛膝葷以補陰安其血也

櫻寧生曰咯血爲病最重且難治者以肺手太陰之經氣多血少又肺爲金象爲清肅之藏爲火所燥迫血上行以爲咯血逆之甚矣上氣見血下聞病音謂喘而見血且咳嗽也

初起宜白扁豆散去半夏加貝母入生地黃藕

節尤佳及虎骨調黑神散各一錢或生地洗

淨搗汁加薑汁少許一法用生薑一片蘸百草霜薑淡再蘸如薑無味再易噲之見于後

勞嗽咯血七珍散加阿膠當歸各半錢惡甜人

更加百藥煎仍調鍾乳粉尤佳一味鍾乳粉糯米飲調吐血嗽血俱佳七珍見虛損門

用力屈身傷肺咯吐血者白芨枇杷丸或白芨

蓮鬚散方用白芨壹兩蓮鬚壹兩剉碎桑葉沙參各伍錢右爲細末入藕汁地黃汁磨墨全調下錢

喉中咯出小血塊或血點爲咯血亦分虛實瘦

人最忌大法四物入童便薑汁青黛服之或加

牛膝膏地黃膏尤妙與咳血大同小異

聖餅子治咯血殊驗用青黛一錢杏仁四十粒

去皮尖以黃臘煎黃色研細入青黛捏作餅子

用時以柿一枚破開以餅值其中令定濕紙煨

研飲余常以二門冬生地煉膏和貝母阿膠杏

仁桔梗百藥煎青黛末噲化治咳嗽咯大有奇

驗

上焦一切血症消止即服六味地黃最不可緩

庶絕病根有血症者終身不可脫妙在濯瀉
芥淺見者謂瀉腎殊可恨詳見本方下

丹溪方用

白芨一兩 藕節 半兩

石為末每服一錢白湯調下神効

白芨治上焦諸血大獲奇驗昔人謂芨下咽至
血則竅為芨末填而血止非欺我也有驗即
有此理詳見本草綱目白芨下一法取末加二

錢于粥中吃妙

治法一法

九十三

荷葉一味為末米飲下咯血妙槐花炒為末糯
米湯化下亦可

舌衄

舌上無故出血不止名舌衄用槐花末搽上立
止得無心火自灼之味麥冬煎湯調妙香散
香薷汁服一二碗佳髮灰二錢米醋調下更付
出血處

妙香散

見類編

文蛤散 治熱壅舌上出血如線五倍子白膠
香牡蠣粉等分為末每用少許慘患處或燒熱

鐵烙孔上

齒衄

齒衄有二一則腎虛虛火泛上服涼藥不愈宜
鹽湯下安腎丸外用青鹽黑香附擦牙一則胃
火崩落口臭用清胃散甘露飲外用大黃米泔
浸軟生地黃二味旋切二片合定貼所患牙上
一夜即止○腎虛血漫胃火血紫而痛亦用此
法

陽明氣血俱多火旺則血如潮湧腎虛血出必
治法一法

九十四

點滴而出齒亦隱隱而痛不如此之暴酒客多

此惟大黃酒煮者妙

白扁豆散

見內傷門

清胃散

見齒門

耳露飲

見齒門

齒縫中出血如注或如細線名齒衄世傳用銀
簪脚燒紅以尖脚于血孔中烙之即止後服清
胃散加熟大黃準繩法屢用去黑屎二三塊効
一法用鹽湯嗽立止又能益齒鹹走血之驗
丹溪方齒齦出血夜以鹽厚傳斷上有涎瀝盡

乃臥涎出時叩齒勿動

千金方用枯礬煎湯先拭齒乃含之

齒搖動出血牙斷痛痒骨碎補二兩細挫炒黑
杵末依常鹽漱畢楷齒斷下良久吐或嚥下

耳中出血龍骨燒灰次入即止

兩關弦數飲酒多怒人屬肝火柴胡清肝散
尺脉弱或躁屬陰虛六味地黃丸

溺血

小便痛者為血淋不痛為溺血宜分新久虛實

治痿一書

卷五

不可例用寒涼

壯盛人關尺弦急或數屬肝火宜龍膽瀉肝湯

加牡丹皮等清血藥不已當歸龍薈丸俱見

一法生料五苓散和四物湯若服藥不効素多

色者五苓和膠艾湯吞鹿茸丸或八味地黃丸

或鹿角膠丸或辰砂妙香散

多慾之人腎陰虧損血隨溺出脉必洪數無力

宜滋陰四物加知母黃柏或加牛膝膏久血溺

不止牛膝一味煎湯代茶屢驗說見本草牛膝

下

初起脉洪數有力屬下焦血熱山梔炒水煎服

或加小薊琥珀實者八正散利之○亦有如砂

石而色紅却無石淋之痛亦屬虛症○八正散

髮灰散溺血絕妙方用無病人髮肥皂水洗淨

燒灰每服二錢醋湯下或用茅根車前煎湯下

尤妙一方用側柏葉汁調糯米粉打糊和髮灰

丸白湯下或四物湯兼治肺疽心衄內崩吐血

一二口舌上出血一切血症

始註錄一書

卷六

丹溪曰髮補陰甚捷本草曰髮灰能消瘀血通

關格利水道破癰疽血衄平常溺血四物加牛

膝山梔或加黃連棕灰不應審而治之

一方用生地小薊滑石通草蒲黃淡竹葉藕節

當歸山梔甘草水煎服效亦治血淋

有氣虛不能攝血王屑膏最妙并治沙淋痛不

可忍者用黃芪人參等分為末用蘿蔔大者切

一指厚三指大四五片蜜醃少時蘸蜜炙乾再

蘸盡蜜二兩為度勿令乾焦至熟蘸黃芪人參

未吃不以時仍以鹽湯送下豈虛火宜補宜緩之意歟

七、瀝可去脫日久不止龍骨火煨爲末水調方寸

汚血結于腦中溺多紫黑以鬱金搗爲末葱白一握相和水煎服二三火

老年有此多是陰虛亦有過服助陽藥而致者多致不救遵生者當知此苦

一法用車前草汁藕汁小蓟汁調炒黑蒲黃末

空心服

丹溪冬用散治溺血下血亦有至理用夏枯草燒灰存性研細空心米飲或凉水調本草言此

草活血行氣有補養厥陰血氣之功前陰屬厥陰故也

下血

脉法腸澼下血脉小留連者生急疾且大身熱者必

下血雖曰大腸積熱亦當分虛實不可純用寒

涼藥必加辛散爲佐久之不愈宜理胃氣兼升舉藥酒沙酒煮黃連之類

下血色清而鮮者爲腸風屬胃與大腸積熱條芩升麻牡丹皮黃連槐角青黛秦艽之類凡下血必加地榆爲使在上防風在中黃連在下地榆乃治血三使也

一說酒毒厚味動血連瀉散吞黃連阿膠丸及香連丸或一味黃連煎湯二九方並見痢門

腸澼下血其血另作一瓜渢出有力而遠射四

散如飾腹中大痛乃陽明熱毒所作也升陽除濕湯主之見泄瀉門

血見愁草搗汁加薑汁少許側柏葉汁頓溫服妙暑毒入腸胃下血者黃連一味煎湯妙

黯而濁者爲臟毒脉實便秘勢盛者黃連解毒加熟大黃輕者解毒涼血見傷寒門

濕毒下血脉必洪濡四肢沉重大便滑瀉宜升麻二陳二木芩連或加風藥以風能勝濕也此

酒麪炙酪厚味所釀之濕非外感濕

下血亦有寒者或飲冷水漿瓜果血爲寒所
而下紫黑血或鮮血腹中必隱隱痛用理中湯
及平胃五苓散不効黑神散或膠艾湯加米湯
煎吞震靈丸黑神散用黑豆炒熟地歸芍肉桂
炮薑甘草蒲黃共末重便酒下二錢
東垣升陽除濕和胃湯治腸澼下血方用四物
去川芎加生地牡丹皮蒼朮黃芪升麻秦艽陳
皮生炙甘草肉桂三分臨時加減亦妙
去血過多以四物加黑乾薑升麻
結陰便血羅謙甫用平胃地榆湯溫中散寒除
濕和胃外炙中脘必飲冷酒中寒乃可用以中
有附子也方用炮附子升麻陳朮乾薑
葛根歸身芍藥甘草益智神龜薑棗煎服
仁齋直指曰血遇熱則流通故止血多涼劑然
亦有氣虛挾寒陰陽不相爲守勞氣虛散血亦
妄走所謂陽虛陰必散是耳外症必有虛寒之
狀法當溫中使血自歸經絡理中湯加南木香
或局方七氣湯加川芎古方用炮薑亦是此義
脉微弱或右手虛大無力此氣血兩虧也補中
益氣加減日久面黃神方

肛門射如線者重痔也或肛內外作痛俱是痔
血宜從痔門
一切下血痔血膿連丸常服佳槐角丸亦妙血
虛者或加四物槐角于臟連丸內妙甚
打撲內損惡血入腸胃下出濁物如瘀血者不
可用涼藥宜黑神散加老黃茹爲末酒服
諸下血銀杏四十九箇搗爛加白藥煎丸彈子
大每空心細嚼兩三丸米飲下
下血服涼藥不止必中氣虛不能攝血非補中
升陽不愈切忌寒涼
血症不斷酒色厚味縱止必發終成痼疾
虞氏曰精氣血氣皆生于穀氣大便下血多以
胃藥收功徒用苦寒而不理脾胃治標不治本
是絕氣危生之下工矣
諸灰能止血百藥煎燒灰存性研細飯丸每三
四十丸或以米湯調末服二三錢亦妙
立齋法下血先用敗毒散解散腸胃風邪大抵
因濕熱酒麵厚味者多風能勝濕久之必固腸

胃弱養升舉 敗毒散見瘧疫門

烏梅丸

烏梅三兩燒灰存性爲末醋糊爲丸桐子大每服七十丸空心米飲下

腸癰者水穀與血另作一派如溷桶出也夏月濕熱太甚客氣盛而主氣弱故腸澼甚也以涼血地黃湯主之黃柏知母炒一錢青皮炒槐花炒當歸熟地各五分水一盞煎七分溫服如二便前後重調木香檳榔末各五分空心服仍後治法彙一卷下血

香梅丸

烏梅連核燒存性香白芷生百藥煎燒存性右等分爲末麩糊丸米湯下三五十丸

一方

五倍子爲末鹽梅搗膏爲丸空心下三五丸此皆酸以收之之意

括曰側柏加礬煮 棕閣下火燒 大黃煨半熟 枳殼炒須焦 黑墨槐花末 黃連酒共

調 腸風並下血 痔漏一齊消

依法修治淡酒調成膏置舌上仍以酒送下乃治標妙方屢驗者

大下不止一來升碗者猪肚一枚男雄女雌洗淨入荊芥四兩當歸一兩黃連一兩紅花五錢地榆三錢皮硝一錢右爲細末入肚中兩頭扎定勿使水進用水淹過肚二三指以盆覆定勿令泄氣煮極爛取起去藥滓肚就以原汁下二三個肚全愈下血勢盛脉洪數有力或酒客痞治法彙一卷下血

梁家尋常藥不應黃連貫衆散佳黃連雞冠花貫衆大黃烏梅肉各一兩炙甘草七錢枳殼荆芥各一兩共末每服二錢溫米飲下

夏月伏暑純下鮮血黃連香薷飲主之風熱入大腸下血不止脉浮有表熱者敗毒散散之

有風濕乘虛入于腸胃或下瘀血者胃風湯加枳殼荆芥槐花煎服

前者名近血出自大腸四物加檳榔槐花枳

之類以瀉大腸糞後來者名遠血出自

小腸四物加木通黃連以瀉小腸

槐皮散 治下血及血痢已經下後不止此藥

能除根

槐根白皮 二兩 槐角仁 四兩 枯白礬 二兩

甘草 炙

右為細末每服三錢清米飲調下

闌廣嶺南多鹽毒中之者下血如鷄肝或臟腑

俱壞惟心未傷用馬蘭根末水服方寸七隨吐

治法集一卷下血

毒極神

一法用白蘘荷蜜置病人席下勿令知病者自

呼蠱者姓名愈

百一方蠱毒下血如爛肝取蚯蚓十四枚以苦

酒漬之蚓从但服其汁自愈

思傷心脾不能攝血歸源或下血或出汗或發

熱或惡寒歸脾湯加減

丹溪方臟毒下血車前草連根一握生薑一小

塊新水研碎去楂候血欲下時腰間必覺重便

服此一盞少坐漸覺冷下腹中登側已不見血

矣 正傳一方大小便血南棗竹葉燒灰存性米糊

丸桐子大每服七八十丸空心米飲下

臟毒腹中微痛濁血兼花紅膿肛門腫脹或肛

突出大便難先用拔毒疎利之劑追出惡膿血

後乃涼血內托祛風虛人兼芪朮參苓助養胃

氣詳見心法

九竅出血南天竺飲主之或用血餘灰自己髮

治法集一卷下血

為佳無即用父子一氣者次則亂髮次則頭胎

男髮肥皂水洗淨燒灰二錢以茅根車前草或

搗汁下或煎湯亦可

病人汗出汚衣皆血汗因大喜傷心喜則氣散

血隨氣上婦人產蓐多此治以葎草汁

葎草不拘多少俗名葛勒蔓是蔓生葉似

草麻而小薄有細刺花黃白子如麻子

右一味搗汁加醋空心服一盞或煮濃汁服

酒煮黃連丸

黃連

去毛十二兩

好酒掩過二指砂礪肉煮酒乾為度晒乾為

細末桐子大糊丸每服三十九空心下

犀角地黃湯

犀角

鎔水

生地

白芍

牡丹皮

各等分

水煎服

血從毛孔出名曰肥兒人中白不拘多少瓦上

用火逼乾研令極細每服二錢入麝少許溫酒

下外以髮灰過之末効壽金末水調鷲羽掃之

即愈

三黃補血湯

血見多及初見血宜用

黃芪

錢半

生地

二錢

熟地

柴胡

川芎

各錢半

芍藥

三錢

牡丹皮

升麻

各五分

白水煎血不止加桃仁半錢大黃斟酌加減

去柴胡升麻

鷄蘇散

鷄蘇薄荷

蘇州者

黃芪

生地

阿膠

貝母

白茅根

各一錢

桔梗

蒲黃

炒

麥門冬

甘草

各半錢

細切水煎

槐角丸

治下血痔血

槐角

二兩

地榆

黃芩

當歸

防風

枳殼

共為末糊丸桐子大每服五十丸空心下

飲酒入下血日二三次四物加條芩防風荆芥

白芷槐花升麻不應加棟斗灰二三錢煎成藥

中調服佳

臟連丸

用宣州肥大黃連不拘多少去毛洗淨為

末篩過如麪以雄猪大腸一段將末入腸

中塞滿兩頭扎定入鍋內蒸爛取出入木

相內杵為丸桐子大早晚每服三十九白

湯下能滌腸胃火毒

九竅出血皆可用墻頭苔鮮可以塞車前草汁

可以滴火燒連房用水調鍋底黑煤可以喫石

榴花片可以塞生菜煎汁可以滴火燒龍骨可

胃風湯 治風濕入于腸胃下血不止色清是

風如豆汁者是濕酌量用之

人參 白朮 炒 茯苓 川芎 當歸 酒洗

白芍 炒 桂 各等分

水煎服

失血後大熱大渴發熱症似白虎惟脉虛大不長實為異爾誤用涼劑必死當歸補血湯主之

方用黃芪一兩當歸二錢

治法彙一書

百七

世傳經驗方下血用乳香沒藥血竭兒茶各一錢巴豆霜五分九菟豆大空心酒下神妙不可言

丹溪曰下血久不止涼藥不應當用溫劑面色痿黃肌瘦濟生方煎紅丸藥用側柏鹿茸附子續斷黃耆阿膠白礬當歸醋糊丸米飲下不若補中益氣湯加減妙

大凡病後咳嗽吐血脉大而亂屬上焦陽絡傷下血瀉血為陰絡傷俱危

丹溪曰一切血症皆是陽盛陰虛君相二火亢盛煎迫其血而出諸竅悉以四物湯為主看出自何經以本經瀉火引經藥佐之今詳其藥品川芎血中氣藥也通肝經味辛性散能行血滯于氣使歸于肝地黃血中血藥也通腎經味甘性寒能生真陰血症用生者是當歸分三治身頭補尾破全和血中主也能使氣血各有所歸味辛性溫芍藥陰分主藥也通肝脾味酸性寒能和血飲血皆純陰之藥陰血不足而陽火旺者必取則于此

治法彙一書

百八

三陽曰四物體瘦多火者宜之若脾胃食少體倦一切失血後須大補脾胃當遵長沙血脫補氣之法多用人參為主或補中益氣湯增損陽旺則能生陰氣旺則能生血乃至妙大經大法昧者毋得妄議若不熟讀本草綱目而泥於言肺熱傷肺之說定誤人矣若四物者獨能主血分受傷為氣不虛者立也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮血滯所宜蒲黃阿膠地榆

百草霜、棕灰爲血妄崩所宜乳沒、玄胡、靈脂、凌
霄花爲血痛所宜、牛膝、枸杞、菴蓉、瑣陽、敗龜板
爲血虛所宜、乳酪、血液之物、血燥所宜、乾薑、桂
枝、棗、肉、血寒所宜、生地、苦參、血熱所宜、此特取
其正治大畧耳、若觸類而長之、則應變無窮矣、
牡丹皮、茅根、藕節、側柏、俱能清血、分中火、血藥
須之、

韭汁、鬱金、梔子、能清上焦之血、

血見黑卽止、水能制火也、古法用棕間烏梅香、

治法彙一朱、下血

二百九

附髮等燒灰皆本此、

血不歸元、責之胃寒、涼藥屢用不効、甘草炙炮

乾薑等分、每服三錢、引血歸元、妙、

失血蓄妄、必先以快藥下之、或問失血復虛、何

以當、曰、血旣妄行、迷失故道、不去蓄利瘀、則以

妄爲常、局以禦之、

諸失血、及崩產後、發熱潮熱、咳嗽脉數、乃是元

氣虛弱、假熱之脉、卽東垣所謂內傷、右寸關大

而無力、爲虛火、舉元氣之脉是也、須主以人參

然血必由于脾胃先損而患、故脉大而洪、但察
其中有胃氣、受補可救、設用寒涼之藥、復傷脾
胃、生氣使血反不歸源、去必不遠矣、

諸失血後、渴者爲血渴、十全大補、或黃芪、人參
五味、地黃、麥冬、葛根、枇杷葉、量胃氣虛實用之、
胃前有一孔、常出血水、名曰心漏、用嫩鹿茸去
毛、酥炙、附子炮去皮、失鹽花共末、棗肉丸、每服
三十丸、空心酒下、兼治腎虛腰痛、

五穀出血不止、用水喫其面、使驚而神收、血止、
治法彙一朱、下血

二百十

一童子年十四歲、發熱吐血、余謂宜補中氣、以
滋化源、不信、謂童子未室、何腎得虛、因述丹溪
云、腎主閉藏、肝主疎泄、二臟俱有相火、而其係
上屬于心、心爲君火、爲物所感、則易于動、心動
則相火翕然而隨、雖不交會、其精亦暗耗矣、又
精血篇云、男子精未通、而御女、以通其精、則五
體有不滿之處、異日有難狀之疾、與補中益氣
湯及六味丸而愈、

一男子咳嗽吐血、熱渴、痰盛、盜汗、遺精、用地黃

九料加麥冬五味子治之而愈後因勞怒吐紫
血塊先與花蕊石散及獨參湯漸愈每勞則咳
血脾肺腎三脉俱虛大洪數投補中益氣湯及
六味丸全愈

脾胃

張三錫曰胃司納受脾司運化一納一運化生
精血然後滋榮各臟腑若飲食失節則胃病胃
病則不能納憂思勞役則脾病脾病則不能磨
脾胃俱病納化皆難而惡心脹滿面黃倦怠食
不消化等內傷症作矣宜分傷胃傷脾而治
兩傷面黃體倦食不消化惡心不喜食脾胃兩
虧也脉必緩而無力或氣口滑而軟宜運脾
消導二陳二木枳實山楂麥芽後補中氣

虛久也二陳薑汁炒黃連麥蘗枳木一二服
後加人參

胃弱氣口脉緩弱或遲無力或虛大嘔吐不食
屬胃虛有寒必過服寒涼或生冷所致宜香
砂六君子湯加厚朴蒼木甚者加炮薑

胃中痰氣口脉滑實嘔吐不食體厚多鬱屬濕
痰仍宜吐之吐定二陳二木香附川芎開鬱

行氣

面色痿黃乃胃口有瘀血宜韭汁加酒飲二
三盃覺心下膈爲佳後以越鞠加血鬱藥炒
梔子倍之此過食炙燂厚味多怒人有之
脾傷脾傷則四肢惰怠飲食不運宜補以健之
非參朮白芍不能補脾非山查麥蘗枳實無
以助其健運明哲類而推之也
食滯開脉沉緩能食不能運化停滯心下痞悶
噯氣噯酸如敗卵臭乃脾弱食滯也宜消導

健脾二陳枳木厚朴山楂麥蘖食下宜糖
氣平時食不消化枳木最妙隨症加減痰加
半夏火加黃連梔子寒加砂仁

脾久病宜補中久病後或吐瀉後食不消化脉
澁或弦而無力屬脾家陰血少津液不能潤
濡以致轉化失常宜養血潤燥健脾下焦通
利津液四布自復四肢怠墮面黃手心熱脉
緩大無力自屬內傷補中益氣湯正藥久病
不食或食不消化痰多或過服剋伐藥致損
治法藥一卷脾胃 百三

脾胃六君子湯最捷

脾胃忌苦寒脾胃兩傷納化皆難或吐或瀉面
色痿黃體倦不支參苓白朮散佳病後調理
最妙百病皆以胃氣為主况病後乎昧者不
知謬以黃柏知母用滋陰氣苦寒傷胃轉變
他症矣

老年或久病脾胃不和食少不磨或吐或瀉
補脾藥中加砂仁肉蔻破故紙妙良由下焦
元陽虛不能薰蒸惟行降令如釜中無火也

二神丹治五更腎瀉大獲奇驗亦是此意
薛立齋法補脾不若補腎用八味丸以補命
門相火虛則補其母他健脾藥不應用之屢
驗淺見者去桂附即不效

胃中濕痰宜升舉肥人體倦脾胃不和食少飽
悶胃中有濕痰也宜燥之二陳二木香附厚
朴少佐枳實氣下行加升柴丹溪謂升柴二
木二陳湯能使大便潤而小便長始為濕痰
鬱于中焦以致清陽不升濁陰不降痞塞填
治法藥一卷脾胃 百四

滿二便阻塞而設二木燥脾濕二陳化痰升
柴引清氣上升清氣一升濁氣自降鬱結開
通津液四布濕流燥潤而小便長矣非至精
至神孰能臻此妙境未學膚見謬指為迂或
謂古法不宜于今誠為可嘆

瘦人健脾兼養血瘦人脾胃不和傳化失常大
便乾燥口時燥心下飽悶多屬血虛宜健脾
兼養陰血忌滲漏分利白朮芍藥陳皮炙甘
草麥芽厚朴薑製黃連當歸知母麥冬花粉

之類

健脾大義養胃必用參朮健脾必用枳木健者
運也動也脾氣不運而助其力以健運也與
天行健之健同

平土脾胃屬土土氣太過曰敦阜人之中焦濕
熱盛即是有餘須平胃五苓之類平之此邪
盛也若後病或稟賦怯弱生冷油膩傷其脾
胃而虛悶痞滿不食者必以白朮為君茯苓
陳皮枳朴等和中藥為佐脾胃喜香甘常以

治法藥一

卷一

脾胃

百一

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

陳土炒白朮炒麥蘖炙甘草陳皮炒扁豆人
參加薑棗煎服養胃進食殊驗喜食而運行
遲者以枳木加神曲山查二陳隨症加減
宿砂白豆蔻辛香俱能快膈開胃第性稍溫
恐積溫成熟無火者宜之胃弱面青白淡黃
手冷脉緩少加于參朮本草中最妙二三服
而止食少迷悶嘔飲小便倦怠者即是元
氣下陷補中益氣湯倍升柴隔間痞悶不
食面慘脉沉自是氣鬱當從鬱結治

也古方用益智正是此意

脾既不能健運傳化失常胃膈痞悶悉由七情
拂鬱饑飽失時膏粱厚味釀成痰火以致脾為
所困力不能勝乃爾必以白朮補脾和中參濕
為君枳實消導化痰清火為臣二味乃健脾之
至藥也然所感不同為病亦異余每因人加減
驗有六法神而明之存乎人又不可執一也昧
者偶得一效輒局信之不知宜于此者必防于

治法藥一

卷一

脾胃

百一

五

五

五

五

五

五

五

彼砂在合宜耳

益氣健脾丸脾弱不能運化四肢倦怠面色痿
黃口淡耳鳴食少宜此

人參

三兩

白朮

三兩

陳皮

半兩

炙甘草

八錢

枳實

兩

半

白茯苓

二兩

大便瀉加山藥扁豆炒蓮肉甚者加肉豆蔻

化痰健脾丸脾胃弱而有痰者宜之

人參

白朮

各三兩

枳實

一兩

半夏

陳皮

各一兩

膽星

各一兩

伍

蛤粉

一兩

赤茯苓

兩半

神麴糊丸

清火健脾丸 脾胃弱、食少嘈雜、惡心、有火症

者宜之、

白朮三兩 枳實一兩 半夏 陳皮各壹兩伍錢

炒梔子兩 炒黃連五錢

水丸

舒鬱健脾丸 多抑鬱、人心下不舒、食少倦怠

婦女用此最宜、

白朮四兩 枳實二兩 香附五兩 川芎一兩 陳皮五錢

治法 藥一茶匙 脾胃 百七

神麴糊丸

神麴糊丸

養榮健脾丸 血少腸胃枯澁、口乾便秘、皮膚

乾燥、食不能運、婦人經血乾涸、色淡來少

人參 白朮各四兩 枳實半兩 當歸 白芍各三兩

撫芎一兩 麥門冬二兩 栢子仁一兩

生地煎湯熬膏丸

健脾丸 如無別症、祇是食後不便傳化、因而

食少用此、

人參 白朮各四兩 枳實三兩 山楂一兩

麥芽一兩 陳皮一兩

神麴糊丸 易老法、用荷葉煮陳米飯為丸

取上升之義最妙

二陳湯見痰門

越鞠丸見鬱門

補中益氣湯見內傷門

平胃散 治中焦濕盛、嘔吐痰水、胃膈痞滯、脾

胃不和、飲食不甘

治法 藥一茶匙 脾胃 百八

厚朴炒 陳皮湯洗去白 茅山蒼朮米泔浸

皮晒乾 甘草兩 生薑汁三兩 小棗一百枚 核去

用水五升、煮乾、搗作餅子、晒乾為末、每服二

錢、鹽湯點服、久瀉用烏梅生薑湯調

六君子湯 治脾胃不和、而有痰

二陳加入人參、白朮、薑棗煎、隨症加減、

參苓白朮散 治脾胃虛弱、飲食不進、嘔吐瀉

利、大病後扶助脾胃、極妙

人參 白朮 白茯苓 山藥 白扁豆去

煎炒各一 甘草 桔梗開提 薏苡仁

蓮肉各一

右爲細末每服二錢棗湯調下

余常加炒麥芽一兩砂仁三錢山楂肉五錢爲丸每服發効有痰加半夏八錢

一人曾用有効蓮肉蒼朮各四兩同上藥入洗淨猪肚中縫緊煮極爛搗爲丸想此人必脾弱多燥結乃補潤之古方道寧純陽丹法同此但藥多燥又有三稜蓬木恐非脾弱者治法莫一求脾胃

所宜茲不取焉

健脾丸必以枳朮爲主因病加減或加砂仁或加橘半或加炒黃連梔子等藥應變而製也經驗健脾丸

白朮四兩 陳皮二兩 枳實二兩 山楂各二兩 麥芽各二兩

神麴炒一兩 人參兩半 厚朴五錢

有人加薑汁炒黃連肝火盛尅脾用吳茱萸

炒黃連五錢

三錫曰命門火衰不能生土先賢未之及至薛

新甫乃表而出之常見中年人下焦元陽虛不

能上蒸腐熱水穀因而食少或五更作瀉往往

作脾治罔効遵用二神丹及八味丸大獲奇功

此發前人之所未發也特爲拈出醫案張廷評

汝翰胃膈作痞飲食難化服枳朮丸久而形體

羸瘦發熱口乾脉浮大而微用補中益氣加薑

桂諸症悉退惟見脾胃虛寒遂用八味丸神命

門火不月而飲食進三月而形體克此症若不

用此丸多變腹脹喘促腿足浮腫小便淋瀝等

治法莫一求脾胃

症急用濟生加減腎氣丸亦有得生者

瑞竹堂方謂二神丹雖兼脾腎治但無幹旋往

往加木香以順其氣使之幹旋空虛倉廩倉廩

空則能受物屢効

脾上交于心下交于腎不能食是戊巳虛也火

乃土之母故以破故紙補之腎爲癸水以肉苳

蔻厚腸胃爲戊土戊癸火化是爲補土母之藥

也楊仁齋云脾腎交通則水穀自消化嚴用和

云人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎

水不濕不能上蒸脾土冲和失布中焦不運是
致飲食不進胃膈痞塞或不食而脹或食而不
化大腑糖泄古云補腎不如補脾予謂補脾不
如專補腎腎氣若壯丹田火盛上蒸脾土脾土
溫和中焦自治膈開能食矣

戴復菴曰脾運食化脾氣不足故不喜食宜啓
脾丸煮朴丸若虛極不進食兼補土宜芎香醒
脾六君子加砂仁藿香若虛寒不進食理中湯
未効加附子下焦元陽虛致脾不運者鹿茸橘

治法彙一卷

內傷

百七

皮煎丸

三錫曰脉小氣弱倦怠食少人俱知爲虛矣至
于脉大飽悶有似食滯尅伐亂投鬱悶轉甚惟
智者辨之昧者忽矣

內傷

張三錫曰勞役過度飲食不節中氣受傷虛火
炎上亦作寒頭痛發熱身痛有類外感先賢因
命此名以別之今人春末夏初病此者比比皆
是谷名注夏內經稱爲解趾乃火乘元氣內傷

津液枯竭舌燥口乾虛熱發斑悞認爲實欲亦
爲悲哉悲哉若將東垣內外傷辨潛心玩味
臨病自無惑矣詳記于左

內外傷辨

東垣曰人迎脉大于氣口爲外感氣口脉大于
人迎爲內傷雖大無力大爲火乘元氣無力爲
虛外感寒熱齊作而無間內傷則寒熱間作而
不齊外傷惡風乃不禁一切風寒內傷惡風惟

治法彙一卷

內傷

百七

惡些小賊風外傷惡寒雖近裂火而不除內傷
惡寒得就溫煖卽解外傷則邪氣有餘出言壯
厲且先輕而後重內傷則正氣不足出言懶怯
且先重而後輕外傷症見在鼻故鼻氣不利而
壅盛有力外傷者則不然外傷症見在口故口
不知味而腹中不和外傷則手背熱而手心不
熱內傷則手心熱而手背不熱外傷熱發于皮
膚怫怫然明其熱在外也內傷熱出于肌肉蒸
蒸然明其熱在內也以此別之則判然矣苟或

內傷外感兼病者宜細心求之若見內症多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先若見外症多者則是外感重而內傷輕宜以發散為急丹溪曰世之病此者良多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱于內而發者皆以補養元氣為主有所挾而兼用藥氣虛甚者必少加附子以行參芪之功挾痰者補中益氣多加半夏以竹瀝薑汁傳送

寸關急大而數無力或熱或不熱手心必熱四

治法第一卷 內傷

百三

肢倦怠頭時痛乃內傷元氣病也脉法曰右寸氣口脉急大而數時一代而游澁為肺之本脉代者元氣不相續此飲食失節勞役過甚太虛之脉也

關脉大而數數中見緩時一代也此不大勞役之脉

關脉損弱甚則隱而不見但內見脾脉之大數微緩時一代此飲食失節寒濕失所之脉也

關脉沉而滑乃宿食不消之脉也

三金三虛診內傷之脉右寸關必大初診時按即軟而無力左脉平和不數亦有弱之但于右手耳乃氣弱火盛之脉數大為虛火無一為氣弱若認為有餘之火用寒涼藥則愈傷中氣火轉甚矣又有悞為氣口緊盛為食滯者然雖疑似以有力無力形狀迥別又須以所兼之症參之方可下手若是宿滯心下必飽悶噯酸噯氣神旺而不倦若倦怠懶言無力下痞不飽自是內傷東垣曰火者元氣之賊火與元氣不

治法第一卷 內傷

百四

兩立一勝則一負經曰壯火食氣東垣曰虛火可補參芪之屬所以補中益氣乃治虛火之聖藥也

若元氣既虛復傷食停滯中膈作飽惡心或發寒熱乃是不足中之有餘

兼見內傷倦怠等症

寸關必滑當助脾消導不可過用剋伐詳見傷食門

左脉浮大兼外感症右脉亦大無力或有汗或無汗身倦怠懶于言動者為內傷挾外感當看

孰急標本治之大抵不宜大汗下或只以補中
益氣湯為主在表當汗者加蘇葉羌活川芎葛
根之類隨症加減汗之在半表半裏對小柴胡
解毒之類在裏當下者加酒洗大黃從輕下之
高年及產婦感冒同法
補中益氣湯

黃芪錢一人參錢一炙甘草五分或七分

白朮各七分當歸各七分陳皮五分升麻五分柴胡二

酒炒各三分
多汗當歸炒
用薑棗煎

治法彙一卷一傷

五十五

脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以實腠理不令
自汗出也上氣喘促損其元氣用人參以補之
心火乘脾用炙甘草之甘溫以瀉火熱而補胃
中元氣若脾胃急痛腹中急迫者宜多用之此
三味除濕熱煩熱之聖藥也白朮苦甘溫除胃
中熱利腰膝間血升麻柴胡苦平味之薄者升
胃中之清氣又引黃芪甘草甘溫之氣上升能
補衛氣之散解而實其表又緩帶脉之數急
當歸以和血脈橘紅以理胃中之氣又能助中

氣上升以散滯氣助諸甘辛為用或少加黃
以救腎水而瀉陰中之伏火也表熱者一二服
氣和微汗而愈如咽乾者加乾葛如心刺
痛乃血不足加當歸如精神短少加人參五
味子如頭痛加蔓荊子痛甚加川芎頂
痛腰痛加桑本細辛有痰加半夏生薑如
咳嗽夏加五味麥門冬秋冬加藕節麻黃
春加佛耳草款冬花久嗽肺中伏火去人參
如食不下乃胸中有寒或氣滯滯加青皮木香
治法彙一卷一傷
五十六
陳皮寒月加益智草豆蔻夏月更加芩連秋加
檳榔砂仁如心下痞悶加芍藥黃連如腹
脹加枳實木香砂仁厚朴天寒加生薑
如腹加白芍甘草有寒加桂心夏加乾薑
黃芩芍藥冬加益智草豆蔻半夏如脇痛
或縮急加柴胡甘草如臍下痛加熟地黃不
已乃是寒也加肉桂如大便閉塞加當歸大
黃如脚乏力或痛加黃芩如無力而軟加
牛膝杜仲如心氣浮亂以砂安神九鎮固

之則愈

三錫曰此方加減法原爲中氣不足而有火者設余嘗治脾胃兩虛食不甘且不化者減當歸加麥蘖神麴山楂大獲奇驗第下焦陰虛火盛者不宜服詳見虛損門

硃砂安神丸

黃連

一兩

硃砂

一兩

酒生地

酒當歸身

炙甘草

各五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服十

治法彙一卷

內傷

百廿七

五九津唾下

調中益氣湯其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澁其症四肢倦怠肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦口失滋味腹難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月殮泄米穀不化或便後見血或見白膿胸滿短氣膈噎不通或痰嗽稠粘口中沫沫食入反出耳聾耳鳴目中溜火視物昏花

努肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力

不思飲食此藥主之

卽補中益氣湯減當歸白朮加蒼朮五分木

香二分

水二鍾煎一鍾空心溫服寧心絕思藥必神

効蓋空心病在四肢諸脉皆會于旦故也

如時見躁熱乃下元陰火蒸蒸發也加生

地二分黃柏三分大便虛坐不得或了

而不了腹中逼迫血虛血泄也加當歸三

治法彙一卷

內傷

百廿八

分如身體沉重雖小便數多亦加茯苓

二分蒼朮一錢澤瀉五分黃柏三分如

胃氣不和加半夏五分生薑三片有嗽

加生地二分如痰厥頭痛非半夏不除

此足太陰脾經所作也如兼躁熱加黃

栢生地各三分如無上症只服前藥如

惡寒腹中痛加桂心三分去苓名桂枝芍

藥湯如冬月腹痛不可用芍藥蓋酸收

且寒故也只加乾薑二分生薑製半夏七

分如秋冬之月胃脉四道爲衝脉所逆併脇下少陽脉二道而反上行病名厥逆內經曰逆氣上行滿脉去形明七神昏絕離去其形而灰矣其止氣上冲不得息而喘息有音加莫茱萸五分或一錢湯泡去苦水觀厥氣多寡而用如夏月有此症爲大熱也蓋此病隨四時寒熱溫涼又宜以黃栢黃連知母俱酒製等分細末白湯丸桐子大每服二百丸空心白湯下仍多

治法彙一卷內傷

百七

飲白湯少時以羹飯壓之使不停滯于中焦直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦之脉乃虛勞與七損症也當用溫平甘多辛少之藥治之是大法也

升陽順氣湯 治飲食不調勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒饑則常如飽不善食冷物

卽補中益氣湯去白朮加草豆蔻四分黃栢三分神麴三分

中之陽引脾胃清氣行于陽道及諸經發陰陽之氣以滋春氣之和又引黃芪參茸草茸溫之氣味上行充實腠理使陽氣得衛外而爲固也凡脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也

當歸補血湯 治肌熱燥熱煩渴飲引目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛血虛仲景曰血虛發熱症像白

治法彙一卷內傷

百七

虎惟脉不長實爲辨耳誤服白虎必死此病得之于饑困勞役

黃芪一兩當歸酒洗二錢

水二鍾煎一鍾食前溫服

益胃升陽湯 肺及脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱稍退體重節痛口燥舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病漸惡寒慘慘不樂面色惡而不紅乃陽氣不伸故也當

升陽益氣

黃芪錢一半夏

人參

甘草

炙五分獨活三分

防風以辛溫散之

白朮

三分白芍何

秋旺人參白朮白芍及補蓋因脾虛

羌活分三橘紅半

茯苓

小便利不柴胡分二

澤瀉秘不用

黃連

一分

薑五片棗二枚早飯後服藥後如小便罷而

病加是不宜利小便去茯苓澤瀉如方

喜食一二日不可飽食恐胃再傷以藥力

尚少脾胃之氣不得轉運升發也須滋味

之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋

其胃氣慎不可煩食以損藥力而助邪氣

之降沉也可以少役形體使胃與藥得轉

運升發慎勿太勞役使氣復傷若脾胃得

安靜尤佳若胃氣稍強少食佳果以助藥

力經曰五果為助是也

雙和散補血益氣治虛勞少力不熱不寒溫而

有補方用四物加黃芪六分甘草炙肉桂

各四分薑棗煎服大病後血虛氣乏

此調理妙

四肢怠惰食不甘虛火炎上手足心熱身亦時

熱勞役飲食失節者極多世誤以為腎虛用坎

藥胃氣轉傷害人殊甚大凡足三陰虛多緣

修食勞役以致腎不能生肝肝不能生心而害

脾土不能食化源乏滋但補脾土則金旺水生

木得平而虛火息矣

有人數傷風鼻塞流涕嚏噴是肺脾兩虛腠理

治法藥一卷內傷

不密也愈發則愈虛愈虛則愈感惟補中益氣

湯能治之

薛新甫曰凡人元氣素弱或因起居失宜或因

飲食勞倦或因用心太過致遺精白濁自汗盜

汗或內熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳

膨脹脇肋作痛或頭脛時痛眩暈眼花或心神

不寧寤而不寐或小便赤澀莖中作痛或便溺

餘瀝臍腹陰冷或形容不克肢體畏寒或鼻氣

急從一切熱症皆是無根虛火但服十全大補

加五時麥門固其根本諸症自息若急于降火攻痰則悞矣

一人脾胃素弱飲食勞倦腹痛胸痞悞用大黃等反加譫語煩躁頭痛喘汗吐瀉頻頻時或昏瞶脉大無倫與六君子湯加炮薑四劑而安但倦怠少食口乾發熱六脉浮數浮為氣虛數為血虛大劑補中益氣湯十服愈

凡人飲食勞倦起居失宜見一切火症悉屬內真寒而外假熱故肚腹喜煖常以熱手按口畏冷物此形氣病氣侯屬不足法當純補元氣為主

治法彙一卷

百世

中年後齒縫脹皆氣虛而火泛上補中自愈

怠惰嗜臥

東垣曰脉緩四肢怠惰不收嗜臥或大便泄瀉此濕勝從平胃散又云怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沈困或泄瀉加蒼朮白汗加白朮食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾胃虛故也六君子加神麴麥芽山查之類四肢怠惰人參

福氣湯

丹溪曰脾胃受濕沉困無力怠惰嗜臥半夏白朮肥人是氣虛宜人參二朮二陳亦有體厚而濕痰勝作麻倦軟者二朮二陳加滑石秦艽黑瘦人脉弦數是血虛有熱四物加酒芩白朮飲食太過轉運不調枳實白朮

身重

東垣云身重者濕也補中益氣加去桂五苓散肥人多濕痰與氣虛潔古曰起臥不便謂之

治法彙一卷

百世

濕身重是也小柴胡湯黃芪芍藥湯仲景云風濕脉浮身重汗出惡風防已黃芪湯潔古曰夏月中風濕身重如山不能轉側除風勝濕去熱為主仲景曰腎者之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出表裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢其薑苓木湯主之脾胃虛弱元氣不能榮于心脉四肢沉重食後昏悶參朮湯主之

補中益氣湯參芪木草佐升麻柴胡雖引藥
補陽氣亦取其升胃氣也綱目曰人五十以後
其氣消者多長者少降者多升者少秋冬之令
多春夏之令少若稟受弱又兼勞碌饑飽必多
內傷症倦怠手心熱自汗食少飯後轉劇頭目
沉重大便或秘或瀉小便頻數是也

防已黃芪湯

防已 黃芪 白朮 甘草

水壹鍾薑棗煎至柒分溫服

治法彙一卷 身重

百廿五

黃芪芍藥湯 黃芪 甘草 升麻 葛根

羌活 白芍 白朮煎服

甘藷苓朮湯 甘草 白朮 乾藷 茯苓

白水煎服

參朮湯 益氣湯 去白朮加蒼朮黃柏青皮神麴

小柴胡湯 見傷寒門

虛損

五臟六腑氣血不足為虛虛甚臟腑經絡有虧
經損宜分臟腑氣血

難經曰氣虛則惡寒血虛則發熱此診虛症

三時語

虛脈必緩而無力即難經所謂至脈之為病

也

血虛脈必數而無力即難經所謂損脈之為病

也

治法彙二卷 虛損

乙

諸證曰心肺損而色敗腎肝損而形痿 心肺

屬陽在上故損則色敗腎肝屬陰在下故損則

形痿 難經曰一損損于皮毛皮聚而毛落二

損損于血脉血脉虛少不能榮于五臟六腑也

三損于筋筋緩不能自收持五損損于骨骨痿

不能起于床反此者至脈之為病從上而下者骨

不能起于床者少謂從肺而之腎也從下上

者皮聚而毛落者少謂從腎而之肺也損其

者益其氣損其心者調其榮衛損其肝者緩

其中損其脾者調飲食適其寒溫損其腎者益其精此治損之法也

脈來軟弱濡緩遲微或虛大無力為氣虛上半日轉劇倦怠心煩反覺火上炎下午即安手冷而白色

脈滿數孔細逼指空大為血虛甚于下午及夜

身恒熱瘦而憔悴色黑兩頰赤便澀口鼻乾

四君子湯治氣虛藥也 四物湯治血虛藥也

八物湯治氣血兩虛藥也 六君子湯治氣虛

治法彙二卷

虛損

二

挾痰藥也 十全大補湯治氣血兩虛有寒藥

也 補中益氣湯內傷脾氣中氣不足藥也

天王補心丹栢子養心丸治心虛藥也 人參

膏治肺虛藥也 六味地黃丸坎離丸治腎經

陰虛藥也 五臟之中肝常有餘古人畧補肝

之劑 虛而熱在上者八物加片苓麥門冬

虛而熱在中者八物加炒黃連梔子 虛而熱

在下者八物加酒黃栢知母 虛而熱在外者

八物加軟柴胡地骨皮 虛而有痰者八物加

陳皮貝母或薑製半夏花粉 虛而脾不運者

八物去地黃加陳皮山楂麥芽神麴香附砂仁

之類此特示其端倪耳臨病增損原無一定

丹溪方老年人虛損但覺小水短少即是病進

宜人參白朮為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為

佐春加黃芩麥門秋冬加歸貝倍生薑一日一

貼小水如舊乃佳此老人順養捷法也

陰虛發熱咳嗽世人往往用坎離而百無一効

者何哉蓋陰既虧矣火必上炎而用芎當歸皆

治法彙二卷

虛損

三

味辛大溫非滋陰降火之藥又川芎上竄尤非

虛炎短乏者所宜地黃泥膈非食少胃弱痰多

者所宜黃栢知母苦辛大寒雖曰滋陰其實燥

而損血雖曰降火其實苦先入心久而增氣反

能助火至于敗胃所不待言常以薏米百合天

冬麥冬桑皮地骨皮牡丹皮枇杷葉五味子酸

棗仁之類佐以生地汁藕汁乳汁童便等如咳

嗽則多用桑皮枇杷葉有痰則多用貝母有血

則多用薏苡至七八錢而麥冬為之主以保肺

金而滋其源無不應手獲効

腎陰虧損骨疼不能行宜加味虎潛丸

氣虛生脉散不言白朮血虛三才丸不言四物

大凡虛弱人須以人補人河車人乳紅船俱妙

須緩心和氣人可用粗暴者恐反助火也

服乳須擇謹慎婦人頭生無病者屏除一切厚

味只以糯米粥猪肚蹄湯將養醞造三二日佳

李時珍曰人乳無定性隨飲食氣而變然乳

是血所化惟陰血燥涸者宜脾胃弱作瀉者恐

增痰作瀉牛乳亦同性第平爾

治法彙二卷 虛損

四

韓飛霞曰人參煉膏固元氣于無何有之鄉一

切產後病後及癰疽出膿後元氣未復者大獲

奇驗第王道無近功粗心者難以語此

肺氣虛而咳嗽自汗脉緩不食當先補脾所謂

虛則補其母也

虛弱發熱有氣虛血虛之分氣虛則重甚而自

汗倦忌當補中益氣血虛則盛于下午脉數疾

口燥渴當養血滋陰今人但見發熱即用柴胡
不知柴胡走泄之藥惟肝膽有實火者宜之或
補養藥用酒製為佐以清肌表之熱同牡丹皮
地骨皮用可也

補腎丸

黃柏 龜板 各二 杜仲 同上 牛膝

陳皮 各二 乾薑 冬加五 五味子 八錢

右為細末薑汁糊丸或酒糊丸溫酒或白湯

下

治法彙二卷 虛損

五

補天丸

紫河車一具即胎衣古方不分男女惟初

胎者佳如不可得但求肥盛無病婦人俱

可長流洗淨酒煮搗膏頓熟炭籠烘者

或以前補腎末酒糊丸或以六味地黃丸

加用亦可任病加減

虛勞者當以骨蒸藥佐之氣虛加補氣藥

血虛加補血藥

虛勞之疾百脉空虛非粘膩之物填之不能實

也宜用人參黃芪地黃二冬枸杞五味各煎膏
另用青蒿以童便熬膏及生地汁白藕汁人乳
薄荷汁隔湯煉過酌定多少并鹿角膠霞天膏
和合成劑每用數匙湯化服之如欲行瘀血加
入醋製大黃末玄明粉桃仁泥韭汁之屬欲止
血加京墨欲行痰加竹瀝欲降火加重便

虛勞之症大抵心下引脇俱痛不能臥止一邊
臥蓋滯血不消新血無以養之也尤宜膏子加
韭汁桃仁泥呼吸少氣嗽言無力動作目無

治法彙二卷 虛損

六

精光面色皎白皆兼氣虛用麥冬人參各三錢
橘紅炙甘草各半兩五味子二十一粒為極細
末水浸蒸餅為丸雞頭子大每細嚼一丸津液嚥
下名補氣丸

治心肺損及胃損飲食不為肌膚宜益氣和血
調飲食十全大湯治腎損骨痿不能起于床宜
益精補腎金剛丸 治腎肝損骨痿不能起于
床宜益精筋緩不能收特宜緩中牛膝丸 治
肝腎損及脾食穀不化宜益精緩中消穀煨腎

丸如陽虛陰虛肝腎不足房室虛形瘦無力面
多黃而無常色宜榮血養腎地黃丸如陽盛
陰虛心肝不足及男子婦人面無血色食少嗜
臥或體弱出宜八味丸如形體瘦弱無力多困
未知陰陽先損夏月宜地黃丸春秋宜腎氣丸
冬月宜八味丸病久虛弱厭厭不能食和中丸
肝勞盡力謀慮而成虛寒則口苦骨疼筋攣煩
悶宜續斷湯炙肝俞實熱則關格牢澀不通眼
目赤澀煩悶熱壅毛悴色天宜羚羊角散

治法彙二卷 虛損

二

心勞兩運神機而成虛寒則驚悸恍惚神志不
足宜遠志飲子酸棗仁湯實熱則口舌生瘡大
小便秘澀宜黃芩湯

脾勞意外過思而成虛寒則氣脹咽滿食不下
噫氣宜白朮湯生嘉木散大健脾丸實熱則四
肢不和脈滿氣急不安宜小甘露飲

肺勞預事而憂所成虛寒則心腹冷氣胸滿背
痛吐逆宜溫肺湯實熱則氣喘面目苦腫宜二
母湯

腎勞矜持志節所成虛寒則遺精白濁腰脊如折宜羊腎丸實熱則小便黃赤濕痛陰生瘡宜地黃丸

肝傷筋極虛則手足拘攣腹痛指甲痛轉筋宜木瓜散當歸枸杞續斷實則咳而脇下痛脚心痛不可忍手足甲青黑宜五加皮湯

心傷脉極虛則咳而心痛咽腫喉中介介如梗宜夜神湯遠志酸棗仁硃砂龍齒實則血焦髮落唇舌赤語澀肌瘦宜麥門冬湯

治法彙二卷

虛損

八

脾傷肉極虛則四肢倦關節痛不食陰引肩背皆強宜半夏湯豆蔻厚朴陳皮益智實則肌肉痺湊理開汗大泄四肢緩弱急痛宜薏苡仁散肺傷氣極虛則皮毛焦津液枯力乏腹脹喘息宜紫菀湯人參黃芪白石英實則喘息衝胸心悲腹滿熱煩嘔口燥咽乾宜前胡湯腎傷骨極虛則面腫垢黑脊痛氣衰毛髮枯槁宜鹿角丸益智仁五味子鹿茸實則面焦耳鳴小便不通手足痛宜玄參湯

癰疽虛腫膿已卸精極虛則遺精白濁體虛小腹急重弱核小宜磁石丸鹿茸菴蓉破故紙龍骨人參附子鍾乳實則目昏毛焦虛熱煩悶泄精宜石斛湯

古今錄驗五蒸湯甘草炙一兩茯苓三兩人參二兩乾地黃三兩竹葉二把葛根三兩知母二兩黃芩二兩梗米二合石膏五兩碎石十味咀以水九升煮小麥一升至六升去麥入藥煎至二升半分三服實熱加黃連黃芩黃蘗大

治法彙二卷

虛損

九

黃虛熱加烏梅秦艽柴胡氣也青蒿鱉甲蛤蚧牡丹皮小麥血也

二十三蒸主治加法于後

肺蒸乾鼻加烏梅紫苑天門冬麥門冬○皮蒸乾鼻石膏桑白皮○膚蒸唇腫牡丹皮○氣蒸身熱石膏桑白皮○大腸蒸鼻右孔促鼻乾人參黃芩梔子○

大黃

心蒸舌乾加黃連生地黃○血蒸髮焦地黃當歸桂心童子小便○脉蒸自汗地黃當歸生地

黃○小腸蒸下焦木通赤茯苓生地黃

脾蒸中焦加芍藥木瓜苦參○肉蒸食無味而喘

芍藥○胃蒸下焦石膏粳米大黃芒硝芍根

肝蒸中焦加前胡川芎當歸○筋蒸中焦川芎當歸

膽蒸上焦柴胡枯藁○三焦蒸中焦石膏竹

葉

腎蒸下焦加石膏知母生地黃寒水石○腦蒸

髓蒸中焦羌活地黃防風○髓蒸中焦當歸地黃

天門冬○骨蒸中焦當歸地黃

治法彙二卷虛損十一

皮壯丹皮生地黃○肉蒸中焦石膏黃蘗

胞蒸中焦生地黃澤瀉茯苓沉香滑石○膀

胱蒸中焦澤瀉茯苓滑石

凡此諸蒸皆因熱病後食肉油膩行房飲酒犯

之而成久蒸不除變成痺病即成矣 珍珠囊

云地為陰骨為裏皮為表地骨皮瀉腎火壯丹

皮瀉包絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉

腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治

婦人骨蒸 證治要訣云五勞皆因不量才力

疲強云為憂思過度嗜慾無節或病失調將積

久成勞其證頭旋眼暈身疼脚弱心怯氣短自

汗盜汗或發寒熱或五心常熱或往來潮熱或

骨蒸作熱夜多惡夢晝少精神耳內蟬鳴口中

無味飲食減少此皆勞傷之證也五臟雖皆有

勞心腎為多心主血腎主精精竭血燥則勞生

焉治勞之法當以調心補腎為先不當用峻烈

之劑惟當溫養滋補以久取効天雄附子之類

投之適足以發其虛陽緣內無精血不足當此

治法彙二卷虛損十一

猛劑然不可因有熱純用甜冷之藥以傷其胃

氣獨用熱藥者猶釜中無水而進火也過用冷

藥者猶釜下無火而添水也非徒無益而又害

之宜十全大補湯或雙和湯或人參養榮湯七

珍散樂令建中湯皆可選用間進雙補丸

右所列五勞六極二十三蒸諸治法亦畧備矣

然當以脾腎二臟為要何以言之腎乃繫元氣

者也脾乃養形體者也經曰形不足者溫之以

氣謂真氣有少火之溫以育形體然此火不可

使之壯壯則反耗真氣也其火之壯少皆在腎
腎間經又曰精不足者補之以味五味入胃各
從所喜之藏而歸之以生津液輸納于腎者若
五味一有過反成其藏有餘勝克之禍起也候
其五味之寒熱初在脾胃次在其所歸之藏即
當補其不足馮其有餘謹守精氣調其陰陽使
神內藏夫如是則天樞開發而胃和脉生故榮
衛以周于內外無不被滋養而病愈也

四君子湯 治氣虛

治法彙二卷 虛損

人參錢五 白朮錢一 茯苓錢一 甘草錢三

每服四五錢水煎服

四物湯 治血虛

川芎 當歸錢各五 芍藥錢一 熟地錢各一

用水煎每服五錢

八物湯 四君四物相合治氣血兩虛

十全大補湯 治氣血兩虛脾弱手足逆冷脉

沉微無火症者即八物加黃芪肉桂薑棗煎

服

還少丹 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗

筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣靡乏

小便渾濁

乾山藥 牛膝酒浸 遠志心去 山茱萸肉

白茯苓 五味子 巴戟心酒浸去 杜仲去

皮薑汁酒拌 石菖蒲 楮實子

肉蓯蓉酒浸一 舶上茴香各壹兩

枸杞子 熟地黃各貳兩

右細末煉蜜同棗肉爲丸桐子大每服叁拾

治法彙二卷 虛損

丸溫酒或鹽湯下日叁服

金剛丸命保 治腎損骨痿不能起于床宜服此

益精 草薢 杜仲炒去絲 菴蓉酒浸

兔絲子酒浸各等分

右爲細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大

每服伍柒拾丸空心用溫酒送下

牛膝丸命保 治腎肝損骨痿不能起于床筋弱

不能收持宜益精緩中

牛膝 <small>浸酒</small> 杜仲 <small>炒去絲</small> 白茯苓 防風	鬼絲子 <small>酒浸</small> 肉苁蓉 <small>酒浸</small> 官桂 <small>減半</small>	右製服同上金剛丸法	鹿茸角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅	鹿茸角 <small>銹</small> 柴胡 黃芩 當歸 羌活	決明子 炙甘草 赤芍 <small>各等</small> 加薑煎	遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸	遠志 <small>心去</small> 茯神 <small>木肉桂</small> 人參 酸棗仁 <small>炒</small>	黃芪 當歸 <small>酒浸各</small> 甘草 <small>炙</small> 加薑煎	治法彙二卷 虛損 十四	酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲	肉蓄怔忡恍惚夜臥不安	酸棗仁 <small>炮去皮</small> 遠志肉 黃耆 蓮肉 <small>去心</small>	羅參 當歸 <small>酒浸</small> 白茯苓 茯神 <small>各壹兩</small>	陳皮 粉草 <small>炙各半</small>	咬咀每服肆錢水壹盞半 參片棗壹枚瓦	罌煎柒分日叁服臨臥壹服	黃芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利	澤瀉 梔子仁 黃芩 麥門冬 <small>去心</small>
---	--	-----------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------	--	--	-------------	--------------------	------------	--	---	--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------------------

木通 生地黃 黃連 甘草 <small>炙各等</small>	每服肆錢水壹盞薑伍片煎服無時	白朮散 治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胸滿喜噦	白朮 人參 草果仁 厚朴 <small>製</small>	肉豆蔻 <small>麵裹煨熟取出</small> 陳皮 <small>淨</small>	木香 麥蘖 <small>炒各</small> 甘草 <small>炙半</small>	咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服無時	治法彙二卷 虛損 十五	生嘉禾散 治脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰	不進飲食或五噎五膈	白茯苓 <small>去縮砂皮</small> 薏苡仁 <small>炒</small> 枇杷葉 <small>去毛</small>	炙人參 <small>去蘆各</small> 白朮 <small>炒二</small> 桑白皮 <small>炒</small>	檳榔 白豆蔻 <small>炒去</small> 青皮 穀藥 <small>炒</small>	五味子 <small>炒各</small> 沉香 杜仲 <small>去皮薑汁酒</small>	丁香 藿香 隨風子 石斛 <small>酒和</small>	半夏 <small>薑汁搗和作餅炙黃色</small> 大腹子 <small>炒各七錢</small>	甘草 <small>炙兩</small> 陳皮 <small>去</small> 神麴 <small>炒各二錢伍</small>
---------------------------------	----------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	---------------------	-------------	--------------------	-----------	--	--	---	--	--------------------------------	---	--

每服參錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎米分不
拘時溫服五噎入乾柿壹枚膈氣吐逆入薤
白叁寸棗五枚

生脉散 見暑門

霞天膏 見積門

小耳露飲 治脾勞實熱身體面目悉黃舌乾

咽喉腫痛

黃芩 升麻 茵陳 梔子仁 桔梗

石斛 甘草 炙 生地黃 各等分

治法彙二卷 虛損

十六

每服肆錢水壹盞薑五片同煎溫服無時

和中丸 治久病虛弱服厭不能食

乾薑 錢一 甘草 炙 陳皮 各一錢 木瓜 一枚

人參 白朮 各三錢

爲末蒸餅丸食前白湯下叁伍拾丸

七珍散 開胃養氣和肝進食 續易簡十珍

散即此加扁豆砂仁桔梗五味子

人參 白朮 黃芪 炙 山藥 白茯苓

粟米 微炒 甘草 各等分

右爲細末每服參錢薑棗煎服如故不思飲
食加扁豆壹兩名八珍散

大健脾丸

白朮 淨三斤 廣陳皮 永洗 斤 溫 川黃連 八兩

吳茱萸 三兩 湯泡 人參 五兩 當歸身 六兩

白豆蔻 三兩 去殼 南木香 二兩 枳實 八兩 蒸

白茯苓 一斤 去 神麴 八兩 穀藥 八兩

青皮 五兩 醋炒 右爲末老粳米荷葉湯疊丸

菜豆大食遠白湯下貳錢小兒壹錢

治法彙二卷 虛損

十七

三才丸

天門冬 地黃 人參 各等分

右爲末煉蜜丸空心服

柴胡飲子 解一切肌膚蒸熱寒熱往來及傷

寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經

病不快產後但有此症並宜服之

黃芩 甘草 炙 大黃 芍藥 柴胡

人參 當歸 各半 每服肆錢薑叁片煎

陸分溫服

濕肺湯 治肺勞虛寒心腹冷痛胸脇逆滿氣

穿背痛飲食即吐虛乏不足

人參 鍾乳粉 製半夏 肉桂 不見火

橘紅 乾薑 炮各一兩 木香 不見火 甘草 炙各半

煎服法同前

二母湯 治肺勞虛熱面目浮腫欬嗽喘急煩

熱頰赤骨節多痛乍寒乍熱

知母 貝母 去心 杏仁 去皮尖 各半兩 製半夏 一兩

甜葶藶 炒半 秦艽 橘紅 各一兩

治肺癰主藥 虛損

炙甘草 半兩 右煎服法同前

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈

伸不利夢寐驚悸小便白濁

熟地黄 酒蒸 杜仲 炒 兔絲子 酒蒸 石斛 去

黃芪 斷續 酒浸 肉桂 磁石 煨醋 各一兩

牛膝 酒浸去 沉香 別五加皮 山藥 各一兩

右爲細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入

少酒糊杵丸桐子大每米拾九空心鹽湯下

木瓜散 治筋虛極脚手拘攣十指甲痛數轉

筋甚則舌卷卵縮唇青面黑

木瓜 去 虎脛骨 酥炙 五加皮 洗 當歸 酒

桑寄生 酸棗仁 製 人參 栝子仁

黃芪 各一兩 炙甘草 半兩 煎服法同前

五加皮湯 治筋實極咳則兩脇下痛不可轉

動並脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢

筋急

羌活 羚羊角 切 赤芍藥 防風 秦艽

五加皮 洗 枳實 去穢 甘草 炙各半兩

治筋癰主藥 虛損

煎服法同前

茯神湯 治脉虛極嗽則心痛喉中介介如梗

狀甚則咽腫

茯神 去 人參 遠志 甘草 炙 通心

麥冬 去 黃耆 製 桔梗 甘草 炙各等分

呖咀每服肆錢水壹盞置伍片煎服無時

麥門冬湯 治脉實極氣衰血隳髮落好怒唇

口赤甚

麥門冬 去 遠志 製 人參 黃芩

生地黃洗 茯神 石膏煨各一兩 甘草炙半

煎服法同前

半夏湯 治肉虛極體重連肩脇不能轉動則

咳嗽脹滿痰飲大便不利

製半夏 白朮 人參 茯神 陳皮淨

附子炮 木香 肉桂 大腹皮

炙甘草各等分 煎服法同前

薏苡仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液

開泄或時麻痺不仁

治法彙二卷虛損 二十

薏苡仁 石膏煨 川芎 肉桂 防風

防己 羚羊角錫 赤芍 杏仁去皮炒

甘草炙各等分 煎服法同前

紫苑湯 治氣虛極皮毛焦枯四肢無力喘急

短氣

紫苑茸洗 乾薑炮 黃芪 人參

五味子 鍾乳石粉 杏仁蘇炒去

甘草炙各等分

每服肆錢水壹盞薑伍片棗壹枚煎服無時

前胡湯 治氣實極胸膈不利咳逆短氣嘔

不食用薑棗煎服

前胡 製半夏 杏仁製 紫蘇子炒

枳實 淨陳皮 桑白皮炙甘草各等分

鹿角丸 治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立

氣血衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角二兩 牛膝酒浸焙去蘆

右爲細末煉蜜丸桐子大每服柒拾丸空心

鹽湯下

治法彙二卷虛損 二十一

玄參湯 治骨實極面色焦枯隱屈勝腕不通

牙齦腦髓苦痛手足酸疼大小便秘

玄參 生地黃洗 製枳殼 車前子

黃芪 當歸酒浸 麥門冬去心 白芍藥各兩

炙甘草半兩

每服肆錢薑五片水壹盞煎服無時

磁石丸 治精虛極體氣瘦悴夢中走泄後遺

瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石醋淬 肉蓯蓉酒浸 鹿茸酒蒸

續斷 <small>酒浸</small> 杜仲 <small>薑汁炒</small> 赤石脂 <small>煨</small> 栢子仁 <small>炒</small>	熟地黃 <small>酒蒸</small> 山茱萸肉 兔絲子 <small>酒蒸</small>	巴戟 <small>去心</small> 韭子 <small>炒各壹兩</small>	右為細末酒糊丸桐子大每服柒拾九空心鹽酒鹽湯任下	石斛湯 治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚則胸中煩悶夜夢遺精	小草 石斛 黃芪 麥門冬 <small>去心</small>	生地黃 <small>洗</small> 白茯苓 玄參 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙</small>	治法彙二卷 虛損 二十二	吹咀每服肆錢水壹盞薑五片煎服無時	人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證	勿論其病勿論其脉但用此湯其病悉退	白芍藥 <small>壹錢</small> 人參 陳皮 黃耆 <small>蜜炙</small>	桂心 當歸 白朮 甘草 <small>炙各壹錢</small>	熟地黃 五味子 <small>炒</small> 茯苓 <small>各半</small> 遠志 <small>伍分</small>	右薑棗水煎服	雙和湯 治虛勞養氣血
--	--	---	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--------------	------------------	------------------------------------	------------------	--	---------------------------------	--	--------	------------

白芍藥 <small>米兩</small> 熟地黃 <small>酒洗</small> 黃耆 <small>去蘆</small>	當歸 <small>酒洗</small> 川芎 <small>各壹兩</small> 炙甘草 肉桂 <small>各二錢半</small>	每服叁錢水壹盞薑參片棗壹枚煎柒分空心溫服	樂令建中湯 治藏府虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣	前胡 細辛 <small>淨</small> 黃耆 <small>蜜炙</small> 人參 桂心	橘皮 <small>去白</small> 當歸 <small>洗</small> 白芍藥 茯苓 甘草 <small>炙</small>	麥門冬 <small>去心各壹兩</small> 半夏 <small>湯洗七次切</small>	治法彙二卷 虛損 二十三	每服肆錢水壹盞薑肆片棗壹枚煎柒分不拘時熱服	究原雙補丸 治一切虛損五勞七傷面目黧黑唇口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠痛	鹿角霜 <small>炙</small> 黃耆 <small>炙</small> 沉香 熟地黃 <small>洗</small>	兔絲子 <small>酒洗</small> 覆盆子 <small>去枝</small> 人參 <small>去蘆</small>	宣木瓜 白茯苓 <small>去皮</small> 五味子	薏苡仁 <small>炒</small> 肉苁蓉 <small>洗酒</small> 石斛 <small>去根炒</small>	當歸 <small>酒洗</small> 澤瀉 <small>各壹兩</small> 麝香 <small>壹錢</small> 朱砂 <small>半兩為衣另研</small>
--	---	----------------------	-----------------------------------	---	---	--	--------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--

右爲末煉蜜丸桐子大每袋拾九空心

下

瓊王膏 治虛勞乾咳嗽

人參

十二兩

白茯苓

去皮淨者 二十五兩 白砂蜜

五斤煎

生地黃

洗淨十斤石礱內杵爛 取自然汁大忌鐵器

沉香

五錢

琥珀

五錢

曜仙曰今予所製此方加沉香

琥珀貳物其功效異于世傳之方

右以人參茯苓沉香琥珀俱爲細末先將地

黃汁與白沙蜜攪勻用蜜絹摠去渣入藥末

治法彙二卷

虛損

主五

攪勻入好磁瓶或銀瓶內用綿紙拾數層外

加箬葉包扎瓶口入砂鍋內或銅鍋內以長

流水浸至瓶頸用桑柴文武火煮三晝夜取

出換蠟紙重包扎瓶口浸投井中半日以出

火毒提起仍入前鍋內煮半日以出水氣然

後收藏每日清晨及午前後取一二匙用溫

酒一盞調服不飲酒人白湯亦可此法須用

不聞雞犬聲處煅煉之及不許孝子婦人見

之

煉石法

童便壹缸牙皂煎水貳叁碗入缸內用柳條

亂攪起白泡用杓撇去隨攪隨撇令泡盡澄

清許久上去其泡下去其垢膩惟取中間清

水入鍋內煎熬用劈柴火先文後武火熬二

三碗又加童便半鍋又熬至乾又加又熬至

缸中童便盡爲度熬至焦乾入香油一碗從

鍋週圍傾入鍋底下用極猛火燒過透紅無

油氣連鍋撥起放地上待冷一時自然成塊

治法彙二卷

虛損

主五

而起研羅細末用淨水二碗入內攪勻如米

湯樣澄一二日再攪起傾入上好雪白連四

紙十數層盛之下用竹篾爲筲箕先以筲箕

用水浸一宿去竹內黃水令淨然後放竹箕

內下用磁器盛之濾下極清水於磁器內濾

令乾收入鍋內將紙內渣再入水攪亦如上

法濾之將先濾清水用廣鍋一口以砂石打

磨令光如銀白入內用炭火熬令乾爲度孤

起放帑上再將鍋打磨淨又熬第二次清水

如上述法只要潔淨熬成如雪之白服之大有神益善降虛火其功不可盡述

六味地黃丸 治腎氣虛損久新憔悴寢汗發

熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸痿弱下血

乾山藥 山茱萸 澤瀉 牡丹皮

白茯苓 熟地黃

右爲末煉蜜丸桐子大每服一百丸白湯下

加味虎潛丸 虎之精力潛于脛骨人腎主骨

而司精精弱則骨痿用此強骨補精故名

治法藥性

虎潛

人參 黃芪 芍藥 黃柏 堅厚老酒

當歸 山藥 鎖陽 比蓯蓉乾而色淡

枸杞 虎脛骨 酒浸一宿 五味子 各七錢

牛膝 酒洗一熟地 四兩

右煉蜜加猪脊髓丸桐子大每服一百丸空

心溫酒下

人參固本丸

天門 麥門 生地 熟地 人參

右等分爲末蜜丸桐子大每服七八十丸空

心鹽湯下 三味補陰丸 治酒色過度傷肺

龜板 黃柏 知母 牛膝 酒

右蜜丸每服七八十丸空酒或鹽湯下

八味丸 治腎虛氣乏下元冷憊臍腹疼痛夜

多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或

黎黑及虛勞不足渴欲飲水腰脚痛小腹

急痛小便不利愚按此方卽六味地黃加

治法藥性

附子 炮肉桂 各一兩 乃兼補命門相火也

尺脉微弱而元陽虛者宜之

坎離丸 此藥取天一生水地二生火之意藥

輕而功用大久服而取効速先賢王道之

藥無出于此大能生精血升降水火

歸身 全用好酒 川芎 大者各 白芍 酒浸切

知母 兩厚黃柏 去皮八兩 酒浸切 熟地 八兩

熟地 八兩 白茯苓 絹袋裏爛 仁白茯苓 用

右六味修製的確平鋪日曬三次以收

天地日月精華研細末煉蜜丸桐子大每服八九十九空鹽湯下

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸

療咽乾養育心神

熟地 白茯苓 栢子仁 丹參 去蘆

白朮 石菖蒲 牛膝 去蘆酒 杜仲

天門冬 泡去 當歸 酸棗仁 炒

玄參 遠志 甘草 水泡 五味子 去梗

治法彙二卷 虛損 二天

棟參 去蘆 白茯苓 桔梗 甘草

各等分 一方有麥門冬 硃砂飛淨爲衣

蜜丸彈子大每服一丸臨睡龍眼湯化下

班龍丸

昔蜀中一道人童顏漆髮眉宇疎秀自歌曰尾閭不禁蒼海竭九轉神丹都漫說惟有班龍頂上珠能補玉堂關下穴按班龍珠乃鹿角鹿之精血結而爲角性溫大補精血元陽相火虛者宜之或加于六味地黃中亦妙

鹿霜 別以微火烘乾去其油所餘者子十兩

免絲子 十兩酒浸一宿 栢子仁 十五兩

熟地黃 十四兩酒蒸

有爲細末先將鹿角膠用無灰酒於磁器中

漫火化開再添煉蜜爲丸如栢子大每服四

五十丸空溫酒或淡鹽湯下

九僊酒 治諸虛

八物各二兩 甘杞半斤 生薑二兩 棗十枚

煮好酒五十斤任飲

治法彙二卷 虛損 二天

張三錫曰補方不啻百種大法有三曰陽虛曰

陰虛曰中氣虛陽虛者三焦元陽虛也即火衰

不能上行腐熱水穀脚膝無力小便頻白不禁

脈緩沉無力者是須益火之源即從蓉桂附鹿

角膠鹿茸之類溫補之陰虛者天一真陰虧損

咳嗽潮熱夜分熱盜汗枯槁脈弦數而疾是也

須壯水之主即六味地黃丸坎離膏丸氣味俱

陰之藥炒黃栢知母地黃門冬之類中氣虛者

脾胃受傷怠惰手心熱且飯後轉增煩悶食不

其氣口脉大而無力是也。即東垣內傷不足之症。治須補中益氣湯加減。醫者不察。但見倦怠體弱。不分所屬。一槩妄治。苦寒泥膈。辛熱助火。胃氣轉傷。飲食益少。臟腑無所稟受。氣口損而體日羸。卒至不救。良可太息。

續命膏 治男婦氣血虛弱。痰火上升。及中風不語。左癱右瘓。腰腿疼痛。動履不便。飲食少進。一切虛損。

人乳二盞香 梨汁一盞

治法藥二卷 虛損

三十

右二味。傾入銀錫錠中。入湯內頓滾。有黃沫起。為度。每五更後一服。

按此二味甘潤之劑。虛火盛而痰多血少。腸胃燥。口乾皮藁者。大有利益。若脾虛中氣不足。大腸濡瀉者。服之恐轉不禁。要在合宜。門冬諸膏亦然。

集靈膏

此方不知出自何許。方書未載。或云自吳中傳來。凡一切氣血兩虛。身弱咳嗽者。固不獲

効。養生家競自修合。醫者每每惜本。謬指為不可服。昧者又減去人參一半。良由不深知人參之性故耳。凡少年但覺氣弱倦怠。津液少。虛火上炎。急宜服之。若待虛極火旺。脉數而疾。咳血盜汗。縱服亦難見効。况黃栢知母四物耶。重生者幸留意。

人參 枸杞各一斤 生地 熟地 天門

麥門去心各一斤 血虛加當歸四兩

脾弱加白朮四兩或半斤 如常炮製將成加蜜

治法藥二卷 虛損

三十

六兩再滾數沸

三才大補膏

生地 熟地各一斤 天門 麥門各半斤

人參四兩 甘杞四兩 牛膝去蘆四兩 何首烏八兩

右咬咀勿犯鐵器。同入大砂鍋內。用水二十

碗。煎至七碗。將汁別貯。藥渣再煎九次。得

七十碗。慢火熬汁。乾一碗。方添一碗。添盡則

汁已濃矣。大抵得汁六碗。却用山白蜜去蠟

一斤半。同藥入砂鍋內。重湯煮滴水不散。則

膏成矣磁礮貯之埋土中七日取出如前再煮一晝夜再埋一日乃分貯小瓶內以次服用不拘時以醇酒或白湯點服按此方地黃門冬爲君補陰要藥少佐人參助陽首烏烏鬚髮陰虛而鬚髮憔悴者宜之

補陰丸 論曰人之一身陰常不足陽常有餘况節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而勞瘵咳嗽咯血吐血等症作矣故宜常補其陰使與陽齊則水能制火

治法彙二卷 虛損

而水升火降斯無病矣故丹溪先生發明補陰之說謂專補左尺相火也古方滋補藥皆兼右尺相火不足左尺原虛右尺原旺只補其左制其右庶得水火相平也右尺相火固不可衰若果衰者方宜補火世人火旺致病者十居八九火衰成疾百無一二少年精壯陰強自不必補中年斷喪太過焉得復實及暮年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自少至老不可缺也

黃柏 去皮酒拌 知母 去皮毛炒足鉄

瑣陽 兩 酥炙乾二 敗龜板 酥炙透 五味子 兩

熟地 酒拌蒸 天門冬 去心 甘枸杞

白芍 酒炒各 乾薑 炒紫色三錢寒月加

右爲細末煉蜜加猪脊髓三條和藥末拌極

勻丸桐子大每服八九十九空心淡鹽湯送

下寒月可用溫酒

夢遺精滑病者加白朮 白茯苓 山梔仁

黃連 各炒五

治法彙二卷 虛損

脚弱無力加牛膝 酒浸 虎脰骨 酥炙 防已 酒浸

木瓜 各五

若有疝氣病加蒼朮 鹽炒一 黃柏 炒 山梔子 各炒

六 川芎 一 吳茱 炒 青皮 去穢各

若脾胃虛畏寒泄者加白朮 三錢 陳皮 一兩

乾薑 炒加至

眼昏加當歸 酒洗 川芎 菊花 各一 柴胡

黃連 酒炒 烏犀角 各伍

兼氣虛加參芪 密炙各

天既虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加服

附子小便肉桂去皮各七錢沉香五錢

接命丹

用無病室女月經首行者為最，二次者為中，四五次為下，如急用但未點破者，俱可取鉛打一具，如黃衣月牙冠，俟月信動時，即以此具令老嫗置陰戶上，用絹幅兜住，接取入磁器中，再取，俟經將衰已過大半而止，澄沉底如硃砂子，乃真母氣，其面上黃色浮者，挹去。

治法彙編卷八 虛損 三十四

却用極細白淨好茯苓為末，用熟水浮去木屑，取沉底曬乾，搗入紅鉛中，如和麪然，多寡軟硬以意消息，打作薄薄餅子，陰乾待用，不可鐵犯，既乾研末，以麻黃洗淨，煎濃汁，濾淨和丸，如菜豆大，以老坑辰砂飛過為衣，用銀罐盛之，以黃蠟收口，每服五十九，或七八十丸，靜坐無風處，見微汗為驗，藥性流行，充溢四肢，經絡皮毛之間，如服後發熱躁渴，此元氣虛藥性到也，須服乳汁數盞止之，服後三

日內蔬食，不可吃油膩之物，此藥進二三次，

或越三五年，又進二三次，立見氣力煥發，精神異常，草木之藥，千百不如此藥一二服，蓋人自十六已後，精氣漸減，不但男女聲色，足以損敗，一與事應，皆耗精氣之原，故禪氏面壁，僊家守丹，築基煉已，苦行以防耗此精神，便是長生之術，此藥採于人身，非若金石草木有偏勝之害，一于補益功力到處，自然外邪不浸，內神愈旺，功眸造化，壽等喬錢，養生

治法彙編卷八 虛損 三十五

者，宜加珍重。○後法：每服一丸，以飯後服，一粒則加茶湯送下，分兩次服，或服一丸，可也，然不特補法妙。

至藥歌

至藥訣，至藥訣，神僊裁接人難說，真機發露有緣人，天律至嚴勿妄泄，勿妄泄，莫輕談，忠孝之人，誓與傳，先積陰功在人世，却選賢良美少年，美少年，方二七月，過十五，輝光熄，櫻桃小口石榴牙，目秀眉清，膚似雪，五千四十莫遲延，緊看印堂光潤澤，光潤澤，驗遲早，精神變態人難曉，至藥初生五彩形，霞光萬道眉間透，三尸六賊

盡潛逃聖母真金無價寶無價寶應天星磨如
血珀電光生兩目瞳人如漆黑五心煩熱藥將
益藥將益益藥將益金勿馳走勿馳走五七九鼎
分厚薄先天有寶殿初離地應潮金爐煉就長
生寶長生寶返八菟色如琥珀石榴形石榴形
賽火棗鮮似日輪紅瑪瑙紅瑪瑙續命基首男
乳服最相宜一日一粒周天過閉目澄心妄念
除靜室焚香守齋戒防危慮險要扶持要扶持
莫懈怠切忌腥羶戒淫愛七日混沌如分明時
治法黃二卷虛損三

進藥歌

此藥進此藥進此藥進時人不信微哉一點落
黃庭攪動一身天地震衝開夾脊過三關一氣
氤氳布腎間腎間冷痰走如飛始信人間有殺
機胸前頭面汗若傾頭似千斤足似蒸湧泉趕
出真陽氣衝過元宮至頂門誰肯信甚分明入
骨穿皮處處尋思量往日風寒濕得遇元陽總

是春週察遍上崑崙纔到明堂好用心雀橋有
路休延滯直下重樓見主人主人乍見多疑或
遙指黃庭是我親取坎填離第一乘一乘若是
功怠惰立地災殃生大禍得者七日如學藥不
宜行動只宜睡三食薄粥須當進切忌淫心莫
食鹽將二七始安然方整衣冠出市塵有人問
汝玄中妙可作磨兜莫妄傳

取藥法

用猪尿泡一箇制度極乾淨用軟鐵線圈起口
治法黃二卷虛損三
來如碾槽樣用帶二條兜住候至景象現方用
追攝法取藥此藥屬陽奇數上等鼎器九粒中
等七粒下等五粒取下藥來不可與孝服尼師
貓鼠見之

分藥口訣

此藥勿以漆器盛之銀磁二器可用此藥一至
急以真童便一甌傾入雙手捧起旋轉不定童
便與經俱出少停其藥沉定在底不動銀匙取
起收貯聽用內水銀四兩此藥洗淨待乾蓋

于藥上四季通用水銀蜜燄不染

服藥口訣

此藥取出異香爲上每至子丑寅三時可進乃天地發生之際用乳一酒盃入藥一粒配合聽用先用乳香漱口淨後乃捧起吞之閉目靜坐片時但丹田火熱五心煩躁渾身微汗病者有大汗腹中如雷鳴身上如虫行勿得驚異乃是此藥之靈驗如此服後煩渴須服乳數盃五六度以退火煩渴卽解此藥一進人事昏沉身體

治法藥二卷

虛損

三七

重墜要人扶持切勿動念勞碌戒之次日依法又進一粒

擇乳口訣

血化爲膏體似銀蟠桃酒熟鎮長春

凡用初生男乳母必欲選擇二十上下方妙雪白如銀香濃爲上僊書謂爲蟠桃酒血化爲膏體似銀是也先預備乳母然後服藥乳如稀黃腥羶穢氣者此婦有病不可用

驗藥口訣

鼎器有厚薄十四歲乃僊方所謂五千四

黃庭是也三十時中計取紅鉛不前不後氣厚

者十三歲至者有之氣薄者十五歲至者有之

但是先天不分前後但看歌中景象大機妙用

卽是藥候有何難哉有何難哉此藥與我已永

配合成丹精凝氣聚永無漏泄之患凡人得一

度者可延七七之壽非人勿授已上惠岩願宗伯傳

勞極

俗名勞病一曰弱疾

勞傷氣血已極悉屬陰虛補陰爲主隨經加減

然亦不可過用寒涼先固胃氣

治法藥二卷

虛損

三七

尸症卽傳尸勞古方用獺肝一具陰乾杵末水

調方寸匕日再入法用獺爪爲末酒下昔一人

因入空房作一寒噤遂瘵傳四五人俱歿後一

人服天靈蓋散下虫七枚如爛肉腹白約一寸

濶七分前銳後方病頓減又一服下小虫四枚

遂全愈

丹溪曰此陰虛之極痰與血病多亦有有虫者

其傳厥一症不可云無大法四物加童便竹瀝

薑汁

予按所稟不同常見氣弱者往往生子多羸或母病陰虛稟來已弱加以過勞及鑿發太早鑿喪天真遂成陰虛咳嗽吐血骨蒸非染也會見一家五人悉病此已殞其三家中就覓屍虫藥予以丹溪法大補氣血使陽旺生陰繼以人造丸二人俱無恙

咳嗽發熱人多用滋陰藥四物二門坎離之類脾胃受虧不食惡心泄瀉卒至不救不知氣血全賴脾胃飲食化生必須先固脾胃于土中補

治法彙二卷

虛損

金匱生水火自滅矣常以白朮為君麥門為佐濃煎膏服最妙火未盛者加人參陰虛服人參轉劇者不治

天靈蓋散

天靈蓋

年深泥漬清切虎糞內骨一錢酥

取出者青蛇腦色黃大酥多齧甲一兩九助

良者安息香半斤桃仁共為末檳榔另末

青蒿六兩取近土麝研一錢另跋二百

葱根三十箇東引桃李桑柳枝各七枚長

視藥二十童便半斤

先將青蒿桃枝葱豉等以官升量六三升煎至半升去渣入天靈蓋桃仁等末加童便煎去渣至四五合下檳榔麝香同研勻作一服清晨溫服被覆取汗汗內或有細虫以布拭去燒之次瀉下虫即入火焚之棄灰并衣被于長流中用藥切不可令患人知之十日後元氣稍復再進一服

骨蒸發熱脉細數咳嗽午後甚者秦艽鱉甲散

治法彙二卷

虛損

効汗多倍黃芪

按秦艽柴胡風藥也熱極生風骨蒸非此不能引邪從毫竅而出鱉屬陰用甲者骨以及骨之義烏梅味酸引諸藥入骨而收其熱青蒿味苦解饑熱當歸和血引藥入血分地骨知母滋陰羅太無犀角河車丸治傳厥有驗用河車一具鱉甲醋炙桔梗胡黃連白芍藥大黃敗鼓皮心醋炙貝母膽草黃藥子知母各錢半犀角硃砂一錢芒硝蓬朮煉蜜丸每三四十九空心酒下

咳喘不得眠喻化丹間服麥冬膏即太平丸加百藥煎

好色人色白脉大無力咳嗽者瓊玉膏最捷

咳喘有血勞傷肺氣所致雞肫散妙見咳血門

虛勞肺腎脾受症者多發熱咳嗽十居八九大

抵不過滋陰補肺健脾四物苓朮地骨二母二

門阿膠玄參之類但見聲啞不食泄瀉者不治

勞嗽不食或吐或瀉是胃與脾病先用參苓白

朮散俟中氣復再議滋陰若泥于肺熱不可服

參之說則束手待斃矣

治法彙二卷

虛損

四二

虛勞嗽蛤蚧補肺極効及治久嗽不愈肺間積

虛熱久則成瘡故嗽出膿血晝夕不止喉中氣

塞胸膈噎痛用蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊

角各一兩除膠外皆爲屑次入膠分四服每服

河水三碗並細細呷之

身瘦屬火因火消燥也肉脫者不治

傳炭勞寒熱交作久嗽咯血日益羸瘦先以三

拗湯散其寒熱次以蓮心散乃丹溪法也藥皆

發泄有丹溪之灼見者乃可用之昧者不可輕

言以備參考可耳

二十四味蓮心散

川歸 黃芪 甘草 鱉甲醋炙 前胡

柴胡 獨活 羌活 防風 防已

茯苓 半夏 黃芩 陳皮 阿膠炒成

官桂 芍藥 麻黃根不去 杏仁另研 南星

蓮心此味常用 川芎 枳殼炒各 芫花醋炙

右藥煎服待吐有異物芫花漸減少蓋芫

元及其草所以殺蟲妙之所以斷熱去寒妙

治法彙二卷

虛損

四三

處在此

三拗湯

見喘門

麥門冬膏

見救門

直指方云瘵蟲食人骨髓血枯精竭不救者多

人能平時愛護元氣保養精血瘵不可得而傳

惟夫縱慾多淫精血內耗邪氣外乘是不特男

子有傷婦人亦不免矣然而氣虛腹餒最不可

入勞瘵之門弔喪問成衣服器用中皆能乘虛

而染觸間有婦人入其房觀其人病者思之勞

氣隨入染患日久莫不化而爲蟲治瘵之法大

按以保養精血爲上去蟲次之

傳屍紫庭方用乳香燒薰病人手仰堂以帛覆其上良久手背出毛長寸許白而黃可治紅者重青黑者灰若薰之無毛卽非傳屍乃屬虛損用參芪溫補

氣血虛甚發熱成勞者補天丸加骨蒸藥卽知母黃柏地骨麥門秦艽青蒿鱉甲竹葉烏梅之類

勞瘵發熱青蒿飲子最妙醫者宜多合以濟人

治法彙二卷

虛損

四四

本少而功多勞瘵取虫古方雖有天靈蓋散等法然既屬陰虛恐服此瞑眩藥未必効而且傷仁德智者不爲也無已則白蠟虫花椒棟根法或可代之

丹溪曰勞瘵必歸重于一經如足脛酸腰背拘急遺精白濁面色黃黑耳輪焦枯脉沉細而數知其邪在腎也宜四物加黃柏知母五味天靈澤瀉杜仲肉桂之類入童便竹瀝薑汁

王損庵曰勞瘵古方瀕肝天靈蓋狸骨銅鎖鼻

其說未見有效惟參崔氏四花穴膏言

或取効遲亦不濟
心勞或心神驚悸怔忡無時盜汗自汗心煩
通口舌生瘡咯血面赤脉洪而數其邪在心
也前方去杜仲牛膝澤瀉肉桂加茯苓胡黃
連連心遠志菖蒲硃砂之類

肺勞其或咳嗽喘促衄血皮膚枯燥時吐痰沫
脉微虛而瀉數知其邪在肺也四物加沙參
麥門五味二母桔梗桑皮地骨款花紫宛馬

治法彙二卷

虛損

四五

兜鈴百合百部之類

肝勞症脇痛目赤面青頰赤多怒虛陽不斂夢
與鬼交甚則卵縮筋急脉弦而數邪在肝也
四物加竹茹膽草柴胡黃芩青皮竹葉之類
脾勞其或面色痿黃唇焦焦燥飲食無味腹痛
腸鳴瀉痢四肢倦怠脉虛濡而數知其邪在
脾也宜以四君湯加酒炒白芍藥蓮肉薏苡
山藥猪苓澤瀉扁豆之類

凡骨蒸勞熱元氣未脫者參崔氏四花穴無有

不安

百勞丸用熟大黃四錢水蛭各十四當歸乳沒人參各一錢蜜丸作一服百勞水下亦是去勞瘵有積者今人用滋陰藥不應則坐以待斃嗚呼術豈有盡耶

五臟勞極七情傷損久之蒸熱臍腹有塊作痛脹滿不能食中必有乾血經絡傷破而然外症必見肌膚甲錯兩目暗黑大黃虜虫丸主之乾血不去則新血不生况瘵留手中養虎成害此

治法彙二卷

勞瘵

四六

說不可不知其方用乾漆桃仁蜜虫以逐乾血君以大黃佐以芍藥地黃生新血也杏仁甘草致新氣也黃芩驅腸胃熱乃仲景良方

瘵論

醫案曰此症屬足三陰虧損虛熱無火之症故晝發夜止夜發晝止不時而作當用六味地黃丸為主以補中益氣湯調補脾胃若脾胃先損者補中益氣爲主以六味地黃丸溫存肝腎多者得生者若誤用黃柏知母門冬之類復傷脾

胃飲食日少諸臟愈虛元氣下陷腹痛作瀉不可救矣衄血吐血之症因虛火妄動血隨火

而泛行或陽氣虛不能攝血歸經而妄行其脉弦洪乃無根之火浮于外也大抵此症多因四五月火土大旺金水衰涸之際不行獨當滋陰養陰及冬月元陽潛伏之時走其元氣至春末夏初頭痛脚軟食少倦怠注夏之病或誤服剋伐之藥或酒色自戕少有老態猶不知謹卒至真陰大虧脉細而數遂成勞瘵

治法彙二卷

勞瘵

四七

如左脉虛細而弱是腎水不足也六味地黃丸右尺脉遲軟或沉細而數欲絕是命門之相火不足也八味丸

兩尺脉微弱是陰陽俱虛也十補丸此皆滋其化源也

灸崔氏四花穴

先一穴令患者平身正立取一細繩蠟之勿令展縮男左女右脚底堅踏之其繩前頭與大拇指端齊後頭循當脚跟中心向後引繩從脚脰

肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷

橫紋即委中

又令病人解髮分兩邊令見頭縫自息門平分

至腦後却平身正坐取向所截繩一頭令與鼻

端齊引繩向上正經頭縫至腦貼肉垂下循脊

骨引繩頭向下至繩盡處當脊骨中以墨記之

墨記不是

又取一繩子令合口將繩子按于口上兩頭至

吻却約起繩子中心至鼻孔根下如么此便齊

兩吻截斷將此繩展令直於前量脊骨上墨點

治法彙二卷

勞瘵

四

處橫量取平勿令高下其量口繩子先平中摺

當中以墨記之却展開繩子橫量却以中摺墨

點記處按于脊骨中先以點處兩頭是穴也

次二穴令患人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞

項向前雙垂頭鳩尾齊胸小前岐骨間盡處也

雙頭截斷却翻雙頭繩向後以繩子中心按于

喉嚨結骨上其繩兩頭雙垂循脊骨以墨點記

之墨點不是

又取一繩子令患人合口橫量齊兩吻截斷還

于脊骨上黑點橫量如法繩子兩頭以白圈記

之白圈是灸處

以上是第二次點穴通前共四穴同時灸三七

壯累灸至一百餘壯候灸瘡將瘡又依法灸二

穴

葛可久十藥神書方法治勞漸次用藥大有神

驗要在用之當藥囊須預製以候病者今錄于

此妙在獨參湯與十灰花瀝石散太平消化二

九汝言之說太滯

惟讀本草綱目熟者知此

四

葛先生曰葛病莫若勞最難治蓋勞之起因少

年氣血完聚津液克滿之時不知節養酒色是

耗以致耗散真元虛敗精液初則嘔血咳血次

則痰嗽骨蒸體熱腎虛精竭面白額紅口乾咽

燥白濁遺精盜汗食少怔忡倦怠謂之火盛金

衰陰微陽元重則半年輕則一載卒莫能救醫

者誠能審察氣血脾胃按法施治痛加調攝鮮

有不愈者苟或不分所主一槩妄治大寒大熱

不惟不効而反增劇矣今開其法次第于後

咯嗽血先以十灰散遏之甚老
居散消之大抵血熱則行得寒則凝見灰
理勢必然

止血之後其人必倦次用獨參湯一補令其熟
睡一覺不可驚動睡醒病去五分後服諸藥

保和湯止嗽寧肺

保真湯補虛除熱

太平丸潤肺除痰

消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六
事加減保真湯內分驚悸淋濁遺精便澀燥

治法彙二卷

五十

熱盜汗六事加減

保藥之法每日用薄荷湯

灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次嚥
一丸緩緩溶化至上床睡亦如此用之夜則肺

竅開藥必流入竅中此訣最妙如痰壅盛先

用飴糖拌消化丸一百丸吞下次又依前嚥嚥

太平丸令仰面臥服前七藥後若肺有嗽可

煮潤肺丸食之如常七藥之有暇亦可煮食

再續煮白鳳膏食之固其根本病勢安後方

可合十珍丸服之乃收功起身之妙用也

此遏之
治勞症嘔血吐血咯血先

大薊 小薊 栢菜 荷葉 茅根

茜根 大黃 山梔 牡丹皮 棕櫚皮

名等分

右各燒灰存性研極細用紙包碗蓋于地上
一夕出火毒用時先將白藕搗汁或蘿蔔汁
磨陳京墨半碗令極黑調下五錢食後下如
病勢輕立止成升斗者用後藥止之

治法彙二卷

五十

乙字號花蕊石散

治五內崩損湧噴血出斗

升用此止之

花蕊石

火煅存性
研如粉

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢

食遠下男加酒一小半女加醋一半和小便

調更佳使瘀血化為黃水服訖以後藥補之

丙字號獨參湯 治諸失血後用此補之

大人參

去蘆二兩

右水二鍾棗五枚煎不拘時細細服之熟睡

一學安後隨症治

丁字號保和湯 治勞嗽成肺癆者服之決効

知母 貝母 天冬 款冬花 各三錢

麥冬 薏苡 杏仁 天花粉

五味子 各二錢 粉草 炙 馬兜鈴 紫菀

百合 桔梗 阿膠 炒 當歸 生地

紫蘇 薄荷 各五分 生薑三片煎成加

飴一匙入內食後服加減于後

血盛加蒲黃 茜根 藕節 大小薊

治法彙二卷 勞瘵

茅根 痰盛加竹瀝二陳南星枳實枳殼

婁實 喘盛加桑皮陳皮蘇子蘿蔔子

氣盛作脹促者加葶藶 熱盛加解毒湯一

二味或再加連翹 風盛加荊芥防風金

沸草甘菊細辛 寒盛加人參五味子蠟

片

戊字號保真湯 治勞症體虛骨蒸服之決補

當歸 生地 白朮 黃芪 人參 各三錢

蓮心 赤茯 白茯 各半錢 天冬

麥冬 陳皮 白芍 知母 黃芪

五味子 柴胡 地骨皮 熟地 各一錢

赤芍藥 甘草 各錢半 薑三片棗一枚

食後服

驚悸加茯神遠志柏子仁酸棗仁 淋濁加

草薢白烏藥猪苓澤瀉 便澀加木通石

菴篇蓄 遺精加龍骨牡蠣蓮子

燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲 盜汗加浮麥

炒牡蠣黃芪麻黃根

治法彙二卷 勞瘵

巳字號太平丸 治勞嗽症久嗽肺癆並皆喘

服

天門冬 麥門冬 知母 款花 貝母

杏仁 各二兩 當歸 生地黃 熟地黃

黃連 阿膠 各兩 蒲黃 京墨 桔梗

薄荷 各兩 白蜜 四兩 麝香 少許

白為細末用銀石器先下白蜜煉熟後下諸

藥末攪勻再上火入麝香畧焚三二沸丸如

彈子大每服日三食後嚼一丸煎薄荷湯

緩緩化下，次噙一丸，臨臥如痰盛，先用飴糖拌消，化丸吞下，却嚼此丸，仰臥使藥流入肺竅，則肺清潤，其嗽退除。七日病痊，一切虛嗽服此除根。

庚字號沉香消化丸 治熱痰壅盛

青蒙石 煨黃 明礬 飛研 猪牙皂角

南星 火地 半夏 白茯苓 陳皮 各

枳殼 兩半 枳實 兩半 薄荷 一兩 沉香 錢五

黃芩 兩

治法 藥二卷 勞瘵 五五

右爲細末，和勻薑汁浸神麴攪糊丸，桐子大。

每服一百丸，臨睡用飴糖拌吞，次噙嚼太平。

丸二藥相攻，痰嗽悉除。

辛字號潤肺膏 治久嗽肺燥肺痿

羊肺 一具 杏仁 一兩 柿霜 真酥 真粉

各一 白蜜 二兩

先將羊肺洗淨，次將五味入水攪粘，灌入肺

中，白水煮熟，如常吃，與煎七藥相間用，亦佳。

壬字號白鳳膏 治一切久怯弱極虛憊咳嗽

吐痰咳血發熱

黑嘴白鴿 一隻 大京棗 二升 陳煮酒 一瓶

參苓平胃散 一升

右將鴨縛定，脚量患人飲多少，隨以酒盪溫。

將鴨項割開，滴血入酒，攪勻飲之，直入肺經。

潤肺補虛，將鴨乾擇去毛，于脇下開去腸物。

拭乾，將棗子去核，每箇中實納平胃散末，填

滿鴨肚中，用麻扎定，以砂礮慢火煨，將陳煮

酒作三次添入，煮乾爲度，後煎溫食，其棗子

治法 藥二卷 勞瘵 五五

陰乾，隨意食用，參湯下，後服補髓丹，則補髓

生精和血順氣。

癸字號補髓丹 一名十珍丸

治久勞虛敗，髓乾精竭，血枯氣少，服前藥

愈後服此。

猪脊脊 一條 羊脊脊 一條 團魚 一隻 烏骨雞 一隻

淮山藥 五條 蓮肉 半斤 京棗 一百枚 霜柿 十枚

四味修製淨用，井花水一大瓶，于沙礮中煮

熟，搗細，與前熟肉一處，再用慢火熬之，却下

明膠四兩直黃蠟三兩右二味逐漸下與前八

味和一處搗成膏子和平胃散末四君湯末

知母黃柏末各一兩共一十兩搜和成劑如

硬再入白蜜同熬取起放青石上用木槌打

如泥丸桐子大每服一百丸不拘時棗湯下

勞瘵兼痰積其症腹脇常熱頭面手足則于寅

卯時分午有涼時者是也宜以霞天膏入竹瀝

薑汁調玄明粉行之若頑痰在膈上膠固難治

者必用吐法吐之或沉香滾痰丸透膈丹之類

治法彙二卷

勞瘵

五十六

下之甚則用倒倉法若肝有積痰汚血結熱而

成勞瘵者其太衝脉必與衝陽脉不相應宜以

補陰藥吞當歸龍薈丸

古方柴胡飲子防風當歸麥煎散皆用大黃蓋

能折炎上之勢而引之下行莫速乎此然惟大

便實者乃可若溏泄則雖地黃亦不宜况大黃

乎

透肌解熱柴胡葛根為要劑故治骨熱方中用

之然二者之性皆走泄外發能散有餘之熱于

三才參芪藥中為佐可也若君主之

藥去必不遠又大忌苦寒以傷胃鬱火

若服涼藥多證雖退脉反加數者陽鬱也宜升

宜補大忌寒涼犯之必死

勞瘵久而嗽血咽痛無聲此為自下傳上若不

嗽不痛久而溺濁脫精泄瀉此為自上傳下俱

灰証也

骨蒸之極聲啞痛而驚脉躁汗出如珠喘乏氣

促出而無入毛焦唇反皆灰証也

治法彙二卷

勞瘵

五十七

又骨肉相失聲散嘔血陽事不禁日涼夜熱者

灰

水丘先生紫庭治瘵方妙在開關把胃以咽燥

口乾咳嗽煩熱大便秘結為陽用陽病開關散

以大便溏瀉胃弱食減小便多為陰用陰病開

關散陰陽二候先須起胃用起胃散其說良是

第陰病即是胃虛氣弱陽病即是陰虛陽虛須

參芪其病尚可治陰虛滋陰藥固効方錄于此

以備參考

陽病開關散

北柴胡去枯梗炒 秦艽 麥冬 各五錢

芍藥 木香 澤瀉各一兩 木通 半兩

甘草一錢 當歸 桑皮炙 地骨皮 各一兩

咬咀每服三錢薑三片水二鍾煎六分空心服小便多即去病也

陰病開關散

赤芍 當歸 肉桂 白芷 甘草炙各半兩

木香二錢 枳殼錢三 天南星一錢去皮薑汁浸

治法彙二卷勞瘵 辛八

咬咀每服三錢薑三片煎七分入無灰酒三分童便三分又煎七分先服起胃散服此一二日不問退否兼主龍膏

起胃散

起胃散

黃芪炙三兩 白朮炒一兩 白芷半兩 人參半兩

山藥 一兩

咬咀每服三錢加木瓜煎或加沉香茯苓甘草各五錢

七寶圓

治骨蒸傳尸邪氣陽病可服黃連四

兩為細末猪肚一箇洗淨入藥末縫緊如

童便煮五升煮極爛搗丸桐子大硃砂磨

香作衣空心麥冬湯下或陽病開關散下

烏龍膏 烏梅去核柴胡紫苑生地黃木香各

一兩秦艽實者貝母麵炒去心防風各三

錢杏仁五兩麵炒為末皂角六十片二十

片去皮醋炙為末二十片燒灰存性二十

片湯浸去黑皮用精猪肉剝爛如泥同皂

角一處入水細揉汁入童便三升無灰酒

治法彙二卷勞瘵 辛八

一升並熬膏和前藥末丸桐子大每服二

十丸空心麥冬湯下甚者二十日効

主龍膏 青蒿子柴胡白檳榔各三兩製鱉甲

白朮赤茯苓木香牡蠣各半兩人參一兩

生地一兩當歸三錢硃砂一錢豆豉心二

合虎頭骨研開酒炙黃一兩肉苁蓉酒浸

一宿炙一兩鱉甲湯煮去裙皮酒浸炙黃

赤俱末加烏梅肉枳殼却以杏仁五升童

便浸春夏七日秋冬十日瓶中日

一換新者，是以清水淘去皮尖，焙乾，以童便一升，于砂礪中，文火煎至，隨手攪，燂濾過，入酥一兩，薄荷自然汁二合，攪勻，和藥搗五百下，丸桐子大，空心湯下，十五丸，加至三十丸，如覺熱減丸數，忌覓生血，雀鷄冷水。

訶梨散 治勞嗽上氣

赤茯苓二兩 訶梨勒二兩 木香二兩 檳榔一兩 當歸一兩
炒大黃一兩 莫茱萸七次

治法彙二卷 發熱 六辛

每服三錢，薑三片，水一盞，煎六分，溫服。

發熱

發熱必脉弦數而急，浮而數者，表熱也；沉數者，裏熱也；數而有力者，爲實熱；數而無力者，爲虛熱。

有表熱有裏熱，有虛熱有實熱，夫何世人一築作風寒治，既汗且下，卒至天枉，良可太息，因區分其類如左，爲初學之云。

外感發熱初起，身痛脊強，左脉浮緊，是

感冒風寒，太陽受病，如脉浮緩，或左微急，兼之鼻塞眼脹，或自汗，或無汗，是傷風陽明經受症，其熱翕翕然在皮膚之間，是爲表熱，且手心不熱，手背熱，或酒客革內火盛而手心亦熱者，又不可不知，治均發散，須分經絡，太陽則冬月麻黃，十神餘三時大羌活，陽明則升麻葛根白芷芍藥之類，或始自太陽，不解轉入陽明，脉洪而長，其治亦同，或再不解，脉或隱伏，或微弱，或浮急，症兼嘔吐，須防發斑。

治法彙二卷 發熱 六辛

再以升麻葛根等升發之，斑出之後，煩渴飲引，面赤口苦，或耳聾寒熱往來，是少陽經受病，屬半表半裏，宜小柴胡加減和之，如熱再不解，手足汗出，舌乾煩滿，大渴，脉來沉實有力，是爲裏熱，其蒸蒸然從內而發于外，亦看輕重用藥，如無下症，只以小柴胡合解毒一二味，徐徐退之。

內傷發熱，自汗，六脉微弱，或右手大三倍于左，人迎按之無力，渾身酸軟，或痛倦于言動怠，

陰虛發熱盛于午後或兼盜汗遺精或

有紅皮毛枯槁屬陰虛熱久則變為骨蒸

極宜坎離地骨之類不已秦艽鱉甲散

傷食熱發熱惡寒頭痛嘔惡胸口飽悶而痛脹

右寸關俱緊而滑或沉伏左脉弦急屬內傷

飲食外感風寒之熱先宜解散後消導和中

如不愈變出口舌乾燥心下作痛等症當消

治法彙二卷

發熱

息攻之或大柴胡湯或枳實導滯丸若誤用

正傷寒之法治之立成

腫毒熱發熱拘攣每日哺憎寒壯熱脉數而急

者須問有無痛處乃瘡腫之脉也治先發散

小兒發熱須問痧痘出未

婦人有孕忽然寒熱大作或因登高倒仆當問

胎動否如不動小腹作脹即是胎氣已損急用

佛手散或加香附益母之類催之若已見紅而

胎不下用純謹穩婆取出為佳不可忽畧

方見

男婦四肢發熱筋骨間熱肌表熱如火燎

烙手右關脉緩弱或弦而浮數乃火鬱發熱也

升陽散火湯散之此病多因血虛或胃虛過食

冷物抑遏陽氣于脾土之中而然火鬱發之後

隨症治補養

治驗

一人發熱頭痛七日止余診之左脉平和右

寸關俱弦急有力乃內傷宿食為患也以二陳

加枳實厚朴查麴柴胡三劑再加黃芩頭痛除

治法彙二卷

發熱

但熱不淨投枳實導滯丸百粒更衣而愈

一人傷風自汗發熱不止自以為虛服補中益

氣湯熱轉劇診之脉弦而長實有力予升麻葛

根湯倍芍藥加桂枝少許一劑汗止熱淨

一婦每夜分即發熱天明暫止自投四物湯反

加嘔惡診得左關微急而右寸關俱弦數有力

詢之經後食梨午後遂熱起正丹溪所謂胃虛

過食冷物抑遏陽氣於脾土之中此病多因血

虛而得者遂以升陽散火湯一服熱已後用四

物去地黃加枳木陳皮健脾胃養血調理不愈
一人熱而頭身痛七日不已是下證余診得
左脉浮緊且時惡寒仍屬表熱投大羌活湯加
蔥薑出汗而愈

一人同此多煩躁時值炎月于六神通解散亦
大汗而解

一人咳嗽已成勞極用四物知栢不愈乃以秦
艽鱉甲散加二母二門十數劑頓愈

一中年婦每夜發熱天明方止定惡心不食

治法彙二卷

發熱

李四

肢倦且云素體肥今漸消瘦因憶一人有言昔
肥而今瘦者痰也痰滯中官阻碍升降宜平不
食且作惡心痞悶血無所滋因而不食故夜熱
乃以二陳治痰參朮補中氣枳實麥冬寬中香
附炒梔子清火柴胡退熱凡二十劑間服橘半
枳木丸一月愈後日進人參湯體漸復舊
凡人飲食失節勞役過度一切火症悉屬內真
虛而外假熱故肚腹喜暖頭以手按口畏冷物
乃形氣俱病屬不足滿中益氣湯作大劑佳

干神湯

治霜降已後春分節前八日發熱

表症脉浮緊者或初春寒令仍肅亦宜
之

紫蘇 白芷 甘草 麻黃 陳皮

香附 升麻 葛根 赤芍 川芎

蔥薑煎取汗

九味羌活湯

見痰腐門

升麻葛根湯

同上

小柴胡湯

治法彙二卷

發熱

李奎

黃連解毒湯

大柴胡湯

俱見傷寒門

補中益氣湯

見內傷門

四物湯

見血門

枳實導滯丸

見傷食門

升陽散火湯

治火鬱發熱

葛根 柴胡 羌活 炙甘草 升麻

陳皮 白芍 防風 人參

薑蔥煎服

二 秦艽鱉甲散

見勞熱

草遂月青蒿一斗五升童便三斗文武火
約重減半去蒿莖至一升入猪膽七箇并
收和爲丸桐子大每服五十丸取表裏俱青
者爲

勞熱重夜輕口中無味陽虛也午後發熱夜
半則止口中有味陰虛也陽虛責之甘陰虛責
在腎益饑飽傷胃則陽虛房勞傷腎則陰虛以
藥論之甘溫補氣苦寒滋陰若氣血兩虛只補
其氣氣旺自然生血陽旺生陰也若中氣虛悞
用苦寒禍不旋踵

治法彙二卷

勞熱

王節齋曰南人稱發熱爲勞發蓋謂勞苦而發
熱卽東垣內傷之旨也此病輕者一二發自愈
重者用東垣法補之甚則加熟附子若因勞力
辛苦而發熱輕易發汗立危
薛師曰潮熱咳嗽而脉數者假熱之脉也甘溫
調養爲主補中益氣湯下六味丸

潮熱 虛弱

治法彙二卷

勞熱

痰飲門末之

肺熱者輕手乃得微按全無日晡熱甚乃皮毛
之熱其症必見喘咳寒熱輕者瀉白散重者涼
膈散地骨皮散方用地骨苳草參柴半夏知母
等分水煎瀉白涼膈見火門
心熱者微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得
微按至皮毛之下則熱少加力按之則不熱是
熱在血脉也其症煩心心痛掌中熱而腕以黃
連瀉心湯導赤散硃砂安神丸

肝熱者、輕手摸之不熱、重按至筋骨又不熱、不輕不重、在輕手重手之間、熱在肌肉、遇夜尤甚、其症必怠惰嗜臥、四肢不收、無氣以動、瀉黃散、肝熱者、重按之肌肉之下、至骨之上、乃肝之熱、寅卯間尤甚、其脉弦、四肢滿悶、便難轉筋、多怒、多驚、四肢困熱、筋痿不能起于床、瀉青丸、柴胡飲子、瀉黃散、瀉青丸並見火門、柴胡飲子見虛損門、腎熱者、輕手重手俱不熱、重手按至骨分其熱、蒸手如火、其人骨蒸、蘇如虫蝕其骨、困熱不任治法、治法、藥二卷、發熱、亦不能起于床、滋腎丸主之、

惡寒

有外感、有內傷、有氣虛、有瘡腫、有濕痰、有火鬱、外感脉浮緊、頭痛拘攣、身痛、漸漸熱起、是外感、審時令輕重發散、

宜從傷食治

內傷脉緩弱、或氣口虛大、按之無力、兼見倦怠、手心熱、內傷等症、屬氣虛、從補中益氣湯法、

曰陽虛則惡寒、參耆爲主、加桂甚者、加熟附、千二三分、以行參耆之氣、且益陽氣、

瘡腫、曰背惡寒、脉浮大而無力者、氣虛、脉弦數者、熱兼作、乃瘡腫之候、須問身中有無、時痛處、隨部分用藥、大抵惡寒症、除氣虛外、裏表者多、乃表中陽氣不得發越、而然、須辛散之、○仲景曰、心下有留飲、其人背惡寒、冷如冰、茯苓丸、茯苓一兩、半夏二兩、枳實五錢、風化硝二錢、半共末、薑汁糊丸、桐子大、薑湯下、三十九、濕痰脉滑、或沉、周身重痛、而惡寒者、屬濕痰、乃治法、治法、藥二卷、惡寒、

六十九

痰在上、焦過絕陽氣、而然、肥人多此、宜二陳、二朮、羌活、防風、少加桂枝、甚者先吐之、

丹溪治一婦人惡寒、用赤小豆、苦參各一錢、爲末、薑水調服、探吐、後用川芎、南星、蒼朮、酒炒、黃芩爲末、麴糊丸、每服五六十丸、白湯下、

冬月減芩一半、加薑汁、惡寒久病、亦宜解鬱、

火鬱、火鬱即抑遏陽氣于脾土、亦令惡寒、升陽散火湯、○惡寒非寒戰、深從火鬱治、升陽散見火門、

產後、產後氣血兩虛、而惡寒者、腹中不和、脉虛、

大八珍加減若小腹脹痛是惡露乳脹作痛是乳結心下飽脹是食滯俱有惡寒要在辨之詳

丹溪治惡寒皆用參朮一加附子一加升柴預防是升散解鬱一加竹瀝是消痰也小兒惡寒須防痧痘

傷食

氣口紫盛為傷于食經曰脉滑者有宿食東垣曰宿食不化則獨右關脉沉滑又曰浮而滑者

治法彙二卷

傷食

七十

宿食也又曰脉弦者傷食大抵兩寸關弦滑有力必是宿食凡傷食惡食膈間飽悶或脹或痛宜導痰運脾二陳加枳木山查神麴麥芽香附之類挾氣脉沉加青皮木香傷肉食加草菓○傷粉食加杏仁○麴食加蘿菔子○糯米食用白酒藥為末滾湯下二服後用上藥積久生熱口乾噉氣前方加薑汁炒黃連山梔初起惡心即指于喉中探吐如不吐急飲鹽湯得吐為佳所謂在上者因而越之也○食滯中焦胸膈

痞滿如敗卵臭頭痛寒熱有類外感但身不寒五脈不浮為異耳宜參蘇飲藿香正氣散加消導藥七八日不大便口乾煩躁臍上硬痛積實導滯丸妙食積日久不愈保和丸神效氣虛者以人參湯下傷風門 藿香正氣散並見食滯心下初起不可驟用苦寒藥必兼辛散二陳平胃之類以食得寒則凝得熱乃能腐熟也若已成糟粕日久生熱須假涼藥一二味以降之妙在合宜譬之風寒有寒實結胸熱實結胸治法彙二卷 傷食 七十一 之介宜容混治○如冷物停滯作嘔二陳加炮薑白豆蔻山查厚朴神麴枳實煎成稍涼服乃熱因寒用法也○宿食已消而中焦未和不想食或吐或瀉倦怠面黃脾胃受傷也六君子養之傷蟹紫蘇丁香湯 傷狗肉心下堅脹口乾發熱妄語煮蘆根汁之魚膾及生肉不消搗馬鞭草汁飲之及生薑草果湯○虛人六君子倍陳皮脾胃素弱復傷糯米食六君子倍酒麴

左脉微弱、右寸關弦滑、或弦大、形氣俱虛、又兼饑餒、驟為飲食所傷、當補瀉兼施、六君子、加消導藥、山查、神麴、麥芽、枳朮、砂仁之類、實者、只宜消導、人有饑餒不食、胃氣空虛、此為不足、固失節也、食而過飽、停滯中脘、乃不足兼有餘、亦失節也、以受傷言、則不足、以停滯言、則有餘、惟其不足、則補益、惟其有餘、故消導、二者審緩急、標本而治、有物滯而氣傷、補益消導兼行者、有物暫滯而氣不甚傷、宜消導獨行者、亦有既停滯不能自化、須補益助脾、使之溶化、不消導者、皆當臨時消息、不可固執一偏、至如枳朮丸、枳實丸、雖曰消導、固有補益之功、存乎其間、其他如木香分氣丸、枳實導滯丸、大枳殼丸、雖無補益、然施于有餘之症、無不護効、但不可視為常用之藥爾、若所滯之物、非枳朮等消導藥所能去者、亦安泥于消導、而不知變乎、則備急丸、養黃丸、感應丸、瓜蒂散等、推逐者、東垣丹溪、亦未常委之而弗用也、故善用兵者、攻亦當、守亦當、不

治法彙二卷 傷食

五十二

善用兵者、則宜攻而守、宜守而攻、其敗也、非兵之罪、用兵者之罪、安常議症、乃最上乘法、氣口脉弦、傷於硬物、經曰溫以克之、微遊傷辛辣物、經曰苦勝辛、微滑傷腥醃物、經曰甘勝鹹、弦緊傷酸硬物、經曰辛勝酸、洪滑傷甜爛物、酸勝甘、微遲傷冷物、且有積聚惡痰、溫胃和中、單伏主食不消化、積滯膠固于中、不能化、痛脹不可當、須巴豆霜、黑丑水、推逐之、實人乃可、

治法彙二卷 傷食

五十三

神麴、麥芽、助戊土、以腐熟水穀、然二味善消化、故乳脹、炒二兩麥芽、煎服、即消、良方云、神麴下胎丹、溪曰、麥芽消腎、有宿滯者、宜之、若無宿滯、恐消元氣也、說見醫案、

木香見現丸 治傷生冷硬物、心腹滿悶疼痛、

巴豆 錢荆三稜 一兩 神麴 一兩 木香 二錢

香附 半兩 升麻 三錢 石三稜 半兩 炒

草豆蔻 半兩 炒

石為末、炊餅丸、菜豆大一倍、每服二十丸、白

溫下世所傷加減

三稜消積丸 治傷生冷硬物不能消化心腹

滿悶

丁香 益智子 各三錢 陳皮 青皮 各五錢

茴香 炒半神麴 炒 廣木 炒 京三稜 炮各七錢

巴豆 炒去

右為末醋糊丸桐子大每服十九至二十九

溫湯下

阿魏丸 治脾胃怯弱過食肉麵生菓停滯中

治法彙二卷傷食 七十

焦不能消化以致腹脹刺痛不食或利

或秘

百草霜 錢三 巴豆 去皮心 阿魏 酒浸化

官桂 蓬朮 炒 麥蘖 炒 神麴 炒 青皮 白去

蘿藦子 炒 白朮 炒 乾薑 炒各半

右末薄荷糊丸菜豆大每服二十九麴食用

麴湯下生菓腐香湯下

感應丸 化滯不動臟腑

丁香 木香 檀香 陳皮 角沉香 不見

青皮 黃連 砂仁 香附 三稜 煨

半夏 湯泡七 茯苓 十分大者炙

以上藥各一兩淨末外用烏梅肉一百箇巴

豆肉三百箇去皮膜入磁器中以烏梅蓋巴

豆上用陳米醋浸與烏梅肉平饒上蒸以巴

豆紅色為度却搗二件極爛加糯米糊和前

末杵千餘下以黑為度象手丸蘿藦子大每

服十丸食滯陳皮湯下氣滯茴香湯下嘔吐

生薑湯下

治法彙二卷傷食 七五

和中丸 治病久厭厭不食臟腑或秘或瀉此

胃氣虛也常服則和中聖氣消痰去濕

厚腸胃進飲食

厚朴 製一兩 白朮 二錢半 夏 兩一 陳皮 八錢

檳榔 四錢 木香 五錢 甘草 炙三 枳實 炒三

薑汁浸炊餅丸桐子大每服三十丸白湯下

按此方皆消導藥中焦有滯者宜之

保和丸 消痰利氣快脾胃進飲食

山查 神麴 炒 半夏 湯泡 七 茯苓 各三兩

陳皮 連翹各三兩 羅服子各二兩 白朮五兩

蒼朮米泔浸去粗皮 枳實去皮各一兩 香附酒炒

厚朴薑炒各二兩 酒芩 酒連各一兩

薑汁浸炊餅丸 桐子大每服五十丸漸加至

百丸

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化而作

痞滿悶痛

茯苓 黃芩 白朮 黃連各二兩 甘草一兩

枳實五兩 大黃十兩 澤瀉二兩 神麴五兩

治法彙二卷傷食 七六

炊餅丸 桐子大每服七八十丸白湯下量輕

重強弱加減以利爲度

木香檳榔丸 治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹

悶二便結滯不利者

木香 檳榔 青皮 陳皮 枳殼炒

廣莪朮煨 黃連各一兩 黃柏炒 香附

大黃炒各三兩 黑丑生取頭末

水丸菟豆大每服三五十丸生薑湯下

大枳殼丸 治一切酒食傷中胸膈悶閉疼痛

飲食不消兩筋刺痛嘔逆惡心皆効

蓬朮煨香 厚朴薑炒 人參 青皮 黑丑炒

枳殼炒 茯苓 木香各一兩 大黃二兩 陳皮

白朮各一兩 檳榔二兩 半夏湯泡七次 神麴炒

三稜各一兩 麥蘖炒一兩

右末薑汁糊丸 桐子大每服三四十九薑湯

下

備急丸 療心腹諸卒暴痛宿食爲害者

大黃 乾薑 巴豆去皮各一兩

治法彙二卷傷食 七七

共爲細末搗均丸小豆大每服三九若中惡

客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤

欲卒死者以煖水下之或不下捧頭起下噤

須臾未差再與三九以腹中鳴轉卽吐下便

愈若口已噤拆齒灌之乃急劑也

秘方化滯丸 治一切積滯奪造化有通塞之

功調陰陽有補瀉之妙久堅沉澀磨之

自消暴疾乍留導之則去

南木香堅實者不見火 丁香 青皮四花去

橘紅

黃連

大者各二錢半

京三稜

炒

莪朮

兩

煨各四

半夏

二錢半

共末

巴豆肉

湯泡去心

煨去心

煨去心

煨去心

煨去心

入後

烏梅肉末

五錢

米醋調

各清火

煨去心

煨去心

用白麩八錢

打糊丸

粟米大

每服五七丸

盛

者十九

者十九

五更空心

橘皮湯下

常服磨積

嚙津下

但有所傷取本汁下

常服磨積

嚙津下

但有所傷

取本汁下

治法

二卷

治法

二卷

惡食

壬九

要宣

積滾薑湯下

要宣

積滾薑湯下

得熱則行

得冷則止

惡食

丹溪曰

丹溪曰

惡食者

胸中有物

導痰補脾

二陳加二

木香附

木香附

引芎主之

病久胃敗

惡聞食氣

大劑人

參養之

參養之

不能食

心下痞滿

則不能食

有虛有實

實則心下

同

心下痞滿

則不能食

有虛有實

實則心下

同

痛惡心口苦

痛惡心口苦

宜消導

虛則倦怠

色黃痿心下

軟異功散

加砂仁

軟異功散

加砂仁

錢氏異功散

方用參朮

苓草

三錫曰

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

橘紅

木香

薑朮

煎服

久病不食

屬胃敗

四君子

加砂仁

有痰脈滑

或

兼惡心

六君子

湯佳

饑而不能食

屬胃口

有熱

素問曰

胃熱則消穀

善饑

熱病後餘熱不淨

善饑

熱病後

餘熱不淨

脈虛洪

不食

白虎加人

參湯

參湯

羅謙甫云

脾胃弱而飲食難任者

不可一藥用

尅伐之劑

宜錢氏異功散

補之自然能食

設或

嗜食太過

傷脾而痞滿嘔逆

權用枳朮丸

一服

治法

二卷

惡食

壬九

慎勿多服

予曾治翁氏婦

久瘡食少汗多用六

慎勿多服

予曾治翁氏婦

久瘡食少汗多用六

君子加黃連枳實

月餘不應因悟此言

遂減連

枳純用補劑

枳純用補劑

又令粥多于藥而食進

再加附子

三分半一服而痊

許學士云

有人全不思食

補脾罔効授二神丹

服之頓能進此

即補母法

黃魯直用鬼絲子淘

淨酒浸

出挑數匙以酒下之

十日外飲

敵如湯

沃雪亦此理也

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

毒藥攻病

良工亦未常委

而不用

但中

三錫曰

痛即止不必盡劑然脾胃必素弱而後全愈
枳實厚朴山楂神麴尚不可過况牽牛大黃巴
豆青皮則所以東垣立枳朮丸一補一瀉消導
藥每加白朮保獲中氣最妙昧者不知一于攻
下往往變重良可哀憫良由不讀素問之故爾
抑考之至真大要論曰大毒治病十去其六小
毒治病十去其七無毒治病十去其八常毒治
病十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷
其正也然穀肉菓菜尚不可過况毒藥乎

治法彙編卷八傷食

八十

凡傷食必詢問所食何物寒者熱者是喜食而
多食之耶當助脾消化是乘機困而食之耶當
益氣補中兼消化若氣惱後食或食後着惱當
舒氣解鬱兼消化病後癰瘡潰後產婦老年凡
有食滯只宜補中消導若柴妄下立見傾危
大凡停食必因于脾弱宜六君加枳朴山楂神
麴食已消而不愈六君子○內傷外感用藿香
正氣散○若內傷多而外感少人參養胃湯若
勞傷元氣補中益氣湯用川芎○若勞傷兼停

滯補中益氣加神麴甚者加山楂○若氣惱與
食用六君子加香附山梔○若口酸噯酸多是
飲食須節之

資生丸 健脾開胃消食止瀉調和藏府滋養
榮衛余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼
問之曰此得之祕傳饑者服之即飽飽者食
之即饑因疏其方余大善之而頗不信其消
食之功已於醉飽後頓服二丸徑投枕卧夙
興了無停滯始信此方之神也

治法彙編卷八傷食

八十一

白朮 米泔水浸用山黃土拌蒸九次
人參 去蘆人乳浸透飯
白茯苓 去蘆皮水飛去筋膜人乳拌
橘紅 山查肉 神麴 炒各二兩
川黃連 薑汁 白荳蔻仁 炒澤瀉 去毛炒各
桔梗 炒米泔浸 真藿香 洗 甘草 蜜炙去皮
白扁豆 炒去殼 蓮肉 去心各 薏苡仁 淘淨炒
乾山藥 炒 麥芽麴 炒 芡實 淨肉炒各
末之煉蜜丸每丸貳錢重每服壹丸醉飽後

三陽經淡薑湯下

傷酒

三陽曰酒大熱有毒氣味俱陽陰寒之時少飲能禦邪助神壯氣恣情則生痰益火耗氣損精今暴病暴死世人謬爲痰厥中臟竟不知酒色自戕之所致也悲哉悲哉體非金石日見消爍雖修短有數待其自盡乃可云胡自速耶如或傷之當微汗及利小便使上下分消與濕同法不可妄用巴豆牽牛大黃等藥此無形元氣受治法彙二卷

傷酒

卷三

病用此反傷有形陰血所謂誅伐無過也金匱要畧曰酒疸下之必爲黑疸慎不可犯此戒○脈浮洪而數傷酒三錫曰傷酒惡心嘔逆頭痛眩運參蘇飲倍加木香弱人宜之葛根解醒湯藥多辛熱爲一時酒後食涼物鬱其毒于胃中吐而煩躁不寧者設非常用之藥也如或小水難腰脹者五苓散加葛根按葛根乃輕陽之劑本陽明經藥酒毒客于胃與大腸所以惡心懊憹嘔雜痞悶不食

入陽明順其性而揚之毒從裏發解酒也昧者但云葛根葛花解酒失本旨

中酒嘔惡頭痛脈洪大或弦滑以二陳加薑汁炒黃連梔子蘇葉葛根加薑汁熱服殊效酒積瀉黃沫腹痛不時更衣酒蒸熟大黃作丸服妙或用香連丸加大黃者極驗無非蕩滌積熱耳○小水不利用益元散燈心湯亦佳

治法彙二卷

傷酒

卷三

和湯半夏茯苓湯或理中湯加乾葛七分或用末子理中湯和縮脾飲酒渴縮脾湯或煎乾葛湯調五苓散久困于酒遂成酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致然並宜酒煮黃連丸多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下冲和湯加蓬朮半錢酒停胸膈爲痰飲者枳實半夏湯二味加麥芽各半錢冲和湯加半夏一錢茯苓七分

分 縮脾飲見第門 酒煮黃連見第門

解酒毒無如枝矩子之妙一名枳椇一名木蜜

俗呼癰漢指頭，北人名曰爛瓜，江南謂之白石樹，杭州貨賣，名蜜屈立，詩所謂南山有枸是也。樹形似白楊，其子着枝端，如小指，長數寸，屈曲相連，春生秋熟，經霜後取食，如饒美，以此木作屋柱，令一室之酒味皆淡薄，趙以德治酒人發熱，用枝矩子而愈，卽此也。

按酒之爲物，氣熱而質濕，飲之而昏醉狂易者，熱也，宜以汗去之，既醒則熱去而濕留，止宜利小便而已，二者宜酌而用之。大抵葛花解醒湯，治飲酒太過，嘔吐痰逆，心神煩亂，胸膈痞塞，手足攣掉，飲食減少，小便不利，白朮、人參、神麴、白豆蔻、砂仁、葛根、木香、青皮、陳皮、赤茯苓、澤瀉、乾薑。

此方辛熱，乃從治之藥，無非以熱攻熱耳，若多服則損人，天年傷酒，食不藥方，心中酒食停滯，或被人強勸，腰

中脹滿不消，用鹽花擦牙，溫水漱下，如湯沃雪，卽時通快。

除濕散 治傷馬牛乳酪水一切冷病。

車前子炒 澤瀉各三錢 神麴炒 半夏湯泡

乾薑各三錢 紅花 甘草炙 茯苓七錢

共爲末，每服三錢，白湯下。

益脾丸 古云：服之飲酒不醉，亦好事爲之耳。

恐未必然。

葛花二兩 小豆花一兩 萊豆花一兩 木香二錢五分

一方加草豆蔻一兩，右末，蜜丸，桐子大，不

津下五丸。

痰

三錫曰：痰之爲患大矣，須分所禁之邪而治之。有熱痰，有濕痰，有食積痰，有風痰，鬱痰內因于七情，外感于六氣，俱能助痰爲患。乃血氣津液不消，薰蒸結聚而成。有此生，便有此氣血津液。有此氣血津液，便有此痰火。乃清濁邪正之氣變化必然之理，但不可使清濁混淆邪害正氣。昧者不知培養，惟務剋伐，必欲追淨其痰，卒至胃損氣傷，終不知悔，良可慨也。我丹溪先生憫其治法，彙二卷，痰。

八十五

天柱故示人曰：治痰者，實脾土，燥脾濕，是治其本。乃千載不易之確論。因立二陳湯以爲主治。看所挾而兼用藥，以半夏燥脾濕，橘紅利滯氣，茯苓滲濕和中，甘草益胃緩中，蓋濕滲則脾健，氣利則中清，而痰化可謂體用兼該，標本兩治之妙品也。今人不知古人精微，謬謂藥燥而以貝母代之，殊失立法之初義。按貝母乃心肺二經藥，性能療鬱，詩云：言採其甘是也。凶血家肺有鬱火，及產乳餘疾，消渴陰虛咳嗽之人忌。

用燥劑必以此代之，餘皆非半夏不可，詳見綱目半夏下。

痰皆動於脾，濕寒少而熱多，濕在肝經謂之風痰，濕在心經謂之熱痰，濕在脾經謂之濕痰，濕在肺經謂之氣痰，濕在腎經謂之寒痰。風濕脈弦，面青，四肢滿悶，便溺秘澀，心多燥怒，水煮金花丸，川芎防風丸，熱痰脈洪，面赤，燥熱，心痛，唇口乾燥，多喜笑，小黃丸，小柴胡湯加半夏，濕痰脈緩，面黃，肢體沉重，嗜卧。

八十六

不收，腹脹而食不消，白朮丸，局方防已丸，肺氣痰脈澀，面白，氣上喘促，洒淅寒熱，悲愁不樂，痰分五色，色白西方本色，色黃逆而之坤，色紅甚而之丙，金受火因爲難治，青色受風之羈絆，黑如煙煤點，順而之北方，不治自愈。

濕痰多身重，加二木爲防，火痰加青黛，葶連，梔子，食積加山楂，神麩，麥芽，黃連，枳實，甚者必攻之，久病加參朮，風痰加南星，老痰加。

軟堅藥海石蛤粉瓦礫子瓜薑香附五倍子之類亦曰五倍子佐他藥大治頑痰脉滑數或弦急症兼口乾面赤心煩嘈雜等火症者芩連二陳湯主之不已滾痰丸或玄明粉
脉濡緩身體倦怠體厚人屬濕痰二木二陳防風羌活酒芩氣虛佐參朮
脉沉滯或滑瘕兼惡心心下飽悶屬鬱痰宜開鬱行氣
脉滑見于右關時常惡心吐清水痞塞就吐中以驚羽探之後以小胃丹徐服痰在膈上瀉亦不去必用吐膠固稠濁非吐不開
脉浮滑宜吐脉澀高年虛人不可吐
痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之意須先升提其氣乃吐如防風川芎桔梗芽茶薑汁之類
晴明時于不通風處以布繫勒其肚乃可吐
痰因火盛逆上者治火爲先白木黃芩軟石膏枳實之類故曰黃芩治痰假其降火也

氣虛而有痰必用參朮佐以薑汁傳導
宜清中氣以運痰使之下二陳枳朮兼用升麻以提清氣中宮有食積與痰飲而生病者胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣又曰治痰用利藥過多則中氣傷痰反易生而多矣
脉來細滑或緩痰涎清薄身體倦怠手足痠軟此脾虛挾濕六君子湯或補中益氣加半夏茯苓
凡人身中下有塊不痒不痛或作麻木名敗痰失道宜隨處用藥消之無碍亦不必治
如痛而按之無血潮淡薄不熱堅硬如石破之無膿或出清水如乳又有壞肉如破絮或如瘰癧在皮膚間咽中結塞俗名梅核氣作寒作熱皆屬敗痰急于益氣養榮湯中加星半治其內外用玉龍膏以拔其毒使成膿破爲良輕者必自內消如內熱痰壅則用控涎丹如結于咽喉

耳前後尤爲難治。夫血氣和暢，自無此病。必補養爲主。切忌針刀。日久不作膿，悉屬虛如腐肉。用針灸而不去者，白礬、朴硝二味等分爲末，傳之自化爲水，內服大補藥。

痰挾瘀血 成窠囊，膈間脹悶，諸藥不効，神木丸佳。

鬱痰用白蠟、蠶、杏仁、瓜蒌仁、訶子、貝母五倍子作丸，每服五十丸，佳。

痰在脇下，非白芥子不能達。痰在四肢，非竹

瀝薑汁不行。

卷十

痰在皮裏膜外，非竹瀝薑汁不能達。二味治陰虛有痰，大獲奇驗。噎膈、贍胃、陰虛勞嗽，半身不遂，加而用之。

陰血不足，相火上炎，肺受火侮，不得下行化令。由是津液凝滯，生痰不生血。當用潤劑如門冬、地黃、枸杞之屬，滋其陰，使上逆之火得返其宅而息。則痰自清，投以二陳立見其效。瘦人多此痰在咽喉，燥不得出，化痰加軟堅藥，瓜蒌、杏仁、海粉、桔梗、連翹，少佐風化硝，以薑汁入蜜和。

大丸喻化海石，卽海粉。濕痰能燥，熱痰能降，結痰能軟，頑痰能消，可入丸子不入煎藥。枳實治痰能衝墻倒壁。天花粉大降隔上熱痰。

痰在膈間使人顛狂健忘，四肢偏枯及風痰俱用竹瀝妙。竹瀝又能養血清金潤燥。丹溪詳言之矣。荆瀝滑痰尤速，第不似竹瀝有神耳。故曰能食者用荆瀝。

痰挾瘀血成窠囊者，由厚味積熱，腸胃枯涸，又

治法彙二卷

卷十

加拂鬱胃脘之血爲痰濁所滯，日積月累漸成噎膈。若用燥劑其結轉甚，惟竹瀝薑汁、韭汁可以治之。日吃三五盃，必胸中躁煩不寧，乃妙。後用養血健脾潤燥藥詳具本門。

痰在腸胃可下而愈。枳實、甘遂、大黃、芒硝、巴霜之屬。

痰飲流入四肢，令人肩背痠痛，兩手軟痺，醫誤以爲風，則非其治。宜導痰湯加薑、黃、木香、五分。

匪虛有痰，肺經數而汗者，宜二陳加天門冬、知母、瓜蒌仁、香附、米竹瀝薑汁，或自汗渴者以貝母易半夏。

痰爲飲之積，飲爲痰之漸，稀涎水是也。

五飲氣稍旺人，三花神祐丸控涎丹妙。

肝結滯胸膈不利，或作刺痛，此痰挾氣鬱，宜七

氣湯、越鞠丸。

有人坐處率吐痰涎滿地，其痰不甚稠粘，只是

沫多，此氣虛不能攝涎，不可用利藥，宜六君子

湯、法藥二卷、痰。

湯加益智仁壹錢以攝之。

兩手關前脉浮大而實者，膈上有稠痰也，宜吐

之。

眼胞上下如燥黑者，亦痰也。

病人百藥不効，關上脉伏而大者，痰也。

喉中有物咯不得出，嚔不得下，此是老痰，重者

吐之，輕者用瓜蒌實等潤劑，實人加竹瀝。

脉澀者，卒難得開，必費調理。

氣實痰熱結者，吐難，或成塊吐咯不出，氣滯者

難治。

痰有輕重新久之殊，新而輕者，形色清薄，氣味亦淡，久而重者，黃濁稠粘，凝結咳之難出，漸成惡味，酸辣腥臊，甚至帶血而出，痰隨氣上下，無處不到，調氣爲先，分導次之，氣順則津液流通，痰飲自下，亦是妙境。

王節齋曰：痰屬濕，乃氣血津液之所化，外因風

寒濕熱所感，內因七情飲食所傷，以致氣逆血

濁，津液不清，薰蒸結聚而變爲痰，爲病百端不

治法藥二卷、痰。

能枚舉，積于體中，變出異證，故曰怪病起于痰。

眼黑而行步呻吟，舉動艱難者，入骨痰也，其病

遍體骨節疼痛，審氣血加化痰藥。

眼黑而面帶土色，四肢痿痺屈伸不便者，風濕

痰也。

酒痰用瓜蒌青黛蜜丸喻化。

痰痰有用溫劑者，乃寒因熱用，非真寒也。

用法用蘿蔔子半斤，搗水一碗，去渣入少油與

蜜溫肝，或用蝦半斤，入薑蔥薑等物料，水煮先

後竹汁少時以鷺羽探吐其鷺羽先用柳
子浸乃以皂角水洗淨曬乾待用如用瓜蒂梨
蘆等不用探吐自出

痰火盛于上焦非滾痰丸不解

腎虛不能納氣歸元出而不納則積滯積弗散
則痰生焉肥人多此八味丸主之

多鬱悵胃中濕痰盛周身走痛飽悶惡心者輕
則墜痰丸或小胃丹重則三花神祐丸但要酌
量用之可也

治法彙二卷

九二四

大凡痰飲變生諸症不當為諸症牽掣作名且
以治飲為先飲消則諸症自愈故如頭風眉核
角痛累以風藥不効投以痰劑收功如患眼赤
羞明而痛與之涼藥弗瘳昇以痰劑獲愈凡此
之類不一而足散在各門不復繁引

仲景曰氣虛有飲腎氣丸補而逐之即六味地
黃丸也凡尺脉浮大按之則滯氣短有痰小便
赤澀足跟作痛皆腎虛不能行濁氣泛上而為
痰也腎氣丸屢驗脾肺氣虛而不能運有痰者

六君子加桔梗脾經氣滯而痰中有血者加味歸
脾湯若肝經血熱而痰中有血者加味道遙散
肝腎陰虛而痰中有血者六味丸若過服寒涼
之劑墜痰有血者四君子湯佳

二陳湯 半夏陳皮二味宜陳者佳

陳皮 半夏 赤茯苓 甘草

導痰湯前方加枳實南星

燥濕痰星夏丸

治法彙二卷

九十五

南星 半夏 各半 海蛤粉 三兩

右為末薑汁浸蒸餅為丸青黛為衣菴豆大
每服二錢薑湯下

中和丸 治濕痰氣鬱

蒼朮 黃芩 半夏 香附 各等分

右為末薑汁神麴糊丸桐子大每服六七十

丸遠白湯下

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰

能損胃不食胃弱者忌

甘遂麩暴燥大戟長流水煮一時洗

芫花醋伴經宿炒黑勿焦各一兩大黃酒伴濕紙燬煨培乾再用

酒伴潤一兩五錢黃柏炒褐色二兩

右爲末粥丸麻子大每服十丸溫湯下

墜痰丸能墜痰從穀道中出

風化硝 枳實炒黑牽牛頭末五錢

生白礬錢三牙皂錢三去皮弦酥炙黃

一本有貝母錢三

右細末蘿蔔汁丸桐子大每服五十丸白湯

治法彙二卷痰左

人中黃飯丸菉豆大每服十數丸白湯送下能

降火清痰又治食積

滾痰丸 治一切有餘痰火

大黃酒伴黃芩去朽各半斤沉香錢五礞石硝煨黃金

色五錢百藥煎五錢

右爲細末滴水丸梧子大每服三五十丸或

作菉豆大服壹錢視強弱加減

括曰甌裏繼身中掛金如今頭戴草堂深相逢

二八之斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中

兩水桐子意湏斟諸般性症如神驗水瀉

身却不任

半總曰倍若沉者加五倍子如沉香之數也

千縉湯 治風痰壅盛

半夏湯泡七次皂角二寸去皮炙黃甘草炙一寸

右水煎薑叁片

利膈化痰丸

南星煨蛤粉 半夏湯泡貝母去心

治法彙二卷痰瓜蒌仁 香附 皂角去皮杏仁去皮

青黛各等分

右以前六味爲末皂角槌碎熬濃煎汁研青

黛爲衣任用

青礞石丸 能化痰降火一云治食積痰去積

痰

風化硝二錢盆淨者冬月以茯苓

南星煨火煨青礞石敲碎如穀子大同礞

半夏湯泡七次黃芩錢五陳皮七錢

右爲細末神麴丸入薑汁爲丸桐子大每服
三五十九薑湯下此藥重在風化硝一方有
白朮無南星一方有枳實因人加減可也
神朮丸 治痰飲

蒼朮錢五生芝蔴二錢五錢研水大棗十五枚煮
先以蒼朮焙乾爲末和芝蔴漿棗肉爲丸桐
子大每服五七十九湯下
黃芩利膈丸 除胸中熱利膈上痰

生黃芩 炒黃芩各一兩半夏 澤瀉
治法彙二卷 痰

黃連錢各伍南星煨枳殼炒陳皮去白
白朮錢各伍白朮錢各伍

右爲末湯浸蒸餅丸

枳實錢各伍逐飲消痰導滯清膈

枳實錢各伍半夏 陳皮去白黑丑取頭末

右炊餅丸桐子大每服五十九薑湯下

十惠湯 治懸飲內痛

芫花 甘遂 大戟

右爲細末大棗十枚煮湯去棗調藥末強人

受錢人半錢平旦服之不下加伍分芫花
之辛以泄飲二物以瀉滿甘遂取其直達水
氣所結之處乃泄水之聖藥也然有大毒涉
虛者不可妄用

三花神祐丸 治一切氣濕熱沉積痰飲變生
諸病或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風
痰涎嗽氣壅滯不得宣通等症人壯氣實
者可服

甘遂 大戟 芫花伴濕炒黑丑二兩取
治法彙二卷 痰

大黃一兩輕粉一錢

右爲細末滴水丸小豆大每服加五丸溫水
下日三服加至快利後須服至病根盡除
爲度痞悶極甚者多服則頓攻不用時加痛
悶當初服參丸每服加貳丸以利爲度
控涎丹 治患背脇頸項及手足腰膝隱痛不
可忍筋舉引釣痛時時走易乃是痰涎在
胸膈間隨氣升降于經絡中作痛而然或
手足冷痺氣脉不通誤認爲癱瘓者

耳遂 去心 大戟 去皮 白芥子 主上氣發汗

右各等分爲細末糊丸桐子大每服五七丸

淡薑湯下食後臥服量人虛實加減丸數一

方名妙應丸治驚痰加硃砂爲衣痛甚者加

全蝎驚痰成塊加穿山甲鱉甲玄胡索蓬莪

木臂痛加木鱉子霜桂心熱痰加盆硝寒痰

加丁香胡椒肉桂

半夏丸 治肺熱痰嗽

瓜蒌仁 另研 半夏 湯泡七次去皮

治法 藥二卷 痰

右爲細末和均薑汁打糊爲丸

取竹瀝法 大治熱痰能養血清熱有痰厥不

省人事幾成者得竹瀝灌之卽甦誠起死回

生藥也

古方用水竹早筍竹 俗名雷竹東坡曰淡竹

苦竹爲文耳除苦竹之外皆淡竹也丹溪只

用此二竹蓋取其諸竹中之最淡者南都春

末先出者名芽竹筍甘而淡晚出者爲筍竹

筍黃而苦不佞只用芽竹瀝亦甘淡

每段劈作四片以薄磚架兩頭

寸一以猛火迫之兩頭以碗盛瀝六分中加

薑汁一分服之熱多者止可加半分耳

荆瀝如取竹瀝之法清火化痰功勝竹瀝第不

補耳

潤下丸 降痰極妙一人心下常覺痞塞或教

服此傾之覺有一塊自心而下遂愈

廣陳皮一斤四兩擇淨一斤好鹽肆兩同

入水煮用宜適中不可過多不可不及約

治法 藥二卷 痰

鹽入透爲度取起曬乾仍碎片焙燥爲末

入炙甘草末肆兩酒糊爲丸粟豆大每服

米拾丸不拘時清茶下

瑞竹堂化痰丸 快脾順氣化痰消食

白礬 半夏 洗淨 草角 天南星 生薑

右肆件各肆兩砂鍋內加水煮南星無白點

爲度去草角將參味切片曬加後藥

青皮 陳皮 薑根 蘇子 神麴

麥芽 山楂 蘿蔔子 炒研 香附子 炒研

杏仁去皮尖炒一方加枳實茯苓

右拾件各壹兩合前藥共為末薑汁炊餅丸
每服伍拾丸食後白湯下

辰砂祛痰丸 治酒食過度酸醃釀成痰飲聚

于胸中凝則嘔逆惡心流則背臂痛腫頭

目昏眩腰脚疼甚則左癱右瘓淺則蹶然

倒地此藥神効

硃砂一兩水飛過入藥半夏四兩槐角炒

陳皮白礬生用荆芥各一生薑四兩槐

治法彙二卷痰

作餅

右為末薑汁打糊為丸桐子大每服伍拾丸

食後薑湯下忌動風動氣之物

四製化痰丸

半夏壹斤作肆分勿切碎

壹分用生薑黃連各壹兩用水貳碗同煮

乾去薑連

壹分用知母貝母各壹兩如上煮去貳母

壹分用人參杏仁各壹兩去皮尖如上法

壹分用桔梗桑皮各壹兩同上法

左標出半夏切碎晒乾為末水糊丸每服

伍拾丸薑湯下

法製半夏

用明礬陸兩硝肆兩煮水陸碗半夏貳斤

先將溫水洗淨入藥水內浸一宿次日取

出入清水內浸貳七取起用刀切片加薄

荷肆兩甘草貳兩任用

節齋化痰丸 痰因火動肺氣不清咳嗽時作

治法彙二卷痰

及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐咯難

出此等之痰皆因火邪炎于上焦肺氣被

鬱津液之隨氣而升者為火薰蒸凝結鬱

濁而成歲月積久根深蒂固故名老名鬱

而其原則火也病在上焦心肺之分咽喉

之間非胃中濕痰之比固非半夏二陳等

所可治者惟在開鬱降火潤肺金而消痰

凝滯之痰緩以治之庶可取効

天門冬去心淨酒枯苓一海粉另研

橘紅一兩 另研

桔梗去蘆五錢 另研

香附炒五錢 連翹五錢

右爲極細末煉蜜入生薑汁少許和藥末拌

極勻丸龍眼大噲化或細嚼亦可一方作碎

丸服不如噲之妙

三錫曰按此方天門冬黃芩除肺火也海石芒

硝礬能軟堅也瓜蔓仁潤燥洗滌上焦香附降

火連翹開結降火青黛解鬱火爲陰虛燥痰妙

治法彙二卷痰

品抑又論之上焦乾燥痰結于喉固宜潤劑萬

不可易第五液皆本于腎腎水虛不能制火則

火炎上又當補腎滋陰以治本乃端本澄源之

意錫常治老年男婦一切燥痰噎嚥不舒大便

乾燥或痰結喉中咯不出悉用清化膏以培腎

壯水兼噲化此丸其効更速可補王君之遺矣

白龍丸 治酒積有痰

半夏 滑石 茯苓 白礬各等分

右末神麴糊丸

時疫曰痰涎之爲物隨氣升降無處不到入于

心則迷竅而成癰癩妄言妄見入于肺則癰

而或咳唾稠粘喘急背冷入于肝則留伏蓄聚

而成脅痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻痺疼

痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛

陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝

滯而爲痰爲飲爲涎爲涕爲癖大戟能泄臟腑

之水濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮

治法彙三卷痰

裏膜外之痰氣惟善用者能收奇功也

回陽王龍膏 治一切癰腫堅硬不痛肉色不

變久而不潰或潰而不斂或骨變骨痛及

一切冷症

草烏三兩 南星一兩 生薑二兩 白芷一兩

肉桂半兩 赤芍藥一兩

爲末葱湯調搽

二卷終

咳嗽

有火有風有寒有痰有癆有肺脹

傷風脉浮兼自汗頭眩眼脹鼻塞涕涕者屬傷

風冬月十神湯餘月芎蘇飲最捷

外感脉浮紫症兼頭痛拘急惡寒發熱無汗者

屬寒冬月十神湯加減餘月芎蘇飲加羌活

大寸滑而數或沉實而弦口乾頭時痛有聲痰

少面赤者火也宜降火清金加味芩連二陳

湯

治法彙三卷

鬱火如曾服涼藥或起初發散未淨火鬱在肺

痰結不出兼氣促者仍用解散輕則芎蘇飲

甚者加麻黃

已經發散降火咳嗽不已口乾內熱盛者二

陳加枯芩花粉瓜蒌蜜蘇子其寒潤之

痰脉滑或弦數動作便有痰聲痰出嗽止者痰

也主豁痰利氣二陳加南星枳桔前胡香附

滾痰丸佳

因痰而嗽者痰爲重主治在脾因咳而動痰者

咳爲重主治在肺一切食積痰積上升而致咳

者只治其痰消其積咳自止不必用涼藥肺藥

潔古曰治咳嗽以化痰爲先化痰以導氣爲主

以南星半夏化其痰而咳嗽自愈以枳殼橘紅

利其氣而痰飲自降此其大畧耳

痰爲火所逆上者先瀉火然亦看緩急治或先

降火或先理氣

陰虛脉弦而數或細數或瀉症兼盜汗下午作

寒熱面色純白兩頰赤多清痰乾咳者勞也

治法彙三卷

屬陰虛火盛清金補陰四物加竹瀝薑汁或

早服補陰丸晚服門冬膏

咳嗽氣脹壅遏不得眠者難治

乾咳乾咳嗽係火鬱之甚難治乃痰鬱火邪在

肺上用苦梗開之下用補陰降火藥不已則

成癆須行倒倉法此症因不得志者有之切

忌半夏宜瓜蒌貝母等潤劑惡心忌瓜蒌

脉弦急或溢出寸口動則喘急屬肺脹宜收斂

肺脹肺爲火傷遂成鬱遏脹滿用訶子爲君佐

以清粉青黛杏仁又曰肺脹而嗽或左或石
不行服此痰挾瘀血碍氣而然宜養血以流
動子氣降火疎肝以清痰四物加桃仁訶子
青皮竹瀝薑汁之類

風寒鬱熱于肺夜嗽者三拗湯加知母脉數大
而浮加黃芩生薑

聲啞者寒包熱也宜半夏生薑辛以散之

久嗽聲啞不治是肺管破也

陰虛火動而嗽四物合二陳或加知母黃柏見

治法藥主卷八咳嗽

血者加貝母去半夏

陰虛或吐紅者坎離加五味子人參麥冬桑皮

地骨皮

氣虛好色之人元氣虛弱咳嗽不愈瓊玉膏妙

病後氣促咳嗽色黃白脉虛大多屬肺虛生脉

散主之

咳血咳見血多是陰虛火載血上四物一門

二母牡丹皮阿膠脉數者忌參耆易沙參

肥白人咳嗽目汗日久不愈人參膏以生薑陳

皮佐之有痰加痰藥

咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服
之

醫說方治痰嗽用蚌粉新瓦上炒通紅入青黛
少許以淡薑水滴入麻油數點調服

食積痰嗽發熱半夏南星爲君瓜麤萊菔子爲

臣青黛海石石礮爲使薑汁浸蒸餅丸服

咳嗽聲嘶引兩脇痛不可忍者二陳加芎歸芍

藥青皮柴胡草龍膽黃芩竹茹之類

治法藥主卷八咳嗽

腸痛嗽嗽而脇痛宜以青皮疎肝氣後以南星

香附青黛薑汁一云實者白芥子之類

嗽而心煩不安六一散加辰砂服

心脉不足兼心跳口乾煩躁者補心丹

久嗽失聲曾經發散過不愈者潤肺散至之訶

子五味子五倍子黃芩甘草爲末蜜丸喻化或

清音丸亦妙

有熱嗽失聲多服涼劑而聲愈不出者以生薑

法調消風散或一味薑汁亦可冷嗽失聲尤宜

或喻橄欖丸或煎一味杜杞藥湯徐徐熱飲一
寒熱交作而咳嗽者小柴胡加知母之類一方
加芍藥五珠子桑白皮陰氣在下陽氣在上咳
嗽嘔吐喘促瀉白散加青皮五味子人參茯苓
糯米

咳而嘔胃氣衰弱肺氣不利咳嗽嘔吐併作為
子母俱病最重先安胃氣二陳加白朮薑汁
準繩法嗽吐痰與食俱出乃飲食失節致肝氣
不利而肺又胃寒邪肝為濁道肺主清道清濁

治法彙纂卷八咳嗽

七

相干宜二陳加木香杏仁細辛枳殼各半錢
熱嗽膏滿小陷胃湯有血碍氣作嗽桃仁去
皮尖大黃酒炒薑汁丸服

凡嗽春是上升之氣寒令尚存微兼辛散夏是
火邪炎上宜潤以降之秋是濕熱傷肺宜清肺
冬是風寒外束宜發散

早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣流于肺
中以知母地骨皮降肺火

上半日嗽多者胃中有火知母石膏降之午後

屬陰虛四物加知母黃柏先降其火
黃芩多者火氣浮于肺不宜用涼劑宜五味
五倍飲而降之

久嗽用生訶子一枚含之嚥津瘥後不知食
味煎檳榔湯服之便佳

治嗽須分新久虛實如久嗽脉滿或雖洪大按
之不鼓屬肺虛宜五味款花紫苑馬兜鈴之類
欬而補之或日數雖久脉數滑有力尚屬有
餘實火更宜清金尋火尋痰分緩急治一法

治法彙纂卷八咳嗽

六

久嗽肺虛自汗倦怠參芪阿膠當歸生薑天冬
款花馬兜鈴酒芍藥煎服氣促有火脉數去人
參易沙參

治久嗽用訶子味酸苦有收欬降火之功五味
子收肺氣乃火熱必用之劑杏仁散肺中風熱
然肺實有火因于寒者為宜桑白皮瀉肺氣然
性不純良用之多者當戒或用兜鈴以其去肺
火補肺也多用生薑以其辛能發散也瓜蒌子
其能潤肺寒能降火以肺受火逼失降下之令

今得甘緩潤下之助則痰自降宜其爲治嗽之要藥也除陰虛血虛火盛乾咳者勿用

嗽久不問風寒鬱熱曾先服過麻黃杏仁防風等藥病雖退減而根未除者二陳加粟殼烏梅阿膠五味子瓜蒌仁之類

久嗽必用粟殼不必疑要先去病根此乃收功後藥也與治痢同

勞嗽卽火鬱嗽因火傷急遂成鬱遏脹滿不得眠一邊訶子取其酸苦有收斂降火之功佐

治法彙主卷

七

以海石童便浸香附瓜蒌青黛杏仁半夏麴之類薑汁調喻化必以補陰爲主陰分嗽悉作陰虛治肺燥者潤之口乾痰不得出者是屬熱桔梗大力雞子清

肺氣虛無火色白者人參膏阿膠爲主陰不

足者六味地黃丸爲要藥或知母茯苓湯見肺寒熱交作而咳嗽小柴胡加知母或加五味子痰積嗽非青黛瓜蒌不除

因感冒已經發散而咳不止脉數無力屬陰虛

六味地黃作湯服大驗

有金積人面青白黃色不常面上有如蟹爪路一黃一白者是 一方香附瓜蒌貝母海石青黛半夏麴軟石膏山查子枳實薑汁炒黃連蜜調喻下

嗽而咳逆非蛤粉青黛瓜蒌貝母不除

久嗽曾經解散涼藥致肺胃俱寒飲食不進用溫中助胃加和平治嗽之藥

形瘦脉澀無汗者屬陰虛宜潤肺

治法彙三卷

八

若酒色過度虛勞少血津液內耗心火自炎遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連咳而不已夫惟血不榮肌故邪在皮毛皆能入肺而自背得之尤速此則人參芎歸萬不可無者口燥咽乾有痰者不用半夏南星恐性燥也用瓜蒌貝母膈間有痰飲作脹者忌瓜蒌恐泥膈不鬆快知母止嗽清肺滋陰降火

酒多傷肺咳嗽青黛瓜蒌蜜丸喻化救肺一方紫蘇濃煎汁生薑竹瀝吞上丸或加杏仁煎

熟者干貝兩星為君、瓜蒌、羅漢二

入肺久嗽者用鴛管石雄黃鬱金款冬花為末以生薑一片置舌上以藥末伴艾于薑上灸之取煙入喉中

治嗽烟筒用鴛管石雄黃款冬花佛耳草為末以雞子清刷紙上捲藥末作筒燒烟以口啣吸烟入喉薑湯下

久嗽必用薰用款冬花雞子清將蜜拌花潤入有

治法藥三卷

九

嗽壺中燒以口于嘴中吸烟咽之若胃中悶須舉起頭以指捻着烟稍間再吸五日一次至六日飽食羊肉餛飩妙

咳而膈乳痛即看痰色如何如或濃濁如膿或黃或赤口中臭即從肺痿肺癰治以脉數而虛者為肺痿脉數而實者為肺癰

遇寒則發內有鬱熱結痰也解表熱自除二陳加枳桔防風紫蘇麻黃本通黃芩歲寒加杏仁藏茶

皆治無痰而嗽者以辛甘潤其肺也

一種傳注勞病近世用蛤蚧天靈蓋桃柳枝丹砂雄黃安息香蘇合香丸通神之劑咳嗽于此可以問津索途矣一說肺出氣腎納氣凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能收其歸元也當以破故紙安腎丸主之毋徒事於寧肺也甚妙

潤肺法

治法藥三卷

十

地黃二斤生杏仁二兩生薑各四兩

右搗如泥入瓦盆中置飯上蒸七次每五更挑三匙嚥下

又方治久嗽無痰

白蜜一斤生薑二斤

右二味先秤銅銚知斤兩約蜜再秤如數次

納薑汁以微火熬只存蜜分兩則止早晚食棗大一塊忌一切雜食

體虛傷風咳嗽參蘇飲全用妙二陳加枳殼桔

小兒咳嗽本香再加桑杏薑棗煎服

六味地黃丸火鬱者茯苓補心湯最妙即參蘇

飲加四物是也有痰者二母花粉麥門歸芍

白朮甘草茯苓欬花煎服前後心脹有血腥

氣者膈間有蓄血四物加鬱金牡丹皮童便

製香附枳殼紅花甚者桃仁承氣湯下之

百病惟咳嗽號難治大要分辨明白方妙如一

咳便有痰者屬脾濕盛而痰滑也宜南星半夏

皂角灰之類燥之油潤之劑所當忌也如連咳

治法要三卷咳嗽

數聲痰便不出者屬肺燥宜杏仁蘇子麥冬花

粉知母之類潤之忌燥劑

又曰咳而無痰者以甘寒潤其肺痰多而致

咳者以辛平燥其脾

肺與大腸為表裏火鬱于肺肺氣不得下降因

而咳多大便結澀大柴胡湯下之或用竹瀝薑

汁下滾痰丸

綱目曰利肺氣藥加大黃腸胃壅滯而脉沉實

滑數者宜之

過飲水或多食梨蔗冷涎停滯心下攻肺作

嗽小兒龍湯煎之

小兒孕婦產後咳嗽與尋常同第分虛實兩

種寒咳白痰作白泡屬肺中虛寒口甘涎沫流

肺沉弦細遲屬胃中寒口出清水心下汪洋

作膈雜胃脇脹痛不食均屬冷飲停于胃中

攻肺則咳半夏溫肺湯主之

旋覆花 人參 細辛 桂心 甘草

陳皮 桔梗 芍藥 半夏 赤茯

治法要三卷咳嗽

薑三片煎服

十神湯 冬月發表要藥

紫蘇葉 白芷 甘草 麻黃 陳皮

香附 葛根 川芎 升麻 赤芍

葱薑煎取汁

十味芎蘇飲

二陳 前胡 枳殼 桔梗 葛根

川芎 紫蘇 桑皮 杏仁

薑棗煎服

水黃金花丸 治咳嗽脉弦面青色白四肢

悶便溺閉澀性偏疎屬風痰嗽用此燥之

南星 半夏各一兩 天麻五錢 雄黃 一錢

白麩三兩 寒水石一兩

右爲末水丸桐子大每服五拾丸至百丸煎

漿水沸下藥煮令浮爲度冷漿覆之薑湯下

化痰玉壺丸 治風痰逆頭痛目眩咳嗽喘

天南星 半夏生風 天麻 半兩 白麩 三兩

右末水丸桐子大每服三十丸水煮浮起放

治法藥三卷

上

溫薑湯下

法製半夏 用大半夏不拘多少湯洗七遍去

脂焙乾再洗七洗用米泔浸一日夜取起控

乾每半夏一兩白礬兩半研溫水化浸上兩

指許頻攪冬月宜溫暖處頻攪浸五日夜取

出焙乾用鉛白粉一錢溫水化又浸二日通

七日夜盡取出再用藥水于慢火煮令勿滾

候漿水極熱取出焙乾每服一二粒食後細

嚼生薑湯下

不離拾喉因成咳嗽不止諸藥不効甘肅之效

甘草二兩去皮作二段半中劈開用猪膽五

枚浸三日取出火上炙乾爲丸每服四五十

丸茶清化下臨臥服

蘇沈九寶湯 治素有痰火遇寒則發咳嗽喘

急不得安臥

桑皮 大腹皮 陳皮 麻黃 桂枝

薄荷 紫蘇 杏仁各六分 甘草三分

薑三片烏梅半個煎服

治法藥三卷

上

杏仁煎 治哮喘寒熱喜少噴多面色不潤食

少脉弦緊杏仁一兩去皮尖用童便浸一

日一夜夏月一日三換浸半月取出洗淨

焙乾研令極細每服棗一大枚用薄荷一

葉白蜜少許水一盞煎食後服不過兩劑

瘥

右法如上浸七日漉出洗淨研泥別入瓶中換

小便糞成膏白湯下二錢或攤曬乾蜜丸亦可

每服三四十九茶下

犀角 治久嗽喉中氣塞胸膈噎痛

膠犀角 羚羊角各一兩除膠外皆為末次

入膠河水三升煮半升臨臥細細服

久咳不止百部二十斤搗汁煎如飴服方寸匕

妙名百部膏

人參五味子散 治男婦諸虛氣血兩弱咳嗽喘

或唾膿血寒熱往來自汗羸弱

人參 五味子 桔梗 白朮 白茯苓

甘草 炙 熟地黃 當歸 焙半 地骨皮

治法藥主卷 咳嗽

前胡 桑白皮 枳殼 炒 黃芩 陳皮

柴胡

薑三片煎煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加阿

膠

紫苑茸湯 治飲食過度或食煎燥邪熱傷肺

咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得安臥

兼治肺痿

紫苑茸 洗 經霜桑葉 欬花 百合 蒸

杏仁 去皮 阿膠 炒 貝母 去心 蒲黃 炒

半夏 犀角 甘草 人參

右薑煎服

杏參散 治胸膈脹上氣喘急咳嗽不得睡臥

桃仁 去皮 人參 桑皮 蜜炙 杏仁 去皮

右薑煎服

久嗽已經發散清肺諸法不應胸膈不利唾膿

咳血坐臥不寧語言不出寧肺散主之有是病

投是藥若拘泥澁滯斷不可救矣

烏梅 錢八 罌粟殼 一斤蜜炙

治法藥主卷 咳嗽

共為末每服二錢烏梅煎湯調下

異功散久咳不已腹痛少食面腫氣逆又治脾

胃虛弱飲食少思等症人參茯苓白朮甘草陳

皮各等分薑棗煎服

九僊散 治久嗽

人參 欬花 桔梗 阿膠 五味子

烏梅 兩 貝母 罌粟殼 各半

右為細末每服三錢白湯點服

白石膏 治肺虛有火咳嗽有血

冬花 百合

右為細末煉蜜丸龍眼大食後細嚼薑湯下
嚼下亦可

貝母散 治久嗽

貝母 桑白皮 五味子 甘草炙一錢五分

款花二杏仁 去皮炙

每服一兩薑三片煎八分去查服

一方二母為末薑一片煎細嚼白湯下

圍參飲子 治憂思過度喜怒饑飽失宜致傷

治法藥三卷

十七

脾肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞嗽

人參 紫苑 阿膠蛤粉 百合蒸 細辛洗

款冬花 杏仁 天門冬 半夏

經霜桑葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

有血加生地 肺寒加鍾乳粉 嘔吐加白

朮 咳而遺溺加益智 大便糖去杏仁加

鍾乳 薑煎服

法治久嗽

人參 杏仁去皮 五倍子各五錢 半夏七錢

右為細末另用

蘿菔去頂取空以草麻子去殼四十九粒

明礬五錢為末同入蘿菔內以頂蓋紙包

煨爛研泥和上末凡梧子大每服十九烏

梅湯下

按肺主皮毛平人榮衛週流內氣自皮膚腠理

宣達于外衛護一身一為風寒外束內氣不暢

變從中起所以氣升痰上而為咳嗽治必用辛

散以表散之邪退正復而嗽止肺為華蓋喜

治法藥三卷

十八

清惡濁或饑飽勞役七情內傷酒肉膏粱太過

火升痰上肺不清亦令人咳治必降火化痰且

肺主氣運行血液周流一身今也肺受火逼氣

從火化有升無降久而不治元氣日損痰火日

盛咳唾稠粘膿血枯稿睡驚煩躁養氣血滋陰

降火以清肺金又須分別氣血孰虛隨宜處治

庶有成績

肝咳之狀咳則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩脚下滿小柴胡湯

咳嘔吐苦水如膽汁黃芩半夏生薑湯

主之黃芩生薑三錢炙甘草半夏二錢

心咳之狀喉中如梗狀甚則咽腫喉痺苦梗三錢甘草六錢煎服

肺咳咳而失氣芍藥炙甘草各四錢主之

脾咳之狀咳而右脇下痛痛引肩背甚則不可

以動升麻白芍甘草各二錢葛根三錢煎服

胃咳之狀咳即嘔嘔甚則長重出烏梅九主之

烏梅三十箇細辛附子桂枝人參黃栢各六錢

治法彙三卷

咳

錢乾薑一兩黃連一兩五錢當歸蜀椒各四

兩共末飯為丸桐子大每服五十丸白湯下

肺臟發咳而喘急有聲甚則吐血麻黃湯主

之原方

太腸咳咳而遺尿赤石脂禹餘糧湯主之

腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎又治

寒邪犯齒致齒痛腦亦痛麻黃附子細辛湯

肺肺咳而遺溺茯苓甘草湯主之茯苓二錢

桂枝二錢半生薑五片炙甘草一錢

薛新甫曰春月風寒所傷咳嗽聲重頭痛金沸

草散之一二服不止口乾脉浮洪有火也兼涼

藥蓋肺主皮毛肺氣虛則腠理不密風邪易入

治法當解表兼實肺肺有火則腠理不閉風邪

外乘治宜解表兼清肺火邪退即止若數行解

散則重亡津液邪蘊而為肺疽肺痿矣故凡肺

受邪不能輸化而小便短少皮膚漸腫咳嗽日

增者宜六君子湯以補脾六味丸以滋腎夏

月喘急而嗽面赤潮熱其脉洪大者黃連解毒

湯治之

咳

湯熱躁而咳梔子湯咳唾有血麥冬湯俱吞六

味凡吐水之主以制陽光而保肺金秋月咳

而身熱自汗口乾便赤脉虛而洪者白虎湯身

熱而煩氣高而短心下痞滿四肢困倦精神短

少者香薷飲若病邪既去宜用補中益氣湯加

乾山藥五味子以養元氣柴胡升麻各三分以

升生氣冬月風寒外感形氣俱實者華蓋散

加減麻黃湯所謂自表而入亦當自表而出若

形氣病氣俱虛者宜補其元氣而佐以解表之

子解表則肺氣益虛、肺理益虛、外邪入難治矣、

身熱往來、或午後熱、咽乾、噎痛、精神疲極、所嗜之痰、或淡或濃、或血腥臭、語聲不出者、薏苡仁五錢、桑白皮、麥冬三錢、白石英二錢、人參五味子、款冬花、紫苑、杏仁、貝母、阿膠、百合、桔梗、枇杷葉、各壹錢、薑棗梗米同煎、去渣、調鍾乳粉亦宜、蛤蚧湯、保和湯、知母茯苓湯、紫苑散、寧嗽湯、

治法彙三卷

二十

咳嗽

二十一

經年累月、久嗽不已、服藥不瘥、與勞嗽不同、宜保肺氣、一味百部膏妙、

衍義載一婦、患熱嗽、身如炙、肌瘦、將成肺勞、以枇杷葉、木通、款冬花、紫苑、杏仁、桑皮、各等分、大黃減半、各如常製、同為末、蜜丸、櫻桃大、食後夜臥、各啗一丸、未終劑而愈、

白前治嗽要藥、而今罔識惜哉、

崔紫虛曰、咳嗽之脉、浮風寒、收熱細濕、房勞、瀆難、右關濡者、飲食傷脾、左關弦短、疲極肝傷、

浮短、肺法當咳嗽、洪滑多痰、弦濇少血、脉上、逆氣、喘息、脾脉微為咳、肺脉微為咳、咳唾血、浮直而濡者易治、喘而上逆、脉數、不得臥難治、上氣喘急、面浮腫、肩息、脉浮大者、久嗽、脉弱者可治、實大數者、咳而脫形、身熱、脉小、堅急、以疾是逆也、不過十日、咳而羸瘦、脉形堅大者、咳、嗽、脉沉、緊者、久、浮、直者、生、浮、軟者、生、小、沉、伏、匿者、死、咳而嘔、腹滿泄、弦急、欲絕者、死、

治法彙二卷

咳嗽

二十二

滾痰丸

生脉散

二陳湯

六一散

補陰丸

香薷飲

瓊玉膏

補中益氣湯

補心丹

門冬膏

麥門冬湯

紫苑散

保和湯

保和湯

三拗湯

消風散

安腎丸

瀉白散

俱見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

見喘門

麻黃附子細辛湯

小陷胸湯

黃連湯

批仁承氣湯

白虎湯

大柴胡湯

梔子仁湯

小青龍湯 俱見傷寒門

華蓋散 卽三拗湯加桑皮、蘇子、赤茯苓、紅等

分右薑棗煎服

加減麻黃湯 原方加陳皮、半夏、紫蘇、半錢、薑

叁片煎服

清化膏 清肅肺金、降火養陰、陰虛腸胃乾燥

治法彙三卷

三三

口乾咳嗽、血枯、噎膈者、宜之、胃弱者忌

天門冬 一斤 麥門冬 斤半 生地黃 一斤

當歸 洗六兩 知母 四兩 白朮 六兩

甘草 三兩 陳皮 三兩

共如法煎成濃膏、加竹瀝梨汁、白蜜各一碗

薑汁 薑每服十數匙、白湯調下

寧嗽 四君四物、加五味子、桑皮、阿膠

薑煎服

治咳嗽吐膿血、及肺痿、癰瘦、涎涕稠

粘

蛤蚧 酒浸 知母 焙 貝母 焙 鹿角膠 炙

枇杷葉 去毛 葛根 桑白皮 炙 人參 甘草

炙 杏仁 湯浸去皮尖、雙仁 炒已上各一兩

每服叁錢、水一盞半、煎八分、去滓、不拘時服

清音丸

桔梗 訶子 各一兩 甘草 五錢 礪砂 青黛 各三

冰片 分

石爲細末、煉蜜丸、龍眼大、每服一丸、噙化

治法彙三卷

三三

橄欖丸

百藥煎 烏梅 甘草 石膏 各等分

肺虛火熱傷肺宜分虛實○初起喘嗽氣急胸滿脈浮緊者宜表散古法用小青龍湯須照時令加減○上氣喘急胸膈脹滿或身面浮腫屬上焦痰熱葶蘆大棗瀉肺湯主之

大法養血養氣養肺清火

丹溪治一婦人二十歲胸膈間一竅口中所咳膿血與飯相應而以人參黃耆當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈寸口脈數而虛滿

治法集卷三 肺病 五

或虛洪口中咳唾膿血為肺痿酒客膏粱厚

味家咳唾痰似膿血兼有力脈數有力者為實

火二母甘桔枯芩梔子瓜蒌犀角牡丹竹瀝藕

汁童便潤以降之勢盛者加熟大黃色白痰

頓脈大無力屬肺虛有火人參阿膠甘桔涼補

之劑黑瘦面蒼赤脈數兩尺洪咳臭膿血屬

陰虛坎離加竹瀝童便阿膠貝母

金匱曰肺痿屬熱如咳久肺痿聲嘶咯血

此屬陰虛從陰虛治肺痿者如吐涎沫

其人不渴必遺尿小便數以上虛不能製下故也此為肺中冷必頭眩多涎沫用炙甘草乾薑此為寒也肺涎唾多心中濕液濕液者用炙甘草此補虛勞也宜分治之

人參養肺湯治肺痿症咳嗽有痰午後熱并

聲颯者

人參 甘草 阿膠珠 各一錢

柴胡 四錢 貝母 五味子 杏仁 各一錢

桔梗 炒各一錢 桑白皮 一錢 枳實 半錢

治法集卷三 肺病 五

每服八錢薑王片棗二枚水二鍾煎八分臨

睡服

知母茯苓湯治肺痿咳嗽不已往來寒熱自

汗

茯苓 甘草 知母 五味子 人參 各一錢

薄荷 半夏 柴胡 白朮 欬花 各一錢

桔梗 麥門冬 黃芩 各一錢

阿膠 炒各一錢 川芎 同上

每服一兩水二盞薑三片煎八分去渣連口

服

人參平肺湯 治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘

嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑皮兩一 知母錢七 甘草 地骨皮 茯苓

五味子三伯 人參錢各四 天門冬去心

陳皮半兩

火盛加黃芩四錢蘇葉半夏各半錢

每服五錢薑三片煎八分溫服或為丸嚥化

亦可

治法彙三卷 肺痿 二十七

紫苑散 治咳唾中有膿血虛勞肺痿

人參錢一 紫苑分五 知母錢一 貝母錢半 桔梗錢一

甘草分五 五味子分五 茯苓錢一 阿膠珠分五

水煎服

劫勞散 治心腎俱虛連嗽無痰遇夜即寒寒

過即熱時有盜汗四肢倦怠體羸食少夜臥

恍惚與憂驚悸唾中有紅絲名曰肺痿不治

成瘵

白芍 黃耆 甘草 人參 半兩

白茯苓 熟地 當歸 五味子 阿膠各錢

二 右咬咀每服一兩水二盞薑三片棗

三枚煎一盞不拘時服

桔梗湯 治欬而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口

燥煩悶多渴時出濁唾腥臭

桔梗炒 貝母 當歸酒洗 瓜蒌仁 枳殼炒

薏苡仁微炒 甘草節 防己去皮各

桑白皮炒 黃耆湯水件 白合錢半

五味子炒 甜葶藶炒 地骨皮 知母炒

治法彙三卷 肺痿 二十八

杏仁各五

右作一劑水鍾半薑三片煎七分不拘時溫

服咳加白芍內熱加黃芩大便秘不利加煨

大黃小便不利加水通

脉數而實口中膿血胸間隱隱作痛為肺癰治

法詳具外科心法犬抵脉不宜大數短澹面白

者生急疾面赤者死

肺痿咳吐咽燥欲飲水者自愈張口短氣者危

小清龍湯 見傷寒門 葶藶大棗瀉肺湯 見喘門

暴失音 即喉啞

冬月寒包熱痰火鬱于上焦聲啞兼嗽宜麻黃生薑桑杏前胡甘桔辛以散之後加涼藥以清肺利氣

咳嗽聲嘶者血虛受熱青黛蛤粉蜜調服

熱而失音槐花炒香于地上出火毒仰臥細嚼

忽然失音喉燥者用豬脂油二斤鍋中煉化撈

去渣入白蜜一斤再煉少頃濾淨入磁器內冷

定成膏不時挑服一茶匙即愈亦可常服潤肺

治法彙三卷失音

已經發散潤肺不應用 訶子三錢半生半熟湯泡木通

三錢半生半熟湯泡桔梗五錢甘草半生半熟共三錢

水煎用生地黃搗爛入藥服

日久男女聲音不清

訶子五錢真阿膠五錢白芷一兩黃柏一兩

熟地黃 知母 生地黃各一兩天門冬

麥門冬各五錢當歸一兩人參三錢

烏梅十五個人乳一兩梨汁一兩

將藥共為末煉蜜丸黃豆大每服八九丸訶

下或蘿蔔湯

有嘶罵叫喊喉破失音者不可作火治而用涼藥須大補八珍加甘桔倍參芪從傷損治

人舌短言語不出乃痰涎閉塞舌本之脉而然

足少陰腎脉挾舌本足太陰脾脉連舌本手少

陰心經脉繫舌本此三脉虛則痰涎乘虛閉塞

其脉道而舌不能轉運言語也若三經血不能

營舌亦令人瘖經曰刺足少陰重虛出血是誤刺也

則舌難以言又曰刺舌下中脉太過血出不止

治法彙三卷失音

為瘖又有吐血過多而舌不能言者亦三經受

虧之故中風不語言語蹇澁皆虛為本而痰火

是標要在察其緩急標本以治斯無忒矣昔有

人病傷寒五日後神昏不語遂作體虛有痰治

之用人參五錢黃芪白朮當歸陳皮各一錢煎

成入竹瀝薑汁飲之十二日始得吐一字又服

半月舌乃能轉熟淨而言亡血家舌瘖與病後

及中風舌瘖此方俱妙妙在合宜耳

丹溪治一男子年三十五因勞倦發寒熱悞作

瘡治致舌短喉中作痰聲其脉洪數似滑遂以獨參湯加竹瀝兩服吐膏痰數塊舌轉能言餘症未退遂煎人參黃芪湯半月諸症皆退兩月全除

失音

風痰壅塞舌機不轉從類中風治久病失血後及誤汗下後心家氣血衰不能鼓舌獨參湯八物增減有痰佐竹瀝上焦濁氣壅塞痰涎阻礙童便製香附蛤粉青黛爲丸徐徐開之久

治生藥三卷

失音

三

嗽失音不治無已訶子炮去核木通各一兩甘草五錢水三鍾半入生薑地黃汁一合再煎熟沸徐徐呷之以訶子折逆氣木通通利機竅枯梗通肺氣童便降火久嗽聲啞用之

妊娠瘡黃帝問曰人之重身九月而瘡此爲何病岐伯曰胞之絡脉絕也胞絡者繫于腎少陰之脉貫腎絡舌本故不能言以胞絡之脉養胎弱者不能上榮也治之奈何岐伯曰無治也當

足月復

產後瘡心腎氣虛不能發聲七珍散脾氣鬱結歸脾湯脾虛食少四君子氣血俱虛八珍湯不應獨參湯更不應急加附子補其氣以生血若單用佛手等血藥則誤人矣

喘

有火有痰有陰虛有氣虛有火衰

丹溪曰喘急者氣為人所鬱而作痰在肺胃也
有痰有火有陰虛自小腹下火起而上逆者有
氣虛而致短氣者

哮喘遇寒則發如水鷄聲名哮喘病有積痰在肺
腕也必吐去忌寒涼宜醋加吐藥中仍淡食

年載再灸肺俞膏盲方得除根不爾成終身
痼疾年高氣弱人不可吐不可純用涼藥必

醫法彙三卷喘

三三

兼辛散凡喘未發時以扶正氣為主既發時
以散邪為主

肺實者肺必脹上氣喘逆咽中逆如欲嘔狀自
汗氣口以前陰脉應手或虛大

實喘者氣實脉盛呼吸不利肺竅壅滯寸脉沉

實宜瀉肺

虛喘者腎虛先覺呼吸氣短兩脇脹滿尺大而

虛宜補腎

邪喘者由肺受寒邪于內關竅不通呼吸不利

亦有六脉俱伏者宜發熱

喘則發其法有二一屬中外皆寒參蘇

溫肺湯調中益氣加吳茱萸湯紫金丹遇

厚味即發清金丹主之一屬寒包熱越婢

加半夏湯表散藥預于八九月未寒之時用

大承氣湯下其熱後至冬無熱可包自不發

矣余以為肺中有稠痰者多未必熱也

有因氣而成者着惱便發脉必沉弦此氣滯其

痰也蘇子降氣湯加減

治法彙三卷喘

三三

遇寒即發不能眠脉必浮緊先以湯以表

之口乾煩躁等火證者二陳加瓜蒌實蘇子

枳實枯芩等潤以降之甚者加玄明粉或滾

痰丸初虞世曰火喘用白虎加瓜蒌枳殼

黃芩効

陰虛氣從臍下衝上而尺脉洪盛或數兼見盜

汗潮熱咳嗽挾喘屬陰虛四物加炒黃柏知

母二冬貝母玄參陳皮青黛竹瀝白芍須以

酒浸此症多矣若腎膈欠癸不宜地黃以

二冬、桑皮、貝母、地骨皮、枇杷葉之屬、

中年人病後氣促、痰嗽、腿足冷腫、腰骨大痛、面目浮腫、太陽作痛、悉屬命門火衰、陽虛之候、用八時丸料佳、若作痰治、立危、

戴氏曰、痰者、凡動便有痰聲、火炎者、乍進乍退、得食則減、食已則喘、大槩胃中有實火、膈上有稠痰、得食則墜下其痰、喘則暫止、稍久食已入胃、反助其火、痰再升上、喘反大作、俗不知此、作胃虛治、以燥熱之藥、以火濟火也、苦葉都督病治法彙三卷、喘、

此衆作胃虛治、不減、後以導水丸行五六次而安、氣短喘息者、呼吸急促、而無痰聲、又有胃虛而喘、擡肩拮肚而無寐是也、

病後產後一切瘡疽、癰疽、發喘、悉屬氣虛、不能接續、非喘也、卽是短氣、雖素有痰火、年高病久、正氣耗散、若誤作有餘治、禍不旋踵、須大劑生脈散、爲君、少佐陳皮、二母、扶接元氣爲急、通時極難下手、雖醫者、真知灼見、而遇病家、懷然、惶皇之際、一不詳事者、從傍敗之、反遭謗矣、惟仁

人濟世法救援爲佳、

雙全善治一婦、年五十餘、素有痰火、忽一日大喘、痰出如泉、身汗如油、脈浮而洪、似命絕之狀、速用麥冬二錢、人參三錢、五味子一錢五分、煎服、喘定汗止、三貼痰少、復加瓜蒌仁一錢五分、白朮當歸、芍藥、黃芩、各一錢、服二十餘貼而安、此肺虛喘也、

綱目載一男子、五十餘歲、病傷寒、咳嗽、喉中聲如鉤、與獨參湯一服、而鼾聲除、至二三貼、咳嗽亦漸退、服二、三斤、病始全、不佞亦屢用有驗、但可與知者道爾、今人因右寸脈大、不知分別、有力無力、遽認爲實、枳桔桑杏、芩梔妄投、成亦不悔者、多矣、

本草治虛喘、用人參一味爲末、雞子清投新汲水調下一錢、昔有二人同行、一人含人參、一人不含、俱走三五里、其不含者大喘、含者氣息如故、人參之功如此、

大忌甚者、不可用苦寒藥、火盛故也、宜溫劫之、

用楮目五六錢研爲細末生薑湯調服喘止之後因痰治痰因火治火

七情鬱結上氣喘急宜四磨湯四七湯

痰喘不休不得臥人扶而坐數日千縉湯一服而安一方千縉湯合導痰湯妙氣實人悞服

黃芪過多而喘者三拗湯瀉之

肺虛自汗少氣倦怠而喘生脉散佳

濕痰壅盛胃膈脹悶上氣喘急身體浮腫不得臥脉滑有力者葶藶大棗瀉肺湯瀉之甚者

治法彙纂

卷三

用遇僂丹導水丸俱可虛者忌之

仲景曰支飲不得臥用葶藶大棗瀉肺湯

葶藶子不拘多少炒黃爲末蜜丸彈子大水參

薑大棗十個煎至二盞去棗入葶藶丸再煎至

壹盞溫服之

自汗兼腹痛脉弦滑而實者下之

喘不得臥

脉弦滑有力健人屬痰火常時發屬哮喘久病脉浮按之虛瀉爲陰虛難治宜四物加童便竹瀝

青黛五味麥冬

產後喘喉中氣急喘促者因去血過多榮血暴

竭孤陽絕陰爲難治濃煎獨參湯或佐芎歸

若惡露不快敗血停凝上薰于肺亦令喘急宜

奪命丹血竭散

若風寒外鬱輕于解散旋覆花湯

婁全善治一婦產後洗浴卽喘不得臥已五日

惡風得暖稍寬兩關脉動尺寸俱虛百藥不効

用牡丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑枳朴桑皮紫蘇

治法彙纂

卷三

五味子瓜蒌仁服之卽寬二三服卽臥其痰如

失蓋作汚血感寒也

傷鹽冷飲食而喘者宜見現丸

喘逆上氣脉數有熱不得臥者難治上氣而

浮腫肩息脉浮大者危上氣喘息低昂脉滑

手足溫者生脉澀四肢寒者死右寸沉實而

緊爲肺感邪亦有六部俱伏者宜發散則熱退

而喘定寸口沉實爲肺實兩尺大爲腎虛

短氣

一 文飲脉必弦滑一屬氣虛脉必不足東垣曰胸滿少氣短氣者肺主氣氣不足乃爾氣短小便利者四君子湯去茯苓加黃芪如腹中氣不轉者加甘草肺氣短促或不接續者人參白芍藥用白芍則脾中陽氣升使肝膽之邪不敢犯如衣薄而短氣則添衣于無風處居止用沸湯一碗薰其口鼻即不短也如厚衣暖處宜減衣摩汗孔深堂簾屋為陰寒所遏而短氣者宜湯薰之

治法彙三卷

三

戴復菴云短乏者下氣不接上呼不來語言無力宜補虛四柱飲木香減半加黃芪山藥各一錢若不勝熱藥當易熟附作生附若藥輕病重去木香加炒川椒十五粒不應則用椒附湯若不勝藥宜椒附湯中加人參氣短乏力之人于進藥之外選一盛壯人吸自己之氣噓入病人口中如此數次亦可為藥力一助此法不特治虛尋常氣暴逆致呃者良驗

濟生葶藶散 治過食煎燂酒肉太多致肺壅

喘不得臥及肺壅咽燥不渴濁唾腥臭

成肺痿

甜葶藶 枳梗 瓜蒌子 升麻

薏苡仁 桑白皮 葛根 各八分

甘草 四分

薑五片水二盞煎一盞溫服

人參半夏丸化痰定喘婆全善云予平生用此

方治喘未發時服此丸已發用滾痰丸微下有

効 槐角利膈丸亦効

治法彙三卷

早

婆全善云凡下痰定喘諸方施之形實有痰者

神効若陰虛而脉浮大按之濡者不可下下之

反劇而灰

經驗方 治遠年痰喘

桑木內蠹虫 一升 蘿菔子 半升 杏仁 半升

甘草 二兩

共為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十

丸淡薑湯下

一方治哮喘用葶藶根和砂糖水煮爛時時嚼

喘下永絕病根

又方猶兒頭骨燒灰酒調二三錢一服即止

又方郭公荊刺根煎服即不發

三扣湯 治哮喘遇寒則發或暴感冒咳嗽氣促不得臥

甘草 麻黃 杏仁 各等分

薑煎服取汗為度

哮喘脈實少年二陳加蒼朮黃芩作湯小胃丹

佳

治法彙三卷 喘

喘症已服疎氣化痰諸法不効是腎不收氣也佐以補骨脂或安腎丸妙

安腎丸

破故紙 懷香子 乳香

之

共末蜜丸空心白湯下四十丸或以煎藥吞

丹溪方喘而心痛油炒半夏為末粥丸薑湯下

急十九

參蘇溫肺湯

治暴感寒喘

人參 肉桂 甘草 木香 五味子

陳皮 製半夏 桑皮 白朮

蘇葉 各二錢 白茯苓 一錢

薑煎服冬月加麻黃

人參半夏丸 化痰定喘療一切痰逆嘔吐頭

痛胃膈不利

人參 半夏 白茯苓 南星 薄荷

薑屑 寒水石 白礬 生各一兩 蛤粉 二兩

薑香 二錢 五分

治法彙三卷 喘

四

右末糊丸桐子大每食遠薑湯下三十九治

酒病加黃連黃柏

清金丹 治食積痰壅哮喘咳遇厚味發者

蘿蔔子 淘淨蒸熟曬乾 猪牙皂角 燒存性

右以薑汁浸炊餅丸菜豆大每服五六十丸

紫金丹 治多年肺氣喘急哮喘久不得臥

砒 半錢 淡豆豉 好者二錢用米泔水磨

右用豉膏子和砒同杵極勻如麻子大每服

五丸至拾丸量大小與之並用臘茶清極冷

天下... 以強弱增減

磁如加半夏湯

麻黃一錢 石膏二錢 生薑三片 甘草五分 夏一錢

大棗二個

右六味以水貳碗先煮麻黃去上沫火諸藥

煮取一鍾溫服

千縉湯 治喘急有痰挾外邪者

半夏朱攷 皂角去皮 甘草炙各 生薑如指

右用水一碗煮去半頓服一方不用甘草但

治法彙三卷

喘

用半夏末壹兩皂角半兩生薑柒片同入紗

袋中水叁升煎至壹盞伍分以手揉洗取清

汁分作叁服併服貳服効

槐角利膈丸 治風勝痰實胸滿及喘咳嗽

皂角兩酥炙 半夏 槐角各 牽牛一兩

同為細末薑汁麪糊丸桐子大每服叁拾丸

食後薑湯下

奪命丹 治瘀血... 亦能作喘

急急服此... 衣自下

附子半兩 牡丹皮壹兩 乾漆兩碎之炒

右為細末好醋壹升大黃末壹兩同熬成膏

和藥丸如桐子溫酒下五柒丸

血竭散 治產後敗血衝心胃滿上喘

真血竭如無紫 沒藥等分

右細研頻篩再研取盡為度每服貳錢用童

便合好酒大半盞煎一沸溫服方產下一服

上床良久再服其惡血自循經下行更不衝

上免生百病

治法彙三卷

喘

旋覆花湯 治產後傷風寒咳嗽痰涎壅盛

坐臥不寧

旋覆花 赤芍 荆芥 半夏 麴 麻黃

五味子 茯苓 杏仁 甘草 前胡各

每服肆錢水壹盞薑五片棗壹枚煎柒分食

前溫服

四柱飲 見海門

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短

氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子十粒麥冬十粒當歸各五錢人參各五錢

黃芪錢一生地黃錢五水煎服不拘時

椒附丸 補虛壯氣溫五臟治下經不足內

挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面

色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜

多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺

瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不

進飲食並宜服

附子炮川椒法去子炒出汗檳榔各半兩陳皮白

牽牛微炒五味子石菖蒲乾薑炮各一兩

右以好米醋於磁器內用文武火煮令乾焙

為細末醋煮麪糊丸如桐子大每服叁拾丸

鹽酒或鹽湯空心食前吞下婦人血海冷當

歸酒下泄瀉米湯下冷痢薑湯下赤痢甘草

湯下極暖下元治腎氣虧乏及療腰痛

蘇子降氣湯 痰痰丸

四磨湯 導痰湯

四七湯 俱見氣門 小胃丹 俱見痰門

大承氣湯見內傷門見傷寒門

八寶丸 見現丸見傷食門

四君子湯 導水丸見脾氣門

四物湯 俱見虛損門 生脈散見暑門

遇仙丹 見積聚門 瀉白散見火門

久喘氣弱食少不得臥神授方用連皮胡桃肉

三箇人參二錢煎湯食遠徐服即定屢驗

定喘湯 治有餘痰火遇寒即發哮喘

麻黃 桑皮炙杏仁 蘇子 甘草

治法彙三卷 喘 陳白果二十枚欬冬花 黃芩 熟半夏

括曰諸病原來有藥方惟愁哮喘最難當麻黃

桑杏加蘇子白果冬花効更良甘草黃芩同半

夏水煎熱服不須薑病人得此真僊藥服後方

知定喘湯●華陀云肺氣盛為喘法八書曰氣

有餘則喘氣盛當認作氣衰有餘當認作不足

若肺果有餘則清肅下行豈復為喘良由肺氣

不足不能勝敵火邪火乘虛而炎上作喘焉所

言盛與有餘者非肺氣也肺中之火也此謂高

張三錫曰七情拂鬱結而不暢始因于氣隨痰血食濕熱而變生諸症理氣爲先丹溪先生以香附撫芎爲主治理可見矣

氣鬱崔紫虛曰下手脉沉便知是氣以故鬱脉皆沉而瀆外症胃脘痛脹悶噯氣單氣鬱香附撫芎蒼朮爲主或加紫蘇烏藥青皮枳殼審輕重用

痰鬱脉沉而滑動則喘急或背膊一片冰冷四治法彙三卷

四十七

四十七

肢麻痺喉下噎塞是痰鬱氣滯二陳加南星海石香附口乾有燥症見者加瓜蒌花粉潤以開之肥人濕痰盛加蒼朮川芎燥之

濕鬱脉沉緩周身走痛關節煩疼遇天陰卽發是濕鬱二朮二陳五苓加秦艽妙甚者加羌

防

熱鬱脉沉而數小便赤澀或口乾燥目赤是熱鬱山梔青黛芎附散加薄荷荆防等辛涼散藥

血鬱脉沉瀆或不能食便紅或心下脹滿口血腫氣是血鬱芎附加桃仁紅花青黛牡丹皮鬱金不應加大黃

食鬱脉沉滑右寸口獨盛噯酸腹飽惡心心下脹痛是食鬱二陳越鞠加山查枳實有火加炒梔子或加針砂于越鞠丸服消食積妙越鞠丸總解諸鬱要在加減合宜

蒼朮 香附 撫芎 神麴 梔子 炒各水丸菜豆大每服六七十丸白湯食遠服

治法彙主卷

四十八

蒼朮足陽明胃藥也氣味雄壯辛烈強胃強脾開發水穀氣其功最大香附陰血中快氣藥也下氣最速一升一降以散其鬱撫芎者足厥陰直達三焦俾生發之氣上至頭目下至血海通疎陰陽氣血之使者也然用此不專開中焦而已其胃主行氣于三陽脾主行氣于三陰脾胃既布水穀之氣行縱是三陰三陽各臟腑自受其燥金之鬱者亦必因胃氣可得而通矣天真等氣之不達亦必可得而伸矣况蒼朮尤能徑

人言經脈泄陽明之濕通行收飲者也氣有
便是火因佐梔子鬱久脾傷不能腐熟水穀生
以神變觀此六鬱藥之九例其升降消導殆將
于受病未深者設也若或氣耗血衰津液枯竭
病已入深寧復令人守此必須審胃氣進飲食
或補中益氣或養血歸脾佐以舒鬱可也
交感丹 治一切名病失意抑鬱煩惱七情所
傷不思飲食面黃形羸腎膈痞悶諸症
香附米二斤瓦上炒黃色取淨末一斤
治法彙三卷

鬱

聖九

茯神去皮爲末四兩

右爲末煉蜜丸彈子大空心細嚼白湯下或
用降氣湯下

王節齋曰丹溪先生治病不出乎氣血痰三者
故用藥之要有三氣虛用四君子湯血虛用四
物湯痰用二陳湯又曰久病屬鬱立治鬱之方
乃越鞠丸蓋氣血痰三病多有兼鬱者或鬱久
而生病或病久而生鬱或悞藥雜亂而成鬱故
予用此三方治病時以鬱法參之氣虛兼鬱則

用加開鬱藥痰血病亦然其四法者治病
用藥之大要云

診察多沉伏鬱在上則見于寸鬱在中則見
于關鬱在下則見于尺

鬱或促或結或澀滑伯仁曰氣血食積痰飲
一有留滯于其間脉必因之而止瀉矣但當求
其有神何害之有所謂神者胃氣也

噎塞

東垣曰堵塞咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不
得下降者曰噎初起七情鬱悞氣不得暢而胸

鬱

五十

膈逆悶噎氣若有物塞在胸中卽內經所謂濁
氣在上則生腹脹者是治必舒氣開鬱越鞠七
氣等選用久之中氣爲鬱所損或過服壯劑愈
攻愈甚腎肝之陰不得下降體倦瘦弱心下
氣兼滋血乃是
七氣湯見氣門

氣

多起鬱抑大法宜舒鬱化痰與瘰癧馬刀同
一方用

海藻 一兩 黃連 二兩

右爲末以少許置掌中時時舐之津液嚥下
消三分之二止

海帶丸 治瘰癧氣久不消

海帶 貝母 青皮 陳皮

右各等分爲末煉蜜丸彈子大每一丸食後

治津氣三卷瘰癧氣

主

輪化

丹溪治結瘰在項或脛或臂如腫毒不紅者多
是濕痰流注用

殭蚕 酒大黃 青黛 牛膽

右爲末蜜丸輪化

又方項頭痰核

二陳湯 大黃 連翹 桔梗 柴胡

水煎服

大抵宜消痰舒鬱兼養血切不可妄用針刀或

加蒼木酒本忌用追風藥之戒之

一切結核耳下結久馬刀瘰癧多服益氣養榮
湯佳乃屢驗者

益氣養榮湯

香附 貝母 人參 黃芪 白芍

歸身 陳皮 茯苓 川芎 熟地

白朮 錢二 桔梗 分五 甘草

姜三片煎服發寒熱加柴苓隨症加減

治津氣三卷瘰癧氣

主

嘔吐 嘔吐者 有痰有火 有食積 有痰飲 有氣鬱 有胃虛 有虫積 有痰 有火 有食 有痰 有痰飲 有氣鬱 有胃虛 有虫

寒吐 胃沉緊 四肢逆冷 或兼腹痛而吐者 屬寒

卒然而起 或過食 生令 或悞服寒藥 致宜

溫中理胃 生薑理中湯主之 或以二陳加炮

薑 肉桂 白豆蔻 草果 砂仁

寒吐 喜熱畏冷 四肢淒清 或先覺噤酸 脉弱

小而滑 因胃傷寒 飲食或汗下過多 胃中虛

治法 藥三卷 嘔吐 五言

冷所致 當以剛劑溫之 二陳加丁香十粒 或

理中湯 加枳實 或丁香 吳茱萸湯 不應附子

理中湯 或治中湯 并須冷服 益冷遇冷 則相

入 庶不吐出 曾有寒吐 用四逆理中 附子到

口即吐 後去乾薑 枳實 附加丁木 煎成加沉

香 立止 蓋虛寒痰氣凝結 丁木以沉

木香 則通乾薑 白木 則泥耳

火吐 脉弦數 或洪滑 口乾面赤 喜冷惡熱 煩躁

引飲 而吐者 屬火 宜清 降火 二陳薑汁炒

黃連 竹青 徐徐服 或加枇杷葉 不應入蘆根

汁服

食積 右關脉弦滑而疾 症兼噤酸飽悶而吐者

屬食積 雖吐 猶當以鹽湯探吐之 吐淨後

二陳 倍半夏 加山查 枳朴 生薑 服因氣

滯 加香附 沉香 木香

痰飲 脉滑或沉伏 或弦實 雖吐口不渴 屬痰

宜 導痰湯 加薑汁 竹瀝

氣鬱 婦女多鬱 或食際着惱鬱而不運 濁氣上

治法 藥三卷 嘔吐 五言

攻作嘔 宜舒鬱 二陳加芎枳 香附 脉沉結者

四磨飲妙

胃虛 脉細弱 或虛大倦于言動 日久不食 而吐

者 屬胃虛 宜六君子湯 加薑汁

久病 或服攻伐藥 吐涎不止 脉大無力 屬脾

虛 不能攝涎 而涎泛上 六君子加薑桂 涼服

睡覺即止

蟲積 脉乍大乍小 時常嘔清水 胃口時痛 時止

得食則愈 饑則甚 者 屬蟲積 面上必有白斑

黑口吐虫二陳湯加苦練根史君子煎服

或片黑錫灰檳榔末等分米飲調下

嘔而流涎脉平即非火與痰是虫積也雄雞
爪蒂炒谷五分酒下吐之胃弱不能當二藥
者烏梅丸健

酒毒脉弦細而滑或浮洪而數症見面赤口乾

頭痛惡心懊憹煩躁嘔吐不寧者酒毒也宜

涼以折之宜二陳加薑汁炒黃連梔子蘇葉

葛根煎成熱服殊効或冲和湯半夏茯苓湯

治法彙三卷

嘔吐

五十五

理中湯俱加乾葛七分煎服佳

痰火平常嘔吐胃中有熱膈上有痰者多二陳

加薑製黃連薑炒梔子乃必用之藥挾虛者

加人參白朮久病必是胃虛宜調中氣或少

佐砂仁藿香

肝火脉弦急出寸口嘔吐酸水或綠水屬肝火

逆上抑青丸主之或以二陳湯吳茱萸炒黃

連柴胡妙

吐食而脉弦者由肝勝于脾脾必虛宜治風安

實金花丸青鎮丸主之

惡心吐清水有熱有痰有虛皆用生薑隨症佐
使方書曰半夏橘皮生薑止嘔之聖藥也

乾嘔亦分寒熱金匱方乾嘔噦若手足厥者陳
橘皮湯主之

卒乾嘔不息取蔗汁溫服半升日三或入生薑
汁搗葛根絞汁亦可

痰飲爲患嘔吐眩運上下腰脊與腿遊走牽引
作痛或發寒熱或過用生冷油膩悒鬱所致宜

治法彙三卷

嘔吐

五十六

轉用黎蘆末或鹽湯瓜蒂散吐之須審虛實乃

可以二陳丁香烏梅生薑汁加減

痰熱惡心嘔吐氣盛者導痰湯加宿砂薑汁炒

黃連竹茹

凡嘔吐家切不可下逆之故也仲景曰嘔家雖

有陽明症不可下下之爲逆陽明症者謂痞滿

燥實堅也○嘔家思水當少與之

食積暴起與寒氣相假吐且痛宜化積丸

嘔吐諸藥不効再以鷺羽探之吐出積痰爲愈

久服藥不效日久胃虛不納穀用長流水和
竹龍肝澄清炒陳米煮湯飲一二盃以安胃氣
砂以六君子加薑汁服

食拔肝氣結滯嘔吐酸水不止用大半夏加白
豆蔻煎服良

漏氣身背熱時背牽痛其氣不續膈間厭悶食
入即先吐嘔而後下名曰漏氣此因上焦傷

閉其腠理經氣失道邪氣內着麥冬湯主之
金匱方云嘔家本不渴渴者為欲解所以不渴

治法彙三卷嘔吐

五十七

者心下有支飲也小半夏湯主之用半夏一斤
生薑半斤恐太多只半夏五錢薑半之足矣三
錫曾見吐過傷津液而渴者惟人參湯妙不可
誤以渴為大也服小半夏不愈加橘茯苓

夏湯

大半夏湯 治諸嘔要藥隨病因加減

半夏 陳皮 赤茯苓 各二錢 生薑 一錢 五

水煎服

嘔吐諸藥不效當借鎮墜之藥以墜其逆氣宜

黃連湯下靈砂丹百粒俟藥得止却以養正丹
半碗九導之嘔吐津液既去其口必渴不可因
渴而遽以為熱

若陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地
不通也當用潤劑生地當歸桃仁紅花之類和
血涼血潤燥兼用甘草以補其氣微加大黃芒
硝以通其閉若大便利邪氣去則氣逆嘔噦自
止 胃中虛熱穀氣久虛發而嘔噦但得五穀
之陰以和之則嘔噦自止

治法彙三卷嘔吐

五十八

走嘔下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不
禁名曰走嘔人參湯主之

金匱方云食已即吐大黃甘草湯又治吐水夫
既曰嘔家不可下復用此何也曰欲吐者其症
在上因而越之可也而逆之使下則必抑塞憤
亂而益甚故禁之若既吐矣吐而不已有升無
降則當逆而折之引令下行無速于大黃也故
不禁即避其銳擊其情之義

丹溪曰嘔家忌服瓜瓞杏仁桃仁蘿蔔子山梔

不效

一、治霍亂之藥皆犯胃作吐丸藥中帶香
藥完日嘔家不內藥必有烟在膈間聞藥則
嘔動則藥出于止嘔藥內加川椒十粒即定蓋
蛔見椒頭伏也余常先飲椒湯一二口良

久病胃虛加砂仁炮薑于六君子湯中必永冷
服即內經從治之法若調寒熱之逆則熱藥冷
服下噤之後冷體既消熱性隨發由是病氣隨
愈嘔煩皆除情且不違而致大益

治法彙三卷

嘔吐

五九

宣明方戴人治大小腸結滯不通上作嘔吐不
止用三乙承氣湯徐徐細啜因是處權一法然
所因與所稟不同須斟酌之倘不中病反增其
嘔矣或下部用法導引其燥屎為良

芩連二陳湯 治胃火嘔吐 原方加芩連薑

汁炒各一錢伍分

加味理中湯 治胃虛受寒嘔吐不止

人參 白朮 乾薑 各一錢 甘草 炙五分

丁香 生薑 十片

治法

二陳湯 治停痰氣結而嘔原方加砂仁

丁香生薑亦取其辛能散結也

香安胃湯 治嘔吐不止

丁香 半夏 橘紅 厚朴 蒼朮

薑五片棗一枚煎服

清生竹茹湯 治熱嘔或因飲酒過度而嘔

葛根 半夏 二兩 甘草 炙一兩

每服肆錢水一盞竹茹一塊薑五片煎服

治法彙三卷

嘔吐

李

小柴胡加竹茹 治發熱而嘔原方加橘紅竹

茹薑七片

丁香吳茱萸湯 治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸 草豆蔻 人參 蒼朮

黃芩 各一升 麻七分 當歸 半錢 柴胡

半夏 茯苓 乾薑 丁香

甘草 各五分

右煎服半兩去查食前熱服忌冷物

金化丸 治吐食而脈弦者由肝勝于脾而吐

乃脾胃之虛宜治風安胃

半夏二錢 檳榔二錢 雄黃錢半

右為末薑汁浸蒸餅丸桐子大小兒另化薑湯下從少至多漸次服之以吐止為度

青鎮丸 治嘔吐脉弦頭痛而有汗

柴胡一錢 黃芩半錢 甘草半錢 人參各五錢

半夏三錢 青黛二錢

右細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服伍拾丸

薑湯下即小柴胡湯加青黛

治法彙主卷一 嘔吐 全

扶苓半夏湯

炒麴三錢 大麥蘖半兩 陳皮錢二 天麻各二錢

白朮炒 白茯苓半夏各一兩

每服五錢生薑五片水二盞煎至壹盞熱服

陳皮湯 乾嘔

陳皮四兩 生薑半斤

水柴升煮取叁升溫服壹升下咽即愈

麥門冬湯 治漏氣因上焦傷風開其腠理上

焦之氣慄悍滑疾逆陽即出經氣失道邪

氣內着故有是證

麥門冬去心 生蘆根 竹茹 白朮各五兩

甘草炙 茯苓各二兩 人參 陳皮 姜黃各三兩

每服肆錢水盞半薑五片陳米一撮煎服

人參湯 治走哺蓋下集氣起于胃下口別入

回腸注于膀胱並與胃傳糟粕而下大腸

今大小便不通故知下焦實熱之所為也

人參 黃芩 知母 姜黃 茯苓各三錢

蘆根 竹茹 白朮 梔子 陳皮各半兩

治法彙主卷一 嘔吐 全二

石膏兩一 水煎服肆錢

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升

降陰陽和五臟助元氣

水銀一斤 硫黃四兩

右末新銚內炒成砂子入水大器煨煉為末

糯米糊丸麻子大每服三丸空心棗湯米飲

井花水人參湯任下

半硫丸 治年高冷秘虛秘及痼癖冷氣

半夏湯泡七次 硫黃明淨者研極細用柳木

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪勻入
臼內杵數百下如桐子大每服十五丸至二
十丸無灰酒或薑湯任下婦人醋湯下

大黃甘草湯

大黃

四兩

甘草 一兩

水參升煮取壹升分溫再服

生薑理中湯

即理中加薑

六君子湯 見脾胃

治中湯

見霍亂門

烏梅丸

導痰湯

三乙承氣湯 並見

治法彙考

嘔吐

六十二

化痰丸

並見痰門

理中湯

見霍亂門

白磨飲

瓜蒂散

見彙要

忌心

胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是邪氣羈絆于
脾胃之間當先實其脾氣茯苓半夏湯主之
惡心乾嘔欲吐不吐心下快漾人如畏船宜大
半夏或理中治中

金匱方云病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦
不噦微心中憤憤然無柰者生薑半夏湯主之
舊有風症不敢見風眼澀眼黑胸中有痰惡心
兀兀欲吐但遇風覺皮肉緊手足難舉動重如
死者在內室少出微汗即減古方用柴胡湯余
為氣虛有痰治用六君子加膽星天麻黃芪佳
煎湯俱見嘔吐門

有氣虛有陰火有胃寒有氣鬱有痰

痰火脉洪滑有力症兼口乾惡心屬痰火苓連

二陳湯或加梔子枳殼

胃虛脉虛軟四肢倦怠食少或久病過服尅伐

之藥致咳逆者屬中氣虛六君子加減右寸

脉多虛大若誤認爲有餘立咳

伏陰脉大按之不鼓或沉伏咳逆四肢清冷或

吐瀉後得此或過食生冷及寒涼藥所致羗

活附子散或理中湯加丁香

陰火兩尺洪盛或弦細而數面時赤而咳逆者

屬陰火四物坎離煎服或服大補陰丸

痰血脉滑數至晚甚身夜熱食物則呃湯水則

無乃因飽後用力奔走所致以血入氣分治

之桃仁承氣加紅花韭汁下之

痰滯痰碍氣道而咳逆者必素見痰症用蜜水

探吐痰出爲佳

丹溪治一女大怒後咳逆不止以人參蘆煎湯

吐膠痰而愈必脉實乃可

氣鬱脉沉結胃口氣脹屬氣鬱二陳越鞠枳殼

青皮婦人多此先用辛散稍久佐涼藥

戴氏曰咳逆者因痰熱胃火者極多蓋指平人

而言傷寒咳逆有水寒相搏小腸有燥屎衝肝

膈宜分別而治之口乾舌燥腹中硬痛仍用下

法

寒用丁香柿蒂熱用調胃承氣

治法彙三卷咳逆

戴復菴曰熱呃惟傷寒有之他病暴起多屬寒

半夏生薑湯最妙有服丁香等熱藥不應當順

氣兼涼藥一二味一法湯泡蘇合子研汁調木

香調氣散熱服佳

半夏生薑湯 治水寒氣逆咳逆欲飲

右水二鍾煎八分徐徐服

咳逆自利滑石甘草炒黃精白芍人參白朮陳

皮加竹茹妙

一老人內傷飲食消導未減一人誤與潤腸丸二

服下清水脹痛轉甚一人復投巴豆丸二服致

咳逆不止用大劑六君子湯二貼至五貼全止

補養而愈

產後呃逆此惡症也急灸期門乳頭向下盡處是

穴乳小者以一指為率內有熱者乾柿一箇

煎湯呷之

咳逆灸期門極效男左女右乳下黑盡處一韭

治法彙三卷

葉灸三壯甚者二七壯

一法以紙撚取嚏即止

六君子湯見脾胃門 桃仁承氣湯

理中湯見霍亂門 調胃承氣湯並見傷寒門

越鞠丸見鬱門

羌活附子湯

羌活 附子炮 木香 茴香炒各五錢

乾薑兩一

右為細末每服貳錢水一盞半鹽一撮煎一

十和洋熱服

諸陰丸 降陰火益腎水

黃連鹽酒拌新瓦上 知母酒拌濕炒

熟地肥人沉水者酒 敗龜板酥炙黃各

右為末猪脊髓加煉蜜丸如桐子大每服五

拾丸空心鹽湯下

丁香柿蒂散

丁香 柿蒂 青皮 陳皮各等分

右為麤末每服參錢水一盞半煎柒分溫服

治法彙三卷

水香調氣散 治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不

消心腹刺痛

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二錢

藿香 炙甘草各八錢 縮砂仁四兩

右為細末每服貳錢入鹽少許沸湯不拘時

煎服

霍亂

方以爲內傷外感而成大都因鬱結內傷飲食過度停滯者多一時阻塞氣不升降揮霍

夏月霍亂吐瀉作渴胃苓湯加半夏藿香面赤口乾甚加炒黃連煩渴甚者辰砂六乙散佳

秋冬三時飲食後觸日暴寒成此瘕者藿香正氣散出入五積散一二味

吐瀉脈代乃是順候氣口脈弦滑乃膈間有宿治法彙三卷

食雖吐猶當以鹽湯鷺羽探之吐淨用和中藥凡吐瀉脈見結促代或隱伏或洪大皆不可斷

以爲痰果脈來微細欲絕少氣不語舌捲囊縮者方爲不治

轉筋悉屬風熱傷筋以麥草煎湯盪洗或黑夜舍卒不可得卽以熱湯或鹽湯亦可使腠理開

通邪熱得泄而愈千金方男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩邊伸其所轉之腿

有吐瀉津液大傷不能養筋而筋燥轉者宜

霍亂理中選用

吐瀉已定而筋尚轉用清火涼血藥止吐瀉

大法曰熱多欲飲水五苓散寒多不欲飲水理中湯余以爲猶當審病源觀時令乃可

乾霍亂俗名攪腸沙其狀欲吐不吐欲瀉不瀉擦亂揮霍是也須急以鹽湯鷺羽探吐得吐方

可不吐則卽死法曰既有其入必有其出今有其入而不得其出者否塞也多或得吐後方可

治法彙三卷霍亂用理氣和中消導藥隨證加減二陳平胃山查

神麴亦有宜發散者凡吐瀉霍亂切勿妄與粥食雖米飲下咽立成

謂殺氣反助邪氣也不可不慎有吐傷津液病本屬陰而反發躁作渴者用理

中湯煎成冷服有宜吐者胸口脹惡心脈滑大或伏是也雖吐利猶當以二陳湯或樟木屑煎

湯或鹽湯皆可吐之乾霍亂于委中穴或十指頭出血皆是良法

過食生冷遂成霍亂吐瀉食不消化

不快加青皮陳皮名治中湯加丁香

治中湯重者加附子宜臨病酌量

一法治霍亂欲死神氣已昏但心下有暖氣者

灸之立甦其法以鹽填滿臍孔灸之不計壯數

吐瀉不止灸天樞氣海中脘四穴立愈

天樞二穴在臍心兩傍各開二寸

氣海一穴在臍下寸半

中脘一穴在臍上四寸

治法彙三卷霍亂

七十一

胃苓湯

霍香正氣散 見傷寒門

五苓散

俱瀉門

理中湯

見寒門

五積散

見中寒門

二陳湯

見痰門

三因木瓜湯治遍體筋轉入腹即煩悶欲絕方

用木瓜一兩莫茱萸五錢茴香甘草各一錢薑

三片紫蘇十葉按木瓜屬肝最為要藥而吳茱

萸茴香亦必因于寒者為宜固不可棄用也

妊娠霍亂因內傷飲食外感風寒霍香正氣散

若因食滯平胃散果脾胃氣虛傷陽氣虛寒手足

厥冷瀉用溫補治當詳察使動胎也產後同
法但不可峻劑爾

治法彙三卷霍亂

三十一

有濕有暑有風有痰有氣虛有食積有寒

火脈洪而數腹痛瀉水腸鳴痛壹臍下宜降者

火也宜伐火利水道不連四苓散主之
戴氏曰熱泄黃赤赤黃彈響作疼糞門焦痛泄
出肛門猶如湯熱煩渴小便不利宜五苓散吞
香連丸

瀉傷津液口必渴小便赤澀未可便斷為熱脈
治法彙三卷 瀉

數急的知熱瀉方用冷劑若妄投必致增劇

濕脈濡細瀉水腸鳴腹不痛身重微汗不知穀
味口不渴乃太陰濕土受症久雨泉湧河溢

或運氣濕土太過民病濕泄宜燥濕利小便

胃苓湯主之或白朮湯

暑脈虛細口乾渴煩悶時值夏令屬傷暑宜清

暑分利胃苓湯如黃連香薷玉龍丸治一切

伏暑瀉神效口濕煩滿天水散

夏月的知是暑瀉用暑藥的知冷瀉自合用熱

理中湯加茯苓黃連下泄無度泄後却彈

肛門熱小便赤澀心下煩渴又喜冷此藥為宜

元是暑泄經久下元虛甚日夜頻併暑毒之

已盡而瀉不已復用暑藥則決不能取効便用

薑附輩又似疑似酌宜用此

風脈浮而緩聲重鼻塞涕出為傷風新病先用

參蘇飲不効再與五苓散加蒼朮防風升麻

若春傷于風夏生飧泄完穀不化泄瀉注下

治法彙三卷 瀉

是風邪乘虛入客于腸胃之中古方用胃苓

湯不若五苓散加升麻防風妙久瀉補脾不

應加藁本妙

痰脈弦而滑或瀉或不瀉或多或少或下白物

胃中懊憹不舒者痰也宜化痰平胃二陳加

海石青黛黃芩神麴丸服或用升柴二朮二

陳湯或吐以提之

脾虛脈微弱或細飲食入胃即下注完穀不化

者屬氣虛宜升陽益氣加減參苓白朮散主

之功用補中益氣湯去歸加炒白芍蒼朮一
云瀉水腹不痛四肢倦怠不思飲食俱屬中
氣虛宜四君加黃芪倍白朮升柴防風補以
提之

一法虛瀉用四君子加麴蘖升柴吞二神加
木香丸

傷食瀉因飲食過多脾胃之氣弱運化不及而
瀉其人必噫氣如敗卵臭宜先消導加煖藥如
砂仁豆蔻一二味助脾胃腐熟之或食一物過傷

治法彙三卷

二十五

而瀉後復食之即瀉者以脾為所傷未復而然
宜大健脾胃湯寒者可用仍燒所傷之物存性為
末三五錢重調服不止治中湯加砂仁半錢麴
蘖枳朮丸或七香丸紅丸子雜用如腹痛而瀉
不可遽用治中兜住必用消化

積石關及寸脉滑而弦口燥渴膨脹小便赤澀
大便肛門如沃以湯臭穢異常痛甚則瀉瀉
後痛減者屬食積有熱宜先以木香檳榔丸
或枳實導滯丸以推逐之後以胃苓加神麴

六類以安胃氣丹溪法用神麴大黃作

受病淺者宜神麴之類消導病深
而瀉者必用進退承氣下之方安

氣瀉腸鳴氣走胸膈痞悶腹急而痛瀉則腹下
稍可瀉更又急亦有腹急氣塞而不通者此由
中脘停滯氣不流轉水穀不分所致戴氏用七
香丸入米煎服久而不愈五膈寬中丸吞震靈

治法彙三卷

七十六

丹仍佐以米飲調香附末或調氣散

寒脉沉細或弦遲身冷口不渴小便清白或腹
中疼痛或綿綿作痛而瀉屬寒宜溫中理胃
理中湯對五苓散加炒砂仁

暴瀉如水周身汗出壺身盡痛脉沉而弱氣少
而不能語甚者加吐此名紫病宜漿水散

瀉水多者必用五苓散去桂即不効

薛氏曰泄瀉若脾胃虛寒下陷者用補中益氣
湯加木香肉豆蔻補骨脂若脾氣虛寒不禁者

六君子湯加炮薑肉桂若命門火衰脾土虛寒者八味丸若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯送四神丸若大便滑利小便閉塞或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾腎氣血俱虛十全大補湯送四神丸腎虛脉沉弱或虛大無力按之不鼓大便滑利小便閉澀喘嗽唾痰爲脾腎虧損宜金匱加減腎氣丸

保命集云虛滑不止者多傳變爲利太陰傳少陰是爲鬼邪先以厚朴枳實湯防其傳變按此治法彙三卷

法實者用之虛者不若四神丸實腎之爲愈也收澀之劑固腸丸訶子散皆治熱滑扶脾丸桃花丸訶子丸赤石脂餘糧湯皆治寒滑

瀉泄諸藥不効者宜作九子服

世人治瀉多用澀劑果以病虛者或可若初得而誤用必變他症爲禍不小殊不知瀉多因于濕分利小水爲上策也

如久瀉穀道不合或脫肛乃元氣下陷大腸不行收令而然用土炒白朮白芍神麴陳皮肉豆

蔻仁肉五味子烏梅爲丸以四君子加防風

一法瀉久不止諸藥不應用針砂地龍猪苓參味搗末生葱調汁方寸匕于臍上貼之小便長而瀉止

一婦日久不止右關脉滑而急飲食輒腹痛乃食積也予木香檳榔丸一服下宿物碗許而痛止胃苓湯一服頓愈

老人五更作瀉日久名腎瀉乃右腎名門火衰不能分別水穀而然服二神丹最佳

老人奉養太過飲食傷脾常時瀉泄是脾瀉用炒白朮二兩炒黃芩炒白芍製半夏各五錢山楂炒神麴各兩半共末青荷葉包飯丸桐子大食前白湯下

一人瀉而左脉浮急自汗鼻塞乃傷風作瀉也與五苓散加防風白芷升麻葛根薑蔥煎服

一人過食瓜果時值夏月大瀉不止中脘大痛煩渴引飲自服天水散及香薷飲余脉之右關

寸俱沉伏因作停冷治香砂六君子湯加炮薑厚朴一服痛渴俱止只以胃苓調理而安

一人瀉而口舌乾燥脉洪數與六一散一服知二服已又一人服不應用苓連四苓散効

一老嫗久瀉服補劑不應以參苓白朮散加黃連肉豆蔻少許作丸服未半斤永不發

一稚子久瀉作前丸用燈心湯化下十數丸効若久瀉胃氣下陷分利不應參術芪草茯苓

為君以扶中氣升柴為佐升提清氣再加羌活防風蒼朮白芷等風藥以平之再加炮薑少許以固之

謹按泄瀉之病濕火痰虛暑積風冷八者之殊必以滲濕燥脾為主而隨症加減濕則導之火

則清之寒則溫之虛則補之痰則豁之暑則驅之積則消之風則解之是其大法也雖然八症

既明三虛宜辨三虛者何脾虛肝虛腎虛是也脾虛者飲食所傷也肝虛者忿怒所傷也腎虛者

色慾所傷也飲食傷脾不能運化色慾傷腎不

治法彙三卷 三十九

肝火鬱怒傷肝木邪尅土皆令泄瀉然腎

肝瀉間或有之惟脾恒多耳蓋人終日飲食一或有傷便致泄瀉又常論之泄瀉

源多由暑月傷脾所致飲食纔傷便作泄瀉為輕停滯既久則癰痢為重而癰與痢又有分別

飲食為痰充手胸膈則為癰飲食為積膠平腸胃則為痢古云無痰不成癰無積不成痢良有

以也王節齋曰瀉本屬濕多因飲食不節致傷脾胃而作瀉看時令寒熱新久而治大法滲濕

補脾消導分利為主亦有宜升提下陷之氣者有用風藥以勝其濕五者又有腸胃虛滑不禁

宜收澀者不可不知久瀉不止加破故紙肉豆蔻山藥佳

苓連四苓散 火瀉

條芩 黃連 澤瀉 赤茯苓 蒼朮 陳皮 白朮 腹脹加木通厚朴

燈心參拾根煎捌分空心服 胃苓湯 治四時諸瀉以分利之

陳皮 厚朴 甘草 蒼朮 澤瀉

猪苓 白朮 茯苓 桂少許

渴而脉數小腹不痛悶者去桂

參苓白朮散 見脾胃門

脾瀉丸 治老幼久瀉脾虛不能轉送

人參 白朮 炒 白茯苓 山藥 陳皮 各壹兩

黃連 炒五錢 山楂 五錢 麥芽 一兩 肉豆蔻 錢

澤瀉 壹兩

六乙散 見暑門

治法彙三卷 瀉

香砂六君子湯 治夏月胃虛食冷作吐瀉不止

二陳 人參 藿香 砂仁 炒

薑參片徐徐服如口乾喜冷浸冷服

縱慾傷腎閉藏失職五更洞泄百藥無効五味

子散佳五味壹兩莫菜莫半兩共炒為末極細

陳米湯下貳錢不已二神丹主之

二神丹 治壹切脾腎俱虛侵晨作瀉或飲食

少思或食而不化或嘔或瀉或久瀉不止

乃在門真陽虛不能履熱水穀不化

火也脾虛久濕大便秘不實神効立發先師

治一中年人遍身腫脹諸藥不應進數服

腫勢漸消兼補脾而愈大抵老人脾瀉非

此不除或煎四苓散送下

破故紙 四兩 肉豆蔻 二兩

右為末大紅棗肆拾玖枚生薑肆兩切碎同

棗用水煮熟去薑取棗和九桐子大每服伍

拾丸空心鹽湯下加莫菜莫五味子名四神

治法彙三卷 瀉

丸

腎司閉藏肝司疏泄二經氣虛則門戶不能約

束而瀉泄也參苓白朮散加肉果熟附子為

導以峻補之丹溪法當歸厚朴湯治肝經受寒

面青慘厥而泄者二味加官桂良是散寒補

久瀉不止肉豆蔻一箇剉入乳香少許麩裹

煨熟去麩研末作一服空心陳米飲調下或單

用肉豆蔻煨去油為末和麩糲服亦妙

大抵瀉宜補脾腸滑不禁宜止澁肉豆蔻柯子

烏梅龍骨末赤石脂之類初起必須分利有積腹痛作瀉須行去之

丹溪治氣暴脫而虛頻瀉不知人口眼俱閉呼吸甚微始欲絕者急灸氣海飲人參膏十餘斤而愈

治陰虛而腎不能司禁固之權者峻補其腎

治積痰在肺致其所合大腸之氣不固者湧出

上焦之痰則肺氣下降而大腸自復

治憂思太過脾氣結而不升舉陷入下焦而成

治法彙三卷

全

泄瀉者開其鬱結補其脾胃使穀氣升發瀉自止

脾胃久虛不受飲食者食畢即腸鳴腹急盡下

所食之物方快不食則無事名錄食瀉經年累

月宜快脾丸

因傷于酒每晨起必瀉者宜搜風順氣丸或過

僊丹輕者酒煮黃連或煎解醒湯吞之不已

中湯

因傷麪而瀉者養胃湯加萊菔子炒壹錢

加六分五分瀉甚者去霍香加炮薑如其數快脾丸

生薑

六兩淨洗切片以飛麵

橘皮壹

甘草

四兩和勻就日中曬乾

丁香

各貳兩

縮砂仁叁兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服貳丸食前薑

湯送下

五苓散

見暑門

木香檳榔丸

枳實導滯丸

俱見傷食

七香丸

調氣散

見氣門

五膈寬中丸

見膈噎門

治法彙三卷

瀉

全

過僊丹

見積門

四柱飲

治元臟氣虛真陽耗散腹臍冷痛泄

瀉不止

白茯苓

附子

人參

木香

各一

右咬咀每服三錢水一盞半薑五片鹽少許

煎空心服滑泄不止加豆蔻訶子煎名六柱

散

積滯分多少而治

見于關腹痛後重者積滯多

脈洪而數口乾煩懣者熱多

脈緩而濡不渴身重便溺不利者濕多

寸關滑數有力腹痛後重屬積滯宜木香檳榔

丸下之

脈浮數外症身痛發寒熱挾外感者宜先解散

敗毒散主之○疫痢同法

治法三卷

八十五

初起脈浮數頭身不痛但發熱後重者宜小柴

胡湯去參加香連芍藥檳榔

初起脈弦滑後重者必推蕩芍藥湯主之

下痢腹痛異常脈沉而緊無熱症者宜先以黃

桂之類溫之後理積滯

脈經曰腸澼下膿血脈小留連者生洪大數熱

者死

腸澼筋攣脈小安靜者生浮大而緊者死

脉訣曰下痢微小却為生脉大浮洪無塵且

指久病而言

凡下痢純血或如塵腐色大孔開如竹筒者如

屋漏水者唇如硃紅者俱死如魚腦髓者身熱

脉大者俱凶

久痢積滯已去但腹中隱隱痛不止乃肺金之

氣鬱于大腸也宜升提藥加苦梗開之若脉洪

實有力仍後重屬餘滯不淨香連丸或木香檳

榔丸痢兼小便澀六乙散凉水調一服如神

後重屬氣滯宿物不得下宜和氣消積香連檳

榔等藥或積滯已行後重不減脉無力不食者

屬虛宜升陽益氣

後重有虛有實初起積滯未淨者實也

利之日久及元氣素弱人悉屬虛補中兼升

提

後重本因邪壓大腸墜下故大腸不能升上而

重是以用大黃檳榔葶瀉其所壓之邪此實也

若邪已瀉其重仍在者知大腸虛滑不能自收

而重是以用御米殼等清劑固其滑收其氣用

大腸爲邪墜下之重其重至圍後不
痛大腸虛滑不收之重其重至圍後隨減以此
辨之百不失一亦有積已去又復過食肉麵生
冷而後重者消導爲主

後重服升消藥不愈者用秦艽皂角于煨大黃
當歸桃仁枳殼黃連等劑若大腸風盛可作丸
服其或下墜在血活之後此爲氣滯症前藥
加檳榔一枚後重當和氣積與氣墜下者當
兼升兼消升謂升麻之類消謂木香檳榔之類
治法彙三卷

下痢發熱不止左脉數而無力者屬陰虛宜四
物去地黃加芩朮升柴右脉數而無力者屬氣
虛宜補中益氣湯加香連芍藥倍陳皮

大孔肛門也痛乃熱流于下實者清之香連檳
榔黃芩加炮薑脉滑有力中有熱是也虛者溫
之久病身冷自汗脉微小者是也炮薑歸芍之
類古方真人養臟湯加減

日久大孔痛亦分寒熱熱艾黃蠟訶子燒烟薰
之

腹痛燒鹽熨之炙枳實熨之丹溪用瓦片
敲錢大燒紅淬童便中急取起紙包熨痛處因
時寒恐外寒乘虛而入也人參當歸陳皮作濃
湯飲之食淡味自安

血痢屬暑毒入于血分宜涼血和血不應兼升
舉當歸條芩桃仁之類勢盛者加熟大黃清之
血痢久不愈四物加地榆升柴阿膠

濕熱盛于下焦小便澀少兼之腹痛後重脉洪
大而緩者宜滲濕清熱桂苓甘露飲下保和丸

治法彙三卷

痢

三四十粒

脉緩不數食少腹痛後重夜多利下屬濕與積
宜分滲消導胃苓湯加木香水下保和丸下
如豆汁者亦屬濕

脉弦緊腹脹痛後重食少屬脾胃不和有積宜
平胃散加芍藥肉桂白朮茯苓下保和丸

脉細弱或虛大微汗時出面色痿黃或枯白色
倦怠後重不食兼腹痛者屬氣虛有積宜黃耆
建中湯下保和丸

虛甚者四君子湯下久病年高產後及病後諸
瘡痼疾痢悉屬虛補中益氣加炮薑產後有此
症和實者香連丸虛者同上法○諸涉虛者二
神或四神丹佳

脉弱力倦氣少惡食但後重不痛者屬虛宜歸
芍苓朮主之甚者加人參陳皮虛回而痢自止
脾虛下陷後重日久脉虛大補中益氣倍升柴
痢後調補用四君子加陳皮一錢名異功散或
七珍散惡甜者平胃加人參茯苓各五分

治法彙三卷

十九

勞痢因痢久不愈耗損精血致腸胃空虛變生
他症或五心煩熱如勞之狀宜積連散赤多倍
石蓮肉白多倍山藥二味爲末生薑茶煎湯調
下三錢○下膿血久諸藥不効人參一兩樗皮
炒同爲末空心酒下二錢

久痢脉弦細無力穢積已行糟粕未實宜固脾
氣少加泄藥訶子肉豆蔻之類須佐以陳皮恐
太泄作痛也

一法用炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯

一二三六二三十粒然此丸性燥有去積之功
之忌若滯氣未淨者未可遽用宜酌量之

如氣行血和積去但虛作勞漬此爲無血症四
物用生地倍歸芍加桃仁泥佐之陳皮和胃血
生自安

凡後重逼迫而得大便者爲有物而然今虛坐
而不得大便知其血虛也故用當歸爲主芍藥
佐之

若初起腸中有積後重腹痛又惡心心膈作脹
治法彙三卷

九十

乃新飲食未曾腐熟也不可遽用涼藥先消導
之俟下膈不惡心不脹懣方可攻下如惡心甚
者先以鹽湯吐之

噤口下痢惡心不食俗謂之噤口是也古方悉
云胃虛有熱然亦有宿食痰飲挾熱因下焦不
通泛上而作嘔者不可不辨○食滯胃膈必脹
宜先消導不可遽用涼藥

脉洪而弱屬胃虛有火當用古方薑製黃連人
參煎湯細細呷之如吐少時再強飲但一

又方以白礬搗末，以引下其毒，
熱但當開以降之，人多不知，藥用酒煎，
誤胃寒，以火濟火，以滯益滯也，亦有誤用熱藥，
犯胃而致者，當推明治之，解毒用蜚蛆焙乾，爲
末，清米下一錢七，甚効。

一法田螺一箇，加麝半分，搗付臍引熱下行，又
法用木鱉子仁，加麝如上法，頻以熱手熨之，又
法木鱉子仁搗，以燒餅切兩開，安木鱉合臍中
冷換。

治法彙考卷八 痢

九十一

脾胃不弱，頭痛心煩，手足溫熱，未嘗服涼藥者，
乃毒氣上攻，所以嘔而不食，宜敗毒散四錢，陳
米一百粒，薑棗煎服。

如氣口脈洪數有力者，屬實火，與痰，宜二陳加
薑炒黃連，徐徐服。

又曰：噤口不食，雖曰脾虛，蓋亦熱氣閉塞，心胸
間也，俗用木香，則失之熱，用山藥，則失之閉，惟
真料參苓白朮散，加石菖蒲末，以陳米飲調下，或人
參茯苓石連子肉，入些少菖蒲末，與之，則火一

開，自然思食矣。

諸病壞症，久下膿血，或如灰猪肝色，或五色雜
下，頻出無禁，有類下痢，俗云刮腸，乃臟腑俱虛，
脾氣欲絕，故腸胃下脫，若投痢藥，則悞矣，六柱
飲去附子，加益智仁、白芍，或可救其萬一。
時疫作痢，長幼相傳染是也，宜審寒暄分表裏
而治。

噤口痢諸藥不應，用石連肉晒乾爲末，每服二
錢，陳米湯調下，便覺思食，仍以東壁土炒真橘
治法彙考卷八 痢

九十二

皮薑棗煎湯佐之。
一方用黃連半斤，生薑四兩，切作片，與連同炒，
何薑焦黃爲度，只取黃連爲末，同陳米飯搗爛，
爲丸，桐子大，每服七八十丸，赤者陳米飲下，白
者陳皮湯下，赤白相兼，二湯相合下。

痢後脚漸細，不治成鶴膝風，用蒼朮二兩，白芍
龜板各二兩半，黃柏五兩，粥糊丸，以四物加陳
皮甘草煎湯送下，氣虛加參朮，甚者大防風湯，
或多以骨碎補三分之一，同研取汁酒調服外。

白芷、南星、草薢煎湯薰洗。

通曰：瘰癧後痛風，係惡血入臟腑，下未淨復發，經絡不得行故也。松明節一兩以乳香二錢炒焦，二錢以二兩紫葳兩半、甘草五錢、桃仁去皮不去尖一兩俱末，每服三錢，生薑同捍細水盪起，二三沸服。

丹溪治一人痢後痛風，號叫極隣里，乃惡血入經絡，血受濕熱，久為凝濁，所下未盡，留滯隧道，所以作痛。經久不治，恐成枯細，以四物湯加桃仁、紅花、牛膝、黃芩、陳皮、甘草、煎生薑汁研潛行散入少酒飲之，數十貼，又與刺，委中出黑血，近三合而愈。

小兒痢疾，屬暑毒與食積者多，治同大人，但丸劑差小耳。

大抵痢疾初起，有表症者，用敗毒散，表症既除，當審積滯微甚而下之，日久不愈，當理血氣，胃氣為急，不可驟用止瀉藥，若誤用之，使毒氣不得出，必上攻胃而成噤口矣。如果積滯已淨，六

便未固者，于養胃藥內，或少加肉豆蔻、訶子，亦澁可去脫之意，第不可孟浪耳。

一方加粟殼醋炒、烏梅二味于四君湯中，屢効。久瀉痢殊驗。有下症者，木香、檳榔丸最穩，勢甚者，芍藥湯倍大黃，斷不可用。巴豆、牽牛、慄悍毒藥攻之，以傷脾胃，清和之氣，戕人天年，乃古今至論。後學幸毋忽畧。

下痢發熱不食，脈弦滑者，敗毒散加陳倉米、薑棗煎服，良名倉廩湯。

治法彙纂卷三 痢

九十四

下墜異常，積中有紫黑血塊者，屬瘀血，宜插桃仁泥、滑石行之。治痢不止，鹽水梅除核一枚，合臘茶加醋湯沃服，一啜而瘥。又方三物散、胡黃連、烏梅肉、竈心土等分為末，茶調下，食前服。下痢必須斷飲食，一切油膩肉麪痛絕之，服藥乃驗。若宿滯未淨，又增新者，腸胃何由以清，漸漸壅塞，直至惡心不食，成噤口矣。諺云：撐不灰痢疾，謂痢疾不宜噤口，非強食之謂也。今人不知，往往強與肉食，以滯益滯，誤人多矣。明哲幸

察之

濕熱傷氣成白痢者宜調氣滲濕爲主兼清熱
濕熱傷血爲赤痢者宜涼血清熱爲主兼養血
氣血俱傷宜兼治

一老人深秋患痢發呃逆嘔吐黃藥炒燥研末
陳米飯爲丸小茺荳大每服三十丸人參白朮
茯苓三味濃煎湯下連服三劑卽愈切不可下
丁香等熱藥

一人病痢發寒熱頭痛左脉浮緊而右脉滑大
給法彙三卷 痢 九十五

乃內傷挾外感也先用敗毒散加薑葱一服表
症悉退但中脘作脹悶後重不已以平胃散加
枳殼木香檳榔山楂又二服脹悶移于小腹投
木香檳榔丸三錢下粘硬物而愈

一婦病痢自投承氣湯二服不應余診之左脉
浮而帶弦右三部俱沉關脉畧滑必鬱悶中食
物所致病家云素惱怒遂以厚朴蒼朮香附撫
芎舒鬱山楂檳榔木香理氣芍藥調中三服愈
一人痢初愈遂飲燒酒雜進肉麪胸口脹悶發

寒熱右脉弦滑倍常知飲食酒毒爲患也予謂
病後中氣未復火邪尚存多食自難傳化燒酒
復助其毒勢在不救今食填胸中得吐乃有生
意卽內經云在上者因而越之之意彼不信自
服巴豆丸藥下咽去血升許而殂

一人夏月遠行飲酒致下痢皆純血日夜無度
心下脹不食三部俱弦滑而數先與山楂枳實
檳榔橘紅香連以和其中次與木香檳榔丸以
導其滯脹悶已除下血愈急遂以四物用生地
給法彙三卷 痢 九十六

條芩萊連牡丹皮二劑血止一半再加地榆三
服已

一人痢脹痛自服大黃丸一時痛轉甚手足俱
冷脉沉伏知寒涼用早也投炮薑理中湯加厚
朴蒼朮山查一服外用炒鹽熨之下膈過時卽
定後用香連芍藥厚朴枳殼等調理

一人病痢二月不愈穢汚在床六脉弦而弱投
補中益氣加酒炒白芍藥八貼始止二十貼全
一人病痢日久不止四肢俱腫而脉細小尚可

一法久痢食時身熱左脉浮數右脉滑數詢

其飲食雖病未減至劇始不能食與余用湯先

去其熱後以枳木人參陳皮查麴又二服腹中

漸寬後重不止乃以調中益氣湯下水香檳榔

丸二服下穢物碗許愈

李時珍曰血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱

藥中加川芎氣行血調其病立止乃醫學妙旨

圓機之士始可語之

治法彙三卷

九

一法治痢止痛如神方用揀淨川連片一兩枳

殼一兩槐花二三兩用水浸片時漉淨同川連

先炒老黃色次入枳殼再炒待燥揀出槐花不

用止將黃連五錢枳殼五錢作一服水煎七分

去渣調乳香沒藥淨末各七分五釐服之次照

前方再服一劑腹痛即止痢即稀神効此方有

服之如醉者乃藥力行也不妨

一法久痢穢積已去糟粕未實晝夜五六次脫

肛不安諸藥不効用蠟一個如法修事加薑作

羹入砂糖一塊不用鹽醬煮熟吃湯及薄肉少

許二三日而安蓋久病脾土受虛不能生金肺

與大腸無所稟受以故不行收令乃母令能子

虛也驚乃个虫屬金而有土性溫能補脾肺又

况肺惡寒先得芩連寒涼之味已多今用生薑

之辛以補肺砂糖之甘以補脾肺氣既實大腸

亦隨而實故得以行收令也學者若不深諸物

性何能擴克得此妙境哉

一法久痢不止虛滑甚者用椿根白皮東南行

治法彙三卷

九

者長流水內漂三日去黃皮切片每一兩配人

參一兩入煨木香二錢粳米一撮煎湯服

後重有積下墜者香連丸利之○大腸氣滯墜

下四君子送香連丸○大腸氣虛下陷宜四君

子加升柴送香連丸○若大腸血虛後重四物

加參朮送香連丸○丹溪曰裏急者腹中不寬

快也亦有虛坐而大便不行者皆血虛也血虛

多裏急後重

醫案少宗伯顧東江停食患痢腹痛下重或用

疏導之劑。兩足腫脹。食少倦怠。煩熱作渴。尿洪。數按之微細。以六君子加薑桂各二錢。吳茱萸五味子各一錢。煎熟。冷飲。即睡覺。而諸症頓減。此假熱而治以假寒也。

太常邊華泉。嘔吐不食。腹痛後重。自己用大黃攻藥一劑。腹痛益甚。自汗發熱。昏瞶。脉大。用參朮各一兩。炙甘草炮薑各三錢。升麻一錢。一劑而甦。再以補中益氣加炮薑二服全愈。

又一八十婦。患痢。渴飲水。腹喜手按。脉大有力。治法藥三卷。九十九。

乃與氣虛而邪氣盛也。用人參五錢。白朮茯苓各三錢。陳皮升麻附子炙甘草各一錢。服之。腫覺即索食而愈。

芍藥湯 行血則便膿自愈。和氣則後重自除。用白芍藥二錢。黃芩黃連各一錢。檳榔五分。大黃一錢。肉桂三分。木香五分。當歸五分。甘草五分。

燈心剪空心服。初病窘迫甚者。倍大黃便硬者。加芒硝一錢。治臟毒下血。加黃柏一錢。

木香檳榔丸

保和丸 見傷食門

加味香連丸

黃連十兩。莫菜莖半斤。湯浸二次。同黃連拌一宿。同炒。去菜。木香二兩。檳榔三兩。大黃四兩。

共為末。水丸。菜豆大。每服任輕重用。

固腸丸

樗白皮 不拘多少

右為末。米糊丸。桐子大。每服三五十丸。或用

治法藥三卷。九十九。

陳米湯下。或以炒白芍炒白朮炙甘草陳皮湯下。

倉廩湯。敗毒散。加陳倉米。

局方香連丸。輕者調之。

黃連 二十 莫菜 十兩 二味各以酒拌

木香 石兩八錢

右為細末。醋調。麝糊丸。桐子大。每服三五十丸。清米飲下。加石蓮肉半斤。治噤口痢。石蓮

明巴雙鹿者非

治血痢神效又治濕熱泄瀉不止

紅末湯

六乙散 一料加紅麴五錢

紅末湯浸蒸餅丸服

瀝六丸 治食積瀉或兼嘔吐及痢皆效

六乙散加乾薑或生薑汁加蒸餅丸服

純陽真人養臟湯 治大人小兒冷熱不調下痢

赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹

疝痛及脫墜下酒毒濕毒便血並宜服之

治法彙三卷

人參 白朮 當歸各六錢 白芍藥

木香 各一兩 甘草 肉桂各八錢

肉豆蔻 各一兩 御米殼 各六錢

訶子肉 各二錢

每服肆錢水煎服

小柴胡湯 見傷寒門 敗毒散 見瘟疫門

補中益氣湯 見內傷門 桂苓甘露飲 見暑門

七珍散 見虛損門 胃苓湯 見瀉門

六狂飲 見瀉門 平胃散 見瀉門

天防風湯 見肺氣門

黃芩建中湯 見虛損門

潛行散 見痛風門

二神丹 見瀉門

四神丹 見瀉門

治法彙三卷

百一

瘧

一日一發者受病淺，二日一發受病深，三日又深，連發二日，住一日者，氣血俱病。

瘧疾多主乎內傷鬱結，或寒或熱，或熱後大渴，或出汗，皆宿食與痰之所為耳。須消導化痰，寬中理氣，大隨症治。數發之後，人壯氣實者，可用截藥。虛者，祇宜補中益氣，兼化痰消導，慎勿妄施猛劑，損人天年。雖有風暑化壯之分，未必不由內傷而生寒熱。柴平湯加檳榔、草果，即小柴治法。彙三卷瘧一百三

胡藹平胃散也。

瘧疾初起，先寒後熱，胸膈飽悶，或戰後大渴，消中驅痰飲主之，即清脾飲加減。

四五大脉弦實而氣壯者，須推蕩之，宿滯已下而不止，脉有力者，六丁散主之。

痰滯胸膈，大便燥實不通者，滾痰丸利之。

已服消導化痰，尅伐不止，脉弱體倦，或脉來虛大者，調中益氣湯佳。

夏月熱多寒少，大渴脉虛細，宜人參白虎湯煩

瘧疾連發二三日後熱多，寒後渴躁，凉水調之，丁劑妙甚。兼飲食作飽，宜先消導，不能食者，必于飲食上得當從食治。

暑月汗多作渴，宜解暑固元氣。

虛者，必用參朮一二貼，托住其氣，不致下陷，後隨症治。

若無汗，要有汗散，邪為主，帶補。蒼朮、川芎、升麻、葛根、柴胡、白朮之類。若有汗，要無汗扶正氣為

主，帶發散。參朮、黃芪、白芍之類。

治法彙三卷瘧一百三

四五發之後，便宜截而除之，遷延日久，中氣大

傷，病邪轉深，卒難取効。

宿滯與痰膠于膈中，痞悶多熱，口乾燥實，大柴

胡瀉利之愈，或用枳實導滯丸。

久瘧不得汗，以二陳、二朮，加檳榔、倍蒼朮。

老瘧係風暑入于陰分，宜用血藥引出陽分，而

散。青歸、紅花、二朮、黃柏、甘草、升柴、露一宿，服胃

不和，膈有痰，須用軟堅化痰，健脾藥。小兒瘧疾

治同大人，日久不愈，成瘧塊者，古方用生地芍

藥各一錢半、陳皮、川芎、沙黃、芩、半夏各一錢、甘
草二分、生薑煎成、調醋、煮蟹甲末、

癰疾初起、頭痛身拘急、有表症者、先以太羌活
湯汗之、須詳時令、

日久腹中有塊、作寒熱者、名癰母、用丸藥消化
之、醋炙蟹甲為君、三稜、蓬朮、香附、海石、青皮、桃
仁、紅花、神麴、麥芽、隨症加減、為丸、醋湯下、久病
脾虛、補養為主、蟹甲等為佐可也、

癰瘡老癰也、二日一發、陰經受病也、夫癰得于
治法彙三卷 癰 百五

暑、當以汗解、或取風涼、令汗不得泄、鬱而成痰、
又復嗜慾、縱飲、及輕試截藥、胃氣大傷、其病難
愈、必須用參、朮、歸、芍、陳皮等補劑、佐以本經藥、
引用之、若得汗而體虛、又須重補、俟汗通身、過
委中、方是佳兆、仍節飲食、避風寒、遠房勞、無不
愈者、此古法也、至妙至妙、今見醫家、惟縱口
腹、不守禁忌、病後傷脾、有此者、十居八九、貧寒
衣食不克、勞役復損脾氣、又不可不審、大抵補
中益氣、消導化痰、斷不可少、苟醫者不加調、

治法彙三卷 癰 百六

此經有六經之癰、學者自宜搜究、丹溪先生悉
以二陳為主、各加引經藥、可見無痰不成癰也、
凡癰方發時、不可服藥、如服須在未發之先、
否則藥病交爭、轉為不安、戒之、或躁熱將止時、
服亦妙、所謂避其銳氣、擊其墮歸是矣、

大抵癰初起、宜散邪、消導、日久養正、調中、所謂
氣虛則惡寒、血虛則發熱、二者不可不知、日數
雖多、飲食未節者、未可便斷為虛、須禁食消導、

治法彙三卷 癰 百六

憑脉下手可也、

體厚之人、多濕痰、發則多畏寒、日久不已、脉軟
而沉帶滑、用補中益氣、加熟附二三分佳、

癰後不喜食、四肢倦怠、面色痿黃、六君子、加山
查、麥芽、黃連、枳實、良、或參苓白朮散、

久癰不止、元氣虛甚者、用人參、常山各五錢、剉
碎、微火同炒、去常山、只以人參煎湯、未發前服、
屢驗、○一法人參、生薑各一兩、煎湯于發前三
時服、或發日五更連進二服、無不愈者、

瘧疾每發嘔吐不止以鹽湯探之吐出積痰爲佳嘔定投清中導滯藥

清中驅瘧飲

半夏 橘紅 柴胡 黃芩 檳榔

草果 山查 青皮 厚朴 蒼朮

薑棗煎口乾熱多加花粉黃連湯加五苓

六丁散 量輕重虛實增減

丁香 檳榔 草果 知母 貝母

常山

治法彙三卷

一百七

水酒各一碗煎一硃露一宿五更溫服

調中益氣湯

人參 白朮 白茯苓 陳皮 檳榔

山查 青皮 柴胡 蒼朮 黃芩

升麻 熟半

久瘧在陰分者加芍歸

虛瘧服補劑十數服不止六和湯最捷

人參 知母 草果 貝母 烏梅

白芷 檳榔 常山 柴胡

白朮煎空心服

五疰氣虛七情過度結聚痰飲日久不止四默

飲妙妙在煎法即六君子湯加草果烏梅薑棗

以鹽添食項厚紙包水潤濕灰火中炮令香焙

乾煎服取鹹軟堅之意

砒石切痰最妙須要消導已淨方可一方砒二

錢雄黃黃菜豆各五錢研細麵糊丸筋頭大硃砂

爲衣每服一丸用桃柳條各七寸煎湯露一宿

臨發空心涼服

治法彙三卷

一百八

一方用真萊豆粉一兩砒一錢雄黃五錢井水

河水各半和丸萊豆大每服三丸

又法蒼朮爲末一兩豉一兩蒸爛研均加砒三

錢丸桐子大每服一丸冷水下俱妙須忌熱湯

水一日不爾即吐

阿魏善化肉積加硃砂等分糊丸桐子大氣服

二十九空心白湯下妙久病氣虛人參湯下

尅効餅子 宿滯已去而瘧不止用此截之

龍腦 麝香 定粉 荷葉 萊豆

甘草

各五兩

硃砂

一兩二錢

信

兩半

金箔

二十五張

各五兩

共末煉蜜和勻每一兩作二十餅每服一餅新汲水磨化服之

夫人以脾胃為主未有脾胃實而患瘧痢者若專主發散攻裏消導不理脾胃治標不治本則輕者變重重者變危矣醫家載一人停食傷寒患瘧用清脾截瘧反變浮腫等症其心下脹痛脾虛不能消化也小腹重墜脾虛不能升舉也腿足浮腫脾虛不能運行也吐食不消脾虛寒治法彙三卷

瘧

百九

無火也治以補中益氣湯加莫茱萸炮薑木香肉桂一劑諸症頓退數劑而愈大凡停食必因于脾弱宜六君加枳朴山查神麴食已消而不愈六君子湯○內傷外感用香正氣散○若內傷多而外感少人參養胃湯若勞傷元氣補中益氣加川芎○若勞傷兼停滯補中益氣加神麴甚者加山查○若氣惱兼食用六君加香附山梔○若口酸嘔噯多是飲食滯節之

天熱大渴大躁以薑湯兼熱飲之此去瘧根良法今人取一時之快恣與冷水脾胃轉傷食愈結聚而轉劇矣

大抵內傷飲食者必思食審的勞傷元氣雖有百病皆以補中益氣為主其病自愈兼外感者至以補養佐以解散其邪自退邪既退即當用補中益氣以實其表若邪去而不實其表或過服發表虧損脾胃腠理虛豁邪乘虛而易入矣百病皆然凡瘧日久不問陰陽日夜皆以補中治法彙三卷

瘧

百十

益氣多服自驗乃不截之截也久瘧及涉虛體微弱者立齋法用參朮各一兩生薑四兩煨熟煎服即止或以大劑補中益氣湯加煨薑尤妙生薑一味亦效○大劑參朮芪歸各三錢甘草減半炮薑二錢

楊仁齋法

風瘧自感風而得惡風自汗煩躁頭疼轉而為瘧風陽氣也故先熱後寒可與解散風邪川芎白芷青皮紫蘇之類或佐細辛檳榔○溫瘧亦

先熱後寒，乃傷寒壞症。熱多寒少，小柴胡湯加減。○寒瘧自感寒而得，無汗惡寒，五積散加桂。寒月附子理中湯。○暑瘧一名瘧，但熱不寒，小柴胡對香薷飲。熱多躁甚者，少與竹葉湯。常山、柴胡乃對症藥。○濕瘧者，胃漿雨濕，汗出溼浴，得之身體痛重，肢節煩痛，或嘔逆脹滿，五苓散。○陰濕湯。○二陳、平胃、加藿香、白朮，寒多加附。○牝癰者，久受陰濕，陰盛陽虛，陽不能制陰，所以寒多不熱，氣虛而泄，悽慘振振。柴胡、薑、減半黃芩。治法彙纂卷一瘧
一百一
芩加半夏。○食瘧一名胃瘧，飲食無節，饑飽有傷，致然也。凡食啖生冷，鹹藏魚鹽肥膩中脘，生痰皆為食瘧。其狀苦饑而不能食，食則中滿嘔逆，腹痛。青陳皮、半夏、草果、縮砂、白豆蔻煎服，或四獸飲下紅圓子。○瘧瘧感嵐瘴，溪源蒸毒之氣所成，自巖以南，地毒苦熱，燥濕不常，人多瘧。其症血乘上焦，不能言，皆敗血蓄于心，毒涎聚于脾，治須涼膈解毒，疎通大腸。小柴胡加大黃、治瘧木香丸、觀音丸皆為要藥。

黃德菴曰：不問寒熱多少，且用瀉脾飲、草果、二陳湯加草果、柴平湯加草果、前胡、初發有表症者，必兼發散，得汗為佳。○飲水多而渴甚者，乃痰挾水，停蓄膈間，致津液不得上行，須五苓散利之，或吐去積水為妙。
準繩載一八十孺人夏患瘧，用柴胡、升麻、葛根、羌活、防風之甘辛氣清，以升陽氣，使離于陰，而寒自己。以知母、石膏、黃芩之苦甘寒，引陰氣下降，使離于陽而熱自己。以猪苓之淡滲，分利陰陽，使不得交併。以穿山甲引之以甘草和之，一劑而止。趙以德曰：嘗究本草，知母、草果、常山、甘草、烏梅、檳榔、穿山甲皆言治瘧，集以成方，為知母性寒，入足陽明藥，治陽明獨盛之火熱。草果性溫燥，治足太陰獨盛之寒。二經和合，則無陰陽交錯之變，是為君藥也。常山吐胸中痰結，是為臣藥也。甘草和諸藥，烏梅去痰，檳榔除痰癖，破滯氣，是佐藥也。穿山甲者，以其穴山而居，遇水而入，則是出陽入陰，穿其經絡，于榮分以破

暑結之邪在之使也然此方乃脾胃有鬱痰伏
涎者用之收功若無痰止是暑結榮分太陰受
病而熱者當發唇瘡而愈于此方則無功矣
東南濱海風無常所食魚鹽多停飲故多風癰
食癰烏頭草果陳皮半夏施得其宜西北高曠
隆冬則水冰地裂盛夏則灼石流金人多中寒
伏暑故多寒癰暑癰柴胡常山故應合用東南
西北往來其間病在未分之際可與藿香正氣
散草果飲是猶養胃湯也

治法彙三卷

百五

治北方癰以馬鞭草莖葉煎一盞露一宿早服
寒多加薑汁

白豆蔻能消胎癰流行三焦佐二陳治癰嘔大
驗

癰家多畜黃水常山爲能吐之利之是固然矣
其或純熱發癰或蘊熱內實之症投以常山大
便點滴而下似瀉不瀉須用北大黃爲佐大泄
數下然後獲愈又云凡癰皆因腹中停蓄黃水
惟水不行所以寒熱不歇此癰家受病處也

治法暑癰以香薷飲加青皮大黃二箇烏梅同
煎浸晨溫服寒癰多寒以二陳加青皮良薑多
用薑同煎侵晨吞神保丸五丸並欲取下毒水
去其病根寒熱自解又曰癰有水有血水卽水
飲也血卽瘀血也惟水飲所以作寒熱惟瘀血
所以增寒熱常山逐水飲固也苟無行血藥品
佐助其間何以收十全之効耶今癰家或衄血
或大便血絲或鼻衄適來適去皆是血症當于
癰藥中加五靈脂桃仁爲佐入生薑蜜爲煎以

治法彙三卷

百五

治之又曰癰之經久而不歇其故何耶有根在
也根者何曰飲曰食曰敗血是耳惟癖爲癰之
母惟敗血爲暑熱之毒惟飲與水皆生寒熱故
暑之脉虛水飲之脉沉澀之脉結挾水飲者爲
之逐水消飲結癖者脇必痛爲之攻癖仁齋
之論固是矣其于治末也大黃止能去有形之
積不能去水其取瘀血亦必醋製及以桃仁之
屬引之而後行不然不行也常山治癰是其本
性雖善吐人亦有蒸製得法而不吐者癰更易

愈其功不在吐瀉也亦非吐水之劑但能敗胃一人用常山或黃連亦不止轉重則補愈後年餘復發又用此藥也藥詎可輕試哉

外有傷寒之來寒熱如瘧勞瘵寒熱如瘧傷食勞瘵脾氣志氣腫毒初起俱作寒熱似瘧非真瘧也各照本病治凡寒熱有期者瘧也無期者非也

紅圓子

治法彙三卷

重五

蓬朮 三稜 橘皮 青皮 胡椒

乾薑 阿魏 煨紅

右每服六十九薑湯下

人參養胃湯 加桂治感寒發瘧

草果 茯苓 人參 甘草 各半 錢七

橘紅 七錢五 厚朴 薑 蒼朮 炒湯

半夏 各一 藿香 五錢

右每服肆錢水一盞半薑朮片烏梅一枚煎

至柒分去渣熱服

草果飲 治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草果仁 紫蘇 良薑 炒 川芎 青皮 去

白芷 甘草 炒各

右改咀每服肆錢水一鍾薑三片煎熱服

神保丸 治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大

便不通氣噎宿食不消

木香 胡椒 各二 巴豆 拾粒 去皮 乾蝎 七

右四味爲末湯浸蒸餅爲丸麻子大硃砂爲

衣每服五丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿

治法彙三卷

重五

帶煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下

痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢

下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下

治瘴水香丸

牽牛 一斤 淘去浮者焙 雞心檳榔

陳橘紅 各二 青木香 人參 熟附子

厚朴 製 官桂 京三稜 羌活 獨活

乾薑 炮 甘草 炙 川芎 大黃 白芍藥

各半 肉豆蔻 六個

爲末磁器蜜收臨用秤牽牛末一兩諸藥六

共一兩研和煉蜜丸桐子大每服二十九橘

皮煎湯下以通利爲度

觀音丸 取下暑瘴毒

半夏生 烏梅肉 母丁香 川巴豆不去

此每作各十枚

爲末薑麴糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼有

油又再易紙每服五丸臨臥冷水下此方舟

人于海角遇一白衣授之

治法彙三卷 瘧疾

人參白虎湯 大柴胡湯

小柴胡湯 大羌活湯俱見傷寒

參苓白朮散見脾胃 枳實導滯丸見傷食

六乙散 六和湯

香薷飲俱見暑明 藿香正氣散見濕痰

五積散見中寒 五苓散見泄瀉

何首烏本草不言治瘧而世爲捷應殊効

之于積滯已去之後每每奏功其法用白者一

兩青陳皮各三錢甘草一錢水二鍾煎一鍾露

一宿空心服虛人老人減半

一法減青皮用厚朴參歸各一錢水酒煎亦妙

治法彙

三卷

類中風

大率因氣虛血虛有痰或挾火與濕

張三錫曰病人昏憤四肢不遂舉世皆以中風名之殊不知類中者十居八九今蒐集諸名家古今切用要法為診蹄焉

痰涎壅盛喉中作聲卒然暈倒脉微而數或左關弦急右寸關洪滑而急不寒不熱面赤直視類中風也悉屬痰火○有暴怒氣實人忽然如此屬氣厥當從氣治肥人卒中屬氣虛有痰參

治法彙編

卷六

類中風

一

芪對生散瘦人屬陰虛火盛六味地黃湯口禁不能進藥以生半夏為末吹鼻中或以通關散吹喉及鼻取嚏有嚏可治無則不可治更須急插人中稍甦隨証處治○脉沉滑因于氣者烏藥順氣加減○脉弱氣虛八味順氣俱加竹瀝薑汁○按竹瀝乃陰虛有大熱者僊品中年痰火捨此必不成功特為拈出能食而氣稍實者荆瀝炒○脉洪大或數面赤目赤口乾燥屬火多導痰湯加岑連翹栝薄荷花粉竹瀝薑汁須

治痰理氣為先補養次之○實者導痰湯加荆瀝○痰涎壅盛口眼喎斜不能言語皆用吐法輕而省者用瓜蒂散或稀涎散重而口噤用藜蘆少許加麝灌鼻中吐之惟實者宜虛人年高忌之用蝦汁吐邪出亦妙卒然昏憤口眼喎斜痰涎上湧咽喉有聲六脉沉伏或虛大乃真氣虛而風乘之三生飲加人參一兩煎服炒○按三生飲乃行經治寒痰之藥有所關奪門之功必加人參兩許以駕馭之扶正驅邪否則不能成功○牙緊不能進藥霜梅擦牙自開○脉弱或虛大無力元氣素弱卒然暈倒濃煎人參湯加竹瀝薑汁○有元氣素弱過于勞役或傷于嗜慾而卒然厥仆類中風者手必撒口必開非大劑參芪用至斤許安能回元氣于無何有之鄉哉若不仕但舌強語澀口眼喎斜肢體不遂者作中風治必殆以六君子加諸汁治之○肥人多濕痰少加製附子行經

潔古云手足不遂中腑也初起脉浮數作寒熱

或有汗或無汗是爲表証有痰鬱火于四肢不能運行而然者雖非外邪亦當汗解二陳羌獨蒼朮防風在上加薄荷威靈僊下加防已牛膝或佐以芎歸一二服審氣血治此與痛風門并同○濕痰腫痛黑虎丹最妙○又曰耳聾目瞶唇緩失音中藏也必兼舌乾便秘卽是裏証脉實滑而實者方可用三化湯牛黃通膈湯以疎之

東垣曰半身不遂大率多痰在左屬痰血與血

治法要四卷類中風

三

少四物從紅花紅花右屬氣虛與痰宜四君子俱加二陳竹瀝薑汁○李時珍曰氣虛則痰入于右而爲右癱○血虛則痰入于左而爲左癱乃至精至當之論三錫曰半身不遂古稱偏枯猶老樹之津脉不能遍達而枯廢其半也人之腎主五液所以榮養百骸中年腎水虛乏榮衛失常痰涎阻滯經絡火邪燔灼骨筋故手足不遂或偏于左或偏于右而不爲我用也以左右分氣血固不可易猶當觀人肥瘦參以脉虛庶

無差忒如肥白人有寸脈弦滑或沉緩軟弱肢冷者方可作氣虛治○黑瘦人兩手俱數疾左爲甚或虛大無力收熱者方可作血虛治氣血是本痰火是標○左右通治方用黃芪爲君人參歸芍爲臣防風桂枝鉤藤爲佐荆竹瀝薑汁茱萸梨乳汁爲使捨此而雜用烏附羌獨是促其凶爾○聲如鼾聲屬氣虛獨參湯加竹瀝薑汁○痰多火盛口眼喎斜手足躄攣言語蹇澀晨昏痰壅間服滾痰丸或聖濟方保命金丹妙

治法要四卷類中風

四

○稍健人手足不遂用五枝湯浴或蒸法皆妙酒客膏粱家四肢痺而不遂脉滑實有力邪甚者非尋常湯劑所可治必用大辛大散如活絡丹大烏藥順氣散換骨丹續命丹四生丸黑虎丹等皆內有烏頭地龍乳沒麻黃蝎蛇等散走藥所以祛邪開結是病已深重須毒以攻之又不可拘于腦筋引風入骨如油入燭之說要在用之合宜爾

遺尿

○平者屬氣虛多以參耆補之少加益智子頻
啜妙若平中有此氣諸惡症者爲腎絕不治

若已醒日久不時遺尿者猪羊尿胞煮食伴青
鹽妙原湯煎大劑參芪本草歸芍續斷加升麻
提之

桑枝性平不寒不熱能祛風散熱皮膚燥痒四
肢麻痺清肺止嗽聰耳目用桑枝一升炒香水
煎服無時

千金方半身不遂蜜沙兩石分作三袋每袋可

治法彙四卷類中風

七十蒸熱一袋着患處如冷再換一袋依前法

數整換易

口禁

初中時口禁不知人事藥不得下用皂角末取
涎再以霜梅擦牙即開或用南星研末加白龍
腦搗大牙每用一字蘇合香丸擦牙亦可○或
鬱金梨膏水調搗鼻○肥人以黃芪防風各
十斤煎湯煎○一法用甘草比中指截五截于
油中浸炭火上炙候油入甘草以物幹開牙關

令咬定甘草可如人行四五里時再換一截後
灌藥

丹溪曰凡類中風症悉以二陳湯加竹瀝薑汁
爲主○風痰盛喉中如拽鋸者加南星枳殼皂
角瓜蒌仁○血虛加四物用生地有瘀血加桃
仁紅花○氣虛對四君黃芪自汗倍芪少用茯
苓半夏或少佐以附子○頭目不清或頭痛如
破加川芎白芷荊芥穗細辛蔓荊○頂痛去川
芎加藁木或加酒岑○如無汗身體痛脉浮緩

治法彙四卷類中風

六

有力或浮緊或浮弦是火邪鬱于表本方加羌
活防風川芎白芷蒼朮秦艽之類甚者小續命
倍麻黃須審寒暄○如大便秘結四物三化微
利之三五日一行可也輕則滋腸五仁丸佳心
血虧欠心神恍惚加黃連遠志石菖蒲○或心
動搖悸更加茯神酸棗側柏葉竹葉或補心丹
佳○凡風症小便不利不可利之熱退自解也
○肥人中風口眼喎邪手足麻不分左右皆屬
痰火用貝母杏仁南星半夏陳皮二朮岑連黃

栝蒌活荆芥威靈仙桂枝甘草花粉因濕者加
 附子二三分竹瀝薑汁入酒一二匙行經行火
 ○瘦人中風口喎等証悉屬陰虛火盛四物三
 補知母牛膝入竹瀝薑汁有痰加痰藥○左癱
 者岑連黃栝俱酒製防風各半兩甘草半兩南
 星一兩附子製三片九彈子大酒化下○肥人
 憂思氣鬱右手癱口渴補中益氣加痰藥仍佐
 竹瀝薑汁○中風口眼喎邪語言不正口角流
 涎半身不遂或全體不能舉因元氣虛弱兼酒
 治法彙四卷類中風 七
 色之過更挾外邪用四君四物爲君羌活荆芥
 薄荷葛根白芍爲佐黃芩天麻細辛皂角爲使
 甚者加麻黃仍加竹瀝薑汁外以艾灸治風穴
 道取微汗而愈○因寒而中者薑附湯隨病加
 減手足不仁加防風挾濕加白朮筋脉牽急加
 木瓜肢節痛不可當加薄桂一錢薑棗煎服
 古方愈風湯四白丹藥多辛散恐非類中所宜
 半身不遂病久補氣血化痰藥外更常服稀煮
 花佳

口眼喎邪

悉屬風熱血脈受病也手足陽明之筋絡于口
 會太陽之筋絡于目寒則筋急而僻熱則筋緩
 故左寒則過熱于右右中寒則過熱于左寒者
 急而熱者緩急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急
 者緩之緩者急之○此症少年平時亦有不獨
 中風歷診其人多是陰虛火盛亦有痰生熱者
 往往用滋陰涼血養血藥及滾痰搜風六味地
 黃加坎離等丸調理殊効詳見口門

治法彙四卷類中風

八

一法黃芪二錢人參歸芍各一錢甘草桂枝各
 五分升麻葛根秦艽各一錢白芷防風蘇木紅
 花酒黃栝各五分水酒各半煎稍熱服初起有
 表症加連翹葱三莖取微汗○一膏梁貴介酒
 色過度口喎服搜風化痰藥不應入味丸料
 煎服三服即正乃陰虛之驗也六味滋陰桂附
 行經妙不可言
 戴氏曰中而口眼喎斜者先燒皂角烟薰之以
 逐外邪次燒乳香薰之以順血脉

改容膏傳口喎絕妙

蓖麻子一兩 真冰片三分

共搗膏左喎傳右右喎傳左寒月加乾薑附子各一錢或以蠅螂冰片傳之或以鱉血冰片傳之俱妙

言語蹇澀

痰火壅塞上竅氣血虛不能上榮則舌機不轉宜尋痰尋火兼補養之亦有真氣虛極不能言右寸弦滑無力宜大補之獨參湯加竹瀝能食

治法彙四卷

類中風

卷

者用荆瀝或用梨汁陳醬汁人乳汁生葛汁難經曰三焦之氣通于喉喉嚨之聲則發矣氣弱不能上通故也虛則痰自下脉滑而弦痰壅舌強者酒岑連導痰加竹瀝兼服轉舌膏○已上皆類中風症也世之病此者良多若果屬外邪當從古法○大腸之脉散舌下如舌瘡而大腸秘用消通散秦艽槐角○失音不語一法竹瀝荆瀝大梨汁各三盃生葛汁人乳各二盃陳醬汁半盃和勻頻溫服

薛立齋曰舌瘡不能言足痿不能行屬腎氣虛弱名曰痲症大補為主

真中二 東南絕無悉是大虛症

上古朴質穴居野處多真中風故治皆驅邪慄悍藥今人情慾無涯陰虛內傷在東南尤甚宜遵東垣丹溪法然中年血氣弱真為風所中者庸或有之僅錄一二要法以備參考古云西北二方多真中風以地高風勁故也學者拘泥一偏恐非通士

治法彙四卷

類中風

卷

脉浮而數四肢拘急不仁面加五色惡風惡寒表風也為中府小續命加減一
脉沉而滑或數而弦九竅塞滯唇緩不收舌強失音耳聾目瞽二便秘塞裏中風也名中臟三化湯主之○古云治須少汗亦須少下○多汗則虛其衛多下則損其榮○外無六經形症內無便溺阻隔但手足不遂語言蹇塞乃邪中于經也宜養血通氣大秦艽愈風湯主之○有腑臟兼中者宜審孰急或一氣之微汗或一句之

通利○產後中風角弓反張手足瘳瘳脉浮而虛荊芥炒末豆淋酒下三錢童便亦可其應如神又治血暈四肢強直或調芎歸湯

脉處緩浮遲者生急實大數者死口開

手撒眼合遺尿搖頭聲如鼾睡吐

沫直視面赤汗出如珠皆屬危症

方

增減烏藥順氣散局方中麻黃白芷乾薑

蘘蠶等風藥恐非無外邪者所宜今增損之

治法彙四卷類中風

士

一以順氣化痰為主凡一切氣氣厥氣膈氣

痛七氣為患僊品

烏藥 川芎 青皮 陳皮 香附童便浸

半夏 枳殼 桔梗 前胡下氣極速

有火加涼藥二三味隨病出入

八味順氣散 治氣厥挾虛症

四君子湯加 烏藥 青皮 白芷 陳皮

有痰加星半 引子隨宜

通關散 治一切卒中昏憤不省牙關緊急湯

水難入

細辛洗淨 牙皂去核各一兩

右為細末以經絡搗齏取嚏

稀涎散 治中風痰涎壅盛口眼歪斜膈塞不

通 明白礬生一兩半 猪牙皂角四莢去皮

右為末每服三錢溫水下以吐為度

獨聖散 治諸風膈實痰盛及諸癰痰飲塞溢

等症 甜瓜蒂一兩炒黃熟脫落者佳

右為末每服半錢或一錢量人虛實用之以

治法彙四卷類中風

士

酸齏水調下以吐為度宜于天氣清明日行

之晦日難得吐病急暴者不拘先令病者隔

宿勿食如服下不吐再以熱齏汁投之如吐

風癰病加全蝎半錢微炒如有蟲者加猪油

五七匙雄黃末一錢甚者加芫花半錢立吐

其蟲如濕熱腫滿加赤小豆末然此藥不可

常用大要辨其虛實實者可吐稍虛即不可

妄用吐後可服降火利氣安神定志藥

牛黃通腦湯

二陳湯

導痰湯 見痰門

四君子湯

四物湯 見虛門

活命金丹 治神不清上焦火盛神効即涼膈

散 見火 內加青黛藍根為末蜜丸彈子大硃

砂為衣金箔蓋每服一九茶清化下臨臥服

正舌散風痰舌本強硬語言不正此散主之

全蝎稍 去毒五分 茯神 去木微炒一兩 薄荷 結一

右為細末每服一二錢溫酒調下或用以擦

牙頰亦可

清心散 治舌強不語

青黛 二錢 白礬砂 二錢 水片 二錢 牛黃 分三 薄荷 二錢

右為細末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之

將藥蜜水調稀搽舌上

痰火壅滯上焦舌強不語轉舌膏最驗即涼膈

散加石菖蒲遠志如活命丹法

脈虛體倦痰迷上致舌強不言滌痰湯妙

南星 製半夏 枳實 茯苓 橘紅 錢

石蒲 人參 如去甘草 半

即導痰湯加人參去甘草薑水煎服

青州白丸子 治男婦風痰濕痰壅盛手足癱

瘓吐涎沫及小兒驚風皆治隨症加減

半夏 南星 製川烏頭 去皮臍

右為末以蜜絹袋盛于井花水中擺出未出

者再搗再揉令淨為度于磁器中日晒夜露

每日一換新水攪而復澄春五夏秋七冬十

去水晒乾如玉片碎以糯米粉煮粥清為丸

如菉豆大每服二十九薑湯下驚風薄荷湯

下

僊傳黑虎丹 治男婦血氣虛弱筋骨枯槁外

邪乘虛傳入經絡或濕痰流注足脛手足麻

木腰腿疼痛久成偏枯左癱右瘓口眼歪斜

諸痰火濕熱有餘之症

蒼朮 洗淨去皮 草烏 洗淨去皮

生薑 洗淨去皮 蔥半斤 全用

右四味和一處拌勻醃之春五夏三秋七冬
十日每日一番拌勻候日數足晒乾

五靈脂洗淨乳香研沒藥研各穿山甲炮二
自然銅火煅醋

右同前藥爲末用好醋糊爲丸如桐子大每
服三十丸空心熱酒送下間日服尤妙婦人
血海虛冷白帶肚腹作痛空心醋湯下止服
二三十丸不可多服忌生冷漿涼物但覺
麻木爲効孕婦忌之

治法彙四卷

五

血虛有痰四肢偏枯者虎脰骨酒佳

石斛去根石南葉去根防風去根虎脰骨去根川芎

當歸去根茵芋葉杜仲去根皮川牛膝去根

川續斷去根金毛狗脊去根川巴戟去根

右剉如豆大絹袋盛藥用無灰酒一斗漬之
十日後任飲

口眼喎勢緩者稀茶丸佳

換金丹 治風勢客于上焦口眼喎斜

荆芥穗 白僵蚕 甘草 防風各一

天麻 川烏頭生白附子生蝎炒去

羌活去根細辛 川芎 藁香各半薄荷三

右爲細末蜜丸彈子大每服一九細嚼茶酒
下如左喎再以此全于右右喎塗左

三蛇散治諸風口眼喎邪

蜈蚣三條用酒炙一條酒白芷半兩

南星三個每條紙裹煨熟

右爲末入麝少許熱酒調一錢食後服

牽正散

治法彙四卷

十六

白附子 白僵蚕 全蝎去毒并

右爲末每服二錢熱酒調下不拘時服

天僊膏

天南星大一錢白芨大二錢大草烏頭一錢僵蚕七

右爲末用生鱈魚調成膏塗喎處正則洗去

天南星膏

南星一味爲末生薑自然汁調右喎傳左

左喎傳右

一七 單味法傳亦可或生鱈血加麝亦効

口...法以筆管五寸長插入耳內外以麝香
四圍勿使透氣一頭以艾灸二壯右灸左左

灸右耳痛亦効

又法耳垂下用麥粒大艾炷灸三壯左灸右右
灸左

有人麻木體軟痰湧口斜語澁蹇身痒白屑等
症其人臂廢體軟脾無用也痰涎自出脾不能
攝也口斜語澁脾傷也頭目暈重脾不升也痒
起白屑脾不管也補中益氣湯加神麴半夏茯苓

治法彙四卷

類中風

十七

神三十劑乃愈

預防中風

張三錫曰病之生也其機甚微其變甚速達士
知機思患而預防之庶不至于膏肓即中風一
證必有先兆中年人但覺大拇指及次指時作
麻木或不仁或手足少力或肌肉微掣三年內
必有暴病急屏除一切膏粱厚味肥肉麪酒肥
甘生痰動火之物即以搜風順氣丸或滾痰丸
防風通聖散時服之及審氣血孰虛因時培

夏遠色戒性清虛靜攝乃得有衛無患之妙
肥人更宜加意慎口絕慾人參湯加竹瀝煎膏
日不輟口方是○大抵中年以後多有此水弱
火盛熱極生風明矣治火爲先古方愈風湯四
白丹藥多辛散大非所宜故皆不錄

薛氏醫按載一人形體魁偉中滿吐痰勞則頭
眩所服皆清痰理氣立齋曰中滿者脾氣虧損
也痰盛者脾氣不運也頭暈者脾氣不能升也
指麻者脾氣不能周也遂以補中益氣湯加茯

治法彙四卷

類中風

十七

苓半夏以補脾土用八味丸以補土母而後感
于乾坤生意不加補養祇服搜風丸致大便不
禁而歿大抵預防之理當養氣血節飲食戒七
情遠房幃可也若徒事風藥適足以招風取中
也

搜風順氣丸治腸胃積熱以致膈間痞悶大便
結燥小便赤澀腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻
手足癱瘓行步艱難語言寒澁諸風諸氣膏粱
之家中年宜常服之此藥宣通氣血清熱潤燥

通利大小便諸病自愈

車前子兩半白棋榔兩大麻子微炒去

牛膝酒浸二宿乾山藥各二兩枳殼去穢炒防風法

獨活各一兩郁李仁泡去大黃五兩半

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸茶酒

任下早晨臨臥各一服久之覺大便微瀉以

羊肚肺羹補之老年大腸無血大便結燥最

宜

防風通聖散治熱極生風皮膚風疹燥痒頭目

治法彙四卷類中風十九

不清痰涎阻滯胸膈宜加減用之

防風 大黃 礞石 川芎 當歸

黃芩 滑石 石膏 薄荷 山梔

荊芥 桔梗 麻黃 白朮 甘草

連翹 芍藥

加生薑煎服體麻者加羌活天麻蠶蚕痰多

加星半如大便不實減硝黃表虛自汗減麻

黃加參芪

古方牛黃清心丸中有犀角乾薑皆辛散慄悍

入肝主筋入腎主骨麝香入脾主

肉果中風在骨者能引風出否則引邪入骨

古人有如油入燄之說今閩廣嶺南視為僞品

以其地濕而多瘴氣也用之罔不獲効若干他

處多不相宜按此方藥性一千攻邪挾虛類中

妄用反增亦有暴厥藉其開竅亦是痰火盛而

氣實乃可癲狂神昏言語蹇塞亦可酌用今人

不深察藥性一槩謬謂服後則他藥不効又或

不審寒熱虛實凡有不安即亂投之多致不救

治法彙四卷類中風二十

良可憫也一廣中士夫有妾隨任京都產後發

熱自服四九大汗大喘而卒此可為輕信者之

戒

牛黃清心丸治有餘痰火

白芍麥冬心黃芩 當歸 防風

白朮各一兩柴胡 桔梗 芎藭 白茯苓

杏仁各二錢五分神麴 蒲黃 人參各二兩

羚羊角 麝香一兩龍腦各兩大豆黃卷炒

肉桂 阿膠七錢半白欒 乾薑各一兩

牛黃二錢犀角屑二兩雄黃八錢甘草五錢

乾山藥七錢金箔千二百片內大棗蒸去核研

右除杏仁金箔二角屑牛黃雄黃腦麝外共

末和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九金箔

為衣每服一九食後溫水下

小續命湯 真中風有表証者可用

麻黃去節人參去蘆黃芩去腐芍藥 甘草炙

川芎 杏仁去皮炒 防風 肉桂

防已 附子炮去皮臍

石法藥四卷 風類中風 子二

劑隨輕重增損

麻黃續命湯 治中風無汗惡寒

麻黃 防風 杏仁

有汗惡風用桂枝續命湯

桂枝 芍藥 杏仁

大秦芩湯原為中血脉之證而設方用四物加

二活芷防細辛芩朮白朮石膏按秦芩乃陽明

除濕聖藥濕痰盛而筋痿于前四物四君二陳

方中加而用之大獲奇効第不可執定一方也

活絡丹治有餘痰火經絡鬱滯拘攣不能屈伸

大是捷藥第藥性辛散功在開通鬱結耳不可

妄用

三化湯 中風內有便溺阻隔是風熱內實也

宜此

大黃湯洗厚朴 枳實化痰消痞除痞 羌活祛風

右等分水煎服

稀蒼草一名火吹草葉似蒼耳對節而生春生

苗葉秋初開花秋末結實法于五月五六月六

治法藥四卷 風類中風

七月七八月八月九月採其葉去根並花實洗

淨曝乾入甌中用酒蜜蒸之九遍焙乾搗篩細

末煉蜜丸如桐子大空心用酒或米湯下四五

十九百服後耳目聰明千服鬚髮變黑筋骨強

健大益氣血四肢不遂大有功

風熱膏梁厚味飲酒無度積熱生風或遍身癢

疹頭痒白屑生痰氣促氣實人宜防風通聖散

宜之或搜風順氣丸久久涼血養血蒼耳丸苦

參丸俱佳蒼耳丸○五月五日採蒼耳葉洗淨

晒乾爲末煉蜜丸桐子大每服四五十丸日三服若身體有風處逐出如麻豆粒乃風毒出也以針刺出黃水愈

白集四卷

中風

火

有實火有虛火有鬱火有陰火

脉洪盛有力口燥渴目赤瘡瘍一便秘塞等証實火也芩連梔柏分經瀉之

脉數而無力或虛大羸瘦兩顙赤咽乾消渴午後熱咳嗽有血或衄屬陰血虛火盛宜滋陰降火

脉大而無力或緩而數色白心煩自汗手心熱倦怠早飯後轉劇九竅不利食減頭時痛虛火

治法彙四卷

火

盛宜補中益氣

丹溪曰火與元氣不兩立一勝則一負元氣一回火自退矣

脉沉伏而數肌表熱如燎捫之烙手五心煩熱屬鬱火鬱于肺則咳鬱于胃則嘔忌用寒涼必先升散兩尺洪大爲腎經命門龍火平人

兩尺脉洪大者必遺精陰火盛也

丹溪曰陰虛火盛者難治虛火可補參朮生

甘草之類實火可瀉芩連解毒之類鬱火

可發者在何經風寒外束者宜發 凡火盛者不可驟用寒涼必兼辛散 火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可 人壯氣脈實火盛顛狂者可用正治硝黃水水之類 人虛火盛狂亂以生薑湯從治之若投以硝黃正治立危 補陰則火自降炒黃柏地黃之類 凡氣有餘便是火氣從左邊起者肝火也 從臍下起者陰火也 五志過度喜怒悲思不節正氣亢而鬱滯不清變而為火

治法彙四卷

二五

東垣曰火者元氣之賊謂瀉氣所發之火煩躁者氣為火所升也 黃連瀉心火 枯岑梔子瀉肺火 條岑瀉大腸火 柴胡黃連瀉肝膽火 木通下行瀉小腸之火 知母瀉腎火 白芍瀉脾火 冬月酒浸 石膏瀉胃火 人中白瀉肝火 芩連以豬膽汁炒瀉肝膽之火最速 黃柏加細辛瀉膀胱之火 青黛能收五臟鬱火 小便降火極速陰虛火動非此不除 山梔子降火性能屈屈下行從小便中瀉出

治法彙四卷

二六

浮遊之火 四物加馬脰骨降陰火以代芩連 體薄之人有氣如火從臍下起入腹者此虛極也乃火起九泉之下古謂十不救一倘能清心絕慾養陰滋腎使真陰得復更加補益亦可挽回若徒事服藥而不禁忌多致不救其附子末津和貼湧泉穴引火下行法亦間或取效 壯盛人或酒客輩有此屬濕熱 陰虛發熱者四物加炒黃柏知母乃補陰降火至要之劑氣虛加參朮芪草或加龜板胃氣弱者忌地黃泥隔先扶胃 丹溪曰陽旺則能生陰如失血後即當用參芪歸地大補之若遷延日久虛火尅肺即難用矣 手心熱屬熱鬱當用火鬱湯或以梔子香附白芷川芎神曲為丸服體厚有鬱者越鞠丸四肢倦怠而熱屬內傷 兩手脈弦急而數嘔吐口乾耳鳴腸痛莫茱萸炒黃連佳 與點丸一名清金丸瀉脾肺火效用黃芩酒浸一味為末粥丸 白睛赤煩渴引飲皮膚如火燎而以重手

取之不甚熱熱在肺也黃芩一物湯炒 火之
爲病者十居八九須分經絡虛實兼痰挾氣務
得其實方可下手 上焦火盛頭不清口乾面
赤涼膈散去硝黃芩者全用 中焦火盛心膈
怔忡惡心痞滿連二陳薑炒梔子下焦火盛
二便阻塞八正硝黃之類皆瀉有餘之火也
左金丸原佐金以平木方用莫莖更炒黃連大
治肝火脇痛耳鳴目赤嘔吐至妙脉實勢盛龍
薈九妙 肝心脾肺大腸小腸胃與膽皆能有
治法彙四卷 火 三七

陰虛
黃連解毒湯 治一切火熱毒狂躁煩心口燥
咽乾有餘之火及傷寒汗下後不解目赤唇
焦神昏喘促欲成壞證

黃連 黃栢 梔子 大者生用 黃芩等

右水煎服

宜明金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚
悸溺渴淋閉欬血衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺

痰火嗽加梔子去黃連名梔子金花丸

黃連 黃栢 黃芩 大黃 各等

爲末滴水丸小豆大每服二三十丸新水下

當歸龍薈丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚

悸筋惕肌肉瞤癢腦膈不利耳鳴耳聾下疳

淋秘腸胃燥澀狂亂驚悸等症

當歸 草龍膽 大梔子 黃連 黃栢

黃芩 各一兩 大黃 蘆薈 各半兩 青黛 各半兩

木香 錢一 麝香 半錢

治法彙四卷 火 二六

右爲末煉蜜丸小豆大每服二三十丸薑湯

下

神芎丸 治一切濕熱痰火二便阻塞酒積食

積清利三焦宜通鬱結此藥下濕熱導滯甚

捷陰虛禁用

大黃 黃芩 各二兩 牽牛 滑石 各四兩 黃連

薄荷 川芎 各半兩

右爲末水丸小豆大每服下十九至十五二

十九

紫雪紅雪內皆犀角羚羊硝麝等無非解毒辛涼升散且黃金伯兩固非尋常可力辦者未經用過不敢收入

中氣虛而風熱鬱結于三焦防風當歸飲最佳用大黃瀉陽明之濕熱滑石利三焦之邪火使熱從小便出黃芩涼膈柴胡解肌防風清利頭目人參甘草以補氣當歸芍藥以補血瀉心肝之陽補脾腎之陰不用辛香燥熱之味方大有理治溫熱病後餘熱未退尤妙

治法彙四卷

二十九

涼膈散 治上焦火盛妙品

黃芩 梔子 薄荷 連翹 大黃

朴硝 甘草 水煎服一可爲末

因時增減加蜜一匙和勻服

火鬱湯 治血中伏火身熱手心熱先發散

葛根 赤芍 防風 人參 柴胡

甘草 羌活 升麻

薑蔥煎熱服

升陽散火湯 見發熱門

三和丸 瀉三焦

黃芩 黃連 黃柏

右等分爲末水丸

左金丸 治肝火佐金以平木也

黃連 六兩 萸茱萸 一兩 湯洗浸

右爲末粥丸白朮煎湯下

抑青丸 治肝火

黃連

右爲末糊丸麻子大每服二三十九丸白湯下

石膏丸 瀉胃火并食積痰

石膏煨

右爲末醋丸菉豆大米湯下

丹溪曰上焦濕熱須用酒洗片黃芩以瀉肺火

實者宜之虛人反傷肺氣須用天門冬保定肺

氣然後用之 如去中焦與癰須用黃連以瀉

心火如中焦有實熱者宜若脾胃氣虛不能轉

運及中焦有鬱熱者當用茯苓白朮黃芩葛根

代之 若胸中煩熱須用梔子實熱者切當若

入竹葉煎服	生地黃 木通 甘草稍	導赤散 治小腸實熱	右為末每服二錢童便調服	人中白 二兩 黃柏 鹽水伴炒 湯色 生甘草	人中白散 治陰虛火盛及五心煩熱等症	便中出蓋膀胱乃此物之故道也	非獨瀉肝火又能瀉三焦火及膀胱之火從小	治法彙四卷 火	須去殼水洗去黃漿炒焦色研細用之 人中白	梔子瀉三焦之火在中上二焦連殼用在下焦	片苓佐之 片苓瀉肺火須用桑白皮佐之	桃仁牛膝檳榔黃柏之類 柴胡瀉肝火須用	類 如黑瘦人下焦濕熱腫痛必用當歸紅花	捷藥若肥白氣虛者宜二朮二陳南星滑石之	火邪者須用酒洗防已草龍膽黃柏知母固是	麥門冬大棗之類 下焦濕熱腫痛并膀胱有	虛煩須用補藥為主 人參白朮黃芩芍藥茯苓
-------	------------	-----------	-------------	-----------------------	-------------------	---------------	--------------------	---------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

于星月下露至天明自然結作清白塊磁礮	渴能流濕潤燥以朴硝煎過澄清五次至夜	此藥大治上焦火邪膈上痰火臟腑秘塞燥	玄明粉	病在下焦皆不渴煉蜜為丸服	下焦火也桂與火同體故曰熱因熱用凡諸	右二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉	黃柏 三兩 酒 知母 二兩 肉桂 一兩 伴陰乾 同上	滋腎丸 壯水制火	治法彙四卷 火	右為末每服二錢入粳米百粒同煎食後服	桑白皮 二兩 地骨皮 一兩 甘草 五錢 炒	佐梔子黃連更審氣虛實	瀉白散 治肺火肺熱骨蒸自汗宜此瀉之或	右為末用蜜酒伴勻略炒服二錢	藿香 七錢 石膏 五錢 山梔 一兩 甘草 三兩 防風 四兩	瀉黃散 治脾熱	右為末水調服	瀉心湯 治心熱 黃連
-------------------	-------------------	-------------------	-----	--------------	-------------------	-------------------	----------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------------	------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--------	------------

按實于炭火上，既慢至紫，自然成汁，煎沸直
候不響，再加大火一煅，取出于淨地下，上
用盆合蓋了，以去火毒，然後研為細末，每二
斤入甘草生熟二兩為末，一處攪勻，臨臥酌
量用之，或一二錢，以桃仁湯，或葱湯下。

局方妙香丸 解五臟潮熱，積熱，大治時疫，傷

寒及小兒驚症，功在開痰降火。

巴豆 淨肉一百二十個 牛黃 片腦 膩粉

射香 各七錢半 辰砂 兩九 金箔 九十片

治法彙四卷 火 三十五

右研極細末，煉蠟六兩入蜜七錢半，同煉令
勻，每兩三十九，每服一九，小兒菴豆大二九
白湯下。

腎虛火不歸經

腎虛火不歸經，遊行于外，而發熱者，煩渴引飲，
遍舌生瘡，兩唇黑裂，喉間如烟，火上攻，兩足心
如烙，痰涎湧盛，喘急，脈洪大，而數無倫，按之微
弱者，是也。宜十全大補，吞八味丸，或問燥熱如
此，復投桂附，不以火濟火乎？曰：龍雷之火，在人

伏于腎中，因嗜慾陰虛而妄行，故有以上諸症。
桂附與火同氣，而招之同氣相求，火必下降，
矣。人聞之火，可以濕伏，可以水折。龍雷之火，
見水益熾，天陰轉燔，太陽一照，火自尋滅。人
之相火似之，故腎虛火不歸經，口破煩熱，必用
八味丸是也。蜀中火井，投以水即熾，以灰撲
即止。

醫按載一七十九歲翁，與少妾入房，致頭痛發
熱，眩暈喘急，痰涎湧盛，小便頻數，口乾引飲，遍

治法彙四卷 火 三十四

舌生刺，縮飲如荔枝，然下唇黑裂，而目俱赤，煩
躁不寐，或時喉間如烟，火上衝急，飲凉水少解。
已瀆于灰，脈大無倫，且有力，捫其身，烙手，此腎
經虛火遊行于外，若誤作傷寒治，必死。乃以十
全大補，加山茱萸、山藥、牡丹皮、澤瀉、麥門冬、五
味子、附子，一鍾熟寐，良久脈症俱減。三四再與
八味丸服之，諸症悉已，後畏冷物而痊。
大尹沈用之，不時發熱，口飲水水數碗，寒藥屢
進，熱渴益甚，形體日瘦，尺脈洪大而數，時或無

力 王太僕曰熱之不熱貴其無火寒之不寒貴其無水法當辨腎加減八味丸不月而愈一人年四十六歲仲夏過慾煩熱作渴飲水不絕小便淋瀝大便秘結唾痰如湧面目俱赤滿舌生刺兩舌燥裂遍身發熱或時如芒刺而無定處兩足心如烙以冰折之則痛脉洪大無倫以腎陰虛陽無所附浮散于外非火也蓋大熱而甚寒之不寒是無水也當峻補其陰遂以八味丸料一斤肉桂一兩以水頓煎六碗水冷與飲半餉已用大半睡覺而食溫粥二碗諸症悉退翌日畏寒足冷至膝諸症仍至或以爲傷寒余曰非也大寒而甚熱之不熱是無火也陽氣亦虛矣急以八味丸一劑服之稍安四劑諸症復退大便至十三日不通以猪膽導之諸症復作急用十全大補湯數劑方痊

治法彙四卷

三十五

暑

體虛衝斥道途忽然暈倒脉微而虛或浮大而散或伏外症自汗身熱微煩渴爲中暑亦名中暈 脉虛身熱得之傷暑 暑傷于氣所以脉虛也 脉虛大身大熱躁煩大渴汗大泄倦怠爲傷暑暑傷肺宜人參石膏湯解之汗少加蒼朮 小水不利煩渴身熱者辰砂六一散解暑聖藥也 惡心吐瀉煩渴脉虛者宜消暑分利黃連香薷飲對五苓散

治法彙四卷

暑

脉虛倦怠食不甘爲熱傷胃氣宜補中益氣對生脉散升麻柴胡俱用蜜炒果勞碌受暑加香薷黃連

按香薷味辛淡辛能發散淡能滲泄乃夏月解表利水之劑果身熱煩躁嘔吐小便不利者若黃連以解暑靡不應手獲効若氣虛胃弱之人食少體倦自當多服參芪豈可堪此發泄不快用之是虛其虛也今人不分虛實當不夏月少有不快一藥用之而家往往爲貺所謂訛上傳

訛也。因表而出之以爲重生者勸。一

薛師曰：香薷飲乃散陽氣導其陰之劑也。須審有傷暑症而服，有何患哉？若元氣素弱或犯房過勞而飲之，適所以招禍也。

戴氏曰：暑有胃有傷有中，三者輕重之分。或腹痛水瀉者，胃與大腸受之。惡心者，胃口有痰飲。二者冒暑也，可用黃連香薷飲。黃連退熱，香薷消暑。或身熱頭疼，躁亂不寧，或身如針刺，此爲熱傷在肉分也，當以解暑白虎湯加柴胡，氣虛

治法彙四卷

暑

加入參，或咳嗽發寒熱盜汗不止，脈微者，熱在肺經，火乘金爲中暑，宜清肺湯。柴胡天水散之類，急治則可。古方治暑風用蘇合丸大非。

暑風

夏月率倒不省人事，爲暑風。其因有二：有相火合暑邪，內外炎灼而卒倒者；有暑氣入而鼓激痰飲塞心竅，則手足不知動攝而卒倒者。皆可用吐法，卽內經火鬱發之之義。吐醒後方可用消暑之劑調之，亦有虛而不可吐者。清暑用

黃連香薷飲，增減或辰砂益元散，亦有挾食挾氣而致者，宜詳審。小兒多驚痰與食滯，詳脈症爲主。惟脈虛者，方可作暑治。

暑風卒倒

暑中人先入心，各從其類也。一時昏迷，切不可飲冷水，并臥濕地。其法先以熱湯灌之，或童子小便亦可，更以布蘸湯熨臍，并氣海，續續令暖，氣透徹臍腹，候醒，然後進藥。若途中卒然暈倒，急扶陰處樹道上，熱土作窩于臍中，令人尿其

治法彙四卷

暑

內卽醒，却灌人尿，或攪地漿水飲之半碗，或車輪上土五錢，冷水調澄清服亦妙。

辛苦役作市井人，日間冒熱經營，夜間露臥，或開窗取涼而病，頭疼寒熱，卽同非時暴感。若作癰狀者，六和湯加減，或鼻流清涕，出熱氣者，六和湯加川芎、羌活、黃芪。一方用大蒜三兩，細嚼溫湯下，禁冷水。遠行受暑，閉住汗孔，急取熱湯，嚼生蒜三四瓣妙。無病之人避暑深堂水閣，內食水果，輕則霍亂吐瀉，重則腹痛厥

逆當從陰症治古方大順散是也

古方清暑益氣湯原為感長夏濕熱之氣而病者設內有二木澤瀉黃柏是滲濕清熱也不可不知

夏月無病只宜服補劑以陽氣盡發于外體內虛也惟生脉散加苈木陳皮炒黃柏煎湯妙切忌發泄

近製清暑益氣湯

人參 白朮 麥門冬 五味子 陳皮

治法真四卷

暑

三

甘草 黃柏 黃芪 當歸身

隨人加減薑棗煎

治暑之法清心利小便黃連香薷飲是也暑

傷氣汗多體倦須補氣利行人農夫于日中

勞役得之為中暈其病必苦頭疼發躁熱惡熱

捫之肌膚大熱大渴引飲汗大泄無氣以動乃

天熱外傷元氣宜益氣清暑十味香薷去厚朴

木瓜加五味石膏知母取涼太過寒熱無汗是

周身陽氣為寒所遏也當從傷寒治大羌活湯

加減兼內傷水果生冷當溫中發散炮薑硝砂之類

治暑渴方

生地 麥門 牛膝 黃柏 知母

葛根 甘草

水煎服

生脉散 生津止渴夏月攝生者不可少

孫真人曰夏月宜五味以補五臟氣夫夏月

宜補者補天真元氣非補熱火也人參之甘

治法真四卷

暑

罕

補元氣瀉熱火麥冬之苦寒補水之源而清

肅肺金五味之酸以滋水汗多加黃芪食

少不運加白朮麥芽

人參 麥門冬 五味子

水煎湯代茶

薛氏曰若人元氣不足用白虎香薷等不應宜

補中益氣湯大抵夏月陽氣浮于外陰耗于內

若人勞倦飲食內傷中氣或酷暑勞役外感暑

氣者多患煩熱汗渴倦怠頭痛有類外感法當

謂元氣為主少佐解暑先哲多用藿香附子者乃從內經拾時從症之良法也今患暑歿而手足指甲皆青紫不究其因不溫補其內而泛用香薷飲之類所悞也

人參白虎湯 治中暑自汗煩渴脉虛

人參錢一知母錢二石膏錢五甘草錢一入梗米

一撮水二鍾煎一鍾如伏暑作寒熱未解宜

和五苓散同煎服如無汗燥煩加桂煎服不

拘時

治法彙四卷暑

四十一

十味香薷飲 消暑和脾胃

香薷兩一人參 陳皮 白朮 黃芪

扁豆 甘草 厚朴 乾木瓜 白茯苓

冬五

右為末湯調二錢不若煎服妙

五物香薷飲 驅暑和中通用

香薷去土白扁豆炒厚朴薑製白茯苓各一

甘草五錢

每服五錢水煎服 內加黃連名黃連飲

東垣清暑益氣湯 治長夏濕熱蒸人人感之

四肢困倦精神短少懶于動作胸滿氣促肢

節疼痛或氣高面喘身熱而煩心下膨悶小

便黃而數大便澁而頻或痢或渴不思飲食

自汗體虛

黃芪 蒼朮 升麻各一錢人參 白朮

神曲 陳皮 澤瀉各五分炙甘草

炒黃柏 麥門冬 當歸 葛根各三分

五味子九粒青皮半

治法彙四卷暑

四十二

水二鍾煎一鍾溫服食遠

益元散 治中暑身熱小便不利此藥性涼除

胃脘積熱又淡能滲濕故利小便而散濕熱

也

五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小

便赤澀如心神恍惚加辰砂與桂名辰砂五

苓散 不應桂苓甘露飲

桂苓甘露飲

桂心 人參 黃芪 茯苓 白朮

生薑 葛根 澤瀉 石膏 寒水石

滑石 二兩大 散易研 木香 一錢 藿香 半

右爲細末每服三錢白湯調下

夏月多飲冷水或食瓜果水涼太多中脘痛霍

亂吐瀉古方用大順散或香砂理中湯痛者去

參朮加肉桂吐加厚朴二陳瀉加五苓當從食

陰治

一人夏食羊肉太多作渴煩躁自爲受暑用涼

水調一元散躁渴愈甚診之脉雖滑不鼓隨以

鹽湯吐之得生肉碗許乃以二陳加草菓肉桂

厚朴山查調理而安若用涼藥作暑治立見其

斃

夏月煩渴不可遽爲暑熱而用香薷益元散須

斟酌之果脉虛大自汗煩渴遠行不用冷物

無房事方可作暑治

大順散 治夏月過食水果冷物引飲過多霍

亂水穀不化不分陰症

甘草 乾薑 杏仁 去皮 肉桂

水煎服腹痛脉小欲絕手足青冷者加熱附

子炒白芍

六和湯 治脾胃不調夏月飲水過多氣不升

降霍亂吐瀉轉筋寒熱脹懣

官砂 半夏 杏仁 厚朴 人參

甘草 藿香 木瓜 香薷 赤茯苓

白扁豆

煎服

夏月病者不可遽爲暑必憑症分陰陽辨寒熱

祭虛實以治緣夏月陽氣盡出于外兼之出汗

元氣虛者十居八九所以體倦多睡虛煩手足

心熱或腹痛瀉者皆脾弱所致必補中理脾爲

主慎服寒涼禍必旋踵淺見者夏月有病悉指

爲暑富貴高庭大廈暑從何來必衝斥道途勞

碌而脉虛身熱出汗者方是暑以暑傷氣所以

脉虛細也

來復丹 治伏暑上感下虛裏寒外熱瀉泄如

水等症第石藥之性悍不若補脾爲佳姑筆

之以備參考

硝石

硫黃

各一兩共末微火炒用
研枝攪研末名二氣末

太陰玄精石

研

五靈脂

青皮

陳皮

各

共拌勻醋糊丸豌豆大每服三十九空心米

飲下

傷暑泄瀉胃冷湯佳妙在肉桂以夏月人多用

冷飲食梅湯水果也腹痛甚須加砂仁炮薑有

積加水香檳榔果尿洪數口苦乾燥見火症乃

可用黃連香薷飲加五苓及益元散

治法最四

四十五

嘔吐惡心有宿滯氣口必滑當從食治果受暑

暑氣傷胃者黃連香薷飲加藿香○嘔而作渴

香薷湯浸冷服

傷暑發熱有表症脈數者大羌活湯

胃暑飲酒引暑入腸內酒熱與暑氣相併發熱

大渴小便不利其色如血生料五苓散去桂加

黃連一錢或五苓散去桂吞酒煮黃連丸

暑氣入腸胃而大便艱澀不通者加味香薷飲

仍佐以三黃丸

暑氣入心身煩熱面赤

不展砂五苓散或香薷

加黃連一錢

傷暑而傷食者其人頭

眩背寒自汗發熱畏食

惡心噫酸臭氣胸膈痛

滿六和湯倍砂仁

若因暑渴飲食冷物致

以傷生冷外傷暑氣亦

宜此藥

濕

有表有裏有濕熱有寒濕有風濕有濕痰○脾虛多中濕 脉濡而浮外症關節疼痛四肢痿弱表中濕也名曰濕痺宜滲泄分利五苓加減發黃加茵陳 若關節重痛浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人其脉必沉而緩或沉而微細宜除濕湯或白朮酒此名中濕 有破傷處因澡浴濕從瘡口入其人昏迷沉重狀類中濕名曰破傷濕宜白朮酒

治法彙四卷

濕

四七

濕熱脉濡細而數遍身痛痺小水短黃屬濕熱

詳上下部或汗或滲

詳見痛風門

寒濕脉沉遲而濡身無熱但吐瀉小水自利清

白口不渴身痛重着或手足腫痛者為寒濕宜

分滲溫中胃苓加炮薑木瓜重者加附子

風濕脉浮身重不能轉側自汗或額上多汗為

風濕乃先傷于風又冒風所致不宜大汗宜微

解清漬然似欲汗者則風濕俱去矣若大汗則

風去濕在大羌活湯最妙 濕鬱于頭鼻塞發

治法彙四卷

濕

痰脉濡而滑或沉緩而滑四肢流注或項背強恒見于肥白之人是濕痰宜滲濕化痰二陳二朮羌活防風等加減

詳見痛風門

濕在上宜微汗而解濕在中宜利小便久在下而勢微宜升提之須兼補脾 濕有自外而得者坐臥卑濕衝斥風雨汗出沾衣是也自內而得者恣飲乳酪酒漿多食柑橘瓜果熱氣拂鬱有如氣汗水是也 大抵皆宜發汗及利小便使上下分消為佳

治法彙四卷

濕

四八

丹溪曰濕本為土氣火熱則生濕土故夏熱則萬物滋潤秋涼則萬物乾燥而熱氣拂鬱則生濕濕鬱則生痰故用二陳加酒苓羌活防風去風行濕蓋風能勝濕也大抵以利小便為上策故曰治濕不利小便非其治也濕盛腹脹滿甚而小水不利葶藶木香散佳 治濕者固當以二朮為君以補脾為主然亦有濕氣盛膨脹者又當以利小便行濕為先補脾藥未可遽用或

以二朮爲君而利水藥爲臣使或以水通澤瀉
豬苓澤瀉車前子等利水藥爲君參朮茯苓補
脾爲臣使有本而標之者有標而本之者全看
緩急處治

本草曰蒼朮治濕上下部俱可用

脾胃受濕沉困無力怠惰好睡須二朮爲君

上部濕蒼朮最裂下部濕宜升麻提之外濕

宜表散內濕宜滲泄濕盛身重痛羌活

湯平胃散之類風濕相搏一身盡痛防已

治法集四卷

黃芪湯佳濕盛而氣實者以神祐丸舟車丸

下之虛者補脾滲濕肥白人怠惰是濕痰

氣虛二陳人參白朮瘦人怠惰是血虛有熱

黃芩白朮歸芍濕盛身痛小便不利體重發

渴者五苓散加羌活一倍煎服妙

若因浴出未解裙衫身上未乾忽爾熟睡攻及

腎經外腎腫痛腰背攣曲只以五苓散一貼入

真坏少許下青朮香九如此三服臟腑纔過腫

消腰直其痛自止

勝

脾胃爲水穀之海七情勞碌鬱悒內傷脾弱不
能運化水穀之氣拂鬱成熱熱氣燻蒸釀成濕
氣傳化不及漬入四肢爲腫爲痛人壯氣實而
初病者先攻其濕滲利小便虛人攻補兼施健
脾導水乃標本兼治若一槩妄治愈攻愈虛腫
痛愈甚漸加氣短妄認爲喘五子五皮反瀉其
氣卒至天枉莫之能悞悲夫

麻黃白朮散治感風濕身痛無汗發熱者

麻黃白朮甘草桂心杏仁

治法集四卷

五十

水煎服

羌活勝濕湯治感風濕脊痛項強腰似拆項

似拔上衝頭痛及足太陽經不行

羌活獨活藁本防風蔓荊子

川芎甘草

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃柏

一錢附子三分蒼朮二錢水煎服

平胃散治脾胃不和濕氣阻碍清道用此以

平其壅壅

蒼朮

米泔水厚朴

陳皮

各三斤

甘草

炒三

右爲細末每服五錢薑棗煎入鹽一捻或沸

湯點服

防已羌活湯

治風濕相搏客在皮膚四肢少

力關節煩痛脉浮身重汗出惡風

防已

錢一分

甘草

炙五分

白朮

半七錢

黃芪

二分

薑棗煎服喘加麻黃胃不和加芍藥氣上衝

加桂心下有寒加細辛

治津藁四卷

濕

五十一

升陽除濕湯

治脾虛不能運化濕盛瀉泄見

瀉門

三花神佑丸

見痰門

舟車丸

大黃

二兩

甘遂

大戟

羌花

青皮

陳皮

各一兩

牽牛

頭末

木香

半兩

右爲細末水丸桐子大每服六十九白湯下

二方藥性慄悍非氣實濕盛認真者不可輕

用慎之慎之

滿

治脾虛手足浮腫小便赤澀氣急

赤茯苓

澤瀉

香附子

桑白皮

大腹皮

陳皮

乾薑

各等分

病後產婦須大補脾虛回腫自消

蒼朮丸有塩酒二製者有加童便米泔四製爲

丸者無非滲濕補脾以脾喜燥故也大抵肥

盛人宜此瘦人液少忌用

一切痰涎濕熱蘊結臟腑秘澀腸胃積熱留飲

治法藥四卷

濕

五十一

神芎導水丸佳卽神芎丸減黃連薄荷川芎

各五錢是也

澤瀉水香散

澤瀉

茯苓

猪苓

白朮

木香

澤瀉

木通

甘草

桂枝

滑石

原方爲末湯調不若煎服妙

經驗白朮酒治中濕遍身疼痛不能轉側及皮

肉麻痺着膝白朮一兩無灰酒盞半煎一盞去

滓

甘草附子湯 治風濕相搏，一身盡痛，不得屈伸，近之痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，身體微腫而痛。

甘草 桂枝 附子 白朮
薑棗煎服

瓜蒂散 治寒濕中頭，面黃鼻塞而煩，脈數大，瓜蒂一珠為末

右以些少吹鼻中，其水自下，濕痰濁液留于上焦，頭目肩背脹痛麻痺者立驗。

辨法彙編四卷

五十三

脈澀而緊或浮而弦或細而澀或芤而虛

大者因血虛有火變為燥病，易曰：燥萬物者莫熯乎火是也。在外則皮毛枯槁，在上則咽乾口燥，在中則煩渴不已，治宜生津養血，涼血滋陰，潤燥切忌燥劑，如半夏蒼朮之類。

丹溪曰：皮膚皴揭，拆裂血出，大痛或肌膚燥痒，皆火燥肺金燥之甚也，宜四物去川芎，加麥門冬、人參、天花粉、黃柏、五味子之類治之。

治法彙編四卷

五十四

生血潤燥飲 治血中有火，時值秋燥，皮膚拆裂，手足枯燥，搔之血出，痛楚指甲反出，而莫能搔痒。

川歸 生地 熟地 黃芪各一錢 天門半錢

麥門錢一 五味九粒 片苓五錢 括蕤仁

桃仁泥各五分 酒紅花一分 升麻二分

水煎服，大便秘加麻仁、郁李仁。

瓊脂膏 治血虛皮膚枯燥及消渴等症。

生地黃二十斤洗淨細搗取汁 鹿角膠一斤

白沙蜜二斤煎一其乳酥油一斤

生薑二兩搗取真汁

先將地黃汁文武火熬數沸以絹濾取淨汁

又煎二十沸下鹿角膠次下乳酥及蜜同

煎良久候稠如餠以磁罐盛每服一二匙

空心溫酒調下

瓊玉膏 治症同前及肺虛咳嗽甚者見虛損

天門冬膏 治血虛肺燥皮膚拆裂及肺痿唾

膿血症

治法彙四卷天門冬五五

天門冬新掘者不以多少無則用乾者去皮心潤透搗爛絞取汁澄清以布濾其查用銀砂鍋慢火熬成膏

每用一二匙空心溫酒調服

地壘煎治諸燥症

山藥一斤杏仁去皮生牛乳汁二升

右將杏仁研細入牛乳山藥拌勻絞取汁用

新磁瓶密封重湯煮一日每服一二匙空

心溫酒或湯調下

和血益氣湯 治口燥舌乾便數舌上赤脉此

藥生津液除乾燥生肌肉見消渴門

潤燥湯 治大便秘塞乾燥結硬兼喜溫

飲陰頭退縮舌燥口乾眼澁難開等症

生津甘露湯一名清涼飲子

治消中能食而瘦口乾舌燥自汗大便硬

小便數

生津甘露飲同上法

辛潤緩肌湯 治諸燥機渴及皮膚燥澁等症

四方俱見消渴門

潤腸丸 治大腸乾燥秘結能潤燥和血

潤燥湯 治同上

活血潤燥飲 治大腸風秘血秘常燥結

通幽湯 治在幽門以辛潤之四方俱見秘結

中寒

脈沉遲或伏或微弱外症四肢強直口噤目瞑面色清白或自汗或吐利卒然得于嚴寒之時氣虛表弱寒邪乘虛直入于三陰之經所致與中風相類但脈不浮無痰聲為異耳當溫中散寒兼表症脈浮遲微弱者五積散沉遲而微者理中湯加桂枝重者加附子乃倉卒受邪暴病不分經絡惟當溫補參朮炮薑肉桂有汗加黃芪脈不至加當歸

治法彙函卷中寒

五十七

五積散用附子一枚炮熟細研入真臘茶一錢用一半水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫服之

五積散 治表裏虛豁寒傷內外外症身痛脊強頭疼惡寒或熱或不熱內証中脘臍腹絞痛吐瀉霍亂脈沉伏欲絕者急煎投之

川芎 當歸 白芍 二陳 桂

麻黃 桔梗 枳殼 厚朴 炮薑

人參 白芷 蒼朮

真武湯

治寒中少陰小腹絞痛小便不利四肢沉重瀉利

附子 茯苓 白芍 生薑 白朮 水煎服

真武湯 陰証直中腎少陰之經急事後感寒或多慾陽虛寒乘虛入臍腹絞痛手足青紫厥逆脈微欲絕急煎附子理中湯外用葱一束如茶盞大扎緊切一指厚一段置臍上以熨

治法彙函卷中寒

五十八

斗火熨之熱氣透入腹逼邪外出為佳中寒脈伏昏愴急用艾灸丹田氣海二三十壯以續陽氣妙

凍厥人微有氣速灸丹田灌薑湯即活若用火烘逼寒入心則大咲而死與熱厥人不可與冷水義同

理中湯

人參 白朮 甘草 乾薑 炮

水煎服

傷寒病中惟此最難要得其肯綮耳其詳
細具見六書此特鈞其玄耳醫者先看
六書後從此用藥自無差忒矣

霜降以後春分以前凡有頭痛惡寒四肢拘急
身大熱脉浮而緊者是即病傷寒須麻黃湯加
羌活防風川芎汗之脉淨身涼爲愈看所挾而
兼用藥如汗出不輒仍見太陽証猶宜汗之不
解即傳變矣須分經絡

脉浮而長或目痛鼻乾不眠屬陽明升麻葛根
湯加減 脉弦而長外症耳聾脇痛嘔吐屬少

陽半表半裏小柴胡加減 脉不浮而沉數腹

脹滿咽乾自利也屬太陰柴苓湯加減 脉

沉數有力而洪舌乾口燥屬少陰黃連解毒白

虎陷胸大柴胡湯選用 脉愈沉數舌卷陰囊

縮煩躁脹滿屬厥陰三承氣看輕重用 小腹

脹滿小便自利其人如狂爲畜血一名熱入血

室男女俱有此血室在男子則下血譫語在女

子則經水適來適斷其血必結小柴胡加歸尾

調之 男子譫語其血自下者吉 結而如狂
發黃者桃仁承氣湯

此六經脉症治法大略如此至有隨機應變又
有不同或發汗或解肌或和解或分利或攻下
或潤燥神而明之存乎人初無定法大都不越
乎陰陽表裏寒熱虛實而已

其春夏秋三時有感冒非時暴寒而病者脉病
與傷寒同惟治法少異 表症見者羌活冲和

湯微汗之 汗後不解頭身不痛但熱不寒反

兼胸膈飽悶者小柴胡加枳桔口乾加小陷胸

裏症見者大柴胡湯微利之大抵四時此症

挾內傷飲食者十居八九治之須審輕重 左

脉浮緊大于右手外見表症內有微熱兼飽脹

惡心者屬外感重而內傷輕 右手緊滑大于

左胸口脹痛嘔吐寒熱頭痛身不甚拘急屬內

傷重而外感輕初起必先發散藿香正氣加減

後清熱消導 熱甚口乾黃胎心下硬痛屬

燥屎爲患咽胸白虎解潤之不已枳實導滯丸

勢盛用大柴胡或加砒礞如無外邪只從傷食治

脈沉遲微弱或雖大按之無力頭不痛但身痛如被杖四肢厥逆或雖渴不欲飲水舌上白胎躁極欲坐臥于泥水中或腹痛瀉利者屬陰屬寒脈浮數弦長形壯有力頭痛身熱煩渴引飲舌乾口燥目赤唇焦屬陽屬熱脈浮緊或浮緩若浮緊有力無汗為表實浮緩無力有汗為表虛頭痛脊強目脹惡寒發熱為表實

治法彙編卷四傷寒

六十一

脈沉實而數或遲沉實有力為裏實虛遲無力為裏虛腹堅滿痛多日不大便屬裏實脈微澁虛浮無力自汗短氣出言懶怯手足冷逆身雖熱而神短屬虛脈實形壯有力或洪身熱無汗出言壯厲躁亂不寧為實邪氣盛則實凡狂妄中滿嘔吐頭痛拘急按之石硬二便秘塞一切有餘皆實也正氣奪則虛凡倦怠體羸不食不眠喘汗一切不足皆虛也脈不浮不沉或弦或長或數或洪外無表症內無

近但寒熱往來口苦或脇痛或胸滿者屬半表半裏此病之常脈症如此其變又有不同浮為表症浮緊有力外症無汗惡汗為表實浮緩無力外症自汗惡風為表虛沉為裏症沉實有力內見腹滿堅硬大便硬咽乾口燥舌胎為裏實沉遲無力外症面青厥逆腹痛瀉利嘔吐為裏虛脈數為熱浮數為表熱沉數為裏熱數而有力惟實熱無力為虛熱

治法彙編卷四傷寒

六十二

按全無者必是伏陰忌下涼劑犯之必死以發前人之所未發言哉言乎第內傷元氣一病脈皆無力不可不辨皆當以所兼之症并所得之因參之庶無差謬或元氣素弱色慾過度腠理疎豁寒邪乘虛而直入于三陰之經故曰陰症乃初起不見熱症暴病也若不卽治逼其虛陽上攻反見面赤煩躁等熱症名陰盛格陽一名陰極似陽其躁時欲坐臥于泥水中內雖渴不欲飲水脈又無力以此別之

有病本屬陽未傳入裏悞服涼藥過飲冷水變為陰症或過食冷物或食後飲冷水為食陰之病皆當從陰治而用炮薑肉桂等熱劑若脉雖無力外症身熱自汗體倦手足心熱忽時作寒口不知味出言懶怯者自屬內傷元氣補中益氣湯之病當從內傷門若將內傷元氣陰虛之病悞認為伏陰妄投熱藥禍不旋踵法具內傷門

兩感

治法彙四卷

傷寒

初起頭痛脊強表症又兼口渴燥渴等裏症是為兩感謂表裏俱感也三陽經形症兼三陰形症表裏不一治難措手所以多效善治者當審孰急以法治之如表症多者當先解其表裏症多者當先攻其裏仲景所謂治有先後是也余常以六神通解散加苓連次用解毒合白虎加熟大黃往往獲效要在臨時變通耳

合病併病

三陽經或二陽經悉受其邪相合而病者為合

病多自利一經病未盡又過一經其邪歸并于一經者為併病當隨症施治無越表裏汗下和解一症濕暍風溫風濕溫瘧痰飲食積虛煩內傷皆類傷寒脉症相類也不得與傷寒同治各見本門

傷寒見風傷風見寒

外症屬傷寒頭痛脊強無汗惡寒而脉浮緩為傷寒見風以傷寒之症見傷風脉也外症屬傷風目汗惡風而脉浮緊為傷風見寒以傷風之

治法彙四卷

傷寒

症而見傷寒之脉也二者為榮衛俱病冬時用大青龍湯麻黃杏仁以散榮中之寒桂枝石膏以解衛中之風風宜辛散寒宜甘發辛甘相合乃能散榮衛之邪也他時羌活沖和妙

麻黃湯 冬月正傷寒表藥

麻黃 桂枝 杏仁 甘草

每服三錢

桂枝湯 冬月傷風表藥

桂枝 芍藥 甘草

每服一錢

葛根湯 陽明經表藥

葛根	赤芍	蔥白	生薑	麻黃	大棗
小柴胡湯	少陽經和解藥				
柴胡	黃芩	半夏	人參	薑棗煎	
薑棗煎					
小青龍湯					
桂枝	芍藥	甘草	五味子	生薑	
麻黃	半夏	細辛	每服五錢	水煎服	
大青龍湯	治傷寒見風傷風見寒煩躁頭痛				
身熱兼有水伏胸膈					
治法彙編卷四傷寒					
麻黃	桂枝	杏仁	甘草	石膏	
薑棗煎					
大柴胡湯	治表熱未淨裏症又急不得不下				
只得以此湯通表裏而緩治之					
柴胡	黃芩	半夏	赤芍	大黃	
枳實					
薑棗煎量輕重下藥					
大承氣湯	大熱結實用之乃三焦俱受病痞				
滿燥實堅全見					

硝石	大黃	枳實	厚朴	甘草	
厚朴枳實去滿大黃瀉實去熱硝石鹹寒潤					
燥軟堅薑棗煎					
小承氣湯	病在上焦則為痞實前方去硝石				
恐傷血分之真陰謂不伐其根也					
調胃承氣湯	病在中焦則有燥實堅三症用				
調胃承氣湯前方去枳實厚朴恐傷上焦虛					
無氤氳輕清之元氣					
桃仁承氣湯	治下血譫語或經水適斷下盡				
治法彙編卷四傷寒					
黑物則愈					
桃仁	桂枝	硝石	大黃	芍藥	
節菴加柴胡	青皮	甘草	枳實		
薑三片煎成搥法加蘇木汁三匙					
小陷胸湯	邪傳心下未全入胃用此以瀉心				
下之邪					
半夏	黃連	瓜蒌	薑棗煎		
大陷胸湯	下早邪客心下按之實硬痛大結				
胸也用此瀉之					

芒硝 大黃 甘遂

白虎湯 治正陽明府症舌乾口燥或下後舌不潤煩渴

石膏 甘草 知母 粳米

玄參升麻湯 治少陽陽明二經熱盛咽痛斑毒不出

玄參 升麻 甘草 白水煎

黃連解毒湯 治汗下過經不解一切壞症傷寒餘熱不淨神方

治法要四卷 傷寒

黃連 黃柏 梔子 黃芩

涼膈散 治上焦熱盛及雜症熱極生風見火

九味羌活湯 治非時感冒見疫門

六神通解散 解利兩感及春夏感冒暴寒頭痛寒熱躁渴

麻黃 滑石 石膏 蒼朮 甘草

豆豉 黃芩 薑 蔥

煎服取微汗愈

久汗不出藥中加青皮紫蘇則出

傷風

尋常傷風頭痛眼脹鼻塞涕淚咳嗽脈浮數者火鬱于上也參蘇飲加桑杏妙在木香○冬月加麻黃輕于解散不必大取汗也

參蘇飲 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發

以為熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃

湯法以被蓋臥連進數服微汗即愈尚有餘

熱更徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連

日頻進此藥以熱退為期不可預止雖有前

治法要四卷 傷風

李八

胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能

寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆

惡心開胃進食無以喻此母以性涼為疑一

切發熱皆能取効不必拘其所因也小兒室

女亦宜服之

乾葛 前胡 半夏 人參 茯苓去皮各七分半

木香 枳殼炒 桔梗 甘草 紫蘇葉

陳皮去白

水一盞半薑七片棗一枚煎六分去渣溫服

不拘時

藿香正氣散

治傷寒頭痛憎寒壯熱或感濕

氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉脚
轉筋 加香薷扁豆黃連名藿薷湯

大腹皮

白芷

茯苓

蘇莖葉

藿香

各三

厚朴

白朮

陳皮

去白

苦梗

半夏

各二兩

炙甘草

一兩

右每服三錢薑三片棗一枚煎熱服

治法錄四卷

傷寒

六

瘟疫

眾人一般長幼相傳染乃天行疫癘也然毒氣
滋蔓甚于燎原迎之者靡不焦爛良工須詳脉
症分別經絡庶乎用藥無悞今將古今經驗大
法疏注于左以為初學之楷梯云

瘟疫初起表症見者九味羌活湯敗毒散消息
散之微汗而解如已汗而熱不解脉洪而長或
弦急眼脹鼻乾或耳聾脇痛少陽陽明症見者
柴葛解肌湯主之如再不解須看有無斑症

治法錄四卷

瘟疫

七

或心煩不安身痛如束或足冷耳聾或咳或嘔
便是發斑之候升麻葛根湯主之以斑盡出為
度脉伏心煩謂之欲斑煩止人淨肌膚中無隱
隱之狀始為斑靜斑已出而口乾脉洪用竹葉
石膏湯以化之洪而無力兼體虛煩渴者方加
人參麥門冬知母冷汗出自愈脉洪數有力
心下硬痛舌乾而胎色漸黃黑色乃燥糞為患
也大柴承氣看微甚而下之更衣舌潤為愈
或燥糞未淨舌仍燥者量元氣虛實斟酌湯劑

熱而氣虛者小陷胸湯加枳實柴胡厚朴或枳實導滯丸徐徐調理取下滯爲佳 臬壯而氣實者猶當下之若汗後不解身不疼不煩躁但身熱而嘔者小柴胡加減和之若心下有滯而裏熱淺去苓加消導藥 膈上滿悶小柴加枳桔心下脹滿小柴胡加枳實厚朴 三四日不解熱又漸深煩渴硬痛關寸實大有力分輕重下之 若無裏症但熱而瀉者小柴對五苓散渴者去桂留苓不渴者去苓留桂 內有寒而腹痛理中湯溫之須脈沉小不渴無熱虛方可用之服後痛瀉俱止但熱未淨仍用小柴胡和之 亦有伏寒在內遏其虛火上攻反面赤煩躁欲坐臥于泥水中飲水卽吐爲陰極似陽之症者又不可不辨 陰寒之痛綿綿不止雖脈洪大按之無力陽症之痛時作時止脈實有力小便必數而黃但煩不躁此爲異耳 若傳染在春夏間熱症殊多寒症差少若脈來洪數無表裏症但目赤唇焦煩渴昏憤當用涼膈散

去硝黃加解毒一二味 勢甚者三黃石膏湯至之汗熱止爲愈其妙正在麻黃今人不知臧去往往失得取效 若表已解小便不利是膀胱本病五苓散之桂不可減 熱毒鬱極必發黃小柴合去桂五苓散不退用茯苓滲濕湯發狂不識人臍實者大柴胡加當歸微下之 狂而自利先用柴苓不應三黃石膏解之 若初起未的且先以敗毒散發之看歸在何經隨經施治 大都疫初起宜辛涼解散次則和解解毒必裏症全具而脈實舌燥口乾心下堅滿方可攻下若飲食在胃脘中未曾腐熟糟粕未成雖岑連瓜萸等俱不可用况硝黃乎世有潤腸丸一方原爲腸中熱甚津液乾涸薰得燥而滯于幽門之分不得出以致小腹滿悶或痛故用桃仁泥栢子等油潤藥以潤其燥使尿易下乃立方之初意也今人不知惟務速效競以大黃巴豆類聚成丸若糞未燥尚在胃中未入廣腸一藥用之食爲苦寒所鬱結而不下中氣被

傳傳導失職宜乎有結胸之變也予小子非敢
妄議第恐入門之士憚而難及也奉居司命之
職不容不辯明哲幸諒之若夫已解餘熱不
盡其人狂而不甚小腹硬滿小便自利乃畜血
爲患也宜桃仁承氣加減

饑荒歲多疫然荒必因水旱氣候失和偏寒偏
燥加以飲食失節以身之虛逢天之虛則病作
歲在萬曆壬午久旱民饑熱疫流行起于寒熱
拘攣次變斑黃狂躁死者相繼大都渴躁發班
治法集四卷 瘟疫 七十三

者多右氣口脉多大皆饑飽不時所致用人參
敗毒散先發其表次用人參柴胡湯以和解右
脉大于左有汗心下不脹無表裏症見者補中
益氣湯活者甚多因中氣先因饑餒受虧已屬
內傷不足之病若用正傷寒之法大汗大下寧
不殺人

疫病當分天時寒喧濕燥病者虛實安逸因時
制宜不可拘泥如久旱天時多燥熱疫流行忌
用燥劑宜解毒潤燥天久淫雨濕令大行脾土

受人民多寒疫多兼瀉利忌用潤劑宜滲瀉理

丙戌壬午二年冬旱病從順頤腫先用敗毒散
微汗之次以酒岑連薄荷玄參甘桔鼠粘子升
麻連翹大便實者加熟大黃頻頻緩服多効一
人多用犀角水加服亦是散陽明經邪熱也効
疫氣中人有淺深由所稟異也表實則感邪輕
而淺體虛則感邪重而深治當從中而用陽明
少陽二經藥目痛鼻乾脉弦而長屬陽明升麻
葛根湯往來寒熱耳聾脇痛脉弦而數屬少陽
小柴胡湯隨症加減殊爲切當

治法集四卷 瘟疫 七十四

丹溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有三
宜補宜散宜降用大黃黃芩黃連人參防風滑
石紫草人中黃神曲糊丸每服六七十丸氣虛
四君子下血虛以四物湯下痰多二陳湯下熱
甚者加童便

瘟疫渴用小柴胡加石膏知母 濕瘟渴蒼朮
白虎湯

三黃石膏湯 春夏溫熱時三六七日舌燥目赤班後用此神効

石膏三錢 黃芩 黃連 黃柏各錢半 鼓半合

麻黃錢一 梔子

水煎熱服 敗毒散 治瘟疫初起表藥四時通用

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎

枳殼 桔梗 白朮 人參等分 甘草減半

右爲末每服三錢加生薑三片水盞半煎至治法彙四卷 瘟疫 七十五

一盞溫服或沸湯點服亦可此藥治瘟疫

表症効

九味羌活湯 見傷寒門

黑奴丸 治瘟疫發班煩躁大渴及時行熱病

六七日未得汗脉洪大而數面赤目眩身痛

大熱狂言欲走渴甚及五六日已上不解熱

在胸中昏憤譫妄或不能言爲壞傷寒醫所

不治棄爲成人精氣已竭心下尚溫拈照口

瀝之藥下卽活

黃芩 釜底煤 芒硝 麻黃 梁上塵

小麥奴 灶突墨各一 大黃三錢

右爲細末鹽丸二大新汲水化服服下足發

寒寒已汗出乃瘳時頃不汗須見微利若

不瘳不可與此藥

大無神木散 治四時瘟疫頭痛項強增寒壯

熱身痛山嵐瘴氣之妙劑也

陳皮錢二 蒼朮 厚朴各一錢 甘草 石菖蒲

各一 藿香

治法彙四卷 瘟疫 七十五

右爲細末作一服薑三片棗一枚水盞半煎

一盞去渣溫服一方無菖蒲有香附一錢

名神木散氣散

一家傳染者緣家有病人則憂患而飲食少食

少則氣餒時與病人相近感其病氣從口鼻

而入治須兼舒鬱

張三錫曰瘟疫已經發而熱不止右氣口弦

滑症兼惡心飽悶躁渴必是宿滯太多消導爲

主不必論班黃等候口舌燥加瓜蒌仁潤之不

已十數日不大便大柴胡微利之更衣熱自止
○已汗而熱不解心下飽兼惡心必是宿食爲
患消導爲主比比皆是

若已汗而熱不清身漬漬汗出右寸關雖弦大
按之無力心下痞不飽四肢倦怠屬中氣弱
內傷虛熱補中益氣湯主之汗止身涼爲愈一
屬有餘一屬不足有餘誤作不足猶不大害不
足認作有餘必不可救

時毒

疫毒發于面鼻耳項作腫如疽癰相傳染者是
古表有裏有虛有實脈浮作寒熱多形急頭
眩無汗宜散毒散汗之或解毒升麻湯

脈沉數或滿口乾舌燥不惡寒自汗煩渴大便
硬痛邪在裏五利大黃湯下之

表裏症俱見勢急脈弦數舌乾惡寒者防風通
聖散解毒攻裏無表裏症者或已經汗下腫不

消者小柴胡加連翹玄參花粉酒岑連桔梗鼠
活湯藥四卷 瘟疫

七十八

粘子薄荷和解之

腫甚痠痛汗下不消宜砭去惡血內服解毒藥

勢不可散欲膿脈弱不潰者宜托裏 荒歲普

患者不宜峻劑宜扶正祛邪審而治之 咽下

腫痛水漿不入甘桔湯加鼠粘子先須荆防敗

毒散 衆人一般無表裏症但腫而熱普濟消

毒飲解之 機年傳染先因胃虛飲食不節邪

乘虛入宜從輕治發散解毒必加人參以固元

氣 時毒微腫咽喉不利頻用通氣散取嚏

大抵初起如傷寒五七日間能殺人治者宜精辨之不可驟用托裏藥須憑脉症有表症脉浮者宜汗有裏症而脉實者宜下脉沉濇者邪氣深氣實之人宜急服化毒丹以攻之熱實大便不利大黃湯下之在表者解毒升麻湯又于鼻內噴通氣散取十餘嚏以泄其毒喘藥不嚏不可治左右侍疾之人時用噴藥嚏之必不傳染經三四日不解者不可大下猶宜和解犀角連翹散主之至七八日二便通利頭面腫起赤而黏法彙四卷 瘡疫 七十九

高者可服托裏散黃芪散宜針鏃砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死此疾有陰有陽有可汗有可下常見粗工但云熱毒驟用寒涼不知病有輕重治有逆從豈容輕忽也

荆防敗毒散即人參敗毒散加二味

防風通聖散 見風門

葛根牛旁子湯 治時毒脉數而有力者

葛根	管仲	甘草	江西豆豉
牛旁子	半生半炒	各二錢	
右一劑水二鍾煎一鍾熱服			
五利大黃湯	治時毒燉腫赤痛煩渴便秘脉實數		
大黃	煨	黃芩	升麻
芒硝	各二錢	梔子	各一錢
右作一劑水鍾半煎六分服			
梔子仁湯	治時毒大便秘塞脉沉數		
治法彙四卷	瘡疫		
鬱金	枳殼	去穢	升麻
山梔子仁	炒		
大黃	煨	牛旁子	炒研各等分
右為細末每服三錢蜜水下			
消毒托裏散	治時毒已經汗下解毒不消勢欲成膿未成即消已成即潰		
人參	黃芪	鹽水拌炒	當歸
白朮	炒	茯苓	各一錢
白芷	七分	甘草	五分
金銀花	七分		
水二鍾煎八分分瘡上下食前後服之			

治時毒法無出外科心法學者宜熟記之犬抵
熱不止不可與穀食恐助邪熱也脉虛無停滯
者不在禁例
外用紫金錠水磨傳

大頭天行

丹溪曰大頭天行乃濕熱在高顛之上用羌活
及酒黃芩酒大黃隨病加減切不可用峻藥
東垣曰陽明邪熱太甚資實少陽相火而爲之
也濕熱爲腫木盛爲癰此邪見于頭多在兩耳
前後先出治法大不宜藥速速則過其病所謂
上熱未除中寒復生必傷人命宜用緩藥徐徐
少與當視其腫勢在何部分隨經處治之陽明
爲邪首大腫少陽邪出于耳前後也

治法彙四卷六瘟疫

八十三

二黃湯 治大頭病

黃芩

酒製 炒 黃連 酒製 生甘草 各等分

右細切每服三錢水一盞煎七分溫服徐徐
呷之如未退用鼠粘子不拘多少水煎入
碎硝等分亦時時少與不可驟用飲食如
不消只服前藥取大便邪氣已則止

前方宜各加引經藥陽明湯加石膏少陽湯
加瓜蒌根陽明行經升麻芍藥甘草葛根
太陽行經甘草荆芥防風並與上藥相合

服之或曰頭痛酒岑舌乾口渴乾葛身痛
菟活桂枝防風芍藥酌而用之十餘日
症仍在惡寒頭痛身痛無汗者仍用菟活
防風紫蘇薄荷連翹花粉微散之有下症
者大柴胡湯微利之

普濟消毒飲子 泰和二年四月民多疫癘初

覺增寒壯熱體重次傳頭面腫盛目不能
開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭傷
寒諸藥罔効漸至危篤東垣曰身半已上

治法黃四卷 癰疽

全主

天之氣邪熱客于心肺之間上攻頭面而
為腫須用下項藥共為細末半用湯調時
時呷之半用蜜丸嚥化服盡良愈時人皆
曰僊方遂勒諸石以傳永久

黃岑

半兩酒
炒

黃連

同上

陳皮

去白
二錢

甘草

二錢

連翹

錢一

玄參

錢二

白殭

七錢

升麻

七分

柴胡

五分

桔梗

三錢

板藍根

一錢

馬勃

一錢

鼠粘子

研

右為末服如上法或加防風川芎薄荷當歸

身細切每服五錢水煎徐徐熱服亦可
大便秘加酒蒸大黃一錢或二錢以利之
腫勢盛者以砭刺之

人中黃解毒毒大效用大竹下留節內大國老
于中塞緊豈豈缸中冬月起至春分取出將竹
外淨洗晾風處待乾收罐中待用

春夏初晴山谷蒸氣胃弱者感之面腫發寒熱
先用平胃散加菟活防風荆芥桔梗等微散之
次加酒岑連以降熱

治法黃四卷 癰疽

全主

山嵐瘴氣毒霧皆濕熱也山廣嶺南人中之即
久緣中多毒蛇所吐之氣故耳行者預宜大補
氣微飽食更飲酒則邪氣不浸

時毒從頤頤腫者名鷓鴣瘟俗以耳下頸與咽
中腫脹聲不得出者為蝦蟆瘟皆風熱不正之
邪傷于上焦所致防風通聖散加減先散後兼

解毒或先以小柴胡加防風菟活荆芥薄荷桔
梗煎服外以側柏葉搗汁調大蚯蚓糞傳之或
用丁香附子尖南星醋磨傳之或五葉藤車前

世學司提汁傳之

冬應寒而反溫、人感之多咽喉腫痛、甘桔湯加減、

夏應熱而反寒、感之伏于少陰之經、咽痛且瀉、

名腎傷寒、宜半夏、桔梗、甘草、各一錢、薑五片煎服、

人黃散 治四時疫癘

糞釘 岬置風露中半日者甘草三錢辰砂

雄黃各錢半

治法彙四卷 疫癘

全五

右為細末、每服二錢、煎薄荷、桔梗湯送下、日

三服、濕盛作瀉、加藁本、白朮、風能盛濕也、

萎蕤散 治冬瘟頭面腫

萎蕤二錢半石膏錢半麻黃 白薇 羌活

杏仁 甘草 川芎 青水香各半錢

家菊花錢半

右水煎服

仲景曰、三月四月其時陽氣尚微、為寒所拆、病

熱、五月六月陽氣已盛、為寒所拆、病熱、則

七月八月陽氣已衰、為寒所拆、病熱亦微、
天久淫雨、濕令大行人多腹疾瀉且痛、胃苓湯
加炮薑、肉桂、

寒四卷 疫癘

全六

班疹

有色點而無顆粒者曰班、春夏多此、皆冬月不謹邪乘虛入、至春變為溫病、至夏變為熱病、毒留積胃中、自然發、名曰溫毒發班。

疫氣傳染、多發班、大抵汗後熱不淨、煩躁、肝火便是發班之候、初見紅影、兼身痛者、升麻、葛根湯加羌活、防風、再表而出之、已出而熱盛、脉數者、小柴去半夏加花粉、連赤芍、連翹、薄荷、等辛涼藥、嘔者、大半夏湯加減、心下迷悶、

治法彙四卷

班疹

十七

氣口紫滑、又兼惡心、必是宿食、消導為主、兼清涼藥、瀉者、柴胡湯加減、班症或吐或瀉者、舌謂毒氣上下俱出也、舌乾口渴、煩躁、是毒聚于胃也、化班湯、或陽毒梔子湯、班症舌燥黃胎、即是陽毒發班、不問日數、便投白朮、合解毒柴胡一二味、心下脹悶而裏症見者、大柴承氣、看微甚而下之、發班兼咽痛、玄參升麻湯、勢盛者、陽毒升麻湯、大抵胃熱極、則發班、故升麻犀角乃陽明經升散藥、古方往往用之、勢

盛須兼解毒以降之、

內傷班、內傷元氣不足之病、誤作外感、虛火遊行于外、亦發班、第脉虛大、倦怠懶于言動、自汗為異耳、因氣血虛、亦身痛心煩、作熱若妄作外感、有餘治、立見傾危、速進補中益氣湯、熟眠熱止為愈、

丹溪曰、內傷發班者、胃氣極虛、一身之火遊行于外、宜補以降之、大健中湯佳、夏月蚊跡類班、謬者、誤認為班、而用班藥、殺人殊速、但先紅後

治法彙四卷

班疹

十八

黃者、蚊跡先淡後紅、赤者、班、又蚊跡多見于手足、發班多見于胸腹、欲班之脉、或隱或伏、多躁悶、

升麻葛根湯 治邪客陽明經、鼻塞眼痛、不眠、脉微洪、而長、班症未出者、

升麻 葛根 甘草 赤芍

薑棗煎熱服、頭痛加葱白、

陽毒升麻湯 治傷寒一二日間、身發班、闌或吐下後、變成陽毒、腰背脊痛、面赤狂言、或自

利脈洪大咽痛

射干 犀角 人參 甘草 黃芩

升麻

水煎

化斑湯 治斑已淨多燥陽明症見者即人參

白虎湯加玄參如無汗乾熱加蒼朮薑豉再解之

疫毒發斑無表裏症但發熱無汗葱薑豉煎

湯熱服妙

治法彙四卷

全九

玄參升麻湯 治發斑咽痛煩躁譫語

玄參 升麻 甘草

陽毒內外煩熱百節痛發斑舌燥兼辛涼解散

陽毒梔子湯主之

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥 各一錢

石膏 二錢 知母 半錢 杏仁 七分 柴胡 一錢

甘草 五分

薑三片豉一百粒煎熱服

內有伏陰或悞服涼藥過其虛陽浮散于外而

陰斑雖洪大按之無力或手足逆冷過乎

肘腋者先用炮薑理中湯以復其陽次隨症治

仲景陰毒升麻鱉甲湯專主陰斑凡老宜審之

君內傷冷食外感寒邪而發陰斑調中湯最捷

升麻鱉甲湯

升麻 二錢 當歸 二錢 甘草 各一錢 蜀椒 二十粒

鱉甲 二錢 雄黃 一分

水二鍾煎一鍾調雄黃末服

調中湯 治內傷外感陰斑

治法彙四卷

九

蒼朮 半錢 陳皮 一錢 砂仁 藿香 芍藥 各一錢

甘草 桔梗 去蘆 半夏 湯泡 七次 羌活 各一錢

枳殼 各七 川芎 五分 麻黃 桂枝 各三

白芷 七分

薑三片煎七分溫服

黑膏治溫毒發斑冬月大溫人受不正之氣至

春發斑如錦紋脉浮散屬陽沉伏屬陰用此

以消疫毒

生地 半斤 香豉 一斗

右二味細切以猪膏二斤合煎之取濃如膏

用雄黃麝香如豆大肉中搥勻每服彈子

大白湯化下

大建中湯 治中氣不足無根失守之火出于

肌表而為斑斕的進此益愈須脉大無力倦

怠懶于言動乃可用

人參 黃芪 當歸 芍藥 桂心

甘草 半夏 黑附子 薑棗煎服

大青四物湯 治瘟疫發斑

治法集四卷 斑疹

大青 阿膠 甘草 香豉 一合

水煎服

疹

疹屬風熱浮小有顆粒隨出即沒而又出一翻

者是亦有痰熱在肺不得散發于皮毛而變此

者先須微汗以散次化痰清肺與小兒痧同遍

身作痒抓之即成大疙瘡俗名冷飯疙瘡屬血

熱生風消風解熱為先不可驟與寒涼必先升

散

丹毒俗名火丹言皮色赤如丹是也四肢上下

俱有乃毒熱畜于血分隨經而變出于部也

方書言惡毒蘊畜于命門遇君相二火合熱即

發恐未盡病情若果發于下部命門之分方可

獨指此經大抵三陰受積熱膏梁厚味變此疾

者多若發于上部俗名赤遊風久之變癩無非

風熱毒之微甚耳防風通聖散加減

三錫曰一切風熱痧疹疙瘡丹毒已經升散而

內熱盛者涼膈散倍大黃瀉之大腑不秘脉弦

治法集四卷 斑疹

數多火宜涼血養血四物生地玄參連翹酒本

連

丹毒遇溫暖炎天宜辛涼解散寒月必兼辛散

丹毒先四肢而後入腹者凶

小兒丹毒屬胎毒剪刀草搗汁調原蚕沙傳之

愈

消風散 治風熱隱疹痒

荆芥 防風 甘草 陳皮 厚朴

蟬退 人參 茯苓 川芎 藿香

羌活 白殭蚕

右為末每服二錢荊芥湯下茶清亦可

加味敗毒散 治瘟疫及癰疹即敗毒散加生

地薄荷蒼朮白朮芍藥荊防大抵隨症出入

為佳

犀角消毒飲 治發斑癰疹內熱盛者

犀角磨水一錢牛旁子分四荊芥 防風各二錢

甘草

水煎加犀角水服

治法彙四卷癰疹

九三

解毒防風湯 治同上

防風 地骨皮 黃芪 芍藥 荊穗

枳殼 牛旁子分七

水煎服

丹毒害人極速雖有消毒升散等法無如砭之

為上其法用麻油塗患處以磁砭之毒血去即

愈詳見外科心法

其法用細磁器擊碎取有鋒鉞者以筋一根劈

破一頭夾定兩指輕撮筋稍令鉞磁正對患處

懸寸許再用筋一根頻擊助頭令毒遇刺皆出

却以神功散敷之毒入腹作痛者不救

一切丹毒疹痒癰疽熱小便秘者大連翹飲妙

大半夏湯見喉門

柴苓湯

大柴湯

大承氣湯俱見傷寒

補中益氣湯見內傷門

大連翹飲 治斑疹丹毒癰瘰或作痛及大人

治法彙四卷癰疹

九十四

小兒風熱癰痛作痒小便澀

連翹 瞿麥 荊芥 木通 芍藥

當歸 蟬蛻 甘草 防風 柴胡

滑石 山梔炒 黃芩各一錢

水煎服小兒為末服一二錢白湯下

治法彙五卷

肝江 張三錫 纂

金壇 王肯堂 校

脹滿

有寒有熱有氣滯有氣虛有血虛俱屬脾
寒初起脉沉伏或食寒涼傷脾而脹屬寒平胃
理中湯辛以散之

熱脉弦數膏粱酒色傷中濕熱鬱于中而脹者
屬熱小便必短數芩連梔子滑石苦以洩之大

治法彙五卷 脹滿

便秘而脉數有力者遇僊丹或茵陳梔子大黃
湯以通太便

氣虛脉緩弱無力或氣口大四倍于人迎食少
倦怠朝急暮寬屬中氣虛補中益氣湯加厚朴
氣不運加木香不能食者先用六君子湯

血虛脉弦數或瀉黑瘦口乾二便阻澀暮急朝
寬屬血虛四物加二冬蘇子紅花桃仁泥以生
血潤燥有大加薑製黃連大便秘用搜風頓氣
丸一二服

氣滯脾沉結或伏或弦晝夜不減頻數氣
滯因暴怒或抑鬱而成用木香流氣飲或七氣
湯增減

三錫曰脹滿悉屬脾虛運化不及濁氣填塞所
致初起微佐以消化舒鬱爲先勢盛而二便澀
滯者微利之弱人或稍久一切病後瘡疽後產
後必參木芪芍大補脾氣爲主而佐以消化厚
朴木香黃連三類然王道無近功必數十服以
漸取效常見用商陸牽牛等行水法一瀉卽消

治法彙五卷 脹滿

三日後復起而久者比比皆是良由病家不明
理醫者求速效天人天年悲哉歷考古今明醫
無踰于丹溪東垣薛新甫王損菴矣豈肯曠日
持久而不知剋伐之功速耶其如中氣何可與
高明言難與俗人道爾

肥白人腹脹多是濕痰二木二陳平胃五苓加
減瘦人腹脹是熱用炒黃連厚朴白芍香附
炙血有口嗜煎燂及熱酒物致血蓄于中而脹
者大便必見黑物抵當湯丸下之不若桃仁承

氣湯加紅花蘇木並汁佳

宿食如氣口紫滑惡心飽悶而脹者是食積口乾內熱者木香檳榔九或枳實導滯九下之

初起挾寒食而脈弦者木香厚朴丁香砂仁神麴香附

內有濕熱外被寒鬱而脹者用藿香麻黃升麻葛根桂枝亦表散之

怒則氣逆兩脇脹滿兩手脈弦青陳皮木香梔子仁蘆薈甚者當歸蘆薈九

治法彙玉卷四 脹滿

厚味太過脾傷運化不及而脹者二朮二陳加

薑製黃連薑製厚朴蘿菔子或保和九

因食肉過多而脹者山楂枳朮香附半夏麴有

火加炒芩連

脹而喘喘則必生脹脹則必生喘二者相因之

病脾不運而濁火上炎肺不得清則喘肺氣被

鬱喘而不得下降則脹治分新久虛實初起脈

實者二陳蘇子葶藶洩之二便通暢喘脹俱減

其功易

久病中氣弱食少多鬱悒人必用參朮補中藥佐黃芩麥冬以清肺其效難醫者不可因其難而妄攻下也

丹溪曰脾腹脹乃脾虛之甚必用大劑參朮佐

陳皮曰茯苓朮厚朴之類或曰腹已脹矣反用

參朮何耶曰乃內經塞因塞用之法正氣虛而

不能運行濁氣滯塞于中今扶助正氣使之自

然健運邪無所留而脹消矣

素問曰下氣虛乏中焦氣壅欲散滿則恐虛其

治法彙玉卷四 脹滿

下欲補下則滿甚于中况少服則資壅多服則

宣通遂乃峻補其下以疏啓其中則中滿自消

下虛自實乃塞因塞用也如下痢日百度反用

大黃通利乃因通而用通故曰塞因塞用通因

通用且參朮之性少用則滋壅于上多服則峻

補于下又曰中滿者必須峻補其下以疏啓其

中然氣既得峻補則上行而啓其中焦運行之

令使之疏通乃軒岐與旨世多不解因詳著而

發明之

補脾藥必佐薑製厚朴以其溫能益氣辛能寬
脹也

王損菴曰每見俗工不明其道專守下之則脹
已者一法耳雖得少寬一二日然真氣未免因
瀉而下脫而邪氣既不降必復聚成脹遂致不
救可勝嘆哉因書一二證以驗之嘉定沈氏子
年十八患胸腹身面俱脹滿醫治半月不效診
其脉六部皆不出也於是用紫蘇桔梗之類煎
服一盞胸有微汗再服則身盡汗其六部和平
治法彙五卷 脹滿 五

之脉皆出一二日其證悉平又一男子三十餘
胸腹脹大發煩躁渴面赤不得卧而足冷予以
其人素飲酒必酒後入內奪於所用精氣溢下
邪氣因從其上逆逆則陰氣在上故爲膜脹其
上焦之陽因下逆之邪所迫壅塞於上故發煩
躁此因邪從下而上盛於上者也於是用萸菜
萸附子人參輩以退陰逆水冷氣飲之以解上焦
之浮熱入咽覺胸中頓爽少時腹中氣喘如牛
吼泄氣五七次明日其證愈矣 風寒暑濕脹

藿香正氣散 七情脹五隔寬中散木香流氣
飲沉香降氣湯 或飲食所傷脾胃虛弱以致
水穀聚而不化此寒濕鬱遏而脹香砂調中湯
大熱而脹分心氣飲 憂思過度而脹紫蘇
了湯 濕熱內甚心腹脹滿小便不利大便滑
泄及水腫大楠皮湯 失機傷飽痞悶停酸早
食暮不食名穀脹大異香散 鷄矢醴治心腹
脹滿且食不能暮食由脾元虛弱不能剋制於
水水氣上行浸漬於土土濕不能運化水穀氣

治法彙五卷 脹滿

六

不宜流上下痞塞故令人中滿旦陽氣方長穀
氣易消故能食暮陰氣方進穀不得化故不能
食其脉沉實滑病名穀脹用鷄矢白半升以好
酒一斗漬七日每服一盞食後臨臥溫服脾土
受濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有
聲怔忡喘息名水脹大半夏湯 煩躁漉漉迷
忘驚狂痛悶喘惡虛汗厥逆小便多大便血名
血脹人參芎歸湯 有因積聚相攻或成或脹
者初用七氣消聚散日久元氣虛脾胃弱而脹

者參朮健脾湯少佐消導藥 瘀蓄久血而脹
 腹皮上見青紫筋小水反利脉扎滿婦人多有
 此疾先以桃仁承氣湯勢重者抵當湯如虛人
 不可下者且以當歸活血散調治 勞倦所傷
 脾胃不能運化而脹者補中益氣湯加減法見
 勞倦門 大病後飲食失調脾胃受傷運化且
 難而生脹者先以生滯調中湯次以參苓白朮
 散瀉利後并過服通利藥以致脾胃太弱而脹
 專以補脾為主若瀉痢未止間用胃風湯 喘
 治法彙五卷 脹滿 七
 滿不得臥虛則人參生脉散之類實者葶藶湯
 之類 胸膈滿脹一身面目盡浮鼻塞欬逆清
 涕流出當用小青龍湯二三服分利其經却進
 消脹藥 經久患泄瀉晝夜不止乃氣脫也宜
 用益智子煎濃湯服之愈 凡腹脹小腹脹皆
 有腎熱 三焦虛寒 石水腸癰 女勞疸
 診法曰脹滿脉弦脾制于肝洪數熱脹遲弱陰
 寒浮為虛滿緊則中實浮則可治虛則危急高
 陽生曰腹脹浮大是出脫虛小病深命應促

平胃理中湯
 補中益氣湯 見勞傷門
 遇僊丹
 茵陳梔子大黃湯 見濕門
 六君子湯 見脾胃門
 搜風順氣丸 見風門
 木香流氣飲 見氣門
 抵當湯 見蓄血門
 桃仁承氣湯 見蓄血門
 治法彙五卷 脹滿 八
 當歸龍薈丸 見脇痛門
 保和丸 見傷食門
 藿香正氣散
 五膈寬中散 見反胃門
 沉香降氣湯 見氣門
 木香流氣飲 見氣門
 香砂調中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸膈噎
 噎或胸腹脹痛
 藿香 砂仁 各一錢 蒼朮 一錢 厚朴 一錢

陳皮 半夏 茯苓 青皮 枳實各一錢

甘草一分

薑三片水煎食前服

蘇子湯 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便

不利脈虛緊瀼

真紫蘇子炒提碎 大腹皮 草果仁

半夏製 厚朴 木香 陳皮去白 木通

白朮 枳實炒各一錢 人參五分 甘草三分

治法彙五卷 脹滿 九

薑五片水煎服

大橘皮湯

橘皮 厚朴薑製 猪苓 澤瀉 白朮各二錢

枳榔 赤茯苓 陳皮 半夏 山查

蒼朮 藿香 白茯苓各一錢 木香五分

滑石三錢

薑三片水煎食前服

大異香散

平肝飲子 專治喜怒不節肝氣不和邪乘脾

胃心腹脹滿頭暈嘔逆脈來浮絃

防風 桂心不見火 枳殼 赤芍 桔梗

甘草 人參 枳榔 當歸 川芎

陳皮 薑棗煎服

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹及七情

所傷辛散鬱結也

三陳去甘草 平胃散加白朮 豆蔻

木香 益智仁 莫茱萸 升麻柴胡

澤瀉 乾薑 水煎服

治法彙五卷 脹滿 十

中滿分消湯 治中滿寒脹寒痼二便不通陰

躁厥冷食入反出中寒心痞奔豚寒疝

益智仁 半夏 青皮 柴胡 當歸

莫茱萸 木香茯苓 升麻川烏 澤瀉人參

華澄茄 黃芪 乾薑 厚朴 黃連

草豆蔻 黃蘗 薑水煎溫服

鷄屎醴散 治旦食不能暮食

大黃 桃仁 鷄屎乾者

右等分爲末每服一錢薑三片煎調臨睡服

肝江 張三錫

金壇 王肯堂

水腫

三錫曰水腫悉屬脾虛不能運化濁氣橫溢四肢頭面而為腫初起邪盛宜治標分在上在下仲景曰腰已上腫宜發汗腰已下腫宜利小便即內經開鬼門潔淨府之意開鬼門是發汗潔淨府謂利小便稍久即是脾虛補中行濕利小

治法彙五卷

水腫

十一

便治本為上策也丹溪曰因脾虛不能製水乃濁氣抑遏邪水非天一也水漬妄行當以參朮補脾土氣得實則自能健運自能升降運動其樞機則水自下非五苓之行水也腫病不一或遍身腫或四肢腫面腫脚腫皆謂之水氣然有陽水有陰水並可先用五皮飲或除濕湯加木瓜腹皮各半錢如未效繼以四磨飲兼吞桂黃丸仍用赤小豆粥佐之遍身腫煩渴小便赤澀大便多閉此屬陽水輕宜四磨

飲添磨生枳殼兼進保和丸重則疏鑿飲子利之以通為度亦有雖煩渴而大便已利者此不可更利宜用五苓散加木通大腹皮半錢以通小便遍身腫不煩渴大便自調或澹泄小便雖少而不赤澀此屬陰水宜實脾飲小便多少如常有時赤有時不赤至晚則微赤却無澀滯者亦屬陰也不可遽補木香沝氣飲繼進復元丹若大便不澹氣息脹滿宜四磨飲下黑錫丹四肢腫謂之肢腫宜五皮飲加薑黃木瓜各一

治法彙五卷

水腫

十二

錢或四磨飲或用白朮三兩咬咀每服半兩水一盞半大棗三枚拍破同煎至九分去渣溫服日三無時名大棗湯面獨腫蘇子降氣湯兼氣急者尤宜或煎熱去渣後更磨沉香一呷有一身之間唯面與雙脚浮腫早則面甚晚則脚甚經日面腫為風脚腫為水乃風濕所致須問其大小腑通閉別其陰陽二症前後用藥惟除濕湯加木瓜腹皮白芷各半錢可通用或以蘇子降氣湯除濕湯各半貼煎之羅謙甫導

滯通經湯治面目手足浮腫 感濕而腫者其身雖腫而自腰下至脚尤重腿脹滿尤甚於身氣或急或不急大便或澀但宜通利小便爲佳以五苓散吞木瓜丸內犯牽牛亦不可輕服間進除濕湯加木瓜腹皮各半錢炒萊菔子七分半 因氣而腫者其脉沉伏或腹脹或喘急宜分氣香蘇飲 飲食所傷而腫或胸滿或噯氣宜消導寬中湯不服水土而腫者胃苓湯加五皮湯 有

患生瘡用乾瘡藥太早致遍身腫宜消風敗毒

治法彙五卷

水腫

十三

散若大便不通升麻和氣飲若大便如常或自利當導其氣自小便出宜五皮飲和生薑五苓散腹若腫只在下宜除濕湯和生料五苓散加木瓜如澤瀉之數 已上數條爲有餘之症大病後浮腫此係脾虛宜加味六君子湯白朮三錢人參黃芪各一錢半白茯苓二錢陳皮半夏麴芍藥木瓜各一錢炙甘草大腹皮木瓜各五分薑棗煎服小便不利間入五苓散 有脾

虛者不能通調水道者宜用補中益氣湯

脾肺六味丸補腎 有心火尅肺金不能生腎水以致小便不利而成水證者用人參平肺散以滋肺滋陰丸以滋小便 若腎經陰虧虛火燦肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土肺脾腎之氣交通則水穀自然尅化二經既虛漸成水脹又誤用行氣分利之藥以致小便不利喘急痰盛已成蠱證宜加減金匱腎氣丸主之 已上數條爲不足之證○不足者正氣不足有餘者邪氣有

治法彙五卷

水腫

十四

餘凡邪之所湊必正氣虛也故以治不足之法治有餘則可以治有餘之法治不足則不可 澀古法如水腫因氣爲腫者加橘皮 因濕爲腫者煎防已黃芪湯調五苓散 因熱爲腫者入正散 如以熱燥於肺爲腫者乃絕水之源也當清肺除燥水自生矣於梔子豉湯中加黃芩 如熱在下焦陰消使氣不得化者當益陰而陽氣自化黃蘗內加黃連是也 如水脹之病當開鬼門潔淨腑也白茯苓湯主之 白茯苓

<p>右咬咀每服三錢水煎熱服無時</p>	<p>茯苓皮 <small>各等分</small> 一方加白朮磨沉香木香</p>	<p>五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮</p>	<p>兼治皮水妊娠胎水</p>	<p>目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急</p>	<p>五皮飲 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面</p>	<p>除濕湯 <small>見中濕門</small></p>	<p>食之宜空腹時進</p>	<p>頭鴨或白鴨治如食法細切和米并五味煮粥</p>	<p>治法彙五卷 <small>水腫</small> 十五</p>	<p>已上者煮熟取汁和冬瓜蔥白作羹食之青</p>	<p>度 冬瓜不限多少任喫 鯉魚一頭重一斗</p>	<p>丸如桐子大每服五丸日三漸增以小便利爲</p>	<p>之平復後忌房室猪魚蠶麪等物 香薷熬膏</p>	<p>苓湯下三十九以黃芪芍藥建中湯之類調養</p>	<p>水澤瀉各半兩爲末煎服三錢或丸亦可煎茯苓</p>	<p>從少服五七日後覺腹下再腫治以白朮散白</p>	<p>水一碗煎至一半生薑自然汁入藥常服無時</p>	<p>苓湯能變水白茯苓澤瀉各二兩郁李仁五錢</p>
----------------------	--	------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

<p>不黃腎氣丸 治肺腎虛腰重脚腫小便不利</p>	<p>命門益氣湯 <small>見勞倦門</small></p>	<p>人參平肺散 <small>見喘門</small></p>	<p>六味丸 <small>見虛勞門</small></p>	<p>薑三片水煎食遠服</p>	<p>羌活 茯苓 川芎 <small>枳殼 防風</small></p>	<p>人參 獨活 柴胡 桔梗 枳殼</p>	<p>消風敗毒散</p>	<p>水煎薑三片 小便不利加猪苓澤瀉</p>	<p>治法彙五卷 <small>水腫</small> 十六</p>	<p>茯苓 山查 神麴 麥芽 蘿蔔子</p>	<p>白朮 <small>半錢</small> 枳實 <small>半錢</small> 厚朴 <small>半錢</small> 陳皮 半夏</p>	<p>消導寬中湯</p>	<p>五苓散 <small>見霍亂</small></p>	<p>蘇子降氣湯 <small>見氣門</small></p>	<p>黑錫丹 <small>見諸逆衝上</small></p>	<p>桂黃丸 <small>見</small></p>	<p>木香流氣飲 <small>見氣門</small></p>	<p>迴磨飲 <small>見氣門</small></p>
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------	---	--------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

或肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰厥已成
蠱證其效如神此證多因脾胃虛弱治
失其宜元氣復傷而變此證非此藥不
能救

白茯苓三兩附子五錢川牛膝 官桂 澤瀉

車前 山藥 山茱萸 丹皮 熟地

右爲末和地黃煉蜜丸如桐子大每服七八
十丸空心白湯下

薛新甫曰每見用尅伐傷損脾腎瀉喘腫脹已

治法彙五卷

十七至十

不可救往往用此轉危爲安妙在桂附以補脾

之母也損菴公亦屢稱其神錫常加參朮活人

殊衆後人母得忽略

八正散見淋門

魏子豉湯見虛損門

痞滿

有實痞有虛痞

脈弦急而滑胃中痞滿乃肝氣與食滯而成宜
疎肝消導化痰

脈弦或沉弱或虛大無力氣口爲甚日久脾胃
受虧或過服尅伐之藥中焦痞滿屬虛宜健脾
補中益氣湯六君子湯加減

大法黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴半夏生

薑之辛以散之人參白朮之甘溫以補之茯苓

治法彙五卷

二千

澤瀉之鹹淡以滲之入藥與濕同法使上下分
消可也

戴氏曰諸痞塞及噎膈乃是痰爲氣所激而上

氣又爲痰所隔而滯痰與氣搏不能流通並宜

一陳加枳實砂仁木香或木香流氣飲入竹瀝

薑汁

海藏曰治痞獨益中州脾土以血藥兼之其法

無以加矣

丹溪曰凡心下痞周須用枳實黃連

肥人心下痞悶內有濕痰也宜二朮二陳有火加炒芩連實者去白朮或滾痰丸妙

濕者四肢困重小便短宜平胃和五苓以滲之鬱者脉必沉越鞠加減

熱則煩渴溺赤以苦藥泄之大消痞丸煎湯用黃連葛根升麻發之便結者利之

瘦人心下痞悶乃鬱熱在上焦宜枳實黃連以導之葛根升麻以發之

如飲食後冒風寒飲食不消或食冷物而作痞

清法彙纂卷五 痞滿

十一

悶宜溫中化滯吳茱萸砂藿香平胃草豆蔻之類

類

脾氣虛弱轉運不及飲食不化而作痞者宜四君子湯加山查麥芽之類

有因傷寒下之太早而成痞悶枳桔小柴胡湯

不已對小陷胃氣口緊滑惡心痞悶因于食也

從傷食治

有酒積雜病過下傷脾脾虛不運亦作痞養胃

兼和血參朮歸芍之類佐升提胃氣升柴

傷寒汗下後脉淨身涼但痞悶口乾便難

匹陰津液受虧也四物加參芩白朮升麻

少佐陳皮枳殼之類

大病後元氣未復而胃滿氣短者補中益氣湯

橘皮枳朮丸

陰火上炎時作痞悶噯氣炒黃柏為君或少佐

四物知母

兩寸關脉弦滑帶瀉屬肝氣鬱而不伸膈上有

稠痰也宜吐以達之後舒鬱疎肝平胃

清法彙纂卷五 痞滿

十二

中焦濕痰盛作痞四肢困小便短宜平胃五苓

滲之肥人多此婦女倍香附川芎

胃中有熱膈上有痰作痞悶者黃芩利膈九佳

七情所傷鬱悒不舒臟腑不和心腹痞悶七氣

湯佳

太抵心下痞悶必是脾胃受虧濁氣挾痰不能

運化為患初起宜舒鬱化痰降火二陳越鞠炒

黃連黃芩之類久之固中氣參朮苓草佐以他

藥有痰治痰有火清火鬱則兼化方是或以枳

不為君隨病加減作丸，效若妄用，尅伐，礙

大經之後成痞，或痰中見血，或口中作血腥氣，是瘀血用牡丹皮、江西紅麴、麥芽、童便、浸香附、桔梗、通草、川山甲、降香、紅花、山查、肉蘇木，各錢許，酒童便各壹鍾煎服，甚者加大黃，臨服入韭汁、桃仁泥。

脾胃氣虛，心腹脹滿，疼痛時作時止，厚朴溫中湯主之。

治法：藥五卷，痞滿

十三

厚朴 陳皮 茯苓 草豆蔻 甘草
木香 各半錢 乾薑 壹錢

水煎服，不應加參朮

有痰挾瘀血成窠囊，作痞，脉沉澹，日久不愈，多鬱人悲哀過度，有之宜從血鬱治，桃仁、紅花香附、牡丹皮、韭汁之類。

東垣失笑丸 治右關脉弦，心下虛痞，惡食懶

倦，開胃進食。

乾薑 甘草 麥蘖 炒 白茯苓 白朮 各錢

半夏麴 人參 各參 厚朴 鹽製 枳實 麴炒 黃色 黃連 各伍

右為細末，蒸餅丸，梧桐子大，每服米捌拾丸，白湯下。

東垣木香順氣湯 治腹脹，心腹悶，藥稍辛散，初病無火最妙，或過用寒涼，用此開鬱，壹貳服而止，有驗。

木香 益智 陳皮 蒼朮 草豆蔻 各錢

厚朴 鹽汁 青皮 各四 茯苓 澤瀉

治法：藥五卷，痞滿

十四

半夏 乾薑 茱萸 各三 當歸 人參 各五 升麻 柴胡 各一 水煎服

大消痞丸 治遠年不愈者，其中用人參、白朮

補脾，二陳化痰，和中，枳實、厚朴消悶，茱萸

澤瀉分利，濁氣乾薑、砂仁散鬱，薑黃下氣

佐苓連以降火，神麴開胃，腐熟水穀，最得

立方之妙，昧者謬以為雜，殊可太息。

乾薑 神麴 甘草 炙 半夏 湯泡 陳皮 人參 各錢 朱苓 半 澤瀉 厚朴

薑汁 砂仁 各錢 枳實 伍錢 黃連 黃芩

俱用陳壁土炒 薑黃 白朮 各壹兩

右爲細末浸炊餅丸桐子大每服伍拾丸至百丸空心白湯下

胃痺不得臥心痛徹背括蔓薤白半夏湯主之是飲爲患也

一方瓜蒌炒熟連皮或丸最蕩滌胸中垢膩調中益氣湯 見內傷門

越鞠丸 見鬱門

四君子湯 見傷門

柴胡湯 見傷門

橘皮枳水丸 枳水丸加橘皮 見痰門

吞酸 俗謂之吞酸

中宮氣不清敗痰停飲宿食醴造而成初起惡心飽悶脉兩關並右氣口弦滑乃食爲氣滯用吐法後消導和中舒鬱二陳平胃越鞠加減日久脉沉滑或弦屬鬱結恒多見於女子或失意人宜以吳茱萸去梗湯浸半日爲君佐二陳香附炒黃連或梔子

丹溪曰治酸必用茱萸順其性而折之

因食鬱有痰而致者二陳加南星黃芩或生料

治法彙考 吞酸

平胃散加神效麥芽薑棗同煎服

脾胃虛弱飲食入胃嘔吐作酸不能腐熟者脉

必右寸關弦滑無力宜六君子加丁香砂仁佳

丹溪加味二陳湯治痰飲爲患嘔吐頭眩心悸

或因食生冷硬物時吐酸水原方加丁香

茱萸丸 治平時酸最妙

茱萸 湯浸 陳皮 黃芩 壁土炒 黃連 土炒

各五錢 一兩

右爲細末神麴打糊爲丸茱萸豆大每服貳叁

拾九津液嚥下

一方

莫菜、莫黃連、貳味、隨時寒暄、迭為佐使、月倍菜、夏月倍連、蒼朮、茯苓為輔、湯浸、餅丸、水下吞之

作酸、必須斷厚味、必蔬食自養、則病易安

時清水上溢、或吐出、用蒼朮、陳壁土炒、茯苓

白朮、陳皮煎服

大枳、直作酸、木氣鬱而不伸、痰飲因而阻塞

治法、藥五卷、春酸

二十七

故酸味、蜇心、宜從治之、不宜大寒涼、必佐以辛

味、莫菜、莫、白朮、砂仁、蒼朮、半夏、厚朴之類、佐以

炒梔子、及炒黃連

平胃散 見濕門

越鞠丸 見鬱門

六君湯 見脾胃門

陳湯 見痰門

噎膈

飲食之際、氣忽阻塞、曰噎、心下隔拒、或食到膈間、不得下、曰膈、良久復出者、翻胃

丹溪曰、少壯者、多是痰火七情、年高者、必是血液乾槁、乃千古不易之確論也

血乾、黑瘦面不澤、左脉微弱、右寸關滑大、或實、胸中不寬、久之必噎膈、大腑必燥、左脉弱、知

血少、大便難、右脉滑、知痰火盛、必防碍食、乃屢驗者、必養血、潤燥、兼清中上二焦、若急于

治法、藥五卷、噎膈

二十八

舒鬱快膈、辛香助火、胃汁速乾、去火不遠矣、雖半夏、蒼朮、厚朴、俱不可用、况丁沉、砂仁、蔻

桂、平、四、物、加、竹、瀝、薑、汁、乃丹溪妙用也、余嘗

以歸芍二門、二母、花粉、橘、紅、麥、芽、少佐枳實、

白朮煎成、加竹瀝薑汁、多服、大獲奇驗、俟胃

氣稍開、仍用四、物、加、二、門、生、地、白、朮、梨、汁、竹

瀝、白、蜜、煉、膏、殊、効、右寸關虛大者、加人參、

痰盛、體厚、色白、右脉沉滑、或數、或濡、多兼惡心、

隔胃熱、有痰、宜二、陳、枳、朮、加、竹、瀝、薑、汁、初

元氣實，痰九妙，稍久人倦，必養胃為主。六君子加減。

痰多食緩下，便裏住不得下，以來復丹控其痰，用滌痰九霞天膏和者。

自當舒鬱，久之必兼補養，須分氣血。

丹溪曰：大率因氣血虛而有痰。○叔承子曰：胃中氣血虛，食少津液不生，乾涸痰凝所致。

戴氏曰：氣虛者，脉必緩而無力；血虛者，脉必數。

治法彙五卷 噎膈 二十九

而無力，痰者寸關必沉伏而滑大，有氣滯結者，寸關必沉澹。

張雞岑曰：噎是神思間病，惟內觀靜養可安。此言深中病情。

屎如羊屎者不治，大腸無血故也。年高者危。

戴氏曰：氣血俱虛者，則口中多出沫，但見沫大出者死。

吐痰多者不必治痰，補以化之。

治法用童便、竹瀝、韭汁、牛羊乳，或加鹽尿、氣。

入四君子、血虛入四物湯，切不用香燥藥宜滋味。

服耗氣藥過多，中氣不運而格拒飲食，當補氣使自運。補氣運脾湯，方用四君加黃芪、橘紅、砂仁煎服。

初起有痰火盛，脉洪滑者，宜用黃連炒三錢，薑汁山查肉二錢，保和丸一錢，同為末，糊丸麻子。

大胭脂胚為衣，人參湯加竹瀝下五十丸。

一法馬兜兒即野田燒存性，陳米湯調下。一法

治法彙五卷 噎膈 三十

麴兒一錢，燒存性，好紅棗四枚，平胃散二錢，溫酒調下，即可進飲食，然後審氣血虛實調理。

一法左金丸加貝母、瓜蒌子、牛轉草丸服。

一法用韭汁二兩、牛乳一盞、生薑半兩，搗汁和勻頓服。

有氣結者，開導之。有陰火上炎，作陰虛治，有積血者，消息之。韭汁能消膈上瘀血。

食物下咽，屈曲自膈而下，梗澀作微痛，多是瘀血，用前膏子藥潤補之後，以代抵當丸下之。

虛而胃液乾，噎食不下，生薑汁、白蜜、牛酥各五兩，人參末、白合各二兩，重湯煮膏，不時抄半匙，津下。

古方用人參以補肺，御米以解毒，竹瀝以清痰，四物以養血，粟米以實胃，蜜以潤燥，薑以去穢，有治寒者，必當時有因于寒者，古方用乾薑，恐誤，或作薑導可也。

如服藥不吐，切不可便與粥食，每日用人參五錢，陳皮二錢，作湯細細呷之，以扶胃氣，覺稍安。

治法彙五卷

噎膈

三十一

和漸加人參，旬日半月間，方可小試，陳倉米飲，及糜粥，倉廩未固，不宜便貯米穀，常見即食粥，飯者遂致不救。

寒者或遇食冷所致，稍久鬱即成熟，今人悉因痰氣久悞于醫，傳變而成，其無寒也明矣。

人參利膈，九治噎膈，胸中不利，大便秘結，燥痰嗽。

喘滿脾胃壅滯，推陳致新，乃治標法也。

木香、檳榔各七錢半、人參、當歸、藿香。

甘草、枳實各一兩、大黃酒浸蒸。

厚朴薑製一兩

肝胃稍開，止可米飲、牛乳、韭菜、清虛之物，切不可驟食，蒸點粘膩，恐復傷胃也，或少用養湯、牛鴨清湯，以助胃氣。

李絳法：嘔吐無常，粥飲入口即吐，困倦無力，垂灰者，以上黨人參三兩，劈破水一大升，煮取四合，頓服。

大便燥結，如羊屎，閉久不通，似屬血熱，不可頓攻，止可清熱潤養，小著湯丸，累累加之，關局自

治法彙五卷

噎膈

三十二

透滋血潤腸湯，薑汁炙大黃、人參、利膈丸。

玄明粉少加甘草，然服通利藥過多，致血液耗竭而愈結者，當用前膏子潤之，有火逆衝

上，食不得入，其脉洪大有力而數實者，滋陰清膈飲，加枇杷葉二錢，蘆根一兩。

丹溪曰：凡膈噎反胃，悉以二陳湯加薑汁、竹瀝、童便、韭汁之類為主，如胸中覺有熱悶，本方加

土炒黃連、黃芩、瓜蒌、桔梗之類。

如血虛瘦弱之人，本方合四物湯，可加杏仁泥。

紅花童便、韭汁之類，仍不可缺。若飲酒人，本方加砂糖、鹽尿入內服。

如朝食暮吐、暮食朝吐，或食下須臾即吐者，此胃可容受而脾不能傳送也。或大小腸秘結不通，食返而上奔也。本方加酒蒸大黃、桃仁之類，以潤之。脾不磨者，本方多加麥蘖、神麴之類，以助傳化之令。

氣虛肥白之人，膈噎者，本方合四君子湯亦加竹瀝薑汁為要藥也。

治法彙五卷 噎膈

三

如因七情鬱結成噎膈者，本方加香附、撫芎、木香、檳榔、括婁仁、砂仁之類。

凡大便燥結，用大黃乃急，則治標之劑也。仍用牛羊乳四物、韭汁、竹瀝薑汁為上策也。但不可以人乳代之。養人乳有飲食烹飪之火存乎中，故耳。

有進半鍾米飲，反吐二三碗痰水者，不必治痰，但寧氣血、孰虛及養胃氣為急。

秘方潤腸膏 治膈噎燥結，飲食良久復出及

朝食暮吐、暮食朝吐，其功甚捷。

取新威靈仙

四兩搗汁五生薑四兩月開花者搗汁

真麻油二兩

白砂蜜四兩頭煎涼

右四味同入銀石器內攪勻，慢火煎候如飴，時時以筋挑食之。一料未愈，再服一料，決効。經驗大力奪命丹 治膈噎不下食及翻胃等症。

杵頭糠 牛轉草 各半 糯米一升

右為末，取黃牛口中沫為丸，如龍眼大，入鍋

治法彙五卷 噎膈

三四

中慢火煮食之，加砂糖二三兩入內尤妙。

又法：杵頭糠人參末、石蓮末、柿霜、玄明粉等分，舂吃。枇杷葉拭去毛，陳皮去白，各一兩，生薑

半兩，水煎分溫服。

正傳載一人五十三，得噎膈症，食不下，良久復

出，大便燥結，人黑瘦殊甚。其脉右寸關前弦滑

而洪，後畧沉小。左三部俱沉弦，尺芤，乃中氣不

足，木來侮土，上焦濕熱鬱結成痰，下焦血少，故大便結燥，陰火上衝吸門，故食不下。用四物以

生血四君以補氣二陳以祛痰三合成劑加薑炒黃連炒枳實少加砂仁又間服潤腸丸或服丹溪墜痰丸半年服前藥百餘貼病全安

又一婦四十九身瘦勤于女工得膈噎症半年矣飲食絕不進而大便燥結不行者十數日小腹隱隱然疼痛求治六脉皆沉伏以生桃仁七箇令細細嚼杵生韭汁一盞送下片時病者云胸中畧覺寬舒以四物六錢灰婁仁一錢桃仁泥半錢熟大黃一錢酒紅花一分煎成加溫羊乳一盞合而服之半日後下宿糞若干腹痛漸止徐進稀粥而乃以四物加羊乳五六十服遂不再舉

丹溪法用霞天膏加補虛藥中曾一人則吐瀉積痰皆調理而愈須年未衰憊者乃可

治反胃用新汲水一大碗留半碗將半碗水內細細澆香油鋪滿水面上然後將益元散一貼輕輕鋪滿香油面上須臾自然沉水底此即陰陽升降之道也用匙攪勻服却將所留水半碗

盛碗漱口令淨吐既止却進末子涼膈散通其二便未効再進一貼益元及涼膈即効也此方極驗

治反胃噎膈極驗方

童便降火 竹瀝痰竹 韭汁行血 人乳牛乳

胡蘆補虛 蘆根汁止嘔 茅根汁涼血 薑汁佐竹瀝行痰

甘蔗汁和胃 驢尿殺更

仍入燒酒米醋蜜各少許和勻隔湯頓溫服

製通腸丸 治症同前

治法彙五卷 噎膈

大黃酒浸 滑石飛研各二兩 陳皮去白厚朴 薑汁

兩五錢 人參 當歸 貫衆去毛

乾漆炒所盡 木香 檳榔各七錢

三稜煨 蓬朮煨 川芎 薄荷 玄明粉

雄黃 桃仁泥 甘草各五錢

俱各另研取細末用竹瀝等汁各二盃燒酒薑汁一盃隔湯煮濃和丸如芥子大每服三錢去枕仰臥唾津嚥下通利止後服服此丸及前諸汁後得藥不反切不可便與粥飯及諸飲食每

日厚入參五錢。脾胃皮二錢。作湯細啜。以扶脾胃。一人冬月日飲。剝酒三盞。自後每食必啜。下行膈間。梗塞微痛。乃汚血在胃口也。用薑汁半盞。細細冷呷。盡半斤而愈。以薑汁能開胃氣也。又有反胃。因吐呼極力。破損氣喉。氣喉破漏。氣壅胃管。胃受氣亦致反胃。法在不治。或用牛喉管焙燥服之。

王安道曰。內膈嘔逆。食不得入。是有火也。若病久而吐。食入反出。是無火也。治法若脾胃氣虛。

治法彙五卷

三上

而胸膈不利者。用六君子湯。壯脾胃。生元氣。若用辛熱之劑。而嘔吐噎膈者。四君子加芎歸。益脾胃。以抑陰火。胃火內膈。而飲食不入者。六君子加芩連。清火養胃。若嘔吐食入反出者。六君子加木香炮薑。溫中補脾。若誤服耗氣之劑。血無所生。而大便燥結者。用四君子加芎歸。補脾生血。若火逆衝上。食不得入者。四君子加山梔黃連。清血養血。若痰飲阻滯。而食不得入者。四君子加木香。山梔。補脾化痰。若脾胃虛寒。飲食

不化。或入而不化者。六君子加木香炮薑。補脾胃。更非慎房勞。節厚味。戒氣怒者。不治。年高無血。亦不治。

脾胃陽火內衰。其脈沉微而遲者。以辛香之藥。溫其氣。丁沉香。膈湯。五膈寬中散。嘉禾散。仍佐益陰之藥。

瘀血在膈。阻碍氣道。而成者。以代抵當丸。令其搜逐停積。至天明利下惡物。却好將息。五靈脂。治淨爲細末。黃大膽和丸。龍眼大。每服一丸。好治法彙五卷

噎膈

三六

酒半盞服。不過三服。効亦行。瘀法也。亦有有虫者。以秦川剪紅丸。取之。此丸亦取瘀血。

五膈寬中散。治七情四氣。傷下脾胃。以致陰陽不和。胸膈痞滿。停痰氣逆。遂成五膈。

並治一切冷氣。

白豆蔻二兩 甘草五兩 木香三兩 厚朴製一斤

縮砂仁 丁香 青皮 陳皮各四兩

香附子炒去毛一斤

右爲細末。每服二錢。薑三片。鹽少許。不拘時。

白湯調服

滋陰清膈飲 治陰火上衝或胃火大盛食不

入脉洪數者

當歸 芍藥 黃蘗 黃連 各一錢

黃芩 山梔 生地黄 各一錢 甘草 三分

水煎七分加竹瀝薑汁各半酒盃食前服

丁沉透膈湯 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔

吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆

治之

治法彙五卷 噎膈 手九

白朮 二兩 香附子 縮砂仁 人參 各一兩

丁香 麥蘖 木香 肉豆蔻

白豆蔻 青皮 各半 沉香 厚朴

藿香 陳皮 各七錢 甘草 一兩 熟半夏

神麴 炒 草果 半

每服肆錢水一盞薑三片棗二枚煎七分不

拘時熱服

來復丹 見暑門 滌痰丸 見痰門

霞天膏 見積聚門 抵當丸 見畜血門

六君子湯 見脾胃門 嘉禾散 見虛損門

治法彙五卷 噎膈 五

眩運

眩運悉屬痰火。但分虛實多少而治。

肥人脈沉滑屬濕痰。白朮半夏天麻湯妙。

瘦人脈弦數乃陰虛相火上炎也。宜滋陰降火。

如兩手脈伏。面色痿黃憔悴。屬氣虛生涎。濁氣

泛上。其涎亦令頭眩。恒見於鬱悒之人。及婦女

輩。宜舒鬱。

中年之人。大病初起。元氣未復。起則眩倒。脈必

緩弱。或右手寸關大而無力。宜補中益氣倍參

治法彙五卷

眩運

中

芪加天麻有痰加二陳有火加炒黃柏。

夏月頭眩。偶冒暑勞形。脈虛細煩悶口渴。屬傷

暑。先以六乙散。後用大劑生脈散加黃柏。

劉宗厚曰。眩運上實下虛所致。所謂下虛者。血

與氣也。所謂上實者。痰火泛上也。急則治痰火。

緩則補元氣。

脈弦實有力。口煩渴。壯盛之人。頭眩者。屬實痰。

實火。或過飲恣口所致。宜降火化痰。酒芩。梔子。

二陳。枳桔。薄荷。荆芥。花粉。出入。不惡心。加酒煮

大黃三二錢妙。

丹溪法。眩運不可當者。大黃酒煮二次。為末茶

調下。每一錢至二錢。

浮慾過度。腎虛不能納氣。歸元。使諸奔上。宜益

氣補腎湯。

中宮濕痰盛。壅塞清道。因而頭眩。脈必緩弱。宜

平胃滲濕。

產後血暈。悉屬虛清魂散。加童便。甚者。獨參湯

加童便一大盃。薑汁三茶匙。

治法彙五卷

眩運

中

正傳云。人肥白而作眩運者。治宜清痰降火。為

先。而兼補氣之藥。人黑瘦而作眩運者。治宜滋

陰降火。為要。而帶抑肝之劑。

丹溪曰。眩運者。中風之漸也。如肥白人。氣虛挾

痰。四君二陳。倍蜜炙黃芪。少加荆穗。川芎。以清

利頭目。或加蔓荊子。

風痰眩運。頭痛惡心。吐酸水。半夏。南星。白附子。

生。為末。滴水丸。桐子大。以生麵為衣。陰乾。每服

十丸。至二十丸。薑湯下。

頭面喜暖手按則運定此陽虛也大劑參芪
痰盛氣虛六君子加黃芪少佐炮附子煎成入
竹瀝薑汁

如體瘦陰虛兼痰火盛者二陳四物加片苓薄
荷入竹瀝薑汁童便

天麻荆穗薄荷乃消上焦風熱妙品非治本藥
也因痰治痰因火治火或補氣或補血或滋陰
要在變而通之

古方芎朮湯治冒雨中濕眩運嘔逆頭運嘔逆
治法彙五卷

眩運

四十五

不食等症殊効用川芎半夏白朮各錢二分甘
草六分薑七片煎服

血家作眩芎歸湯胸中有瘀血飲韭汁酒良
上焦風熱作眩脉浮數兼頭痛眼赤作寒熱者

防風通聖散出入

諸失血崩漏肝虛不能收攝榮氣而上逆補肝
養榮湯方用四物加陳菊甘草煎服

嚴氏玉液湯治七情感動氣鬱生涎隨氣上衝
頭目眩運心忪怔忡眉稜骨痛用大半夏泡七

次去皮臍薄切四錢薑十片煎入沉香水磨一
呷服大効

兩手脉緩大無力飲食減而微渴大便三四日
一行亡人乃大虛証參芪歸朮芍藥作大劑濃
煎下連栢丸三十粒連藥皆薑汁炒冬加乾薑
少許更以薑汁煮糊丸

冬月冒寒鼓激痰涎亦作眩運宜從寒治
一老婦白帶眩運專治帶而安

早起眩運須臾自定乃胃中老痰使然古方用
治法彙五卷

眩運

四十六

黑錫丹劫之藥用桂附沉硫黑錫蘆巴故紙茴
香陽起金鈴木香大辛大熱恐却不開轉增病
耳不若礞石鎮墜之藥徐徐取効更慎口腹爲
佳

古方用鹿茸五錢酒煎湯加麝少許治元陽虛
眩運必虛而無火者宜之

嚴氏曰外感六淫內傷七情皆能眩運風則脉
浮有汗項強不仁消風散都梁丸青州白丸子
寒則脉緊無汗筋攣掣痛不換金正氣散加川

芎白芍 暑則脉虛大自汗煩悶十味香薷散

濕則脉沉細體重節痛吐逆涎沫腎着湯除濕

湯 肝家風熱用鈎藤散 七情相干眩運欲

倒十四友丸安腎丸二藥夾和七氣湯送下仍

間用乳香泡湯下 汗多亡陽或中氣虛大劑

補中益氣加菊花 痰結胸中眩運惡心獨聖

散吐之或以鹽湯探吐亦可吐定用導痰藥

二便結滯搜風順氣丸佳

鈎藤散鈎藤陳皮半夏麥冬茯苓石膏人參甘

肅法彙五卷 眩運

菊防風等分甘草減半加薑煎服

有因虛致暈雖暈定而常欲近火欲得煖手按

之蓋頭為諸陽之會陽氣不足故耳

診法 左手脉數熱多 脉澀有瘀血 右手

脉實痰積 脉大是久病

大安腎丸 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元

衰憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇

刺痛小腹堅痛下部濕癢夜夢遺精恍惚

多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思

飲食大便澀泄小便滑數精神不樂事多

健忘常服補元陽益腎氣

肉桂去皮川烏頭去皮臍炮桃仁炒

巴戟去心白茯苓 山藥 茯苓

石斛去根肉蓯蓉 草薢 白朮

破故紙各肆拾捌兩

右末煉蜜丸桐子大每空心鹽湯下三十丸

小腸氣茴香湯下

益氣補腎湯

治法彙五卷 眩運

人參 黃芪各一錢 白朮二錢 白茯苓一錢

甘草炙五分 山藥 山茱萸各一錢

水煎服

半夏白朮天麻湯見頭

防風通聖散見風門

十四友丸見痢門

青州白丸子見風門

不換金正氣散見傷寒門

干味香薷飲見暑門

清鬼散見產門

消風散見斑疹門

都梁丸見頭痛門

七氣湯見氣門

補中益氣湯見內

益氣補腎湯

着湯

搜風順氣丸

除濕湯

見濕門

導痰湯

俱見風門

法彙三卷

里

麻木

榮衛滯而不行則麻木如坐久壓住一處麻不能舉理可見矣屬痰屬虛木則全屬濕痰瘀血一塊不知痛癢若木然是也

脉沉滑體厚人屬痰與濕二木二陳或少佐風藥羌獨桂枝一二味兼參芪補氣

婦人及素有鬱悒者當舒鬱

脉微弱或弦大無力病久體羸者屬氣虛補中益氣或加製附子一片夏月對生脉散

治法彙三卷

四大

一塊不知痛癢陰寒益甚或日輕夜重脉濡而乳或弦屬痰挾瘀血宜活血行氣芎歸桃仁泥紅花牛膝二陳之類加韭汁大便見黑而便閉者桃仁承氣下之

丹溪曰十指麻木屬胃中濕痰瘀血宜二末二

陳桃仁紅花少加附子行經

補氣和中升陽湯

一婦人病六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其

診閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開眼則此症不作是以不敢合眼致不得臥身體皆重時有痰嗽覺胸中不利煩躁氣短喘促肌膚充盛飲食不減二便如常此非風邪乃氣不行也治宜補益肺氣自愈如經脉中陰火乘其陽氣動為麻木者當兼去其火則安矣

補中益氣湯加蒼朮 草豆蔻 澤瀉 茯苓

黃栢 佛耳草 生甘草 白芍 氣不

治法彙五卷麻木 四九

運加木香 隨病加減

三妙丸 治濕熱下流兩脚麻木或如火燎之

狀

黃栢 去皮酒拌 蒼朮 六兩米 牛膝 去蘆 二兩

糊丸桐子大每服七八十丸空心鹽湯下忌

魚腥蕎麥煎炒

人參益氣湯 治兩手指麻木四指困倦怠惰

嗜臥熱傷元氣也

黃芪 二錢 草 炙 升麻 各半 五味子 三十粒

柴胡 六錢 甘草 生人參 各一錢二分半 白芍 七分

白水煎稍服 三服 生脉散 見暑門

桃仁承氣湯 見

大理卿韓珠舉遍身麻木不能舉動求損庵公

治公以神効黃芪湯加減授之用芪一兩二錢

參芍各六錢他稱是一服減半彼欲速効遂併

二服為一服服之旬日病如失論以元氣未復

宜靜養完固而後可出渠不能從盛夏遽出見

朝謁客勞頓累日忽馬上欲墜仆從者扶歸

治法彙五卷麻木 五十

公視公辭不治數日沒嗚呼行百里者半於九

十可不戒哉

頭痛

有風有寒有火有痰有濕熱有氣虛有血虛
食鬱有瘡毒

傷寒脉浮而緊身形拘急惡寒脊強身大熱傷
寒頭痛也冬用麻黃湯餘月羌活沖和湯
傷風脉緩而浮或左脉微急症兼鼻塞眼脹自
汗傷風頭痛也宜解肌冬月桂枝湯餘月十
味芎蘇飲

火兩寸脉洪而大症兼口乾目赤等火症者上
治法彙五卷頭痛

五

集實火也宜清散兼降川芎茶調散之類加
酒芩連梔子石膏勢盛而脉實者用漿大黃
以瀉火也丹溪法用酒大黃半兩茶煎服
食鬱右關寸脉滑而實症兼嘔吐惡心心下痞
悶或痛或寒熱如瘧乃食鬱頭痛也治瀕消
導二陳山查厚朴枳實神麴從傷食治

婁全善曰病在胃而頭痛者必下之方愈也如
孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛郭茂恂以
黑錫丹下其嫂產後汚血頭痛皆下咽即安也

內經曰寸口脉中指短者頭痛也

肝經曰陽弦則頭痛又曰寸口脉浮傷風發
熱頭痛也脉緊傷寒脉訣云頭痛短澁應瀕於
浮滑風痰必易除

痰厥兩寸脉滑而弦或惡心吐清水昏重乃痰
厥頭痛也半夏白朮天麻湯

濕熱脉數而濡或兩寸脉沉伏而數身重肢節
重或四肢面目浮腫乃濕熱頭痛也此多見

於酒客宜散濕解熱二陳二朮酒芩羌獨勝
治法彙五卷頭痛

五

風之類不已用嚏鼻法濕家一身盡痛發熱
面黃而喘鼻塞心煩頭痛者濕在上也瓜蒂
散內鼻中吐之

氣虛右脉大而無力或按之不數或弱或弦或
兩尺洪盛四肢怠墮無力飲食不思口淡無
味乃氣虛頭痛也四君子湯加黃耆蔓荊子
或調中益氣湯加蔓荊子重者加細辛

血虛左脉大而無力或濡細而數自魚尾上攻
於頭是血虛頭痛也四物倍川芎加酒芩

脚氣脈細而緩或濡肢節痛大便秘或吐逆脚

膝軟弱而頭痛者屬脚氣當從脚氣治

子和曰頭痛不止三陽經受病也三經各有部

分區別以治

額痛及眼或兼鼻塞脉浮而長陽明受病也升

麻葛根葱白白芷主之

自汗脉洪口渴屬陽明裏症也白虎解毒承氣

選用

清法彙五卷頭痛

五

眉稜痛眉稜骨痛連兩角脉弦細往來寒熱少

陽受病也小柴胡主之

眼眶痛有二症皆屬肝有肝虛而痛繞見光明

則眼眶骨痛甚宜生熟地黃丸

如痛久不止久則喪目胸間必有宿痰先以

茶調散吐之吐訖再用川芎薄荷清上藥

三陰脉至頸胸而還不循於頭惟厥陰循喉嚨

之後上連目係頂顛故有頭痛症多嘔吐涎沫

四肢厥冷脉多沉伏吳茱萸湯主之

脉沉而細足寒氣逆或身微熱而頭痛者屬裏

虛受寒乃太陽脉似少陰也麻黃附子細辛湯

主之以附子溫中麻黃散寒加細辛是汗劑之

重者

頭久痛非火非風膈上有痰也濃煎茶一碗取

吐苦水出乃止不損人待渴自止

平人頭痛屬火與痰者多

肥人頭痛多是濕痰二陳蒼朮

瘦人頭痛多是血虛與火酒芩連荊防薄荷芎

治法彙五卷頭痛

五

風熱在上脉浮洪而痛者宜天麻荊子台芎酒

芩

貴頭痛加藁本酒炒升麻

頭風偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熱

用酒炒黃芩不應滾痰丸最捷在左屬風熱

與血虛亦云形瘦色弊而頭痛者屬血虛風

熱用荊芩薄荷川芎酒芩玄參血虛用四物

酒炒黃柏知母諸家不分所屬故多不効

少陽偏頭痛便秘者可下之

偏正頭痛不可忍者玄胡索七枚青黛二錢牙

皂二個去皮子爲末水丸杏仁大每以一九水

化灌入鼻內隨左右咬銅錢一個當有涎出隨

愈

東垣一粒金用華撥以猪膽拌勻入膽內陰乾

玄胡索青黛白芷川芎各一兩爲細末無根水

丸化開搐鼻中外以銅錢咬出涎

一人素病黃忽苦頭痛不已發散降火歷試無

治法彙五卷頭痛

五五

效診得脉大而緩且一身盡痛又兼鼻塞乃濕

家頭痛也投瓜蒂散一匕內鼻中黃水去大盃

而愈

瘡毒脉弦數曾病梅毒而痛不止或咽中痛或

臂膊有一塊痛屬瘡毒愈毒湯多服自止

張三錫屢見頭苦痛百法不應詢之曾生過梅

瘡用土茯苓四兩白鮮皮苦參金銀花各三錢

黃柏一錢皂角子三十粒薏苡水通防風各二

錢氣虛加參芪血虛加四物大獲奇驗身痛亦

效

一人頭痛脉滑而數乃痰火上攻也二陳荆芥

羌活酒芩不應加石膏二劑稍可終未盡除前

方加熟大黃三錢食遠煎服病去如脫

一人苦頭痛衆作外感治診得右手寸口脉大

四倍於左兩尺洪盛乃內傷氣虛頭痛也外兼

自汗倦怠以補中益氣湯加炒黃柏一劑知二

劑已

一人頭痛而面色黎黑身體羸瘦左寸關俱不

清法彙五卷頭痛

五五

應指兩尺獨洪盛因作陰虛治用滋陰四物加

黃柏知母玄參二服減半十日全

一婦苦頭痛悞爲外感治發散三黃白虎硝黃

愈投愈甚診之氣口急大而數按之即濡右脉

亦虛大詢之先不熱服藥後始熱余曰風寒必

先發熱在一二日間豈有先不熱而後熱者此

氣虛頭痛也觀其短氣不足以息餘皆可知今

發散過度復耗其氣又復下之復損其血氣血

兩傷宜平虛火獨熾而身反熱也非大補拒能

挽回遂以補中益氣湯大劑加熟附子一片
響導服下即熟睡覺而痛止第人事不清復加
筋腸肉瞶振振不寧彼歸咎于補劑余曰虛極
所致復更一醫用柴胡表藥致一身之火遊行
於外變為斑爛彼益信為傷寒矣化班承氣日
進卒至氣絕而已

一人頭痛身形拘急惡寒便秘惡心作食鬱治
不應診得氣口脉平和獨尺數而細且行步艱
難乃御氣欲動也從脚氣治而愈

治法彙五卷

頭痛

○

一人頭痛作外感治不應左脉平和氣口獨盛
症兼飽悶惡心乃食鬱也消導而愈

一人牙與頭角互痛乃少陽陽明二經火盛之
故清胃散對小柴胡去半夏人參加薄荷石膏

二劑瘳

一老嫗頭痛連額發散降火備用不效面上皆
出小紅泡有微水不甚潰一月後痛悉移於右
左眼胞上紅腫且懶於言動飲食不甜用辛涼

愈投愈甚六脉濡弱如珠絲初按稍弦因作氣
虛治六君倍黃耆加蔓荊子三服後漸安心跳
不眠愈急乃以調中益氣湯加茯神玄參酸棗
仁栝子仁連進數服頓愈

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲

重

川芎 荊芥 各二兩 防風 白芷 甘草 各

薄荷 各四兩 羌活 一兩 細辛 五錢

右為末每服二錢食遠茶湯調下

治法彙五卷

頭痛

加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛

陳皮 黃柏 酒炒各 升麻 柴胡 去蘆各

炙甘草 各六分 黃耆 一錢 川芎 六分

蔓荊子 二分 更加當歸

白水煎服

莫萊萸湯 治厥陰頭痛連巔頂吐涎沫厥冷

脉沉緩

莫萊萸 生薑 各半 人參 二錢 五

棗一錢煎服

半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛眼黑頭旋惡

心煩悶氣喘上促無力以動心神顛倒目

不敢開若在風雲中頭痛如裂身重如山

四肢厥冷不得安臥

黃柏一錢 乾薑二錢 澤瀉 天麻 黃耆

人參 蒼朮各五分 神麴 白朮各五分

麥蘖 半夏 橘紅各七 白茯苓五分

右薑三片稍熱服此頭若痛甚謂之痰厥頭

痛非半夏不能除眼黑生花風虛內作非大

治法彙五卷頭痛 五十九

麻不能已黃耆甘溫瀉火補元氣實表止汗

人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除

濕補土澤瀉茯苓淡滲利小便濕因而導去

橘皮苦溫益氣調中神麴消食蕩胃中滯氣

麥蘖寬中助脾乾薑辛熱以蕪中寒黃柏苦

辛以療冬天小火在泉發燥也

羌活湯 治風熱上壅上攻頭目昏眩作痛

炙甘草半 澤瀉二 酒黃連 酒洗花粉

白茯苓 酒黃柏各四 柴胡五 防風

酒芍 羌活各六

臨睡服

玉壘丸 治風熱頭痛亦治痰厥

雄黃錢一 南星一 半夏七 天麻 白芷各

右爲細末薑汁炊餅丸棗豆大每服一錢食

遠白湯下

白芷散 治諸熱頭痛

鬱金錢一 白芷 石膏錢二 雄黃 芒硝

薄荷錢一

治法彙五卷頭痛 六十

右爲細末含水鼻內吹之

清上瀉火湯 昔人於氣海三里穴過灸至老

苦熱厥頭痛雖冬月內猶喜風寒吹之痛

即愈稍暖或見煙火即作服此遂已

酒紅花 荊穗 川芎 荊子

當歸 蒼朮 細辛 酒連 生地

柴胡 藁本各四 生甘草 升麻

防風 酒黃柏 炙甘草 黃芪各

酒芍 酒知母 羌活各八

白水煎服

安神湯 治頭痛頭旋眼黑

二甘草各二分 防風各二分 升麻 柴胡

生地黄酒洗 知母酒洗 黃柏酒洗 羌活各

黃芪錢半

將熟再加蔓荊子五分川芎三分再煎至一

盞臨睡熱服

大法曰高顛之上惟風可到一切痰火氣血為

病須加風藥如荊芥川芎薄荷羌活白芷藥本

治法彙五卷頭痛 主

之類即前各加引經藥是也

眉稜骨痛風熱與痰酒芩白芷等分為末茶調

散妙不應選奇湯不已滾痰丸

選奇湯 治眉稜骨痛不可忍神効

羌活 防風各二分 甘草一分 夏生 酒黃芩

冬不用有火 痛甚亦用

水煎服

又方酒炒片黃芩白芷等分為末每二錢茶

下

清空膏 治偏正頭痛年深日久不愈○兼

心煩頭痛病在腦中

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒 防風 羌活各一

多甘草半兩 片芩半兩 酒浸切片炒

右為末每服二錢熟盞內入茶清少許湯

調和膏臨睡沫口內少用白湯送下若頭痛

每服加細辛二分如太陰脉緩有痰名痰厥

頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏麴一兩

五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川

芩治法彙五卷 頭痛 主

芩一牛加柴胡一倍如發熱惡熱而渴者屬

陽明只服白虎湯加白芷良

頭痒風屑髮黃酒炒黑大黃末茶調二錢妙血

虛有火弱人四物用生地加玄參牡丹皮

一方山豆根浸油搽妙甚者以湯洗候髮半乾

擦梨蘆末緊縛一夜即止

產後頭痛古方用芎歸湯然亦須分割明白果

血虛宜此氣虛自汗須益氣食滯心下須消導

惡露不淨小腹痛兼去惡露

雷頭風

頭痛腫起核塊或作赤腫或作寒熱拘急皆風熱挾火炎上所致雷屬相火故名古方用升麻蒼朮加荷葉名升麻湯莫若荆防敗毒散為便子和曰雷頭風可用茶調散吐之次服神芩丸下之後乃以烏荊丸及愈風餅之類輕者可用涼膈散消風散疔瘡不消只用排針刺去毒血神芩丸 實熱熱鬱于上者宜之 方見火門

愈風餅子

治法彙五卷 頭痛

李三

川烏

炮半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

甘草炙

天麻

羌活

荆芥

薄荷

以上各一兩

右為末炊餅為丸捏作餅子每服三五餅細嚼茶下

頭重

東垣曰頭重如山濕氣在頭也紅豆散搐鼻妙

羌活

根燒

連翹

各三錢

紅豆

半升

共末搐鼻病在上若用服藥則誤伐無過也

故於鼻內取之猶物在高巖之上必射而取之

頭搖屬風屬火高年病後辛苦人多屬虛因氣血虛而火犯上鼓動也即內經拘攣招尤目暝耳聾上宮下虛之義拘攣疾也目不明曰蒙招為掉搖不定尤為甚

頭痛顛疾下虛上實名腎厥頭痛戴復庵用來復丹并黑錫丹等如不應葦殊丹

葦殊丹

治法彙五卷 頭痛

李四

好殊砂

草烏

瞿麥

黃葉子

各壹兩

右為麤末磁碗一箇以薑汁塗炙數次入殊砂在內上鋪諸藥復以碗蓋了掘一小坑安藥碗在內用熟炭五斤煨令烟盡吹去草藥灰將砂末研細每服一錢半淡薑湯下或加鹿茸炙去毛為末凡人參湯下

面痛

三錫曰面痛屬陽明胃家積熱以腸胃為市飲食之毒聚於中而發於外也王損處方用犀角

升麻湯犀角解毒升麻黃芩入胃陽明經脉環
唇挾舌起於鼻交額中循挾車上耳前過客主
人循髮際出頭顱陽明有熱則諸處俱痛也
一老人過勞與錢則面痛用補中益氣湯加連
翹香附玄參茶梳而愈

一人因鬱悒用越鞠貝母連翹橘紅而愈

頸項痛

邪客三陽則痛寒搏則筋急風搏則筋弛左屬
血右多屬痰丹溪治一人項強痛不可忍以回

治法彙五卷六頭痛

全五

顧作痰客太陽經治之用二陳湯加酒芩羌活
紅花服後二日愈

若人多有挫閃及失枕而項強痛者皆由腎虛
不能榮筋也六味地黃丸佳

升麻湯

升麻葛根湯

升麻附子細辛湯

羌活冲和湯

白虎湯

桂枝湯

解毒湯

小柴胡湯

芩蘇飲

俱見傷寒門

黑錫丹

見嘔吐門

痰痰丸

見痰門

補中益氣湯

見內傷門

五卷六頭痛

頭痛

全六

胃脘痛

有寒有火有痰有氣鬱有食積有瘀血有虫積
大法初痛宜辛散久即多火須監涼藥
惡心者先以鹽湯探吐吐定用藥極妙

寒痛脉沉遲或伏手足逆冷忽然大痛者屬寒
二陳炮薑蒼朮白朮蔻肉桂平胃之類

火痛右寸關脉洪數而疾口乾渴時痛時止者
火也二陳湯加薑汁炒黃連梔子香附撫芎

主之 大槩胃中有熱而作痛者非山梔子

治法彙五卷

胃脘

不可須佐以薑汁多以白芎開之

痰積脉滑而實症兼惡心吐酸清水胸中脹滿
而痛痰也大劑二陳加香附蒼朮貝母膽星
一方濕痰作痛心下有塊時作惡心用螺螄
壳煨服一方用蛤海粉佐香附末用川芎山
梔生薑汁煎辣湯調服爲佳又法牡蠣煨粉
酒下二錢一法明礬溶化就瓦雞頭子大薑
湯下一丸

肥人中脘痰多作痛小胃丹妙

右寸關沉滑有力心下痛手不可近瘕
嘔吐食積也就吐中以驚扇探之吐出宿物
爲佳如吐不出當用二陳加山查枳實厚朴
蒼朮消導和中初必加辛散藥香砂豆蔻炮
薑之類數日不止反加口燥渴火症者減辛
熱佐以薑汁炒芩連不惡心加炒梔子再不
止枳實導滯丸最佳脉弦實七八日不大便
下之亦可痛隨利減也

左脉數熱多滯者瘀血右脉緊實痰多弦大必
治法彙五卷

胃脘

是久病

瘀血脉滿而滑或花口中作血腥氣日輕夜重
者瘀血也越鞠加牡丹皮鬱金龜尾桃仁紅
花不已桃仁承氣湯蘼汁之類一方用蘼汁
炒山梔煎湯佳或入越鞠內以蘼汁能清胃
脘之血故耳

氣鬱脉沉伏或結或弦胸中脹痛者氣鬱也二
陳加製香附川芎木香青皮蓬朮之類不減
亦加炒山梔

心痛用山梔等劫藥復發前藥必不效
一服立止

大凡胃脘痛俗名心氣疼婦人多此氣挾痰
者多二陳對越鞠爲要藥甚者加炮薑初起
用辛熱炮薑白豆蔻二陳片蒼青皮山查神效
之類

重積脈乍大乍小面上白斑唇紅能食或偏嗜
一物時作時止者虫也二陳加苦練根煎湯
或用追積丸當從虫治

治法第五卷 胃脘

李九

藍葉取汁和薑汁服佳青黛亦可胃中有火者
宜之

丹溪曰心即胃脘痛須分新久虛實若明知身
犯寒氣口傷生冷而得於初痛之時當用溫散
溫利之藥病久則成熱熱則成鬱矣若欲行溫
利溫散寧無助火添病耶由是古方多用山梔
子爲君諸熱藥爲之嚮導則邪易伏病易退病
安之後若縱恣不改前非厚味仍前不謹病必
再作矣此病日久不食不飲又曰中宮食積與

痰積而生病者胃氣亦賴所養卒不便虛日數
雖多不食無損若痛止即吃物痛必復作勿歸
咎於醫也必須再服三五服藥後以漸而將息
方可護

心膈大痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不効者就
吐中以驚邪探之出積痰碗許而痛立止
惡心吐清水中有積滯作疼諸藥不効乾漆二
錢炒煙淨醋糊丸桐子大每服五七丸熱酒下
或醋湯下

治法第五卷 胃脘

七十

若平人喜好熱物致成血留胃脘而作痛者用
桃仁承氣下之輕者用韭汁桔梗開提其氣血
藥中兼用之

中氣虛以物柱按而痛定者屬虛二陳加炮薑
和之不應炮薑理中湯妙

痛久洗刷太過脉大或數無力必是中氣虛六
君子加炮薑佳

脉沉伏不渴唇青逆冷面時赤而躁欲坐臥於
泥水中屬寒太陰濕土受症二陳加炮薑草豆

藥香木厚朴不應理中湯

丹溪曰草豆蔻一味性溫能散滯氣利膈上痰若果因寒而痛者用之如鼓應桴若濕鬱結之腹痛者服之多効若因熱鬱而痛者理固不宜用但以涼藥兼之若炒芩連梔子之類其効猶甚東垣草豆蔻丸寒厥心痛大獲奇驗但因熱者不可多用久服恐有積溫成熱之患若久熱鬱熱已甚諸香燥藥斷不可用也胃中若有清痰飲作痛腹中漉漉有聲及手足寒痛或腰

治法彙考卷之六

七十一

膝脊脇抽痛用小胃丹或三花神祐丸或控涎丹漸漸服之能徹去病根而止

一法云輕者散之麻黃桂枝之類重者加石礮

川芎蒼朮炒梔子去皮作丸服

半夏一味切碎油炒爲末薑汁炊餅丸薑湯下

一三十九治痰厥心疼効又治哮喘

一方黃荊子炒焦爲末米湯調下二錢立止又

治白帶

婦人心氣痛不可忍五靈脂淨好者蒲黃等分

爲末每二錢醋半盞熬成膏水一盞煎七分熱服名失咲散

手拈散治心痛妙括曰草果玄胡索靈脂并沒藥酒調二三錢一似手拈却

大抵中宮氣不清則痛有挾痰者有日久成積者有挾火者古方用陳皮香附甘草末爲君因所挾而兼用藥挾痰加海粉挾火加梔子積則蓬朮醋煮灰血加乾漆要在用之合宜耳

一婦苦胃脘痛每發輒大吐多方不應以鹽湯

治法彙考卷之六

七十二

經吐積痰碗許痛良愈後常作惡心知胃中有痰也以橘半枳朮加製香附撫芎白螺壳南星海粉神麴打糊丸白湯下錢半未及一半病去如脫

一老姬性急而痛已六日諸辛藥歷試無驗診得左關弦急而右寸更甚其痛一來卽不可當少選稍定口乾面時赤知肝氣有餘成火也乃以越鞠加吳茱萸炒黃連薑汁梔子二劑頓愈一婦痛幾一月右關寸俱弦而滑乃飲食不節

所致投滾痰丸一服下痰及宿食三碗許、
數日調理一月而愈、

一婦痛久諸藥不應、六脉微小、按之痛稍定、知
中氣虛而火鬱爲患也、投理中湯一服隨愈、
一中年人因鬱悒心下作痛、一塊不移、日漸羸
瘦、予桃仁承氣湯一服下黑物并痰碗許、永不
再發、

和中蠲痛湯 治一切胃脘暴痛

草豆蔻

須用建寧者無
則用白豆蔻

山查

香附

治法彙五卷

胃脘

香附

川芎 半夏 蒼朮 厚朴 宿砂

枳實 炮薑

生薑煎服

清中蠲痛湯 痛久脉數有火

炒黑梔子 炒黑薑 川芎 黃連

橘紅 製香附 蒼朮 神麴

白水煎服

腹痛面色黃中青赤是脾弱肝盛也、補中益氣
湯下左金丸

中湯
王節齋曰、凡心腹痛、但是新病、須問曾服何藥、
飲食因何傷感、有無積滯、便與消導、和中藥若
日數已多、曾多服過辛溫藥、嘔吐不納、胸膈飽
悶、口舌乾燥、二便阻滯、則內有鬱火矣、或原有
舊病、因感而發、延綿日久、見症如前者、俱用開
鬱行氣降火潤燥之藥、川芎香附炒山梔黃連
薑汁之類、甚者加芒硝、但治心腹久痛、須于溫

原缺第七十四葉後半葉

腰痛

中脘痛屬太陰脾 當臍屬少陰腎 小腹屬厥陰肝

有寒有火有積滯有食積有瘀血有虫

寒六脉沉遲腹暴痛綿綿無停止面青白色不渴或暴吐瀉者寒也香砂理中湯主之嘔吐用香砂二陳平胃白豆蔻炮薑官桂之類或日雖久涼劑不應脉雖洪大按之不鼓亦屬伏陰理中湯加熟附子一片浸冷服

治法彙五卷 腹痛

七五

火脉數而疾時痛時止或瀉黃沫症屬口乾惡心頭眩者火也恒見於酒客二陳加薑製黃連木通蒼朮川芎厚朴主之不已用熟大黃瀉之金花丸最妙

氣脉沉結或伏痛引兩脇及肩背不得俛仰者氣滯也二陳川芎木香青皮枳殼香附主之恒見於婦人甚者加三稜蓬朮或先以香稜丸破滯氣

痰右關脉沉滑或弦症兼嘔吐頭眩或嘔冷涎

或下白積小便不利而痛者痰也宜導痰餅鬱二陳香附蒼朮川芎枳殼主之有火症者滾痰丸最佳

食氣口緊盛或沉實痛有形在中脘痛甚即瀉瀉後痛減食積也宜化積消導二陳查麴平胃越鞠炮薑等不應雖瀉仍用化積丸推逐之乃通因通用法也如手不可近嘔吐就吐中以鷺羽探之吐出宿物為佳如吐不出當從食積治脉堅實不大便下之亦可

治法彙五卷 腹痛

七五

血日輕夜重關脉沉滑或芤其痛有常處一塊不移而痛者是瘀血有嗜熱飲辣湯或多怒或因挫而成宜韭汁桃仁歸尾牡丹皮鬱金香附之類當從血鬱治大便燥結桃仁承氣下之一方用韭汁拌梔子炒每用一合煎湯極驗本草言韭汁開畜血梔子能清胃脘之血信然

〔臣〕脉乍大乍小面上一白斑唇紅能食或偏嗜一物時作時止而痛者虫也二陳加苦練根煎

服良古方取重丸有雷丸錫灰文君子
如吐重脉細小責之胃寒非重也理中湯
花椒佳

虛凡痛以手柱按而痛定者屬虛宜溫補參朮
薑桂之類重者加附子二三分爲響導
手不可近者屬實宜導滯清中枳實山查二陳
之類重則用硝黃

肥人腹痛多是濕痰與氣虛

瘦人腹痛多是積熱血虛大便多燥結

治法彙五卷

腹痛

七十七

當臍硬痛有形多燥屎已經攻伐不應再用四物
加桃仁泥紅花升麻麻子仁熟大黃檳榔蜜心
煎服潤以導之痛隨利減

小腹痛屬厥陰肝多屬肝氣鬱結宜青皮木香
香附歸尾酒白芍柴胡澤瀉主之如小水不
利宜分滲加木通車前梔子及龍膽瀉肝湯加
減如小水不利宜分滲大抵小腹痛中必
有物小便利者則是畜血之形小便不利則爲
溺塞之症宜分兩途小腹痛如覆碗爲實

其法有二氣壅塞於下用吐法以提之脉沉弦
小水不通者是血汚於下桃仁之類破之
如小腹痛引陰或睪丸腫硬暴痛不可忍卽是
疝宜從疝治

燥屎滯於幽門當臍悶痛當用導滯通幽湯不
已潤腸丸方見秘結門

腹心卒然互痛不安欲吐不吐欲瀉不瀉屬乾
霍亂乃飲食填塞所致急以鹽湯探吐得吐乃
生後隨症治卽絞腸沙

治法彙五卷

腹痛

七十八

臍下或大痛人中黑者多厥
治痛必兼溫散以鬱結不行阻氣不運故也
大法川芎香附諸痛不可少或以三味加白芷
爲末入湯調服妙

白芍藥止治血虛腹痛以酸收故耳
食積作痛有火症見不大便者木香檳榔丸
氣虛之人傷食腹痛宜補中調胃氣兼消導參
朮山查神麴麥芽枳朴木香砂仁之類
腹中覺有如火作痛此爲積熱宜調胃承氣下

之酒積同法、玄明粉亦可、

小腹實痛、用青皮以行其氣、

小腹因寒而痛者、肉桂、吳茱萸、

因寒作痛、小建中湯、加乾薑、官桂、台芎、蒼朮、白

芷、香附、因熱而痛者、脉必數疾、二陳炒苓連、極

子痛甚者、加炒乾薑從治之、

腹中寒下者、宜川芎、蒼朮、香附、白芷、茯苓、消

加薑煎服、痛瀉皆止、

腹中窄狹

五卷 腹中窄狹

腹中窄狹須用蒼朮、

若肥人自覺腹中窄狹、乃是濕痰流滯臟腑、氣

不升降、燥濕用蒼朮、行氣用香附、

瘦人自覺腹中窄狹、乃是濁氣與火、薰蒸臟腑、

宜黃連、蒼朮、大附燥、加血藥、

平人腹饑則鳴、理可見矣、肥人漉漉有聲、須作

痰治、二陳、二朮、人參、主之、

高良薑湯因寒心腹痛

高良薑 厚朴 官桂

一水鍾半煎一鍾去查稍溫服

單豆蔻湯 治臍腹虛脹作痛

澤瀉 錢一 木香 分三 神麴 分四

半夏 枳實 炒 草果 仁

黃芪 秦夏 去之 益智仁 甘草 炙 各一分

青皮 陳皮 川歸

茯苓 分七

生薑三片煎服

益胃散 治因服寒涼過多、腹痛不止、

五卷 腹中窄狹

人參 厚朴 甘草 白豆蔻 薑黃

乾薑 砂仁 澤瀉 各一分 益智仁 六分 陳皮 七分

黃芪 七分

加薑水煎服

厚朴溫中湯 治胃虛冷脹滿痛悶用

厚朴 陳皮 各一分 茯苓 草豆蔻

甘草 小香 各半 乾薑 三分

加薑水煎服

六合散 治一切燥熱鬱結、汗多、宜轉不

通併治小腸氣心腹滿悶胸中痞結

痛

大黃酒拌蒸 白丑 黑丑炒 芩遂各五錢

檳榔三錢 輕粉一錢

右爲末每服一錢蜜水調下

沒藥散 治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥另研各一錢 乳香另研各一錢 穿山甲五錢 灰

木鱉子四錢 去

右爲細末每服五分或一錢酒大半盞煎三

治法藥五卷

五沸服

木香檳榔丸 治食鬱氣滯作痛

木香三錢 檳榔三錢 青皮五錢 陳皮五錢 枳實大錢

白朮五錢 厚朴四錢 麥蘖十錢

右爲細末湯浸蒸捲丸桐子大每服五拾丸

曰湯送下

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化腹痛

滿悶不安方見傷食

瓜萋散 治傷食填塞太陰悶亂大痛兀兀欲

吐以此吐之吐定用消導和中藥見中風

霹靂散 治腹痛身冷脉微欲絕因于寒者丸

痛極脉必伏當從溫散不可遽認爲陰

附子一枚炮取出以冷灰

右以一味取五錢入真臘茶同研細爲末分

作一服水一盞煎茶分入蜜一匙稍涼服

酒煮當歸丸 治小腹寒痛及婦人白帶疝癰

大寒是痛等症

茴香五錢 黑附子炮 良薑七錢 當歸一兩

治法藥五卷

右四味細切以無灰土好酒升半煮至酒乾

焙乾入後藥

炙甘草 苦楝生用 丁香各五錢 木香

升麻各一錢 柴胡一錢 炒黃鹽 全蝎各三錢

玄胡索四錢

右與前四味共爲細末酒煮麴糊爲丸桐子

大每服五七十丸空心淡鹽湯下

芍藥甘草湯 治四時腹痛

白芍 甘草

各等分薑三片溫服

醫聖元戎曰腹痛脉弦傷氣用本藥、脉洪傷

金加黃芩、脉滿傷血加當歸、脉緩傷水加

桂枝、脉遲傷寒加乾薑、

加減小柴胡湯 治寒熱脉弦腹痛、本方去黃

芩加白芍藥、

四物苦楝湯 治臍下虛冷腹痛、

四物 六錢 加玄胡索 苦楝根 各錢半

水二盞煎一盞服

治法彙五卷

苦楝丸 治奔豚小腹作痛 見前門

一捏金散 治臍腹大痛及奔豚小腸氣等瘕

玄胡索 川楝子 全蠍 去毒炒 茴香

右等分爲細末每服二錢七溫酒調下

丹溪曰腹痛多是血脉凝澁不行必用酒炒芍

藥 酒洗 而痛加桂惡熱而痛加黃柏、

因飲食太過而作痛者必問因傷何物如傷生

冷硬物而作痛者東垣木香見現丸三稜消積

丸之類

如傷熱物而痛者枳實導滯丸三黃枳朮丸

類看強弱寒熱用而下之、

因跌撲損傷腹中痛者或日輕夜重是瘀血宜

桃仁承氣湯下之、

如跌撲後腹中隱隱痛有處是腹腸膜有損宜

活血行氣兼補養之不可妄認爲痰爲火因峻

利破泄藥曾見一人醉後踢門用力遂小腹癢

不止湯藥亂投臨成小腹腫青方悞夕日受病

之因也 治法彙五卷 腹痛 論

中宮有沉積挾血結久痛不止乳漆二兩搗碎

炒用出煙細研醋煮麪糊丸桐子大酒下五丸

至七丸醋湯亦可 塊痛在中脘諸藥不効玉

簪花根洗淨搗濃汁和好酒一半熱服、

一人中脘大痛脉弦而滑右爲甚乃食鬱也二

陳平胃加山查草豆蔻木香砂仁一服頓愈、

一人痛當臍綿綿不已脉弦伏無力因作狹陰

治理中湯加肉桂八分附子三分煎冷服、

一人中脘至小腹痛不可忍已拾參

試且不得臥臥則痛柱上每痛急則脉不見詢之因入房後過食肉食而致遂以爲陰而投薑附余思之飲食自信中氣損矣况在房勞之後宜宿物之不能運化又加燥劑太多消耗津液致成燥屎鬱滯不通所以不得臥而痛也古云胃不和則臥不安遂以枳實導滯丸叁錢去黑屎硃許小腹痛減矣又與黃連枳實瓜萐麥蘗厚朴山查菜菔子二服痛復移于小腹乃更與潤腸丸二服更衣痛除第軟倦不支投補中益

治法彙五卷

腹病

全五

氣湯調理半月而起

一人痛引腰脇不可俛仰脉弦數有力知肝火鬱結也投龍薈丸五十粒頓愈

一人腹痛而瀉口乾面時赤乃食積也與木香檳榔丸一服去硬物愈

一酒客每日腹痛瀉黃沫知積熱也投芩連厚朴炒梔子木通澤瀉赤茯苓二劑稍可復以酒蒸大黃爲丸酒下二錢凡三服遂不再舉

一婦小腹痛醫作陰治投熱劑不應又作燥屎

治者硝黃潤腸丸等藥屢用不減余詢之七日
前作寒熱起遂腹痛左三部皆絕小無力右寸關俱弦滑必起於外感內傷挾氣下早故食滯不下每痛則下黃水止作無時下傷津液故作渴遂以炒白芍白茯苓保脾木香青皮疏氣炒山梔清塊中之火當歸潤燥陳皮甘草和中小水不利加澤瀉升麻車前二劑黃水雖少痛塊不減隨用葱熨法復投二劑二便大去而安
小腹痛不止繞臍生瘡小便數似淋惡寒身上

治法彙五卷

腹病

全六

皮膚甲錯或自汗惡寒屬腸癰當從腸癰治詳見外科心法

腸鳴

內經曰中氣不足腸爲之苦鳴婁全善曰腸鳴多屬脾胃虛一男子腸鳴食少臍下有塊耕動若得下氣多乃已已則復鳴屢用疎氣降火藥半年不愈乃以理中湯爲君佐芩連枳實一服腸鳴止又每服吞厚朴紅豆蔻丸其氣耕亦平東垣曰胃寒腸鳴泄瀉升陽除濕湯加益智半

夏薑棗妙

丹溪曰腹中水鳴火擊動其水也二便加不

梔子必脉滑數胃氣強壯者乃可

病後鳴悉屬虛

取虫丸 見虫門

龍膽瀉肝湯 見腸痛門

香稜丸

理中湯 見寒門

滾痰丸 見痰門

金花丸 見火門

桃仁承氣湯 見傷寒門 調胃承氣湯 見傷寒門

積聚

有形為積或聚或散為聚 積有血積

三錫曰積在中為痰飲在右為食積在左為痰血乃丹溪確論也然胃脘有食積而病發在中者亦有肝氣與宿食相假而積在左者又不可拘泥也曾治一少年體薄弱且咳血左邊一塊不時上攻作痛左金蘆薈俱不應診其脉三部雖弦而細澀不流利因作陰虛治四物加知柏治法彙五卷

積聚

玄參牡丹皮不六劑頓愈此又陰虛似肝積也推此雖因部分名積診視之際猶當詳審病病皆然惟圓機者不昧此語

食積酸心腹滿大黃牽牛之類甚者礞石巴豆酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者甘遂牽牛氣積噎氣痞塞木香檳榔之類甚者枳殼牽牛涎積咽如拽鋸硃砂膩粉之類甚者瓜蒂甘遂痰積涕唾稠粘半夏南星之類甚者瓜蒂藜蘆癖積兩脇刺痛三稜廣茂之類甚者甘遂蜆蜊

水積足脛脹滿郁李商陸之類甚者其
血積打撲閃肭瘀血產後不月桃仁地榆之類
甚者此蟲水蛭

肉積質膩粉白丁香甚者阿魏礪砂或砒刺
出血

河間曰腸胃之絡傷則血溢腸外與痰沫相搏
復遇外寒凝聚而成積矣居于皮裏膜外苟非
剖腹割腸之技何能滌除但不防碍飲食抵宜
養胃中

治法彙五卷

積聚

大法臑以軟之堅以劑之行氣開痰為主

積塊不可專用下藥徒損其氣病亦不去當消
導使之鎔化塊去須大瀉

積久胃弱形羸曾經攻下不消脉弱或大無力
宜養胃氣善乎潔古之論曰養正積自除辟如
滿座皆君子縱有一小人自無容地而出真氣
盛胃氣強積自無矣乃千古至確之論

或中或右硬痛不移嘔吐飽脹或作寒熱身痛
有類外感氣口緊盛或弦急為食鬱二積導痰

山查枳實神麴香附平胃有下症者枳實
丸保和丸隨症加減

五臟之積古方有五積丸皆辛散鹹軟巴豆薑
附稜木等出入學者因時制宜大抵不外行氣
開痰等法猛劑恐未可驟用也

因肉食成積者阿魏丸佳

惡心嘈雜心下痞塞忽時眩暈麻木脉沉滑為
痰積二陳厚粉香附枳木越鞠之類作丸服

火症者滾痰丸妙

治法彙五卷

積聚

口出清水或時吐虫或偏嗜一物脉乍大乍小
面上白斑唇紅能食時痛時止為虫積上半月
頭向上易治下半月頭向下難治先以肉汁及
糖蜜食引虫頭向上用化虫丸萬應丸或苦楝
根檳榔鶴虱煎湯飲妙

石礪去痰積食積滌垢膩最妙

瓦壘子能消血塊次消痰積燒紅以醋淬三度
醋膏為丸治一切氣血塊癥瘕

痞塊在皮裏膜外須以二陳湯加補藥香附開

之兼二陳湯先須斷厚味為要

木香檳榔去氣積 流金膏去酒積 桃仁紅

花蘇木去血積 甚則用蜆蛭水蛭 山查阿

魏去肉積 牽牛甘遂去水積 雄黃膩粉去

涎積

積塊方用海石三稜莪朮香附俱醋煮桃仁紅

花五靈脂之類為丸石礮白朮湯下

黃蜀根煎湯治小腹有塊曾服瀉藥止經因而

血滯成塊并溪用此法妙入人參白朮青陳皮

治法彙五卷積聚

卷一

甘草牛膝煎膏入研細桃仁玄明粉各少許熱

飲之二服當見塊下病重者補接之後加減調

理或再行一度去塊一二次去葵根玄明粉

取重丸

胡黃連 蕪荑 雷丸 鶴虱 大黃

史君子 錫灰 三稜 蓬朮 木香

檳榔 青皮

腸中瘕積行倒倉法妙但虛人不可輕試耳

三聖膏貼積用未化白石灰半斤為末瓦上炒

紅提出稍冷入大黃末一兩炒熱仍提出入桂

心末五錢畧炒以米醋熬成膏厚攤烘熱貼之

琥珀膏用大黃朴硝各一兩為末以大蒜搗膏

貼之

阿魏丸 治肉積成塊

阿魏 山查各一兩連翹 五錢 黃連 六錢 五

右以三味為細末以阿魏用米醋煮糊丸桐

子大每服五十丸脾胃虛者以白朮三錢陳

皮茯苓各一錢煎湯下

治法彙五卷積聚

卷一

一方加半夏一兩以皂角水同煮透晒乾用石

礮三錢

又一方以醋煮神麴為丸兼連翹

又一方兼諸方而又有瓜蜚貝母南星風化硝

胡連萊菔子麥蘖麴湯浸蒸卷丸服治諸般積

聚皆妙智者因病增損原無一定妙在合宜耳

大溫中丸俱因食積或痞塊面色痿黃肌膚虛

腫飲食無味等而設藥雖稍峻對症必奏奇効

藥籠中亦不可不並蓄也方見痘門

婦人腹中有塊多屬瘀血

一方治婦人瘀血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴臍雜脈逆身熱時作

黃連兩半半用吳茱萸拌炒 萊菔子兩半

台芎 梔子 三棱 蓬朮 麥麴

枳實各一兩 香附便 山查各一兩

右為細末蒸餅丸黍米大每服一百丸薑湯下

一法醋煮香附一斤先浸半日煮焙乾為末醋

治法藥五卷積聚

糊丸醋湯下七十九治經候不調痞癖積塊頭運惡心加枳朮當歸各四兩俱酒浸各濟陰丸消血塊刺痛妙

一方治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附兩 桃仁皮 白朮兩 海石兩

右神麴為丸每服二錢白湯下

廣朮潰堅湯治積塊堅硬如石形大如盤令人

坐臥不安中滿腹脹

半夏厚朴湯治症同前見腫脹門

原垣草豆蔻丸 治酒積或傷寒冷之物胃脘痛嘔膈不通

草豆蔻兩 白朮各一兩 大麥芽 神麴各

黃芩 半夏兩 枳實兩 陳皮 青皮

乾薑各二錢 炒鹽半兩

炊餅丸菴豆大每服百丸白湯下

木香通氣丸 治痰癖氣滯心腹痞滿嘔吐咳嗽一切氣滯順氣消痰進食消痞

人參 木香各一兩 玄胡索兩 陳皮

治法藥五卷積聚

牽牛各六兩 檳榔 丁香各半兩 三棱

莪朮各兩 半夏 茴香 木通 神麴

麥蘖各二兩 青皮

右末糊丸小豆大每服三四十丸生薑湯下

千金硝石丸 磨積塊不令人困須量虛實用

之

硝石即朴硝 大黃八兩 人參 甘草三兩

右為細末以三年陳醋三升置磁器中用竹

片作準每入一升作一刻先入大黃不住手

攪便微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火
熬使可丸如彈子大每服一丸白湯下或丸
如桐子大每服三五十丸服後下如鷄肝或
如米泔赤黑色等物乃効下後忌風冷宜微
粥將息

局方妙香丸 治久年陳積方見火門

兩關脉弦急脇痛有塊是肝實也龍薈丸二錢
半加桃仁薑黃各五錢蜜丸服

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔
吐治法彙五卷積聚

吐酸水丈夫酒積婦人血積小兒食積

並妙

陳皮 青皮 莪朮 三稜二味醋

乾薑 良薑各一兩 香附二兩

右末醋糊丸桐子大每服二十丸薑湯下

肥氣丸 治肝之積在左脇下如覆盆有頭足

如龜贅狀久不愈發咳逆嘔其脉弦細

當歸頭 蒼朮各兩 青皮炒一兩 莪朮

三稜 鐵孕粉各三兩與稜朮同入醋煮

蛇含石煨醋淨五錢

右爲末醋煮米糊丸菉豆大每服四五十丸
當歸浸酒下

伏梁丸 治心之積名曰伏梁起臍上大如臂

猶梁之橫架于胸間久不已令人煩心

身體脛股皆腫環臍作痛脉沉而北

枳殼炒 茯苓 厚朴 人參 白朮

半夏 三稜煨各等分

右爲末麵糊丸桐子大米飲下二十九作散

治法彙五卷積聚

酒下亦可

痞氣丸 治脾積在胃脘覆大如盤久不愈令

人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚心

痛徹背背痛徹心其脉浮大而長

附子兩半 赤石脂煨醋 川椒炒 乾薑

桂心兩半 大烏頭二錢半泡去皮脂

右末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服十丸米飲

下

忌黃湯 治肺積在右脇下大如鵝血久不愈

病酒惡寒氣逆喘咳發肺癰其脈

而毛

半夏

湯泡七次 莫茱萸

湯洗 桂心

人參

甘草

炙

桑白皮

炙

葶藶

各一兩五錢

右剉每服四錢水鍾半薑七片棗二枚煎八

分食遠服

奔豚湯

治腎之積名曰奔豚發于小腹若豚

狀或上或下無時久不愈令人喘逆骨

痠少氣其脈沉滑

治法彙五卷

積聚

九七

甘李根皮

乾

乾葛

各一兩

當歸

川芎

半夏

湯泡七次

白芍

甘草

炙 黃芩

右剉每服四錢水鍾半煎七分服

茶癖

用石膏

黃芩

升麻

右爲末砂糖水調下

一方食茶葉面黃用白朮

軟石膏

片苓

白芍

膽星

薄荷

共末糖調成膏臨睡津液下

人凡偏食一物中必有重卽以所好投之隨上

臣藥無不應手獲効

一人飲茶過度且多憤懣腹中常輾轉有聲秋

來發熱寒似瘧以十棗湯料黑豆煮晒乾研末

棗肉和丸芥子大而以棗湯下之初服五分不

動又服五分無何腹痛甚以大棗湯飲大便五

六行皆糖糞無水時蓋晡時也夜半乃大下數

斗積水而疾平當其下時瞑眩特甚手足厥冷

絕而復甦舉家號泣咸咎藥峻嗟乎藥可輕哉

一法病人果有積水瘀血實者可用小胃丹行

治法彙五卷

積聚

九七

水抵當湯行血虛者不若且以淡滲之劑加竹

瀝薑汁以治痰而於隨症藥中加桃仁韭汁之

屬以活血以漸而平慎無以旦夕之功而貽後

悔也

一切有餘濕熱痰火痰涎壅滯酒客膏粱實人

脈滑實有力者遇僊丹妙又治血積氣積痰癖

肢節腫痛等症

白牽牛頭末

四兩半

白檳榔

一箇陳

五錢

蓬朮

三錢

牙皂

各五錢

一方加

沉香一兩

右末醋糊丸。菉豆大。每服三錢。五更時涼茶下。天明看所去之物。有積去。積有虫去。虫小兒減半。孕婦勿用。

霞天膏

即倒倉法。有人指授韓懋天爵投剪劑治痰而遂推廣之。黃牯牛一具。選純黃肥澤無病纔一二歲者。右洗淨。取四腿項脊去筋膜。將精肉切作塊子。如粟大。秤三十斤。或四五十斤。於淨治法藥方卷八積聚

九方

室以大銅鍋。或新鐵鍋。加長流水煮之。不時攪動。另以一新鍋。煮沸湯。旋加。常使水淹肉五六寸。掠去浮沫。直煮至肉爛如泥。漉去渣。却將肉汁以細布漉入小銅鍋。用一色桑柴文武火候。不住手攪。不加熟水。只以汁漸如稀餚。滴水不散。色如琥珀。其膏成矣。此即火候最要。小心不然藥矣。大段每肉十二斤。可煉膏一斤。磁器盛之。用調煎劑。初少漸多。沸熱自成。溶化用和丸劑。則每三分。攪白麵一分。同煮為糊。或同煉蜜。寒天

久收若生微用重湯煮過。熱天冷水窖之。可留三日。

蘇寶導滯丸

佛和丸

俱見傷食門

化虫丸

萬應丸

俱見虫門

十棗湯

小胃丹

俱見痰門

抵當湯

見血門

積聚

脇痛

脇痛有火有痰流注有瘀血有氣滯

肝火痛在左左關必弦右脉亦然屬肝木有餘

宜平肝清火柴胡炒梔子歸尾醋製青皮橘

紅酒芍藥主之不已加吳茱萸炒黃連甚者

加酒炒膽草審果木氣實當歸龍薈丸

痰飲在右體厚脉沉滑屬濕痰流注宜二陳蒼

朮白芥子酒芩膽星枳殼香附煎成加木香

水參茶匙不已控涎丹

治法彙五卷

一百一

因怒氣大逆肝氣鬱甚謀慮不決風中于肝皆

使木氣太實故火盛肝氣急也故痛宜疎肝降

火

因痰下流注于厥陰之經亦能使脇痛病則咳

嗽氣急相引而痛從痰治嗽而脇痛者當疎肝

氣脉弦滑用二陳南星青皮香附青黛薑汁脉

細澀屬陰虛四物加青皮

左痛宜醋製青皮右加枳殼鬱金

食積脇痛發寒熱痛引心下惡心惡食右手脉

沉滑當作食積治先以鹽湯探吐吐定用二

陳蒼朮枳朴山楂川芎柴胡紫蘇有表加表

藥

氣滯兩手脉沉伏或弦痛引肩背胸脇不得俛

仰屬氣滯也宜疎氣開鬱二陳加川芎枳殼

蘇子萊菔子烏藥青皮香附木香之類甚者

加蓬朮

肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮或用小柴

胡湯蓋本方原為脇痛發寒熱者必用之劑

治法彙五卷

一百二

左痛以柴胡為主加佐使藥川芎青皮草龍膽

之類

兩脇走痛因于痰者控涎丹佳以痰在脇下非

白芥子不能除也

脇下一條扛起挾食積痛消導藥中加莫茱萸

炒黃連

氣弱之人脇下痛脉細緊或弦多從勞役怒氣

得之八物湯加木香青皮或加桂心煎服

去滯氣須用青皮乃肝膽貳經藥人多怒脇下

有鬱積者固宜以解貳經之實者若貳經氣血不足者先當補血氣少佐青皮可也

氣虛肥白人氣虛發熱而脇下痛用參耆補氣柴胡黃芩退熱木香青皮調氣

陰虛瘦弱人寒熱脇下痛多怒必有瘀血宜桃仁紅花柴胡青皮大黃之類

發寒熱脇痛似有塊痛必是飲食太飽勞力所致必用龍薈丸治之

解痛治標貼琥珀膏妙又方芥菜子水研付又治法彙五卷

脇痛方以莫茱萸水研傳又方以韭菜搗細炒熟貼而以熨斗盛火熨之

房勞過傷腎虛羸怯之人胸膈脇助多隱微痛乃腎虛不能約氣氣虛不能生血之故氣血

猶水也盛則流暢少則壅滯宜破故紙之類補腎四物之類和血若作尋常脇痛治即始矣

推氣散治右脇痛甚脹滿不食片薑黃枳殼炒桂心各五甘草炙二錢

右爲末每服貳錢薑湯調下水煎亦可

枳芎散治右脇下痛不可忍

枳實炒川芎各錢甘草炙右細末酒調下或白湯

異香散治腹脇膨脹痛且噎塞辛以散之蓬朮煨益志仁各錢耳草炙荆三稜各錢

青皮各錢陳皮各錢厚朴製蓮肉各錢右薑炙片棗壹枚白鹽少許煎服

分氣紫蘇飲治腹脇痛氣促喘急五味子各錢桔梗各錢蘇葉各錢桑白皮各錢

治法彙五卷脇痛草果仁各錢陳皮各錢大腹皮洗茯苓各錢

薑參片白鹽少許煎

河間芎藭湯治脇痛不可忍用桂枝川芎細辛乾葛防風各捌分芍藥枳殼麻黃人參甘草各肆分皆散表之藥必冬月有表邪者乃可

丹溪曰凡脇痛多是肝木有餘也宜小柴胡加青皮川芎芍藥龍膽甚者煎成入青黛麝香

香

痰涎注本方倍半夏加橘紅南星二木茯苓
芎白芥子之類氣實脉滑有力十棗湯最佳
瘀血作痛者小柴胡合四物加桃仁紅花或乳
香沒藥煎服痛甚元氣壯實者桃仁承氣湯下
之

性急多怒之人時常腹脇作痛者小柴胡加川
芎芍藥青皮之類煎服甚者以前藥送下龍薈
丸甚速甚效

婦女多鬱結兼舒氣

治法彙五卷

脇痛

一百五

當歸龍薈丸瀉肝火太甚之要藥因內有濕熱
兩脇痛甚用以伐肝木之邪必脉弦急而
氣實者宜之

當歸 龍膽 梔子仁 黃連 大黃

火炒各 伍錢 木香 二錢 蘆薈 各五錢

麝香 五分

右爲細末神麴糊丸桐子大每服貳拾丸生

薑湯下

方加柴胡伍錢青皮壹兩熱甚者烘熱服

一方木氣實者用川芎蒼朮青皮芍藥柴胡
草龍膽各等分水煎服

左金丸佐金平木之義瀉肝火行濕爲熱甚之
反佐

黃連 六分 莫茱萸 壹分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸菜豆大每服參伍
拾丸淡薑湯下

一方破血行氣治瘀血作痛之症

桃仁 去皮留尖 紅花 酒洗焙 川芎 青皮

治法彙五卷

脇痛

一百六

香附 等分

右細切水煎服

正傳治驗一人左寸尺弦數而瀉關朮且數右

參部皆虛且靜明是血症因壹年前墜馬次年

遂痛用抵當丸壹服下黑血貳升後以四物加

減調理而愈

又遇勞與饑則脇痛用八珍加牛膝木瓜山藥

石斛薏仁酸棗仁枳子仁桃仁煎服之頓愈

又一人同此醫投平肝藥痛止錄之以

分 連翹

柴胡清肝散 治肝膽三焦熱瘡瘍或怒火

寒發熱或瘡毒結于兩耳前後或身外

至足或胸乳小腹下或兩股內側至足

症有驗

柴胡 黃芩 人參 山梔 川芎 各

分 連翹 桔梗 甘草 各

右水煎服

肥膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩脇腫痛或腹中

治法彙編 卷五 腰痛 百七

疼痛或小便澀滯等症

龍膽草 酒炒 澤瀉 各錢 車前子 炒 木通

生地黃 酒拌 當歸 酒片 山梔 炒 黃芩 炒

甘草 各分

右水煎服

小柴胡湯 見傷寒門 桃仁承氣湯 見傷寒門

八物湯 見虛損門

琥珀膏 見積聚門

十棗湯 見痰飲門

腰痛

腰痛有濕熱有濕痰流注有閃挫有瘀血有腎

虛有氣滯有寒有風

濕熱六脉數急而弦或沉濡而數小便黃腰痛

不待俛仰遇天陰及久坐便痛屬濕熱宜滲

濕清熱當歸拈痛湯出入有寒熱者當先發

散

東垣曰身重腰沉沉然痛乃經絡中有濕也薏

活勝濕湯加黃柏壹錢附子五分蒼朮二錢

治法彙編 卷五 腰痛 百八

濕痰脉滑或沉伏動作便有痰或一塊作痛是

濕痰多見于肥盛之人宜快氣豁痰使痰隨

氣運加味豁痰湯主之不應控涎丹徐徐服

之方見痰門

捫拈肝脉搏堅而長或兩尺脉實忽跳不可饒

仰屬閃挫此雖起于偶然亦必有筋覺方可

作閃拈治宜先以乳沒研細沖酒飲之次用

活血行氣藥復元通氣散主之不効必有瘀

血五積加桃仁大黃蘇木各一錢當歸倍原

數

瘀血脈滯滯或花日輕夜重大便黑小便黃轉側如錐刺屬瘀血宜順氣活血元戎加味四物湯或加桃仁紅花王之人壯氣實者桃仁承氣加紅花桂下之果因閃挫打撲瘀血爲患乃可

腎虛脈大或兩尺洪盛疼之不已是腎虛宜滋腎四物加黃柏杜仲五味之類吞補腎丸或青娥丸或大補陰丸萆薢丸

治法彙五卷腰痛

一頁

陰虛因辛苦勞碌而得者宜補養兼利肢節四物加杜仲牛膝羌活獨活少入肉桂爲響導有大加知母甚者十補湯吞青娥丸

風傷腎而痛脈必帶浮或左或右痛無常處牽引兩足宜五積散加防風半錢全蝎三箇小續命湯獨活寄生湯選用仍吞三仙丹三因方用杜仲三錢炒煎酒服又牛膝酒治風毒攻腎刺痛傷濕腰痛如坐水中久坐濕地或爲雨露所傷乘腎虛久客必帶緩遇天陰

久生而發宜溲濕湯不効腎着湯或生附散

感寒而痛腰間如水其脈必緊見熱則減見寒則增宜五積散去桔加吳茱半錢或薑附湯加辣桂外用摩腰膏挾熱者脈必洪數而滑發渴便秘宜甘豆湯加續斷天麻大便秘宜微利之

偶被風寒濕所鬱而作痛宜五積散加減酒獨爲主

治法彙五卷腰痛

一頁

諸腰痛甚者不可用補氣藥及寒涼藥初必加溫散和血快氣後必加補腎藥四物牛杜之類房勞辛苦之人悉宜補審氣血孰虛治各加製附子少許爲引下響導最妙

腎着一病腰重若帶五千錢腰下冷如冰小便自利兼用溫藥三因腎着湯主之

氣滯而痛脈必沉弦或伏結實人初起木香流氣飲日久宜理氣養血

一人因太勞又過飲酒致濕熱乘虛入客于經

作癰夜更甚不得俛仰脉濡而弱先與拈痛去
參朮二貼稍愈遂改用四物加杜仲牛膝獨活
肉桂頓愈

一人脉症同上服拈痛漸減一人改用桂附遂
攻出一腫出膿大補消

一人肥盛而肢節痛腰更甚脉沉濡而滑知濕
痰也予二陳加南星二朮二活秦艽防風十劑
愈

一人體厚腰間常冷予腎着湯加星半蒼朮三
治法彙五卷腰痛 一百一十一

服全愈

一人因墮馬後痛不止日輕夜重瘀血諦矣與
四物去地加肉桂桃仁泥紅花蘇木四服大便秘
下黑而痊

一人素有脚氣每發則引腰痛不可俛仰其人
雄飲明是濕熱脉濡而數投拈痛湯八劑漸減
遂以捉虎丹酒下二丸空心凡三服腿腕出黑
汗永不再發

丹溪曰久腰痛必用官桂開之方止腹脇痛亦

然橘香丸治腰痛經久不瘥亦用官桂開之
義也

當歸拈痛湯 治濕熱為病肩痛沉重肢節腰
脇疼痛胸膈不利

白朮八分 人參 升麻 苦參酒炒 葛根
蒼朮錢各一 知母 澤瀉 黃芩 猪苓

當歸各八分 生地酒洗 茵陳酒炒 炙甘草
羌活錢各一 防風

食遠服
治法彙五卷腰痛 一百一十二

加味豁痰湯 治痰流注腰痛

半夏 赤茯 甘草 陳皮 南星
蒼朮 羌活 枳殼 獨活 防風

姜煎服
元戎加味四物湯 治瘀血腰痛

本方加桃仁泥 酒洗紅花
肉桂少許 或加蘇木

補腎丸
黃柏 龜板 杜仲 牛膝 陳皮各一兩

乾薑五錢 少加五味子

右爲末薑打糊丸溫酒或白湯下

煨腎散 治腎虛腰痛

酒炒杜仲三錢炒斷絲一味爲末以猪腰

子一枚批作五七片以椒鹽醃去腥水摻

藥末在內以荷葉包裹更加濕紙二三重

微火中煨熟食無灰酒下

三因青娥丸 治腎虛腰痛常服壯筋補虛

杜仲一斤酥炙 生薑十一兩 破故紙一斤炒

治法彙五卷 腰痛

一百三

右爲末用胡桃一百二十個湯浸去皮研膏

加蜜些少丸桐子大每服五十九丸鹽湯下

五積散 見中寒門

腎着湯 治腎着腰冷痛

乾薑炮 茯苓各錢半 甘草炙五錢 白朮二錢半

水煎服

捉虎丹

草烏頭 五靈脂 木鱉子一兩去壳

白膠香兩 地龍去泥土 京墨二錢 乳香

芫花半 當歸半 麝香二錢

右爲細末糯米飯丸桐子大每服一九或二

丸多至三五丸空心溫酒下

按白膠香乃楓香樹脂藥肆無此皆松香之

白者殊非立法之初意如用必于夏月山中

于楓樹上流出者採用方妙

華薛丸 治腎損骨痿不能起于床腰背腿皆

痛

華薛 杜仲炒去絲 菴蓉 兔絲子酒浸

治法彙五卷 腰痛

一百四

右等分細末猪腰子搗爛丸桐子大每服五

拾丸至七十丸空心溫酒下

摩腰膏 治老人虛人腰痛並婦人白帶

附子尖 烏頭尖 南星各二錢半 雄黃一錢

樟腦 丁香 乾薑 莫茱萸各錢半

硃砂一錢 麝香五粒大者

右爲末蜜丸桐子大每用一九薑汁化開如

粥厚火上頓熱置掌中摩腰眼候藥盡粘腰

上烘綿衣包縛定隨即覺熱如火日易次

補腎丹 補腎強筋骨

沒藥一兩 杜仲 去皮炒 鹿茸 二兩

神骨脂十兩 用脂 脈五兩 司

除皮枰為膏入麩少許酒煮麩糊丸桐子大

每一百丸溫酒鹽湯下

歷元英談藪載一少年新婚後得脚軟病疼甚

象作脚氣治不効孫琳用杜仲一味寸斷片折

每以一兩用半酒水煎服三日能行又三日全

治法彙五卷 腰痛 頁五

愈

大抵諸腰痛皆起于腎虛統挾邪氣則當先去

其邪若子和以茸遂陳皮當歸等分為末服參

錢酒下者準繩用黑白丑炒末五靈脂各參錢

狗脊微炒半兩草薢炒參錢沒藥二錢胡桃肉

五個醋糊丸甚者加濕紙煨熟巴豆五粒下五

七次後用煨腎散及無北山藥丸是先瀉後補

也

腰痛足太陽經也 膀痛足少陽膽之所過也

若因傷于寒濕流注經絡結滯骨節氣血不和

而致腰膝痛宜除濕丹或參濕湯加芍藥青皮

蒼朮檳榔有痰滯經絡導痰加檳榔青皮芍藥

片澤以為腎肝伏熱治用黃柏防已

背痛

看書久坐對奕而腰背痛者屬虛補中益氣為

主八物湯 肥人多痰年高必用人撻而痛快

者屬痰屬虛除濕化痰兼補脾腎 醉飽後多

痛欲飽是脾不運而濕熱作楚也須節飲 瘦

治法彙五卷 腰痛 頁五

人多血少陰虛亦不禁酒及厚味而然養血

清火四物酒芩連牡丹皮 背痛須加羌活防

風引經肥人少佐附子

有素虛人及病後產後經行後心痛或牽引乳

脇或走注肩背此元氣上逆當引使歸元不可

復下疎刷愈刷愈痛發汗人患此者眾惟宜溫

補拘于痛無補法之法誤矣汗者心之液陽受

氣于胸中汗過多則心液耗陽氣不足故致痛

也

丹谿治一男子忽患肩背胛縫一線疼上膊至胸前側脇而止其痛晝夜不息不可忍其脈弦數重取豁大左大于右夫胛小腸經也胸脇膈經也此必思慮傷心臟未病而膈先病故痛從背胛起謀慮不決又歸之膈故痛至胸脇而止乃小腸火來乘膽木子來乘母是為實邪詢之果因謀慮不遂而病以人參肆錢木通貳錢煎湯下龍督丸數服愈

痛風

平居四肢百節或上或下或偏于左或偏于右或遊走不定而痛者是名痛風一名痛痺又名白虎歷節風有火有痰有濕有血虛有瘀血火六脈洪數或大有力症兼口乾燥而痛者屬火宜清火和血四物易生地酒芩栢知母秦芄看上下加減○熱盛則痛

濕脈沉滑症兼惡心頭眩而痛者屬濕二陳加酒芩二活蒼水秦芄竹瀝薑汁○濕盛則腫

清法彙金卷

痛風

濕熱脈濡緩或沉細身體重着而痛者屬濕濕熱相兼脈必沉濡帶數急以二陳二朮加羌活獨活防風秦芄等風藥以風能勝濕故也有熱加酒連知栢

血虛脈孔大如葱管無力四肢濡弱而痛甚于夜者屬血虛宜補血滋陰四物加知栢之類或血虛而滯隱隱然痛在一處不移脈澁者屬血虛宜歸赤芍桃仁紅花及大黃微利之

經脈必... ○上下牽引疼痛是...
涎伏于腦間必垂頭目昏重夜間喉有痰聲

控涎丹不過數服佳

瘦人多血虛有火脈必數滿而細疾養血爲先
上部痛宜兼發散二陳二活防風蒼朮酒芩薄
桂威靈仙薑蔥微汗

下部痛宜分利小便四苓散加防已木通牛膝
黃柏蒼朮歸身若腫痛而大便不通者宜大柴
胡湯微下之上下痛屬濕熱者當歸拈痛湯最
治法彙五卷 痛風 一百五

佳

丹溪曰因濕痰濁血流注爲病若在下焦道路
深遠非烏附氣壯不能下達須少加引經用之
若以爲主而治非徒無益而反有殺人之毒善
治者必行氣流濕舒風導滯血養新血降陽升
陰治有先後須分腫與不腫可也

痛家斷不可食厚味與肉肉屬陽大能助火

活血丹與四物蒼朮各半湯治遍身疼痛如神
血虛產後胎前一切大病後血少不能榮筋而

虛弱或并大無力四物養血爲主

如素有火盛而痛者因少水不能滅盛火再加
厚味必加口有乾燥中有痞悶下有遺溺須速
將一切油膩肉麪魚腥椒料酒羊等厚味痛絕
之乃以二陳加酒浸白芍藥少佐黃連降心火
看作何應又爲區處也

大法蒼朮星芎酒芩歸芷在上加羌活桔梗威
靈仙

下焦濕熱腫痛用防已草龍膽黃柏知母固是
治法彙五卷 痛風 一百五

捷藥若肥人病此宜蒼白朮南星滑石茯苓之
類瘦人加當歸紅花桃仁牛膝檳榔

下部腫痛須利小便五苓八正大橘皮加燈心
竹葉主之

薄桂味薄者能橫行手臂頰南星蒼朮等藥至
痛處

威靈仙治上體痛風弱人勿用

漢防已治下體痛風胃弱忌之

高年舉動則筋痛是血不能養筋也名爲枯不

此四物主之

兩手十指一指疼了一指疼疼後又腫骨頭裏
痛左膝痛了右膝痛發時多在五日少則三日
晝輕夜重痛時覺熱行則痛輕腫則重解曰先
血後氣素問曰先痛而後重者形傷氣也和血
散氣湯主之

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦痛惡寒煩悶脊

骨押眼膝臍俱痛脉沉數蒼朮四兩水二

鍾煎一鍾去查入下項藥

治法彙五卷

痛風

百手

羌活 升麻 澤瀉 柴胡 藁本

白朮 各半

黃柏 錢

紅花 少許

煎八分服

一方治上下痛風

黃柏 酒炒 蒼朮 水浸

南星 各二

神麴 炒

台芎 各一 防已

白芷

桃仁 各伍

威靈僊 酒桂枝

羌活 各二

膽草 各錢

酒紅花 五錢

右爲末神麴糊丸桐子大每服一百丸空腹

服

血痢止早惡血留于經絡作痛甚者四物加桃
仁紅花牛膝黃芩陳皮甘草煎生薑汁研滑行
散少酒飲之多服自驗于委中刺黑血妙
一方用明松節一兩加乳香一錢炒焦存性蒼
朮一兩紫葳一兩甘草半兩黃柏一兩桃仁去
皮尖一兩俱爲末每服叁錢加薑汁重湯盪沸
服

凡久痢後兩脚痠軟痛或膝腫如鼓槌此凶陰

治法彙五卷

痛風

百手

也宜以芎歸熟地等補血藥治之自愈挾氣虛
者加參耆挾風濕者加羌活防風白芷之類切
不可純作風治而用風藥反燥其血終不能愈

足枯細但膝腫大者鶴膝風大防風湯

丹溪方治氣血兩虛有濁痰陰火痛風

人參 山藥 海石 南星 各一 白朮

熟地 黃柏 酒炒 龜板 酥炙 各二

乾薑 各存 瑣陽 各五

酒糊丸

丹溪曰肢節腫痛痛屬火腫屬風為風火鬱而發動于經絡之中濕熱流注于肢節之間而無已也宜微汗先以散之

麻黃去根 赤芍各一錢 防風 荆芥 二活

白芷 桔梗各五分 葛根 川芎各五分

甘草 歸梢 升麻各二分 下焦加酒

婦人加酒紅花 腫甚加檳榔大腹皮

更加沒藥壹錢定痛尤妙

一云脉澁滯者有瘀血宜桃仁泥紅花芍歸

甚者加大黃微利之

二妙散 治下部濕熱為病

黃柏酒炒 蒼朮米泔浸春秋二節冬三宿夏一宿四兩

右為末沸湯入薑汁調服或用蒸餅為丸薑

鹽湯下二味皆雄壯下行之氣表實不得汗

者加酒少許佐之仍看所挾氣血增減

潛行散

黃柏一味酒浸晒乾為末每服方寸匕血

虛有火痛風煎四物湯調下最勝

三焦痛身上一焦濕痰橫行經絡中作痛也

二朮 二陳 香附 酒芩 威靈仙

薑三片食後服

又方

赤芍 青皮各錢半 紫葳 台芎各七分五

威靈仙 木鱉子錢半 防風錢半 甘草錢半

酒煎服

婦人背背脇走痛

赤芍錢一 桂枝 蒼朮各三分 香附 炒黃柏

治法錄五卷風 威靈仙錢半 甘草五分

白水煎服

治走注痛

威靈仙 蒼朮 桃仁泥各一錢 川芎錢半

川歸 桂枝

薑五片童便竹瀝各半盞煎一盞熱服

外貼方牛皮膠一兩水鎔成膏薑子安息香

川椒附子各半兩為細末入膠中和成膏塗紙

上隨痛處貼之 草麻子一兩黃牛乳

香一錢另研石以猪肚脂煉去沫成膏
入藥攪勻塗摩痛處以手摩如火熱妙
定痛丸 治風濕一切痛

乳香 沒藥 金星草 地龍土土

五靈脂 木鱉子等分

神蜜丸 彈子大每服一九酒磨下

丹溪曰世俗有用草藥而獲効者如石絲爲君
過山龍爲佐皆性急而燥濕者不能養血舒筋
惟能燥濕病之淺者濕痰得燥而開瘀血得熱

治法彙五卷痛風 草

而行故有速効若病深而血少者愈却愈虛而
痛愈急矣戒之戒之

獨活寄生湯 治肝腎虛弱感冒風濕致濕痺

兩足緩縱軟弱不仁

大抵身痛因風寒濕外感者已見本門其平人
或上或下痛者肥人責之痰瘦人責之血少遇
勞則痛屬氣血兩虛與久坐耽書痛同八物爲
主體厚多濕痰二陳加桂附二朮秦艽二活膝
勝濕也

風天麻湯 治風濕麻痺肢節走痛注痛

犀偏枯或暴不語內外風熱壅滯昏眩

防風 天麻 川芎 羌活 白芷

草烏頭 白附子 荆芥 當歸 甘草

炙各 白滑石二兩

右爲末蜜酒下

舒筋湯 治臂痛不能舉蓋是氣血凝滯經絡

不行所致一名通氣飲子一名五痺湯

効如神

治法彙五卷痛風 真

片子薑黃錢二 甘草錢二 羌活錢二 海桐皮錢二

當歸去頭 赤芍藥 白朮各一錢

薑參片煎成入磨沉香少許入內服

本草海桐皮能行經絡達病所又入血分及去

風殺虫古方治腰腿痛用二兩牛膝芎藭羌活

五加皮各一兩甘草五錢薏苡二兩生地十兩

浸酒二十早晚午各一盃此方不得加減

經驗九藤酒 治遠年痛風與中風左癱右瘓

筋脉拘急日夜作痛叫喚不已

青藤 釣鈎藤 紅藤卽省風藤 丁公

藤又名風藤 桑絡藤 虎絲藤卽無根

藤 天僊藤卽青木香 陰地蕨卽地茶

取根五味子俗名紅肉消 忍冬藤各三

右細切以無灰酒一大斗用磁罐一個盛酒

其藥用真綿包裹放酒中浸之密封罐中不

可泄氣春夏七日冬十日夏五日每服一盞

日三服隨病上下早晚進

經驗加味二妙丸 治兩足濕熱疼痛或如木

治法彙五卷 痛風 真

燎從足跗熱起漸至腰膝或麻痺痿軟皆

濕爲病

蒼朮 川黃柏 二兩酒 牛膝 一兩 歸尾 二兩

防已 兩 川草薢 兩 龜板 酥炙 一兩

酒糊丸桐子大每一百丸空心鹽薑湯下

木通一味每用二兩長流水煎汁頓服服一時

許遍身癢甚出紅丹及汗爲佳

晝減夜甚痛徹骨如虎咬名白虎歷節風如掣

者寒多腫甚爲濕多出汗爲風多通用處骨犀

角 黃耆 青木香 當歸 赤芍 牛膝 羌活 秦艽 骨碎

補桃仁各一兩甘草半兩槲葉一握每服五錢

煎服臨服入麝少許

洗法

用樟木屑泡湯置大桶中桶邊放一小枕

安痛處于湯上露之外用綿被覆定其湯

不可近眼屢驗

通氣防風湯 治肩背痛不可迴顧此太陽經

氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似

治法彙五卷 痛風 真

折項似拔者屬太陽經氣不通也

二活 錢各一 蔓本 防風 甘草 各半

川芎 荊子 各三 水煎服

獨痺湯 治風痰濕火鬱四肢手足頑痺者

此方主之

黃耆 蜜炙 防風 羌活 赤芍 薑黃 炒

當歸 酒洗 各三 甘草 各五 分炙

環跳穴痛 俗名勝眼是

丹溪曰環跳穴痛不已防生附骨癰方以蒼朮

佐黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加黃芩體虛者加杜仲牛膝以茸草爲使大料煎入酒深者恐木栢桂等發不動以少蘇黃一二貼又不動者恐癰將成擦地成坑以火煨赤沃以小便赤體坐其上以破席圍抱下體使熱蒸驢理間血氣暢而愈○時行毒氣攻手足痛不可止同上法用酒沃凡手足痛熱醋浸妙

衍義法治痛風并癰瘰有餘症酒拌蚕屎甑中蒸熟鋪油單上就患處蒸之仍覆衣被虛人防治法藥五卷痛風
虛暈

臂痛

東垣曰臂痛有六道經絡各加引經藥乃驗以兩手伸直垂下大指居前小指居後而定之其臂膈之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之內廉痛屬厥陰以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰升麻白芷葱白行之內後廉痛屬少陰細辛獨活行之

臂痛爲風寒濕所搏或飲液流入或因提挈重物皆致臂痛有腫者有不腫者除飲証外其餘諸痛並用五積散及烏藥順氣散或蠲痺湯若坐臥爲風濕所搏或睡後手在腋外爲寒所襲而痛者五積散加減

曾有挈重傷筋以致痺痛宜琥珀散或切勞散或和氣飲每服加白薑黃半錢以薑黃能入臂也

痰飲流入四肢令人肩背痠疼兩手軟痺醫誤治法藥五卷痛風
二二三

以爲風則非其治宜導痰湯加木香薑黃各半錢重者控涎丹輕者指迷茯苓丸一法控涎丹加去油木鱉子一兩桂枝五錢治臂痛每服二十丸加至三十丸

外有血虛不能榮于筋而致臂痛宜蠲痺湯合四物煎服

有氣血凝滯經絡不行而致痺痛宜舒筋湯手氣手腫痛悉屬風熱挾痰五痺湯蠲痺湯白薑黃能引至手臂尤妙

肩背不可回顧東垣謂手太陽氣鬱而不行
以風藥散之然亦有勞傷及房勞過度而痛者
一少年新婚且勞宵間與肩背痠痠大藥過試
不愈脉得右寸關虛大無力授以補中益氣湯
一服減三服全

四物湯

見血門

當歸拈痛湯

見腰痛門

大防風湯

見脾氣門

八物湯

見虛損門

和血散痛湯

羌活

升麻

麻黃

各錢半

桃仁

柴胡

治法彙考

卷五

風

二

紅花

當歸

各錢半

防風

甘草

獨活

猪苓

五黃藥


錢一分

知母

黃連

酒炒

水煎服



脚氣

諸五志風門

初起發寒熱殊類傷寒第脚膝痛或腫是也均
屬濕熱雖因坐臥濕地涉水履水久必變而為
熱初必發散後兼分利與濕同治大法二木以
去濕黃柏知母條芩山梔之類以清熱歸芍生
地之類以調血木瓜檳榔之類行其氣二活利
關節兼散風濕佐以木通防已川牛膝之類以
引藥下行及消腫去濕氣虛肥白人加人參兼
化痰二陳瘦人脉弦濇大便秘者忌燥藥兼補
治法彙考卷五脚氣

陰坎離加減

丹溪曰脚氣濕流于下須提起其濕隨氣血用
入心則恍惚謬妄嘔吐不食眠臥不安左寸乍
大乍小或乍有乍無必不治○方書以腫者名
濕脚氣不腫為乾脚氣雖曰濕盛則腫亦當分
新久虛實○入腎則腰脚腫小便不通呻吟目
與額皆黑氣衝而喘尺絕必
肥人腫痛多是濕痰氣弱宜燥濕化痰兼補氣
脉必沉滑久之必加積養八味丸

人腿痛多是血虛有火宜養血滋陰脉必弦
數六味丸

氣衝心丹溪用四物加炒柴以附子末津調

傷湯泉穴以艾灸引泄其毒○金櫃八味丸治

脚氣上攻虛者宜之○栝榔末三錢童便調下

○五子五皮散○意苡仁散○俱實者宜之

脚氣上氣喘促初起有表邪者小青龍加栝榔

實者五子五皮散或蘇葉三兩製桑皮二兩煎

胡去蘆一兩栝榔二枚杏仁去皮尖二十枚薑

治法彙五卷脚氣

五片水二盞煎一盞溫服已經攻泄分利致不

得眠上喘屬虛八味丸料作大劑煎冷服脾胃

虛用參朮初攻胃嘔逆二陳平胃加木瓜

小便不通初起實者五苓加木瓜虛者八味丸

加車前牛膝

脚氣發熱有表症者五積散發之有裏症不大

便者大黃左經湯下之

五子五皮散見脈門平胃散見濕門

意苡仁散

意苡仁酒當歸 川芎 乾薑 茵芋

甘草 官桂 川烏 防風 人參

羌活 白朮 麻黃 獨活各半兩

右細末每空心臨卧服酒下二錢日三服

外臺曰第一忌噀噀則心煩煩則脚氣發第二

禁大語大語則傷肺肺傷亦發又不得露足當

風入水兩足猶不宜冷雖暑月當須着綿襪令

常暖出微汗佳于寅丑日去手足指甲去氣夏

月勿追涼常宜按授勿使邪氣留數勞動關節

治法彙五卷脚氣

常令通暢此並養生之要拒風邪之法也

治濕熱脚氣方

紫蘇 黃柏酒芍藥 木瓜 澤瀉

木通 枳殼炒栝榔 蒼朮 甘草炙

香附 羌活 防已

痛加水香腫甚加大腹皮發熱加大黃黃芩

防已飲防已大傷胃弱者忌之

黃柏酒蒼朮水白朮 防已各七生地

栝榔 川芎各半木通 犀角屑

甘草 黃連 各三

水煎服有熱加黃芩痰加竹瀝薑汁南星小便澀加牛膝如常腫者專主子濕熱肥人加痰藥

邪客三陽屬表兄寒熱拘急宜汗邪客三陰屬裏見二便阻澀宜滲利

健步丸有二皆下行分滲除濕風藥當審氣血方妙

食積流注用

治法彙五卷 腳氣

蒼木 防已 黃栢 南星 川芎

白芷 犀角 檳榔

血虛加川牛膝龜板酒糊丸服

羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡痛或肢節

腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

羌活 獨活 各一錢 防已 當歸尾 各七

枳實 五錢 大黃 四分

石細切水煎空心服

五積散 治寒濕流注經絡脚膝腫痛中寒

導水丸 治脚氣跗腫疼痛或發熱惡寒濕熱大盛者

大黃 黃芩 各一兩 黑丑 取頭 滑石 各四

右為細末調水丸桐子大每服四五十丸溫水送下以利為度

除濕丹 治諸濕病腰膝腫痛足脛浮腫筋脉勁急津液凝澀便溺不利等症

檳榔 甘遂 赤芍 澤瀉 威靈仙

治法彙五卷 腳氣

葶藶子 各二兩 乳香 沒藥 各一兩 黑丑 兩半

大戟 兩 陳皮 四兩

右細末麩糊丸桐子大每服五十丸溫水下以利為度

三花神祐丸 治濕熱流注足膝浮腫肢節煩

疼行步重墜等症

杉木飲 治脚氣發熱兩足腫大心煩體痛欲

死者

杉木節 四兩 檳榔 七兩 大腹皮 酒 青橘葉 四十

無則用皮

長流水三碗煎一碗分三服一日服盡如大便通利見黃水其病除根未愈過數日再煎一劑服之病根去為度外以杉木橘葉煎湯洗之神效一方用童便煎更佳

勝濕餅子 治遠年脚氣足脛腫如瓜者

黑丑一兩取頭末半兩白芷一兩取頭末半兩甘遂連珠五錢

右三味再同研極細外用舊麥麪兩半連末藥和勻水調捏為餅子如折三錢大放飯

治法彙五卷 脚氣

上蒸熟每服一餅空心嚼茶清下以利為度未利再服一餅忌甘草松菜生冷油膩

魚腥

脚氣隱痛行步艱難用平胃散加赤麴同煎服最妙鷄鳴散亦佳 脚氣兩脛腫滿是為壅疾南方多見兩足腫大與疾偕老者初起宜重劑宜通壅滯或砭惡血而去其重勢後以藥治素問曰畜則腫熱砭射之也

足少陰脚氣入腹疼痛上氣喘促欲死八味丸

佳陽衰腎虛有寒之人多此乃腎乘心水尅火最篤 大凡濕痰濕熱瘀血流注關節非辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得愈須佐以辛涼母大熱耳草烏肉桂黃柏蒼木俱不可少甚者加附子要在臨用斟酌

平胃散 見脾胃門

鷄鳴散 治脚氣腫痛不問男女皆可服如人

感寒濕流注脚走痛不可忍筋脉浮腫宜服

栴榔七枚陳皮去白木瓜各一兩吳茱萸

治法彙五卷 脚氣

紫蘇葉各二錢桔梗去生薑和皮各半兩

右咬咀用水三大碗慢火煎至碗半將粗再煎一碗共一處鷄鳴時冷服冬月稍溫作

三五次服完以乾物壓下天明去大便見黑糞水是濕毒下也此原非峻劑

一膝腫痛不消防生鶴膝風以膝腫如鶴足脛

細脉多弦緊乃三陰經虛寒濕流注為患須用

大防風湯若用尋常攻毒之藥禍不旋踵

一環跳穴在腓及腿根徹痛不已外皮如故脉

沉數或滑防生附骨疽乃毒氣附着于骨而成人多誤爲濕熱及至膿成氣血大虧已不可救矣不知鶴膝風與附骨疽腎虛者多患之因真氣虛弱邪氣得以深襲若真氣壯實邪氣焉能爲患前人用附子者以溫補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人秋夏露臥爲冷氣所襲寒熱伏結多成此症不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化爲熱而潰也若被賊風傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛少止須大防風湯及火龍膏治之若失于早治用寒涼必成廢疾或寧曲偏枯或痿弱不起或堅硬如石或爲石疽日久始潰皮肉俱腐爲緩疽大抵下部道遠非桂附不能下達藥性况腎主骨而腎以下俱屬腎桂附乃腎經藥也學者不可不知詳見外發揮臂癱下少壯酒客痰火濕毒盛而不得開活絡丹妙不可拘泥引風入骨之說筋攣痺縱兩腿無力不能步履三因勝驗丸

河間曰脚氣由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者由血海虛而得與男子腎虛類也男女用藥固無異更當兼七情治之無不効也嗜酒人患脚氣腫痛實而初起者以巴戟半兩同糯米炒米熟去米淨加酒蒸大黃一兩爲末熟蜜丸溫水下五七十九仍禁酒○脾家酒毒濕痰遇仙丹佳虛者禁用脚氣生瘡腫痛用漏蘆白欬槐白皮五加皮甘草各七錢半蒺藜子二兩煎湯于無風處淋洗治法集五卷脚氣脚氣跟注一孔深半寸許每下午痛甚乃脚氣下注成漏也以人中白于火上煨中有水出滴入瘡口脚心痛用大聖散二錢入木瓜末一錢荳淋酒調仍用川椒香白芷草烏煎湯洗大聖散用芎歸參芪麥冬炙草白茯苓香俱養氣血藥也脚心痛多屬虛勞乃不用剋伐脚氣內熱鬱甚二便阻塞右關脈數乃足陽明濕熱下注也大黃左經湯主之脉澁微或弦數腿酸痛似痺屬血虛不能養筋

加味四斤九妙 治風寒濕毒所襲筋骨痛或肢節

虛有痰先化痰正胃百病皆然

外應散 治脚氣用此薰蒸

石楠葉 矮樟葉 杉片 紫荆皮

香 藁本 獨活 大蓼 白芷

紫蘇 羌活

加大椒五十粒葱一握煎水二斗置盆內令

痛者以足加其上用厚衣蓋覆薰蒸痛處候

可下手時令人淋洗

治法彙五卷 脚氣

一方用草麻子七粒去殼研碎合香九和勻貼

脚心即止痛 又法用草烏末以麴酒糟搗勻

貼患處如無糟薑汁亦可

大防風湯 治三陰之氣不足風邪乘之兩膝

作痛久則膝大腿愈細因名曰鶴膝風乃敗

症也非此方不能治痢後脚痛緩弱不能行

步或腿膝腫痛

附子 白朮 羌活 人參 各二

川芎 一錢 防風 二錢 甘草 一錢 牛膝 一錢 酒浸

當歸 酒洗 二錢 黃芪 錢二 白芍 錢二 杜仲 錢二

生地 酒洗 二錢

水二鍾薑三片煎八分空心服愈後尤宜謹

攝更服還少丹或加桂以行地黃之滯若

脾胃虛寒之人宜服八味丸

火龍膏 治風寒濕毒所襲筋骨痛或肢節

疼痛及濕痰流注經絡作痛或不能行走治

鶴膝風痛尤効

生薑 八兩 取汁乳香 沒藥 各五錢 麝香 一錢

治法彙五卷 脚氣

真牛皮膠 二兩 切碎 廣東者佳

先將薑汁并膠鎔化方下乳沒調勻待少溫

下麝即成膏矣攤貼患處更服五積散如

鶴膝風須用大防風湯

大黃左經湯 治四氣流注是陽明經致腰膝

腫痛不可行二便秘或惡食氣喘滿自汗

細辛 一錢 羌活 一錢 大黃 一錢 甘草 一錢

前胡 枳殼 厚朴 黃芩

杏仁 去皮 各二錢 薑棗煎八分食前服

腎經法... 見脈經

胃結導引丸 治脚氣飲食不消心下痞悶

白木 橘紅 澤瀉 茯苓 神曲 炒

麥芽 半夏 炮七次 枳實 炒 巴豆霜 各

半錢 青皮 乾薑 各五

蒸餅丸 菴豆大每服二三十丸白湯下

子按脚氣多屬脾家濕氣鬱積之久痞悶之餘

下注足脛為腫為痛如脉沉緩兼痞悶而大便

雖軟不暢者可用此以運脾下結脉數口乾兼

治法彙五卷 脚氣

百四

火煎者須前條羌活導滯湯以宣之學者固不

可執一法于胸中

麻黃左經湯 治風寒濕流注足太陽經腰脚

攣痺關節腫痛增寒壯熱無汗惡汗或自汗

惡風頭痛脚軟等症並皆治之宜于寒令

麻黃 乾葛 細辛 白朮 茯苓

防己 肉桂 羌活 各五 甘草

防風 去各 薑棗煎服

半夏左經湯 治少陽經為風寒濕流注發熱

膠腸痠痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心

脾緩縱不能行步 半夏 乾葛 細辛 白朮 麥冬

茯苓 肉桂 防風 乾薑 黃芩 各半

小草 甘草 柴胡 各三 薑棗煎服

六物附子湯 治四氣流注于足太陰經骨節

煩疼四肢拘急自汗短氣小便秘手足腫

附子 炮 肉桂 防己 各一 甘草 炙五 白

茯苓 各七 薑三片煎服

治法彙五卷 脚氣

百四

局方換骨丸 治足三陰經為四氣所乘發為

攣痺經絡上攻背脇下注脚膝酸痛足心熱

行步艱難老年足不任地最妙

羌活 南星 石斛 檳榔 石南葉

車前 羌活 防風 川牛膝 酒洗

木瓜 各四 黃芪 歸尾 天麻

續斷 各一

右細末糊丸梧桐子大每服五十丸空心溫

湯下

勞丸 治命門火衰不能上生脾土致脾胃
 虛弱飲食少思或食不化日漸瘦及遺精滑
 欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利及腎
 氣虛寒臍腹作痛夜多旋溺脚膝無力肢體
 倦怠 卽腎氣丸加肉桂附子各一兩其附
 子每日用新童便數碗浸五六日切作四塊
 再浸數日以草紙包裹水濕火炮半日去皮
 臍切作大片以無白星爲度凡用俱照此法
 每服五十丸空心鹽湯下

治法彙五卷 脚氣

五王

虎骨四斤丸 治肝腎氣血不足足膝酸痛步
 履不隨如受風濕致脚氣者

虎脰骨

一兩 另研各
 炙 沒藥 研乳香 五錢

附子

炮去皮 尖二兩 肉桂 蓉 洗 川牛膝 木瓜 去
 穢

天麻

各半

餘爲末將木瓜從蓉搗如膏加酒糊丸桐子
 大每服七八丸九空心鹽湯下

三因勝駿丸 治氣不足爲寒濕所襲腰足
 攣拳或脚面連指走痛無定筋脈不伸行步

不隨常服益氣壯筋骨

附子

歸身

天麻

牛膝

木香

棗仁

乳香 各五錢

麝香

金蠟 炒

沒藥

甘草 各一兩

木瓜 洗

防風

右爲末用生地三斤無灰酒四升煮乾焙爛
 如膏和末杵勻每兩作十九每嚼一丸空
 心酒下

內傷酒食脾胃營運之氣有虧不能上升下
 爲脚氣其症心下痞悶腿脚腫痛用已上藥丸

治法彙五卷 脚氣

良

先推逐之開結導引丸佳

白朮

炒

陳皮

炒

茯苓

神曲 炒

麥芽

炒

半夏

姜製 一兩

枳實

炒 巴霜 各半

青皮

乾薑 各五錢

右爲末湯浸蒸餅丸桐子大每服五六丸或

十九溫水下此藥能引水下行運脾中濁
 氣

脾家濕熱壅遏不通面自手足作痛導滯通經
 湯佳卽五苓散減猪苓官桂加木香陳皮每服

三錢滾湯調下此是末子妙

診

脈浮弦為虛濡細為濕洪數為熱遲澀為寒微滑為虛牢堅為實浮表沉裏沉緊為寒沉細為濕入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠不安脈左寸乍大乍小乍有乍無者不治入腎則腰脚皆腫小便不通呻吟口額黑衝胸而喘左尺絕者不治但見心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脈促而數嘔吐不止者必

足跟痛

有痰有濕熱有陰虛 飲酒人有此悉屬濕熱常歸枯痛湯佳

腫滑肥人屬濕痰二陳二妙加木瓜有表症作寒熱者先以五積發之

瘦人脈數屬陰虛坎離加牛膝

平人脚轉筋屬肝熱松節一兩剉碎乳香一錢砂鍋中炒焦研細木瓜酒下

又方赤蓼莖水酒煎服 外以大蒜磨脚心桃

治法要正卷 足跟

忌

柳楮桑槐五枝煎湯洗亦佳 外捷法樟木煎

湯浴先燠 又法荆條葉燒烟燠湧泉穴出汗

妙

薛氏醫案一人每勞則肢體痛用清痰理氣藥

益甚加導濕滋陰轉腫形筋倦怠內熱盜汗脈

浮大按之微細此陽虛寒用補中益氣加附子

錢人參五錢肺痛悉食又以十全大補百餘

劑而康計服過人參一十三斤薑附各斤餘

腿痛

有濕有濕熱有痰流注有陰虛有陽虛
廉為陽明白芷升麻葛為引○後廉太陽羌
活防風外廉少陽柴胡○內廉厥陰青皮莫
藥○內前廉太陰蒼朮白芍

血虛脈細弱或左脉壯大足不任地行則振掉
屬血虛宜兼補腎四物加黃柏牛膝杜仲之
類恒多見於瘦弱之人

濕熱脉濡細或數痛自腰膀以至足脛或上或
治法藥五卷

下或腫或紅症兼小便赤澀屬濕熱宜滲濕
清熱當歸拈痛湯主之

濕六脉沉濡或伏兩膝隱隱然痛或麻木作腫

症兼遍身沉重者屬濕初宜微表後兼分利

羌活勝濕湯茯苓滲濕湯加減肥人加痰藥

脉沉滑或弦腰膝一塊互換作痛瘡兼惡心

頭眩者痰也宜豁痰行氣羌獨二朮二陳加

咸豁痰湯主之

陰虛脉細而數或兩尺洪血肌體羸瘦足心及

脛痛不能任地屬陰虛滋陰降火大補丸四
物加知母黃柏牛膝杜仲之類

陽虛脉沉弱或虛大兩足浮腫或大便溼小水
短少而痛不能動屬命門火衰陽虛之症補
中益氣加桂附

下部道遠非烏附不能達况濕熱濁痰鬱久固
非尋常二妙等所可治者如舟車丸捉虎丹趨
痛丹當用必用要在用之當耳虛者必加桂附
趨痛丸治脚氣上攻兩脚痛不可忍

治法藥五卷

五子

白甘遂 白芥子 炒 大戟 白麩 各二

右滴水捏作餅子瓦上焙黃碾碎作末醋煮

糊丸菜豆大冷酒下十九粒利則止

濕熱腫痛二便阻塞勢盛者大黃左經湯利之

或羌活導滯湯服後用拈痛湯以散病根

羌活 獨活 當歸 大黃 枳實 防已

水煎服

一人體瘦質弱性復嗜酒致腰及兩脛痛不可

忍作腎虛治不應予診之左脉濡細而數乃血

虛受熱也遂以四物易生地加知柏牛桂肉桂少許二劑知十劑已

一人素肥盛半年漸瘦兩膝與背互痛兩尺沉滑古人有言昔肥而今瘦者痰也遂以加減豁痰湯連進數服日食後或作惡心乃以瓜蒂散一錢投之吐稠痰半升而愈

又一人肩背與膝相引而痛寸脉弦知痰飲爲患也投小胃丹一服吐痰半升間日再進一服瀉痰水有如膠者一升許病根已

治法彙五卷

百五十一

一人體厚自覺遍身沉重難於轉側兩膝時痛腫不紅不硬六脉濡弱天陰更甚因作濕鬱治加減羌活勝濕湯不十劑愈

脚氣筋骨疼金銀花末酒下二錢或加木瓜歸芍甘草肉桂水酒煎服

當歸拈痛湯

見腰痛

加減羌活勝濕湯

二術 二活 二防 木通 木瓜
南星 半夏 澤瀉

癰瘰

瘰者筋脉拘急也癰者筋脉張縱也俗謂之瘡是也小兒吐瀉之後脾胃虧損津液耗散故筋急而搐爲慢驚也俗不知風乃虛象因名誤實反投牛黃抱龍等祛風藥天柱者不知其幾大抵產後血後病後癰疽出膿後氣血津液過傷不能養筋而然與筋惕肉瞤頸振大抵相同補養爲先分氣血孰緩孰急以治庶有生理○經曰肝主筋而藏血蓋肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水產後陰血去多陽火熾盛筋無所養故癰癰癰膿水過多金瘡出血過多及嘔血衄血下血後或傷寒邪在表誤發其汗或虛弱人誤汗誤下氣血津液受虧而致此者輕則加味逍遙散或八珍散加丹皮鉤藤以生陰血則陽火自退諸症自愈不應四君加芎歸丹皮鉤藤以補脾土蓋血生于陰至陰者脾土也故小兒慢驚當大補脾土爲急若陽氣脫陷者補中益氣加薑桂陽氣虛敗者十全大補加桂附亦有復

治法彙五卷

百五十二

生有然筋抽搐顫掉。肢體惡寒。脉微細。人皆知為虛也。是為真象。至于脉大。發熱煩渴。是為假象。嗚呼粗工不知。而誤認有餘。復瀉之者多矣。若抽搐戴眼。反折汗。綴如珠。俱不治。加味逍遙散。

四君子湯

補中益氣湯

十全大補湯

治法彙編

卷五

顫振

顫振也。振動也。筋脉約束不住。而不能任持風之象也。經曰。諸風掉眩皆屬肝木。乃初起熱極生風之病。若病後老年。悉屬血氣衰少。不能養筋而然。素問曰。骨者髓之府。不能久立行。則振掉。髓將慙矣。至如戴人治馬。曳手足振掉。若線提傀儡。用湧法。湧痰數升而愈。必痰症痰脉。而年壯氣實也。學者不可不知。

氣虛手足顫。補中益氣湯。心虛而振。補心丹。

治法彙編

卷五

痰導痰佐竹瀝。老人戰宜定振丸。

秘方定振丸。治老人顫動。皆因風氣所致。及

血虛而振。

天麻 秦艽 全蝎 細辛 川芎

熟地黄 生地黄 當歸 芍藥

防風 荆芥 黃芪 白朮

威靈僊 右為末。酒糊丸。桐子大。每

服七八十丸。食遠白湯下。或溫酒下。

補中益內湯 見內傷門 補心丹 見怔忡門

學謂手足拘攣而不和也

內經言學皆屬肝肝主身之筋故也有熱有寒有虛有實

熱學者經所謂肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣又曰因于濕首如裹濕熱不攘大筋縲短小筋弛長縲短為拘弛長為痿是也筋膜乾者生地當歸之屬濡之大筋縲短者黃仁散主之暴感寒則筋攣拳骨痛發表散和血五積之類經曰虛邪搏于筋則筋拳又云脉弗榮則

治法彙五卷

百五十五

筋急仲景曰血虛則筋急四物增減實學者濕熱挾痰鬱于四肢大便秘結即痛風初起症也分表裏治如戴人用煨腎散上吐下瀉而愈東垣法用桂枝甘草以劫其寒邪而緩其急葛黃栢之苦寒滑瀉實而潤急救腎水用升麻葛根以升陽氣人參補元氣為輔佐當歸去裏急而和血潤燥名曰活血通經湯更暖室中近火按摩為佳

五卷終

三消

三錫曰津液三焦枯涸火邪獨盛水弱不能灌溉隨臟腑之虛而變多生于厚味酒色之徒蒸霍山林庸或有之方書云能食者必傳發背腦疽即膏梁之變飲食之毒聚于腸胃消穀善饑久久毒發殆莫能救可元皆真水消耗之所致人之津液氣血精髓自有限量醇酒炙博情慾無涯寧不消耗積耗成枯成期迫矣譬之煨鐵家以壹盂水早晚淬鐵水豈能久縱口恣慾有

治法彙六卷

一

甚淬鐵重生者試思之

凡平人不時口乾作渴久之必變疽毒須預服八味丸慎口節慾可勉此患乃屢驗者其說詳具外科心法三消已愈防發癰疽須兼服忍冬丸黃芪六一湯

渴家心煩怔忡不眠補心丹佳乃勞神所致

上消者肺也多飲水而少食小便如常

下消者腎也小便數淋如膏之狀

中消者胃也善食而瘦小便赤黃

丹溪曰養氣降火生血為主

三錫曰渴家誤作火治涼藥亂投促人生命必多服生脉散為佳

又曰三消均屬血虛不能生津液俱宜四物湯為主治上消者加人參五味二冬花粉煎成加生藕汁生地人乳飲酒人加生葛汁

中消者本方加知母石膏滑石寒水石以降胃火壹貳服而止

下消者本方加黃柏知母五味子之類以滋腎

治法彙六卷之三消

陰又當間飲繅絲湯為上心移熱于肺則為膈消即上消也肺為火鬱津液不通則渴宜辛以潤之

古方用蜜煎生薑湯冷定時呷之辛散其緩津液流通火得下降其渴乃除

一法用麥冬治肺中伏火止渴為君天花粉知母瀉熱為臣甘草五味子生地藕根人參生津

益氣為佐然心火炎上于肺者必由心有事焉不得其正以致虛火上攻用快神安心定智可

華清火麥冬以安其宅則火有歸息矣

胃中熱則消穀善饑即中消也當用甘草降火潔古方用黃連末生地白藕各取自然汁牛乳各壹升熬成膏和黃連末九桐子大每服參伍拾丸白湯下日叁猪肚丸亦可

腎陰血虛足膝痿弱小便數而稠濁如膏名腎消即下消也古方用六味地黃丸猶當斟酌加減如下集元陽虛損無陽則陰無以生津液不足者又當兼補相火古方八味腎氣丸最妙譬

治法彙六卷之三消

之釜中有水下以火暖之暖氣上騰則覆蓋潤若無火力則水不能上升蓋終不潤又如地氣不得上升則不能為雲為雨理可見矣妙在桂

附

仲景曰消腎飲一洩二者必八味地黃丸救之或作湯服又法腎氣丸去附加五味兩半

三消宜戒厚味酒麪房勞不禁忌雖藥無功小便不利而渴是內濕不能宣達也當利之

熱作渴煩渴也
胃苓湯是也

小便自利而渴是內燥無陰以化也當潤之
脾胃虛弱食少不能生津液而渴者當理脾胃
中益氣加貳門伍味能食而渴者白虎加人
參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍葛根
乃潔古法也

火盛大抵治須分新久虛實如膏粱之家醉飽
濃鮮脉滑實口乾作渴是痰火盛也宜滾痰
丸先蕩滌之勢盛調以承氣湯當從實火治
脉實而堅大者灰細而浮短者灰俱無胃
治法彙六卷三消四

氣也

陰虛如勞碌失意軀體消瘦之人有此悉屬陰
虛養血滋水爲主

脉洪大無力形氣不壯悉屬陰虛

天花粉渴家聖藥亦是潤劑大便燥者宜之
若脾胃弱作瀉者恐非所宜

渴家禁半夏及不可發汗

素病渴雖有外邪當汗當下者當從輕治以
津液之原竭也

氣血兩虛身倦色白而渴兩手俱無力右寸空
虛大瓊玉膏撮撻大病後亡津液而渴者
養爲主生脉散加知母花粉甘草茯苓竹葉
或加葛根以開發胃氣上消脉虛者亦妙卽
河間麥門冬飲子

癰疽潰後渴悉屬虛黃芪陸壹湯時時代茶佳
或加生脉散黃芪陸兩甘草壹兩

脉虛數口乾燥兼火症者降火藥中兼生津
液便秘兼潤劑如東垣生津甘露飲用石膏

治法彙六卷三消

五

本連梔柏升柴又有人參麥門當歸知母加
減在人不必拘泥也

勞役饑飽失時中氣受虧虛火炎上口燥舌
乾有似于渴誤用涼劑漸危宜補中益氣湯

戴氏曰無病而渴與病後瘡疽產後同悉屬氣
虛津少四君子及參苓白朮散縮脾湯加葛根

開提清氣引津上潮或七珍散如少食而瘦
味丸兼黃芪湯累積水在腹小便利而渴者

明知是水阻真水不瀦者乃可用春澤湯卽

本加人參也。

戴院使曰三消不宜用燥劑峻補之惟當滋養除消脾外心腎二消用黃芪六一湯或參湯吞八味丸或玄兔丹小兒絲丸又用竹龍散六神飲等可用惟脾消加當歸去黃芪三消小便既多大便多秘宜常服四物湯以潤大腸加人參木瓜更妙仍煮四皓粥及糯米折二泔飲之口燥咽乾不可認指為火

診心脉微小為消痺滑甚為善渴肺肝脾腎

治法彙六卷

三消

六

微小皆為消痺心脉更而散者當消渴自已者生細小者為消渴多洪數無力洪數者虛火盛也無力者氣血不足也

渴欲飲水不止仲景以文蛤一味桴為散湯

和服方寸匕經驗方用大牡蠣于臘月或午日

黃泥裹煨通赤放冷取出為末鯽魚湯下一七

蓋二藥性收澀回津故也細目以為鹹軟者非

三因方用糯穀旋炒作爆藥根白皮厚者切片

每一兩水一碗煮半碗渴即飲之夫水穀之氣上蒸于肺而化為津以溉一身此金能生水之意二藥固肺藥也而又淡滲故助之保命集蜜煎生薑湯大器貯時時呷之法曰心肺之病不厚而少又曰辛以潤之開腠理致津液肺氣下流故火降而燥衰矣有食韭苗而渴愈者亦辛潤之義

消腎為病比諸為重古方謂之強中又謂之內消多因恣意色慾或餌金石腎氣既衰石氣獨

治法彙六卷

三消

七

在精水無所養故常發虛陽不交精出小便無度唇口乾焦黃芪飲吞玄兔丹八味丸鹿茸丸加減腎氣丸小兒絲子丸靈砂丹皆可用未效黃芪飲加菴蓉五味山茱萸各肆分薺尾湯菴蓉丸

猪肚丸

黃連五麥門冬 知母 栝婁根各肆

右為細末入雄猪肚內縫煮極爛于臼中搗爛或加煨密丸桐子大每服壹百丸食後水

飲下清心止渴妙一方有梁米濟生方加人參熟地

藏器方石燕和水牛鼻煮汁飲治消渴
喻化丹生津止渴遠行不可少

百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參
麥門冬 甘草

共為末煉蜜丸化壹丸

百藥煎治口乾大獲奇驗

古方冬瓜飲 治中消善食而飲水多小便脂

治法集本卷

人

麤片日夜無度用冬瓜壹枚黃連拾兩為細

末將冬瓜破開去穰摻連末在內仍縛緊于

煖灰中煨熟去皮切碎爛研取汁每服壹盞

至貳盞日叁夜壹按冬瓜性急而走久病與

陰虛者忌之此方惟用之實火與酒渴妙用

螺浸水飲治渴亦是解熱利小便有餘火症

胎前渴屬火宜清火潤燥養血

產後渴悉屬虛八物加麥門知母花粉

諸失血及產後渴名血渴宜補血

忍冬丸

忍冬草壹味不拘數花莖葉全用入瓶礮
內用無灰酒浸以糠火煨壹宿取出曬乾
入甘草少許礮為細末以所浸酒打麵糊
丸桐子大每服壹百丸不拘時米飲白湯
下

無病忽大渴少頃又定飲蜜湯佳及縮脾湯或
折二泔涼飲數口酒渴乾葛湯調五苓散佳
又果木渴多食菓子所致藥中宜加麝少許

治法集本卷

九

五豆飲能解酒渴及諸消小兒痘疹不出並解

黑豆 黃豆 菜豆 青豆 赤小豆

乾葛 甘草 黃連 半斤

右壹處用水伍升燭八日用大鍋熬至熟濾

去渣將汁入磁礮中箬葉封固春夏遇渴症

取飲之隨意小兒痘疹不出俱効

錢氏白朮散 治消中消殺善饑

人參 白朮 白茯苓 甘草

藿香葉 枳殼 乾葛 半兩

丁香 北五味 柴胡 各藥

服參錢水煎服

黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁

人參 生地 熟地 黃耆 天門冬

麥門 澤瀉 石斛 去根 枇杷葉 去毛

枳殼 炒 甘草 分

水煎柒分服

三消久而小便不臭反作甜氣在溺桶中漏漚其病爲重更有浮在溺面如猪脂濺在桶邊如

治法彙考卷三消

柏燭此精不禁真元竭也玄兔丹從蓉丸王之

薺薺湯 治消中日夜尿八九升者

猪腎 具 大豆 升 薺泥 石膏 已上各叁

人參 茯苓 知母 葛根 黃芩

磁石 綿 甘草 瓜蒌仁 已上各

右咬咀用水壹斗伍升先煮猪腎大豆取壹

斗去滓下藥煮取叁升分作叁服渴急飲之

下隻藥者夜服壹劑渴止勿服

從蓉丸

從蓉 酒浸 磁石 碎 熟地 山茱萸 桂心

山藥 酒浸 牛膝 酒浸 茯苓 黃耆 酒浸 澤瀉

鹿茸 去毛切 遠志 去心 石斛 草薺

覆盆子 五味子 破故紙 炒 巴戟 酒浸

龍骨 兔絲子 酒浸 杜仲 去皮剉薑汁製

附子 壹個重陸錢者

右爲末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心米

飲送下

玄兔丹 治三消渴利神藥常服禁遺精止白

治法彙考卷三消

濁延年

兔絲子 酒浸通軟乘濕研 白茯苓

五味子 酒浸別爲末 乾蓮肉 各叁

右爲末別碾乾山藥末陸兩將所浸酒餘者

添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如桐子大

每服伍拾丸空心食前米飲下

補心丹 見虛損門 生脉散 見暑門

補中益氣湯 見內傷門 六味地黃丸 見虛損門

八味丸 見虛損門 鹿茸丸 見虛損門

加減腎氣丸六味丸加北五味子

小兒絲子丸見使濁門 白虎加人參湯見傷寒

靈砂丹見吐瀉門 滾痰丸見痰飲門

黃芪飲黃芪六一湯 調胃承氣湯見傷寒

環王膏見內傷門 四君子湯見虛損門

參苓白朮散見內傷門 縮脾湯見暑門

七珍散見虛損門 五苓湯見瀉門

四逆粥見泄瀉門 六神飲

外龍散治消渴

五靈脂另研 生黑豆 共皮各等分

瓜子膏可一日兩服少渴者只一服渴止後
宜八味丸仍以五味子代附子此方沈存中
載於靈苑方衍病者甚多

黃疸

五疸之屬濕熱傷脾所致宜分虛實

大法宜利小便除濕熱

脈浮腹中和宜汗脈浮心中熱腹滿欲吐者宜

吐脈沉心中懊憹或熱痛腹滿小便不利而

赤自汗出宜下脈不浮不沉微弦腹痛而嘔

宜和解脈沉細無力自汗泄利小便清白為

虛身目黃大便自利宜補饑飽勞役內傷中

州非外感宜補

治法最本卷黃疸

十三

痛飲人二便不利目先睛黃久變為疸初起脈

有力能食不大便者茵陳大黃湯微利之次用

茵陳五苓散以滲熱解熱稍久宜固脾胃本方

倍白朮氣虛脈緩弱體倦加人參

酒疸小便赤澀用田螺洗淨浸水煎湯或用煮

螺蛳湯亦可

酒疸中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之

多鬱悶人身痛脈沉伏不因于酒身目俱黃胸

膈不快是穀疸乃穀氣因鬱不能四達通人脾

色見于外也宜舒鬱利膈兼消導運脾二術
二木香附撫芎梔子茵陳枳實麥芽增減

久病瘵黃倦怠不食脉緩無力屬脾虛非疸也
大補脾氣從內傷治黃不退加秦艽薏苡

乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲梔
子槲皮湯

濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者
大茵陳湯

黃如橘而明者熱多脉必數解熱為主
治法彙六卷黃疸

黃如薰黃而暗濕多脉必沉緩滲濕為主
十四

丹溪曰不必分五同是濕熱如倉麴相似輕者
小溫中丸重者大溫中丸熱多加黃連濕多加

茵陳五苓散加食積藥
戴氏曰食積發黃量其虛實而下之其餘但利

小便小便清利則黃自退
或曰黃疸宜用倒倉法又曰黃疸倦怠脾胃不

和食少胃苓湯加減小便赤澀加滑石
小便赤澀為濕熱盛清熱滲濕若小便清白是

虛症

一方治黃疸

本連 梔子 茵陳 猪苓 澤瀉

蒼朮 青皮 龍膽 各五分

穀疸加三稜 莪朮 宿砂 陳皮

神麴 氣不通作脹或喘加苦葶藶

氣實人濕熱盛於上焦惡心飽脹宜吐之

撫芎 梔子 桔梗 各二錢

薑煎入薑汁服探吐酒疸心中懊懣欲吐吐

治法彙六卷黃疸 十五

之愈

濕熱盛於上焦懊懣身目黃用瓜蒂散蓄鼻中
黃水從鼻流出佳

瓜蒂 錢二 毋丁香 錢一 黍米 九粒 赤小豆 錢

右為末每晚噙水一口於兩鼻孔吹上半匙

便睡至明日取下黃水便服黃連散五六服

効若日黃不退瓜蒂散搐鼻取黃水出愈

黃連散治二便秘澀

黃連 大黃 附子 黃芩 炙甘草

其大每服三錢食後溫水調下日三服

一方用苦葫蘆瓢切棗大以童便浸二食頃內
鼻中黃水出妙

桃枝束引煎湯亦可

水濕傷脾脾寒色見于外為陰黃脉沉身冷是
久雨體弱有之四本散加炮薑茵陳重者加附
子從陰症治

酒疸因於酒者葛根山梔豆豉枳實煎服發汗
利小便從傷酒治久則固脾

治法藥本卷

十六

疸久不愈胃強者紫金丹

膽礬 黃蠟二兩 大棗五十

右以砂鍋或銀石器內用好醋三碗先下礬

棗漫火熬半日取出棗去皮核次下蠟再熬

一二時如膏入蠟茶二兩同和丸桐子大每

服十丸茶酒任下酒人下血色黃目黃色

有瘰者亦効

大溫中丸 黃病久者名食勞黃俗名黃胖此

丸妙

一斤者夏一肆草二肆針砂七次

山查五兩 蒼木五兩 白木五兩 蓬木各五

黃連 三稜 蓬木 苦參各五

右為細末醋丸桐子大蒼黑筋骨露氣實者

半飲下五六十九丸肥白氣虛者白木湯下三

四十丸忌一切油膩生冷肉麪鵝羊獐獐雞

化之物服七日後便覺手掌心熱涼口唇內

有紅暈半月愈

小溫中丸 治黃胖宜草野食賤人以內無食

治法藥本卷

十七

針砂一斤以醋 苦參 山查 茱萸

白木 蒼木 川芎 神麴 香附一斤

右末醋糊丸桐子大每服四五十九丸米飲下

忌口輕者不過五六兩重者七兩愈

濕熱盛而口苦作渴面黃氣實者白木 連翹

羌活 通草 煎湯下

穀疸丸保和丸各四十粒阿規九五粒

聚聚丸 食勞黃目黃

皂礬不拘多少置砂鍋

右爲末，棗肉炙爛爲丸，每服三十粒，食後下。

黃疸寒熱嘔吐，煩渴引飲，小便不利，茯苓滲濕湯加梔子、青皮、陳皮、枳實、木煎服。

戴氏曰：飲酒即睡，酒毒薰肺，散於皮膚，則黃。宜合脾肺治，宜藿朴飲、葛根煎湯，或梔子煎湯，調五苓末，或葛花解醒湯。

酒疸心胸堅滿，不進飲食，小便黃赤，其脈弦滑者，心脾陰受傷也，當歸白朮湯。

治法藥六卷

十六

酒疸久之變中滿，面足腫，理脾爲急，兼分利，從腫脹治。

秦艽退黃極妙，以性能逐陽明經濕熱邪氣也，喜食茶葉久之面黃，宜從茶癖治。

濕熱盛，小水不利，茵陳五苓散主之，卽五苓散加茵陳。

酒積面黃，腹脹不消，勢盛脈實，人強者，用甘遂末以猪膽頭肉細切和末，作一丸，紙裹煨令香熟，取出臨臥細嚼嚥下，取出病根。

治疸須分新久虛實，初起脈實有力，卽當分滲，如茵陳胃苓、茯苓滲濕之類。

然脾胃爲濕熱所傷，久之氣血漸弱，必兼補養，如參朮健脾，當歸秦艽散，使正氣盛，邪自退，庶可收功。

有瘀血發黃，大便必黑，腹脇有塊，或脹脈滿，或芤用歸尾、桃仁、丹皮消之，大便不利，脈稍實而

不堪弱者，桃仁承氣湯下盡黑物則退。

失血後崩後一切病後，脾胃肺元氣大傷，面色萎黃，或淡白色，悉屬虛從內傷治，不可誤作

治法藥六卷

十九

淋秘

淋者小便澀滯，玉莖痛，多滑白物，糊于莖端，是也。悉屬火熱，但分新久虛實，在氣在血，解熱利小便。

丹溪曰：淋雖有五，無出于熱。山梔子之類解熱利小便。

兩尺脈弦數，或三部俱弦，小便赤澀，小腹脹悶，或目赤，兩脇脹，屬肝火。龍膽瀉肝湯加減，不應龍蒼丸佳。

治法彙六卷淋秘

子

色慾過度，或體瘦之人，日久不愈，屬虛火，坎離丸主之。色白氣虛，小水不通，宜吐病在下，取之上也。清心蓮子飲主之。

瘦白人，脈緩弱，曾經解熱，利小便不減者，補中益氣湯倍升柴。

不渴而小便不利者，熱在下焦血分，腎與膀胱主之。滋腎丸。

渴而小便不利者，熱在下焦氣分，肺氣主之。清肺湯以清水之源。

二便俱秘，脈實者，八正散倍大黃，形弱及老人產後病後有此，悉從虛秘治。當潤燥養陰為主，下用導引法，若作實秘治，轉耗精津，禍立見。古方二便俱秘，用倒換散甚捷。

老人氣虛不能施化，淋閉用補中益氣湯加淡滲茯苓，知母，車前之類。

死血作淋，出血條點，牛膝膏小腹有塊作痛，婦女多有此。桃仁煎最妙，但太峻，須認真乃可。牛膝一味煎湯，名地髓湯，治溺血殊妙。砂淋痛。

治法彙六卷淋秘

子

者亦妙。煎濃湯，加麝香乳香各少許。

一法治熱淋，梔子木通湯，調益元散，夏月用商香湯調。又法用車前草搗汁，露一宿，清辰稍溫調，益元散。

又法車前子為末，用草搗汁調服，治溺血奇驗。痰滯中焦，淋澀不通，二陳湯煎大碗頓服，探吐以提清氣。

淋澀有血，因火燥，下焦無血，氣不得化而滲泄之，今不行，宜滋陰降火，四物加知柏、牛膝、甘草。

稍或四物湯吞滋腎丸脉左大而虛右

湯佳

陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其

氣耳

初起淋病宜解熱久之當分氣血氣虛六君血

虛四物各加黃柏知母滑石石蒲琥珀

小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓車前麥冬

滑石木通肉桂甘草稍氣虛加參芪木香

是者

脉緩

体倦

是者

治法彙六卷便秘

三

陰虛淋痛加黃柏生地夏月煎調益元散

丹溪曰老人氣虛小便不通四物加參芪吞滋

腎先下焦血氣乾者成

小便黃用生黃柏如澁而數加澤瀉若濕熱流

注下焦而小便黃赤澁用生梔子澤瀉切常濕

多者宜滑石利之

下焦血少脉澁皮膚枯槁小便黃且澁數者坎

離加牛膝甘草稍傷寒脫陽小便不通用生薑

汁調茴香末敷熨小腹上仍服益智茴香丸調

益元散最感寒小腹痛小水不通并氣秘用

熨法妙

加生薑亦可

小便不通炒鹽熨小腹妙或以炒鹽放溫填臍

中用艾炷灸七壯立通

病後產後小水不通悉屬虛血虛脉必澁當有

口乾腸秘等燥症四物麥冬知母黃柏爲主

氣虛脉必緩弱或氣口虛大當有倦怠色白自

汗等虛症補中益氣加減

小便不利有三若津液偏滲于大腸瀉而小便

治法彙六卷便秘

三

澁少一也必分利瀉止自愈

中風及諸病出汗多渴家小便不利者忌分利

汗止津液回自便也悞利之重亡津液煩熱益

甚慎之慎之

熱結下焦津液不行二也必解熱分利

脾胃氣虛不能通調水道下輸膀胱三也當補

以提之

小水不通百藥不應甘遂末水調付臍下內飲

甘草節湯覺至臍下二氣相攻立通

因忍小便夕之不通取自己尿甲燒灰米

止通

小便數

有熱有虛

數而少為實熱宜滲之

數而多色黃亦為虛宜滋陰

數而多色白體羸為真陽虛升者少而降者多

一方用酒鹽慈黃山藥空心食妙

水芝丸 治下焦真陽虛弱小便頻數日夜無

治法彙六卷 便秘

二十四

度

蓮肉去皮不以多少用好酒浸一兩宿猪

肚一箇將酒蓮肉入肚中水煮熟取蓮肉

焙乾為末酒糊丸芡實大每服五十丸空

心飲湯下

下焦元陽虛而小便頻數色白耳鳴體倦須補

右尺相火破故紙桂附參芪鹿茸之類

有人小便日數十次如稠泔色心神恍惚憔悴

食減令服桑螵蛸散未終一料而安能安神魂

心志健忘小便數補心氣用桑螵蛸桑樹

二者無則用他樹者同桑皮炒及遠志菖蒲龍

骨人參茯苓當歸龜甲醋炙已上各一兩為末

以參湯調下二錢

一人病風狂并遂等利藥太過小便不禁服此

頓愈

朴硝雪白者治痛淋殊効每服二錢血淋用冷

水下氣淋木通湯下石淋先隔紙炒紙焦為度

再研細溫水下

治法彙六卷 便秘

二十五

斗溪曰小便不通屬氣虛血虛有實熱痰氣閉

塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣承

載其水也氣虛用參朮升麻等先服後吐或就

參芪藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐

或就芎歸湯探之痰多二陳湯探吐痰氣閉塞

二陳加香附木通探吐之實熱利之當用八正

散蓋大便利小便自通矣所以探吐者病重下

上取之

琥珀丸 治諸淋澀痛小便有血出症

琥珀 沒藥 海金砂 蒲黃各一兩

右末空心煎甘草湯下

又琥珀一味爲末葱白湯下二錢治沙淋大効
丹溪云琥珀性淡滲若陰虛血少者服之反增

其病本草云琥珀消瘀血極驗

清肺飲 治渴而小便不利熱在上焦氣分

燈心分一 通草分二 澤瀉 瞿麥

琥珀分各五 扁蓄 木通分各七 車前分炒另

茯苓 猪苓各一錢 白朮煎服

治法彙考卷一 便秘

海金沙分 治小便淋瀝熱氣不施

化五種淋疾癰閉不通

海金砂 瞿麥 滑石

通草各半兩 杏仁去皮尖

右爲末燈心煎空心服

滋腎丸治不渴而小便不利熱在下焦

血分

黃柏酒洗 知母酒洗 肉桂分五

熟水丸 桐子大每服一百丸空心白湯下服

後須頓兩足令藥易下也

葵花散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化

五種淋疾癰閉不通

葵花根一味水煎服

腎疸湯 治腎疸目黃甚至身黃小便赤澀

用風以勝濕也

羌活 防風 藁本 獨活 柴胡各五分

升麻 白茯苓分二 澤瀉分二 猪苓分四 甘草分五

白朮分五 蒼朮分一錢 黃柏分二 人參分二 葛根分五

治法彙考卷一 便秘

神麴分六 空心服

小蓴湯 治下焦熱結血淋

生地 小蓴根 通草 滑石 梔子

蒲黃炒 淡竹葉 歸尾 藕節 草梢各

長流水煎服

八正散 治二便俱秘或淋疾初起勢盛者

大黃 瞿麥 木通 滑石 扁蓄

車前 梔子 甘草稍

各等分水煎服

腎着湯 治寒濕客于胞中，小水不通，有

疾

赤茯苓 白朮 乾薑 甘草

水煎服

丹溪曰：淋痛屬虛熱，余每用滋腎丸百丸煎四
物湯加甘草稍，杜牛夕、木通、桃仁、滑石、木香、煎
湯空心吞服，甚者兼灸三陰交，如鼓應桴，累試
屢驗。

牛膝膏以牛膝一味，合許細切，新汲水五碗煎

始法彙本卷不便秘

子八

耗其四入麝香少許

倒換散 治二便阻塞，小腹急痛，肛門腫痛

大黃小便不通 荊芥穗大便不通

各等分，右各另細末，每服二錢，空心溫水下

鐵粉丸 治二便不通

大皂角燒存性，右一味為末，不拘多寡，煉

蜜丸，桐子大，每服六七十九，白湯下

石薺散 治小便不通，莖中痛

石薺去毛 瞿麥一兩 滑石五兩 車前三兩

冬葵子二兩

右細末，每服方寸匕，日三

眩膏 治諸淋痛不可忍，及沙石淋，大羅葡

切一指厚，四五片，好蜜淹少時，安淨鉄罐

上慢火炙乾，又蘸又炙，盡蜜二兩，番復炙

令香軟，不可焦，細嚼以鹽湯送下

沙淋方莖中有砂作痛者是

石首魚腦骨五對，火煨出火毒，即黃魚牙

乃腦中骨，滑石拌

治法彙本卷不便秘

子九

共為末，煎水通湯調下

瘀血作淋，牛膝膏妙，但虛人能損胃，不宜用，出

千金方，治小便不利，莖中痛，欲死，及婦人血結

堅痛如神，蓋牛膝乃治淋之聖藥也，但虛人監

以補劑為佳

血淋方

側柏葉 藕節 車前草 各取汁調益

元散服妙

集効方

地黃草自然汁空元飲俗名白地黃

桃仁煎治下焦瘀血作淋

桃仁 大黃 朴硝各一兩 盲虫半兩

右四味爲末以醇醋二升半砂器中慢火煎取一升五合下藥末不住手攪良久冷定丸桐子大先日晩不飯五更初溫酒下五丸日午取下如雞肝蝦蟆衣狀求下再服如見鮮血卽止續以調血氣藥補之

妊娠淋乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊婦胞

系法囊云

子

緊于腎腎間虛熱而成斯疾甚者心煩悶亂名

曰子淋也若頸項筋攣語澹痰盛用羚羊角散

若小便澀少淋痛用安榮散 若肝經濕熱用

龍膽瀉肝湯 若肝經虛熱加味逍遙散 若

腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救

若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛

膝黃栢知母芎歸甘草 若頻數而黃用四物

加黃栢知母五味麥冬玄參 若肺氣虛而短

少用補中益氣加山藥麥冬 若陰挺痿痺而

數用地黃丸 若熱結膀胱而不利用五淋

散 若脾肺燥不能小便生黃芩清肺飲 若

膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸 若膀胱陽虛

陰無所化用腎氣丸

虛後小便不通屬虛者舊方用陳皮去白爲末

空心酒調下二錢外用鹽填臍中却以葱白剝

去麤皮十餘根作一縛切一指厚安鹽上用大

艾炷滿葱上以火炙之炷熱氣入腹卽通

按此法唯氣壅不得通者宜之若氣虛源涸與

夫熱結者不可泥也

子

子淋

月分淺而小水不通或作痛者是用冬葵子散

梔子木通草稍麥門燈心以解熱利小便虛者

加參朮實者加滑石但滑石瞿麥能隋胎虛者

去之

經驗法

小便不通諸藥不効或轉胞至急危困用猪尿

胞一箇底頭出一小眼子翎筒通過放在眼內

瓶底以細線繫定翎筒子口細枝子堵定上用黃蠟封尿胞口吹滿氣七分繫定了再用手捻定翎筒根頭放了黃蠟塞其翎筒在小便出頭裏頭放翎筒根頭手捻其氣透于裏小便即出神効

小便赤澀

汗多而小便赤澀夏月多此證盛暑所飲既多膀胱澀閉則水不運下五苓散一名導逆內有水桂收汗猶苓澤瀉茯苓分水道收其在外者

治法彙六卷

便秘

圭

使之內又從而利道焉發者飲之壅者通之義取于此有虛勞汗多而亦澀者却是五內枯燥滋液既去不能生津故溺澀而赤不宜用利藥以竭腎水惟當溫養潤肺十全大補養榮湯之類白足選用汗者心液心主血血榮則心得所養汗止津生不待通而溺自清矣諸失血及患癰毒人產後大病後小便赤澀悉是枯竭不潤之病並宜前法

小便

內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能

出矣故小便由氣施化而出至于熱結不通乃

一時有餘暴病故八正五淋散爲對症藥若久

必責之虛但有氣血之分爾肥白人脈虛太

或沉弱責之氣虛黑瘦人脈弦數大便燥小便

澀責之血虛又有脾肺氣虛不能通調水道下

輸膀胱者補中益氣爲主陰虛用滋腎丸下焦

命門火衰小便不通兩腿及陰囊腫喘促者不

問男婦有孕急用八味料煎服遲則不救若老

治法彙六卷

便秘

圭

年陰痿思色精不出而內敗小便道澀痛如淋

用八味丸料加車前牛膝若老人精已竭而復

耗之大小便道牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛

亦治以前藥不應倍附子

有人小便赤短體倦食少缺盆痛諸藥不應余

以爲倦怠少食責之脾肺虛小便短赤而澀責

之腎弱當滋化源用補中益氣六味九加五苓

子而安

痢後小便短少胸腹脹滿兩足浮腫悉屬脾虛

神中益氣湯加附子

已經分利或病後有此屬脾肺氣虛而不能施
化也神中益氣加麥門五味

尺脉數大陰火上炎而小便赤少者六味地黃
丸加麥門五味腎經陰水虧不能滑滲者六味
地黃及滋腎丸

下焦元陽虛陰無以化八味丸神中益氣湯

若誤用分滲泄藥分利復傷陽氣陰無所生而
小便不通目睛凸出腹脹如鼓或腿膝腫硬兩

便難

三后

腿皮裂流臭水用滋腎丸益氣丸每見元氣虛

而復用猪苓澤瀉及五子五皮之類而症益甚

者急用金匱腎氣丸多有復生者若妄泄水立

危

遺溺

勞役太過色白倦怠氣口脉大無力屬上焦肺
氣虛神中益氣倍參芪有火加黃柏生地

因先病淋服利藥太多致溺不禁者參芪大補
爲主少佐熟附子

內經曰水泉不止者膀胱不藏也仲景曰下焦
竭則遺溺年老真陽弱補藥中加桂附及牡蠣

乃瀝可去脫也

丹溪方治遺溺桑螵蛸酒炒爲末薑湯下二錢

治法彙六卷遺溺

三主

大無方雞內金散治溺床失禁用雞肫內黃及
研爲末每服二錢酒飲調下

大人遺溺不知薔薇根細研酒下

鹿茸丸治脉沉遺溺下元虛冷小便白濁滑

數不禁

鹿茸 椒紅 肉桂 附子 牡蠣

石斛 補石脂 肉蓯蓉 雞肫脰

沉香 各一桑螵蛸

已上皆瀝而思補之劑故加沉香以行其藥

惡大滯也

酒糊丸桐子大空心三十九

有所傷損汚血蓄于胞中亦令遺失鹿角屑炙黃爲末調下二錢

有熱鬱于下焦而遺者脉必洪滋陰清火

夜遺少壯責之火中年青之虛熱則清之梔子木通茯苓等虛則補之大兔絲子丸猪脬炙碎煎湯下

咳而遺溺屬膀胱

治法彙六卷遺溺

幸六

孕婦遺尿當審虛與熱

本草白薇散主之

薛氏曰前症若脬中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智仁若肝腎陰虛兼燥症者六味丸

遺溺用燕巢中草燒黑水下方寸匕

產後遺用桑螵蛸散佳若因穩婆不慎致損胞而小便淋瀝者八珍湯以補氣血兼進補脬飲難產傷胞遺尿失禁丹溪猪羊胞煎補藥法妙

見在

一方桑螵蛸三十箇牡蠣煅人參黃芪

爲末米飲調三錢或以桑螵蛸炒龍骨煨爲末煎參芪湯調亦可

小便黃赤皆屬下焦熱但有虛實之分爾虛則補中益氣湯

陰虛有火用黃蘗知母實宜分參

幼齡精未通而慾實早開老年精已竭而復耗俱致精不出而內損二陰枯澀大小便道牽痛

治法彙六卷遺溺

幸七

愈疼則愈便愈便則愈疼治須補養治同勞淋若再攻下立危

小便數謂頻數也

數而少熱也茯苓琥珀湯利之

數而多虛也薯蕷蓮肉益智仁之屬收之

生薯蕷半斤刮去皮以刀切碎于罐中煮酒沸下薯蕷不得攪待熟加鹽葱白更添酒空腹服

二三盞

蓮肉去皮不以多少用好酒浸一宿猪肚二箇

將蓮肉入肚中煮爛將蓮肉焙乾

九芡實大每服五十丸食前米飲下

老人及中年人夜多小便悉屬腎虛益智子二

十一箇鹽五分水一盞煎八分臨睡溫服

衛真湯并丸 桑螵蛸散

戴氏曰小便多者乃下焦虛不能攝水宜兔絲

子丸八味丸玄兔丹生料鹿茸丸余按腎氣不

能攝水降多升少非大補莫能參芪佐桂

小便常急遍數雖多而所出少放了復急不澀

治法彙六卷遺漏

痛却非淋多因縱慾或忍尿行房而然宜生料

五苓散減澤瀉之半加阿膠一錢吞八味丸此

丸須五味子者

若頻頻欲去而溺不多但不痛溺此腎與膀胱

俱虛客熱乘之虛則不能制水宜補腎丸六味

地黃丸

大便硬小便數名脾約仲景用脾約丸不若

血潤燥之為愈也

秘結

老人產婦病後汗下吐瀉後大便難悉屬血虛

津液不足虛秘須用潤劑切不可用牽牛巴豆

大黃等真眩藥以及耗津液也雖獲効目前久

之必變他症慎之慎之經曰臟得血而能液當

補血為主微加辛以潤之

一切秘結胃強能食者通幽湯間服古方潤腸

丸微利之今人急於獲効一味大黃或加巴霜

云潤腸丸屢秘屢投卒至天折終莫之悞悲哉

治法彙六卷秘結

丹溪曰有虛有風有濕有熱有津液不足者有

寒者有氣結者切不可倒用芒硝大黃等利藥

血虛津液枯竭而秘結者脉必小澀面無精光

大便雖欲努瀆不出大劑四物湯加陳皮甘草

紅花通幽湯

血少兼有熱者脉洪數口乾小便赤少大便秘

硬潤燥湯活血潤腸丸四物加酒芩佐桃仁紅

花

虛秘腸枯枯槁面不澤當歸潤燥湯投滋腸五

六佳

不能運化，倦怠，懶于言動，補中益氣湯。

赤白帶下，清氣一升，濁氣自降。

秘面赤身熱，腸胃脹悶，時喜冷，口舌生瘡，此由大腸熱結，宜四順清涼飲，吞潤腸丸，實者承氣。

年高虛人，大便秘者，脈浮在氣，杏仁陳皮主之。

脈沉在血，桃仁陳皮主之，所以俱用陳皮者，以

手太陰與手陽明為表裏也。

治法藥六卷秘結

四

膏藥二便澀滯，或欲便不輒，搜風順氣丸妙。

五瀉後，忘津液便秘者，消導加花粉當歸，蘇子，

仍以麻子仁，搗水煎藥妙。

氣結者，脈必沉伏，上下攻走，脹悶或痛，由氣不

升降，穀氣不行，其人多噫，宜蘇子降氣湯，加枳

殼，吞養正丹，或半碗丸，來復丹，木香檳榔

丸，少壯氣實，用牽牛丸一服無碍。

六沉實，體健神旺，二便俱秘者，升麻一末，二陳

湯，先服後吐，以提之。

中實熱，脈弦滑有力，十數日不大便，

腸丸，甚者承氣湯。

過食寒冷之物，停滯不便，腸痛，脈沉伏，為寒結，

從食陰治，腹痛甚，不通，急丸。

方書云：由冷氣橫于腸，凝陰固冷，用藿香正氣

散，加官桂、枳殼，吞半碗丸，熱藥多秘，惟硫黃暖

而通，冷藥多泄，惟黃連肥膠而止。

風秘者，脈必浮數，乃熱急生風，或遍身虛癢，養

血藥中，加防風、羌活、秦艽、皂角等，活血潤燥丸。

治法藥六卷秘結

四

搜風順氣丸，俱對症藥。

方書謂風傳大腸，用小續命湯去附倍芍，加竹

瀝，吞潤腸丸，恐未必。

老人氣血弱，大便秘，蘇子麻仁粥妙，用蘇子麻

仁淘淨，不拘多少，研爛濾汁，煮粥。

產後有二病，鬱目則多汗，血虛多汗則大便

難，故難用藥，惟此粥佳。

汪夏大仙難，黃芪人參湯，加生地、歸身、桃仁泥，

潤之，潤之久不快利者，少加煨大黃。

人莫不應此非血秘是難
加羌活防風

古方潤腸方

麻仁 一斤用生絹袋盛百沸湯中連袋煮

枳實 炒厚朴 薑汁 芍藥 各三 大黃 酒煮

杏仁 去皮尖另研

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸空心白湯下

滋腸五仁丸 治津液枯竭傳化艱難

治法彙六卷 秘結

栢子仁 半斤 桃仁 杏仁 炒去皮尖

松子仁 一錢 陳皮 四兩另 郁李仁 炒二錢

右將五仁另研爲膏入陳皮末研勻煉蜜丸

桐子大空心下五六十九

通幽湯 治大便秘難上衝吸門不開噎塞不便

燥結不得下治在幽門以辛潤之

甘草 炙紅花 各三 生地 熟地 各五分

升麻 桃仁泥 歸身 各一 麻仁 三

臨服加檳榔末半錢加黃麻仁爲引

泄秘而有火者大黃酒浸者二仁俱後加
活血潤腸丸 治大便秘風秘仁常燥結

歸稍 五錢 防風 三錢 大黃 酒浸 羌活 各一

皂角仁 性煨存 桃仁 另研 麻仁 半斤

另研

右除二仁另研外共爲細末煉蜜丸桐子大

每服五十丸白湯下余丸封固不可見風一

通之後卽以麻仁煮粥每日早晚用啜不再

結

治法彙六卷 秘結

枳殼丸 治濁氣閉塞三焦二便不通水穀不

得下

枳殼 二兩 陳皮 二兩 檳榔 半 木香 二錢

黑丑 四兩半生 半炒取頭末

右細末煉蜜丸桐子大每服十五丸薑湯下

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化胸膈

作痛 方見傷食門

丹溪治一人胃虛有滯不通不納藥用黃蠟包

備急丸穿一孔令服三丸取其不犯胃氣故得

一、下血也。次日下結尿升許，繼以...

又一兒痘後秘結，百藥不効，令使婢口含香油，以小筒一箇套入肛門，將油吹入，少時病者自覺油入肛門，如蚯蚓漸漸上行，再過片時許，下黑屎二升，用眠而安。

仲景脾約丸治胃強脾弱，約束津液，不能行于大腸，因而秘結。方用煨大黃六錢，杏仁、麻仁各五錢，枳實、厚朴、芍藥各八錢，蜜丸，下二十九，丹治法彙六卷。

秘結

四

溪曰：既曰脾約，必陰血枯槁，內火熾灼，熱傷元氣，脾失轉輸，肺失傳化，宜乎大便秘而難小便。然無蓄藏也，理宜滋養陰血，使陽火不熾，金行化令，脾土健旺，使津液復入於胃，大小便潤而通矣。此丸止宜熱甚而氣實者與壯盛酒客。

金匱真言論曰：北方黑色入通于腎，開竅於二陰。故腎陰虛則大小便難。宜以黃從容、車前、茯苓之屬，補真陰，利水道，少...

津液而潤其燥，施之於老人尤宜。若大小便結之甚，求通不得，登廁時用力太過，便仍不通，而氣被掙脫，下注肛門，有時泄出清水，裏急後重，不可忍者，胸膈間梗梗作惡，乾嘔有聲，渴而索水，飲食不進，呻吟不絕，欲利之則氣已下脫，命在頃臾，再下即絕。欲固之則溺與燥屎膨滿腸間，恐反增劇。欲升之使氣自舉，而穢物不為氣所結，自然通利，則嘔惡不堪。宜如何處，惟益血潤腸丸多服自愈。俗以便秘為後牢固，壽考之徵，而一時難堪，此方不犯大黃，可以久服。

秘結

聖

丹溪曰：余觀古方通大便，皆用降氣品，劑蓋肺氣不宣，則大便難傳送。用枳殼、沉香、訶子、杏仁等是也。又老弱津液少者，宜胡麻仁、阿膠潤之。後用此藥，旋通旋秘，必變肺痿吐血。

益血潤腸丸

熟地 六兩 杏仁 炒去麻仁 各三兩 以上三味俱搗膏 枳殼 兩半 阿膠 兩 肉從蓉 各兩 蘇子 兩 荊芥 兩 當歸 兩

吳未和前三味杵千餘下加煉蜜丸桐子
每服五六十丸空心白湯下

導引法

先以皂角末加老蜜作小挺或加鹽以鹹能軟
堅也納肛門中如不動乃燥結甚也以猪膽七
八箇取汁加米醋半盃盪溫入雞豚中以小綿
管接入肛門將膝捏上少時通必轉尿氣覺已
在肛不得出熱結乃可

冷秘用醬生薑導或於蜜煎中加烏頭末以化

治法彙六卷

秘結

聖

寒消結

烏梅湯浸去核丸如棗大亦可導

醫瓜削如棗亦可導

一偏者大便素結服搜風順氣丸後胸膈不利
飲食善消面帶陽色左關尺脉洪而虛余曰此
足三陰虛也彼恃知醫不信服潤腸丸大便不
實體倦與神中益氣六味地黃月餘而驗年許
而步

若脾肺氣虛者用補中益氣湯若脾經鬱結者

加味歸脾湯若氣血虛者八珍湯加肉蓯蓉
若脾經津液涸者用六味丸若發熱作渴者用
竹葉黃芪湯若燥屎直腸用猪膽汁導之若肝
膽邪侮脾者脉必弦數兩脇脹小柴胡加山梔
郁李枳殼

若膏梁厚味積熱者用加味清胃散亦有熱燥
風燥陽結陰結者當審其因而治之苟一誤妄
下復傷胃氣多成敗症

一法皂角燒烟于馬桶中薰之

治法彙六卷

秘結

聖

一法皂角末加皮硝一撮水凡煉蜜和成挺子
入肛中佳

勢甚者用麻油一盞熱水一盞入猪尿胞內漬
入肛中立通

二便不通燒鹽鋪臍內切蒜一片於鹽上用艾
灸二三壯

東流飲 治大便熱結

細茶 生芝蔴 生桃仁 大黃 一錢
用長流水生搗服

散治二便不通 方見淋門

症二便不通及諸雜病陰症急危者用牡蠣粉乾薑炮各一兩右爲末男病用女唾調手大擦熱聚揜二卵上得汗出愈女用男唾揜二乳上蓋卵與乳乃男女之根蒂坎離之分屬也非急不可用

治二便不通

六七月間取大蟻蜋糞中者不拘多少線穿懸風處陰乾以刀從中切斷如大便秘

治法彙六卷

秘結

四九

用上截小便秘下截各爲末新汲水調下二便俱秘則全用之

養生論一法用細灰於患人臍上及丹田作一泥塘徑如碗大一指厚四圍高起以新汲水調朴硝一兩傾入灰塘中勿令走須臾迸出

大小便俱秘

脉盛皮熱腹脹前後不通督悶此謂五實脾胃氣滯不能轉輸加以痰飲食積阻碍澀道大小便秘澀不快升柴二朮二陳湯數服能令

大便秘而小便長

濕熱痰火結滯脉洪盛大便秘赤肢節煩痛

丹溪治一婦人脾疾後患二便不通此是痰阻中焦氣聚上焦二陳加木通先服後吐查再煎燒皂角灰爲末粥清調下

一法推車客七箇上狗七箇二物新瓦上焙乾爲末以虎杖向東南者取皮煎濃湯服之

連根葱一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十一

治法彙六卷

秘結

五十一

粒鹽二匙同研爛作餅烘熱揜臍中以帛紮定良久氣自透不通再換一餅

開格

關無出格無入關則不得小便格則吐逆

寒在胸中則格而吐熱結下焦則不得小便

丹溪曰寒在上而熱在下故多从法當取吐以

提其氣之橫格不必在出痰也吐中便有降

久病氣不運者補氣兼升降補中益氣湯加檳

榔使清升濁降也

凡遇此病吐逆而小便不利急先灸氣海天
等穴各三七壯其吐必止後以益元散等藥
利小便

一法治吐逆溺塞用藿六平胃散合五苓散
薑棗煎服

一尼體厚病吐逆忽小便不利頭汗出立斃
既濟丸 治關格脉沉細手足冷者此陽虛之

極用製附子人參各二錢麝少許共末糊丸
桐子大燈心湯下七丸

東垣六卷入秘錄 五十一

痿

痿者筋骨無力足不任地手不能舉俗名癱瘓
是也有氣虛有血虛有痰有濕熱有食積有瘀
血○黑瘦人脉濡弱或左脉雖大按之無力行
步艱難或兼盜汗等陰虛症者是血虛有火宜
四物倍知柏蒼朮下補陰丸○肥白人脉沉軟
或滑兼惡心胸膈不利屬氣虛有痰宜四君子
二陳加蒼朮黃柏竹瀝薑汁○脉沉滑兼腰膝
麻木或腫者屬痰宜二水二陳羌獨芩栢入竹

汁薑汁○脉沉濡而數症兼小水赤澀或作腫
痛者屬濕熱宜清燥湯加芩或二妙丸東垣健
步丸○氣口洪弦帶滑症兼腹脹痛或惡食者
是食積妨礙脾氣不得運于四肢而然宜導痰
運脾加山查神曲木瓜防己不應朮香枳榔丸
從食積治積去補脾○脉澀或乳或因產後惡
血滯于腰膝或因跌撲損傷後得此者方可作
瘀血治四物加桃仁紅花牛膝肉桂徐徐取效
東垣取黃栢為君通治諸痿無一定之法有兼

者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有
扶氣者有挾寒者臨病之際宜加審○大抵
起于濕熱者多斷不可作風治而用風藥

病痿須戒厚味酒麪食淡乃佳
一蒼瘦人每坐輒不能起左脉微弱右關寸獨
弦急亦無力因酒色太過所致用丹溪加味四
物湯不二十劑愈後服鹿角膠調理

一人體厚二足行履不便時作暈運以大劑二
陳加南星二朮黃柏黃芩入竹瀝薑汁數劑頃

治法彙六卷

五十五

愈○一人自覺兩足熱如火炙自足踝下上衝
腿膝且痿弱軟痛脉濡而數乃濕熱挾虛也以
蒼朮黃柏為君四兩牛膝二兩龜板虎脛骨漢
防已各一兩歸二兩人參二兩山藥糊九桐子
大每服一百丸空心鹽湯下古方加附子

一人兩足沉重不能舉六脉沉數詢之平居痛
飲遂作濕熱治乃以四苓二妙加牛膝木通防
已數服漸減用健步丸調理而安

一老人痿厥用虎潛丸不應後于虎潛丸加附

愈蓋附反佐之功也

加味四物湯 治諸痿四肢軟弱不能舉動

歸身錢一熟地錢三白芍錢三川芎錢三人參錢五

黃柏錢一黃連錢五知母錢三杜仲錢三蒼朮錢一

麥門冬錢一五味子錢五牛膝錢三防已錢三

水二盞煎一盞空心服酒糊為丸亦可

健步丸 治膝中無力屈伸不便腿脚沉重行

步艱難

羌活 柴胡 滑石 甘草 瓜蒌根

治法彙六卷

五十七

肉桂各五防風 澤瀉各三防已酒洗

川烏炮 苦參酒浸

石為細末湯煮麪糊丸桐子大每七十九煎

愈風湯下卽荆芥湯

經驗方 治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝

下上衝腿膝等症因濕熱所成者

蒼朮米泔浸黃柏酒浸牛膝去蘆

龜板酥炙虎脛骨同防已歸尾酒

右為末麪糊丸桐子大每服七十九或一百

九空心薑鹽湯下

鹿角膠斤 治氣血兩虛足軟不能行動久

床縛痿症

鹿角膠斤 鹿角霜熟地 各半 川牛膝

白茯苓 兔絲子 人參各一兩 歸身四兩

白朮 杜仲各二兩 虎脰骨酥炙 龜板酥炙

右為細末先將鹿膠無灰酒溶化和丸桐子

大每服一百丸空心薑鹽湯下

大法腎主骨肝主筋足三陰虛則痿弱無力如

治法彙六卷 痿 五十六

長夏多倦怠是也必須大補兼滋陰

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是

絕寒水之化源源絕則腎虧痿廢之病大作

腰以下痿弱癱瘓不能動

黃芪 人參氣補 二木濕燥 黃芩藥和

澤瀉濕 酒栢酒連 生地甘草 藥和

麥冬和中 五味子之氣

又治長夏濕熱太盛脾虛之人久之面目四

肢浮腫自汗息墮氣高而喘身熱而渴乃中

氣受病也用補中益氣加二六

佐五味麥冬清肅燥金得行化令兼治

本也

張二錫曰真氣所受于天與穀氣併而充身者

也故穀入于胃其氣脾為之行于三陽又復行

之于三陰是五臟六腑皆稟氣于胃而四肢筋

骨肌肉皆賴以榮養也陽明胃氣既虛臟腑無

所稟四肢無所榮機關不利而痿治痿獨取陽

明有旨哉

治法彙六卷 痿 五十七

按丹溪以難經瀉南補北之法摘為治痿之方亦

是舉其例爾若胃口不開飲食少進者當以芳

香辛溫之劑進之不可拘于此宜藿香養胃湯

況依內經當分五臟

大烏藥順氣散 治癱瘓脉實氣壯者

歸芍地黃芎 烏藥陳皮龍 香附礞砂枳

芩半與防風 蘇桔并甘草 乳沒沉香停

薑棗均煎服 諸風氣立通

當歸 芍藥 生地 川芎 烏藥

陳皮 地龍 香附 砂仁 枳殼

黃芩 半夏 防風 紫蘇 桔梗

甘草 乳香 沒藥 沉香 各二錢五分

成加一味為末煎 薑棗煎服

換骨丹

我府換骨丹 傳之極幽秘 槐皮芎朮芷

僂人防首蔓 十件各停勻 味苦香減半

難腐即少許 朱砂作衣纏 麻黃煎膏丸

大小如指彈 夜臥服一粒 通身汗漫漫

治法 六卷 癰瘰

五十八

麻黃 仙木 槐角子 桑白皮 川芎

白芷 人參 威靈僂 何首烏 防風

荆子 五味子 麝香 苦參

廣木香 龍腦 朱砂 研為衣

右除桑皮草末外共末 麻黃膏和丸 每兩作

十丸 每服一丸 擊碎酒浸臨臥服 溫覆當

有汗出汗多勿用

續命丹 治有餘癰瘰

天南星 米泔水 煮七日 每日換水煎去

川烏頭 浸七日 加草烏頭 去皮臍 地龍

晒乾 五靈脂 清水 浸十日 每日添薑汁 直候其

色轉黑 滴乳石 研乳香 沒藥 羌活

乾六兩 鐵鑄炒絲 天麻 各二兩 全蝎 去毒晒

白僵蚕 銹去嘴 輕粉 研雄黃 研各片腦

錢半

右為末 薑汁煮糯米飯 搜和石臼中杵五千

下 作錠重一錢 以磁礮收貯 每服一錠生

薑自然汁和好酒一處磨化 臨臥通口熱

治法 桑木 煮爛

五十九

服溫覆出汗為效

神効活絡丹 治諸風濕諸痺肩背四肢腰膝

有餘實痰一主發泄

白花蛇 焙乾 烏梢蛇 半兩 酒 麻黃 二兩

細辛 去土 全蝎 去毒 兩頭尖 酒 浸

赤芍 兩管眾 買方云是 防風 半兩 葛根 兩

沒藥 另研 血竭 七錢 半 硃砂 另研 地龍 兩

烏犀角 兩 甘草 二兩 去 丁香 一兩 麝香 兩

白僵蚕 炒 乳香 一兩 片腦 錢半 玄參 兩

官桂 <small>二兩</small>	草豆寇 <small>二兩</small>	川羌活 <small>二兩</small>	天麻 <small>二兩</small>
虎脛骨 <small>一兩</small>	牛黃 <small>二錢</small>	人參	天竺黃 <small>一兩</small>
威靈僊 <small>酒浸</small>	藿香 <small>二兩</small>	何首烏 <small>二兩</small>	白芷 <small>二兩</small>
敗龜板 <small>一兩</small>	烏藥 <small>一兩</small>	安息香 <small>一兩</small>	骨碎補 <small>一兩</small>
黃連 <small>二兩</small>	茯苓 <small>一兩</small>	黃芩 <small>二兩</small>	白木 <small>一兩</small>
黑附子 <small>一兩</small>	大黃 <small>二兩</small>	當歸 <small>二兩</small>	木香 <small>二兩</small>
香附 <small>一兩</small>	沉香 <small>二兩</small>	白豆寇 <small>一兩</small>	熟地黃 <small>二兩</small>
脂 <small>半兩</small>			松香 <small>二兩</small>
右爲細末煉蜜丸彈子大金箔爲衣每服一			
治法彙本卷八痿			
九溫酒茶清隨病下			
虎脛骨酒	治風痰偏枯一切攣拳		
石斛 <small>根去</small>	石楠葉	防風	虎脛骨 <small>炙</small>
牛膝	茵芋葉	續斷	杜仲 <small>去粗皮</small>
芎藭	金毛狗脊 <small>火去</small>	川巴戟	
右剉如豆大以絹袋盛用無灰酒一斗浸之			
十日後每服一盞量大二三盞妙			
舒筋保安酒 治同上			
木瓜 <small>五兩</small>	草薺	牛膝 <small>酒浸</small>	五靈脂

松節	烏藥	天麻	黃芩	白殭
當歸	防風	威靈僊	虎骨 <small>酒炙</small>	
白芍藥 <small>一兩</small>				
右用無灰酒一斗浸上藥緊封扎罈口待二				
七日取藥焙乾搗爲末每服二錢用藥酒				
半盞調下如酒浸用米飲下一方用金毛				
狗脊一兩却將乳香白膠香各一兩同研				
入乾末內				
又方				
治法彙本卷六痿				
防風	草薺	當歸	桔梗	敗龜板
枸杞	秦艽	羌活	乾茄根 <small>蒸過</small>	
虎脛骨	川牛膝	晚蚕沙 <small>黃</small>	蒼耳子	
蒼朮 <small>炒七</small>	五加皮 <small>各二</small>			
右剉碎絹袋盛浸酒十斤封固一七服如前				
法				
三酒除風散濕功力與史國公萬病無憂藥酒				
同要皆治有餘之風痰濕氣耳氣血虛而痰火				
盛四肢痿痺不遂者大補尚未奏功何況此酒				

○四肢既病、非烏附及酒性不能達、須佐于補藥中、丹溪謂肥人多濕、少加附子行經、正是此意、明哲當斟酌時宜、隨其氣血加減補益之藥、于酒中乃佳、○人參、浸酒飲、治風軟脚弱、可逐奔馬、故曰、奮草曾用有效、

陽痿

方書云、男子精盛而思室、內經曰、男子二八精氣盛、陰陽溢泄、若夫鬱喪太過、精液枯竭、則陽道痿弱不舉、中年人雖舉、亦不得似壯者、皆精力乏所致、昧者悉指為陽虛、妄投桂附、瑣陽、菟、蓉、徒助邪火、煎熬真陰、卒至毒發、中風暴亡、莫之能誤、朱子曰、有子後一點不宜虧泄、誠保命良方也、人惟知慾而不知重命、鞭馬于危途、良可太息、倘無子而有此、須大補氣血、滋陰助精、

治法彙六卷、陽痿

李三

佐以鹿茸、鹿角膠、菟蓉、瑣陽、一二味以兼補命門相火、鼓舞元陽、又須審氣血孰虛、肥人大補氣集靈膏、瘦人大滋陰、八味丸為主、

王節齋曰、男子陰痿不起、古方多云命門火衰、精氣虛、固有之矣、然亦有鬱火甚而致痿者、經云、壯火食氣、譬如人在夏暑而倦怠、遇冬寒而堅強、予常親見腎經鬱火而有此症、令服黃柏、知母、清火堅腎之藥、而効故須審察、不可偏認為火衰也、○節齋長于補陰、故所見乃爾、

壯精固本丸

枸杞子二兩 地黄四兩 砂仁二錢 瑣陽 人參

白茯苓二兩 兔絲子二兩 沙苑蒺藜二兩

歸身一兩 鹿角膠二兩 天門冬 麥門冬各一兩

山藥二兩 五味子二兩 山茱萸二兩 澤瀉二兩

共為末蜜丸桐子大每服一百九空心白湯

下

石人六味地黃丸加枸杞兔絲五味鹿角膠大

陰

佐

門

陰痿陰汗陰冷陰臭陰痒陰痛陰縮陰縱

經傷于內則不起是也仲景八味丸特妙甚者

加人參鹿膠鹿茸或加菴蓉鎖陽枸杞是兼補

右腎相火也

陰汗陰臭俱屬下焦濕熱酒麪厚味過度而然

龍膽瀉肝湯妙○虛者內服青娥丸外用爐甘

石蛤粉撲或蜜陀僧和蛇床子研末撲之

陰汗多者二陳二木加風藥以勝之防風羌

活法彙六卷陰

藥本之類

婦人陰冷肥盛者多是濕痰下流所致二木二

陳加風藥外用坐藥妙

陰中痒亦是肝家濕熱瀉肝湯妙瘦人燥痒屬

陰虛坎離為主外用蛇床子煎湯洗之罌瘡同

治要分虛實耳 尺脉數婦人陰中生瘡下部

腫久之有蟲用猪肝煮熟切長條納陰中引蟲

出乃上殺蟲藥 婦人陰中腫痛不可忍有物

如茄突出即是男子之疝但名瘕聚耳俱屬肝

經氣平肝破氣為主與疝同治外以枳實
碎炒熟用包熨之冷再易但是陰痛俱妙

陰莖痛是厥陰經氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩
其氣爾若病淋而痛似難一槩治必用清肺氣
而清濁自分氣虛六君血虛四物各加黃柏知
母滑石石葦琥珀

新室嫁孔痛宜舒鬱和血四物加香附紅花

千金方有人陰冷漸漸入陰囊腫滿晝夜疼
不已用上好川椒爲末帛包裏囊如不覺熱炒

治法彙大卷

陰

熱更妙以知爲度內煎大薊湯汁服妙陰冷兩
丸如冰出汗兩脚痿弱宜補肝湯

陰囊丹溪治濕痒方先以吳茱萸煎湯洗後用

吳茱半兩寒水石三錢黃柏二錢半樟腦蛇床

子各五錢輕粉一錢白礬三錢硫黃二錢檳榔

白芷各三錢爲末摻之陰痒亦妙病後動淫

陰卵痛大傷氣血而然八珍加肉桂附子

仲景治陰吹用髮膏散

病後陰腫連小腹及腿屬脾腎兩虛少食大便

不實責之脾補脾爲先小水短少責之腎腎氣
不足之妙在桂附

陰縮陰縱陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱謂
前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷于
寒則縮入傷于熱則挺縱不收

丹溪治鮑子二十餘歲玉莖挺長腫而痿皮塌
常潤磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小

柴胡加黃連大劑行其濕熱略加黃柏降其逆
氣其挺腫漸收及半但莖中有堅塊未消遂以

治法彙大卷

陰

青皮爲君佐以散風藥末服外以絲瓜汁調五
倍子末傅而愈又一人挺長腫痛脉弦而數

用朴硝荆芥煎湯洗投三乙承氣湯大下而愈

腎氣丸 見濕明

龍膽瀉肝湯 見腦痛門

青娥丸 見腰痛門

補肝湯

髮膏散 見淋散

三乙承氣湯 見傷寒門

陰瘡

三錫曰婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注其外症有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突出如餅俗呼陰菌亦有如鷄冠花有生蟲腫痛濕痒癢爛出水脹悶脫墜者其內症口乾內熱體倦經候不調飲食無味嘔熱發熱胸膈不利脇脹小腹疼痛赤白帶下小水淋瀝治法腫痛宜四物加柴胡山梔龍膽草丹皮濕痒者宜歸脾加山梔丹皮柴胡淋瀝者宜龍膽瀉肝湯加治法藥六卷陰瘡

李八

白木丹皮潰爛者加味逍遙散腫墜宜補中益氣加山梔丹皮

一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱瞋熱似痒似痛小腹重墜此肝脾鬱結之症蓋肝家濕熱作腫作痛脾虛下陷則重墜先以補中益氣湯加山梔茯苓川芎調理外以生豬脂和藤蘆末塗之遂收

一婦陰中挺出一條五寸許悶痛重墜水出淋瀝小便澹滯夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱朝與

補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾加

山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈有蟲亦用

此法有膿水腫痛用補中益氣倍升柴加茯苓

妙梔子自効

多鬱悶人肝火內鬱有此宜解鬱清肝越鞠對

小柴胡主之

歸脾湯見驚悸門

龍膽瀉肝湯見脇痛門

逍遙散見婦人門

治法藥六卷陰瘡

李九

補中益氣湯見內傷門

便濁

小便渾濁或赤如血或白如泔不痛者是痛則為淋矣屬濕屬熱分虛實治肥白人脉沉滑胸脘不利小便白濁屬濕痰宜燥中宮之濕面色不澤身倦脉無力者屬氣虛兼補氣

黑瘦人脉洪數五心煩熱頰赤唇乾小便赤或白者屬相火宜滋陰肝脉弦數有力火宜龍膽瀉肝湯瀉之

治法一分滲解熱 一燥濕健脾 一滋陰降火 一實下固陽

火 一實下固陽

濁氣下流為赤白濁升柴二木二陳俱最妙赤者黃柏當歸知母白芍丹溪曰升柴二木二陳湯能使大便潤而小便長屢驗

兩尺脉沉弱足膝痠弱白濁頻數凝白如油光彩不定凝腳澄下凝如膏糊古方悉指為陽虛亦有虛而挾相火者不可不辨革解分清飲專

主陽虛

靈樞經曰中氣變便為之變化必先補中氣

升舉之而後分其臟腑氣血赤白虛實以治之夫他邪所傷者固在濕熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者則不宜純用寒涼必反佐治之要在權衡輕重而已

赤者熱傷血宜滋陰

白者濕熱傷氣宜燥濕

白濁不止服珠珀粉丸佳方用樗皮炒黃柏炒

褐色燥濕熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒引下滑石

利竅珠珀寧神定志一方無此用之屢驗久病

治法一六卷 便濁

主

無火症者加炒乾薑

神麴糊丸氣虛四君湯血虛四物湯氣血兩

虛八物湯下

清心蓮子飲 治上盛下虛心火上炎口苦煩

渴五心煩熱小便赤或澀下白濁

石蓮肉子即蓮 赤茯苓 人參 黃芪

地骨皮 麥門冬 黃芩 車前

甘草 空心服

白濁經年不愈或時夢遺形瘦心神不安

治珍珠粉丸合定志丸服

定志丸

遠志去心 石菖蒲各二兩 人參 白茯苓

右為末蜜丸桐子大硃砂為衣每服七丸加

至二十九空心米湯下

一方用炒黃栢生黃栢各一兩滑石三兩神麴

半兩共為末滴水丸空心服

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小

便白濁夢寐頻泄

治法集本卷八便濁

主三

鬼絲子五兩 白茯苓一兩 石蓮肉二兩

酒糊丸桐子大每服三十丸空心鹽湯下

單解分清飲

益智仁 川草解 石菖蒲 烏藥各等分

入鹽少許水煎服一方加茯苓甘草

小便白濁出髓條經驗方

酸棗仁 白朮 人參 白茯苓

破故紙 益智 大茴香 左顧牡蠣

右為末青鹽酒為末每服三十丸空心酒下

酒一盞傾入服之二三服愈酸梅草取汁拌勻

又方用鬼絲子一兩炒黑色滓酒一大碗去粗

熱服立愈

瑞連丸 治思慮傷神小便赤濁

石蓮肉炒去心 白茯苓 龍骨生用 天冬洗去心

栢子仁炒別 麥冬洗去心 當歸酒浸酸棗仁

紫石英火煨 遠志甘草湯洗 乳香 龍齒各一兩

右煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服七十九空

心溫酒下

白淫痿論曰思想無窮所願不遂意淫于外入

房太甚宗筋弛縱帶脉不引發為筋痿及為

白淫夫腎藏天一以慳用事志意內治則精

全而瀆若思想外淫房室太甚則淫泆不守

輒隨洩溺而下也然木于筋痿者以宗筋馳

縱也

白淫責于陽虛當益火之原菰蓉鹿茸入參之

類內補鹿茸丸主之要在斟酌增損分

子 46-347

鹿茸酥炙 虎絲子酒浸 茯苓白茯苓

紫苑 肉苁蓉 蛇床子酒浸

黃芪 桑漂蛸 陽起石

附子炮須用童便製 肉桂各等分

右為細末煉蜜丸桐子大每服二十九食遠溫酒下

夢遺精滑

夢交捷而精遺出為夢遺責之心不交流出相火妄動所致當清心制火

不因夢時時流出者為精滑屬氣虛不能約束精妄走所致當滋精滋腎下部濕熱益白液時時粘糊此非精乃濕熱薰蒸而成肝脉必弦數常瀉肝滲濕解熱當歸龍薈丸龍膽瀉肝湯佳古方治精滑用局方青州白丸子辰砂為衣大驗濕痰明矣

治法彙考六卷 夢遺

七五

治法曰夢遺者治其心精滑者固其真滿而溢者舒其情濁而赤者調其經養其神心安神寧火來坎戶水到離宮水火交養遺濁皆清壯年未偶時夜遺為精氣溢泄不必治心有所思夜見于夢乃心火動而相火隨之也黃連清心飲主之安神丸或用補心丹恣慾太過精滑不禁當大補加滋藥參壯陽五味金櫻膏之類或煎八物湯吞櫻根丸五味金櫻山茱萸蓮實俱酸以收之藥

勞心太過亦令夢遺乃神安越火動所致宜心丹

熱則流通酒客輩不夢而遺當滋陰降火陰虛勞瘵同

若用心太過而得之宜遠志丸用交感丹加蓮米五味子吞下仍佐以靈砂丹審是思色慾不遂得之且以四七湯吞白丸子甚者耳聞目見其精即出名曰白淫妙香散吞王華公丹

若審是色慾過度下元虛憊泄滑無禁宜正元

治法彙六卷

夢遺

飲加牡蠣粉肉苁蓉各半錢吞養正丹或靈砂丹仍佐以鹿茸丸犬兔絲子丸固陽丸之類按此等大僭燥若妄用則陰水耗竭壯火獨炎枯脂消肉骨立筋痿而成不救之疾用者審之若審是壯年滿溢者清心丸夢遺俗謂之鬼交宜溫膽去竹茹加人參遠志蓮肉棗仁炒茯苓各半錢吞王華白丹固陽丸夢遺亦備四症宜審其所感用前藥

王華白丹清上實下助養根元扶衰救危補

夢遺精滑不固小便滑

夢遺精滑

鍾乳粉煉壹兩白石脂煅赤陽起石煅赤酒

各伍錢左顧牡蠣朱袋洗用並汁鹽泥固

右肆味研細糯米粉煮糊丸芡實大入地坑

出火毒壹宿每服壹粒空心人參湯下忌菜

豆猪羊血

昔壹人攻書至肆鼓臥間王莖但着被與腿即

夢遺空則不夢飲食漸減倦怠少氣此用心太

治法彙六卷

夢遺

過貳火俱起夜不得睡血不歸肝腎水不足火乘陰虛入客下焦鼓其精房則精不得聚藏而欲走因王莖着物猶厥氣客之故作接內之夢於是上補心安神中調脾胃升舉其陽下用益精生陰固陽之劑不參月而病安矣邪祟附着於人似夢非夢而泄亦是氣血不足邪因虛襲理或有之惟宜補養為主外及辟邪丹紫金錠以禁之

固陽丸

黑附子炮炙 川烏頭炮炙 白龍骨壹兩

補骨脂 舶上茴香 川練子各壹兩

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸空心

酒下

鹿茸丸

川牛膝酒浸 鹿茸去毛 五味子各貳

石斛根 棘刺 杜仲去皮 陽起石煨

川巴戟去心 山藥炒 兔絲子酒蒸 附子炮去

川練子取肉 磁石煨 官桂不見 澤瀉各壹

治法藥本卷 夢遺 羊九

沉香半兩

右為末酒糊丸如梧子大每柒拾丸空心酒

服

黃連清心飲

黃連 生地酒洗 歸身酒洗 甘草炙 茯神

遠志 人參 酸棗仁炒 石蓮肉即蓮

水煎服

樗根丸

霧根白皮性涼而 煩酒

右為末酒糊丸或加青黛海石黃柏丸煎

物湯下

蛤粉丸 治虛熱遺滑

黃柏 知母 蛤粉各壹 青黛飛為

右粥丸服

小兒絲子丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦

魚夜夢遺精

石蓮肉兩 兔絲子酒炙 白茯苓 山藥兩

治法藥本卷 夢遺 羊九

右為末山藥糊丸桐子大每服伍拾丸空心

溫酒鹽湯任下如脚無力木瓜湯下

金櫻丸 治精滑夢遺及小便後遺瀝

金櫻子 雞頭實各壹 白蓮花蕊

龍骨各半兩

右為末糊丸桐子大每服捌拾丸空心鹽湯

下

金櫻煎 經霜後以竹夾子摘取於木臼中杵

去刺勿損之擘為兩片去子以水淘洗淨

爛搗于砂鍋中以水煎不得絕火煎約水
耗半取出濾過將汁仍煎似稀飴每服壹

貳匙空心暖酒壹盞調服其功不可殫

戴氏曰遺精有肆有勞心過度心不攝腎以致
失精者有思色慾不遂致精失位輪泄而出者
有色慾太過滑泄不禁者有年壯氣盛久無色
然精氣滿泄者然其狀不一或小便後多出不
可禁者或小便而自出或莖中出而癢痛常
如欲小便者並宜先用辰砂妙香散吞王華白
治津液不養夢遺

子

丸佐以威喜丸或分清飲別以龍骨絲綿裹同
煎或分清飲半貼加五倍牡蠣白朮五味子各
伍分

失精夢遺多有經絡虛熱而得者本事方清心
丸用黃蘗腦子者良

水陸二仙丹芡實粉同金櫻膏相和爲丸每服
柒捌拾丸空心鹽酒下

威喜丸 治丈夫陽虛精氣不固小便白濁餘

淋常流夢寐多驚頻遺泄婦人白帶白濁

並皆治之

黃蠟白茯苓去皮肆兩切塊用猪苓膏

兩同煮貳拾餘沸去猪苓將苓晒乾爲末

溶黃蠟爲丸彈子大每服壹丸空心細嚼

津液嚥下小便滑爲度忌醋

五味膏 北五味子壹斤洗淨水浸壹宿研爛

用以手援去核將核研爛再加水濾去渣

同置砂鍋內入好蜜貳斤炭火慢熬成膏

待數日去火毒再服壹貳茶匙空心白湯

遺精

子

調火候最難適中先將砂鍋秤定斤兩然
後秤五味汁並蜜大約煮貳斤肆兩爲度

遺滑古人治有五法壹用辰砂磁石龍骨之

類是重可去怯鎮神之浮游也 有思想結成

痰飲迷于心竅而然者許學士用猪苓丸是導

痰也 思想傷陰潔古珍珠粉丸用蛤粉黃柏

是降火補陰也 氣血兩虛形羸睡不寧睡熟

即遺丹溪用珍珠粉丸定志丸是補心安神也

思想傷陽者謙甫菴蓉兔絲子等調陽是也

猪苓丸 用半夏壹兩破如豈大猪苓末貳

先將壹半炒半夏色黃不令焦出火毒取

半夏為末糊丸桐子大候乾再以前苓壹

半炒微裂入砂瓶養之空心溫酒鹽湯下

參肆拾丸常服于申未間酒下意謂半夏

燥濕痰猪苓滲濕熱乃濕熱盛于下部滑

白物之治非夢遺法也

泄精珍珠粉丸不應用五倍子壹兩茯苓貳兩

為丸服妙五倍溫脫之功敏于龍骨牡蠣也

治法彙六卷 夢遺

八十一

夢遺屬鬱滯者居大半人多不識誤用溫藥愈

澀愈遺丹溪法用倒倉而安有用神芎丸大下

之而愈者不可不知 飲酒厚味痰火之人多

有此疾腎雖藏精其原出于脾胃中宮濕熱內

鬱所輸皆濁氣邪火擾動水不安靜故遺滑也

治以升柴貳陳湯加黃柏使清升濁降脾氣健

運遺滑自止 其有慾心太熾思想不遂而致

者從心治 房勞無度致腎虛者必兼怯弱等

症方可用補腎藥 治有多端不可一例作腎

虛治也

養正丹 見氣門

安神丸 見內傷門

補心丹 見虛損門

遺精

八十三

疝

全屬肝經濕熱被外寒所鬱氣不得通故痛甚或上攻心下大率先從小腹起或左或右或痛連毛際陰囊必先用辛熱散之稍久可佐以涼藥蟠葱散之類

陰囊及睪丸熱則縱寒則痛濕則腫

痛甚脉必沉伏或弦急

內經曰肝脉大急弦為疝

古方用梔子烏頭作湯甚捷隨証加減無不應

治法彙考卷八疝

八四

驗但濕熱又當分多少而治濕則腫多癰疝是也又有挾虛而發者當以參朮為君疎導藥佐之桃仁山楂枳實川練茴香橘核木香梔子玄胡索丁香之類脉不甚沉緊而豁大無力是也其痛亦輕但重墜牽引耳切不可攻下惟劫藥神効

益濕熱因寒鬱而用梔子以降濕熱烏頭以破滯氣九二物皆下焦之藥而烏頭為梔子之所引其性急速不容胃中停留也又按之痛定者

屬虛須加肉桂以薑汁丸服定痛速効用枳實糖橘核茱萸各炒濕盛者加荔枝核炒為末一本有川練子

又方治食積挾瘀血而成病者

梔子 桃仁 山查 枳實 莫茱萸

右為細末順流水作湯調服

按之不痛者屬虛必用桂枝山梔子炒烏頭伴為末薑汁打糊丸桐子大每服四五十丸却痛効

治法彙考卷八疝

八五

諸疝發時用海石香附二味為末生薑入湯調下亦治心痛因清痰為患者

又方治疝痛用橘核炒桃仁研梔子炒莫茱萸炒

川烏炒 水煎服

小腸氣腎核脹痛

蒼朮 陳皮 川練子各二錢半 甘草五分

紫蘇葉 錢半

水酒各一盞連鬚葱白五莖煎服

天台烏藥散川練子散簡易木香鱉子散皆用

豆炒藥許學士曰大抵此病因虛而得不一
驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實
必先滌去所蓄之邪熱然後補之是以諸藥多
借巴豆氣者此也

定痛却藥神効

川烏頭 梔子炒

搗細順流水入薑汁調服

陰囊腫脹大小便不通

白牽牛所一桑白皮 白木 木通去節

治法彙六卷疝 疝

陳皮各半

右爲末薑湯空心調下

偏墜初起穿山甲茴香二味爲末酒調下乾物
壓之外用牡蠣煨良薑等分爲細末嚼津調塗
大者一邊須更如火熱痛即安

三因燔慈散 治一切寒疝作痛

川芎 歸身 枳殼炒 厚朴炒 官桂

青皮 乾薑 茴香炒 茯苓 川練

麥冬 神曲 三棱炮 莢木 熟地

白芍 木香 人參

右細切每服五錢葱白三根鹽少許水煎空
心服

又方桃仁十四個枸橛子十四個炒山梔子九
枚去皮莫菜莢七十粒山查十四粒並炒生薑
一指大搗細以順流水煎服

又方治癰疔不痛如升斗俗名氣胞用蒼朮神
麴白芷山查川芎梔子半夏南星入薑煎服或
加海藻昆布必酒薄味

治法彙六卷疝 疝

凡疝非斷房事與厚味酒麪不可治

一方治癰疔用香附爲末用酒一盞海藻一錢
煎半盞先撈海藻細嚼即以酒下附末二錢

七疝痛不可忍灸大敦穴在足大拇指聚
毛處去甲一韭葉灸三壯屬厥陰井也

治疝痛神効方痛甚致氣上衝如有築塞心下
欲歎手足冷者硫黃不拘多少火中溶化即投
水中去毒研細蒺藜核炒陳皮右三味爲末
每服四五丸酒下其痛立

若不遇六九不可多也

作聖初起用川山甲茴香二味爲末酒送下

丹溪止痛方

蒼朮 香附鹽水炒 黃柏酒炒以上爲

青皮核去 玄胡索 桃仁 益智仁以上爲

茴香 香附子鹽水炒 甘草炙以上爲

順流水煎服

五葉湯洗疝痛立効

枇杷葉 野紫蘇葉 椒葉 蒼耳葉

治法卷六 疝

水晶葡萄葉

右五味不拘多少煎湯薰洗

一方肥人腫疝作寒熱五苓散加茴香煎服神

効

沉香桂附丸 治中氣虛弱真火不足臟腑積

冷腹脇痛手足厥冷便利無度七疝引

痛喜熱物熨

沉香 附子炮 川芎 乾薑炒 良薑

官桂 萸菜莫 萸菜湯炮七 茴香

方爲末醋糊丸梔子大每服五十九或七十
九空心火飲下

元戎加味五苓散 治疝氣卒痛小便秘塞

本方加川練子共末空心米飲下二錢

茴香練實丸 治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子炒 茴香炒 山茱萸 食茱萸

吳茱萸 青皮 陳皮 羌活醋煮

馬蘭花 各等分

一醋糊丸梔子大每三十九空心溫酒下

治法卷六 疝

濟生葵子湯 治膀胱實熱腹脹小便不通口

乾舌燥膀胱作痛

赤茯苓 猪苓 冬葵子 枳實 瞿麥

木通 黃芩 車前 滑石各半錢

甘草二分

薑三片空心服

丁香練實丸 治男子七疝痛不可忍婦人瘕

聚帶下任脉爲病治法同前

當歸 附子炮 茴香炮 川練子各一兩

右爲細末每末一兩入丁香木香各半分玄

胡索五分全蠍十三箇炒

共爲末與前末同拌勻酒糊丸桐子大每服

三十丸加至百丸空心溫酒下

一捏散 治七疝奔豚痛不可忍神効 見氣門

丹溪曰凡治七疝多用熱藥獲效者卽內經從

治之法須用寒涼鹽制不可純用太熱之劑如

烏頭附子之類今人多服久服必變劇不可治

矣但以二陳湯加枳實橘核梔子山查等藥煎

治法藥本卷八

入生薑汁熱服之有瘀血作痛有一塊隱隱

痛者是本方加玄胡索桃仁泥氣結作痛者本

方加木香茴香練實等藥如六脉沉細手足厥

冷者本方加附子乾薑肉桂之類佐之 如舉

凡痛甚者加荔枝核乳香沒藥爲細末調入本

方藥內煎或另用順流水調服亦可 如木腎

腫大如升斗者本方去甘草加海藻昆布荔枝

核茴香川練實等爲末順流水調服爲丸亦可

經驗馬蘭花丸 治七疝瘰癧氣及婦人陰癰墜

下小兒偏墜無不効者

馬蘭花 醋炒 川練子 橘核 海藻

海帶 昆布 洗 木通 桃仁 去皮尖各

厚朴 薑 枳實 玄胡索 絞肉桂 鹽

救命通心散 治疝痛小便不利

川烏頭 兩 青鹽 一錢 酒 一盞 浸烏頭一宿

川練子 炒 一兩 用巴豆二十個同 茴香 半

石燕 對 土狗 枚 芥子 一錢 六

爲末每三錢入羊石子內濕紙煨香熟半夜

治法藥本卷八

時好酒半升入鹽將石子細嚼下不得作聲

小便大利卽愈

大抵疝痛兼小便難須兼利之昔人曾用五苓

散加連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水盞半空

心服小便去如墨汁卽愈此必多服熱藥而然

丹溪治一人酒後飲水致外腎偏大痛而作蛙

聲用炒枳實一兩茴香二錢鹽炒炒梔子三錢

研煎下保和丸

又一人膀胱氣下墜如蛙鳴真橘子炒十枚

仁二十枚、蘿蔔自然汁研勻點湯下保和丸

管子腫痛亦妙
外寒束內熱陰囊及小腹腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊腫毛間出汗金鈴丸主之

金鈴子肉兩五 茴香炒 馬蘭花炒 兔絲子

海蛤粉 破故紙 海帶各二兩 木香

丁香各一兩

右爲末糊丸桐子大每服二三十丸溫酒或鹽湯下

治法彙本卷

生

抵聖丸 治陰癰腫滿赤痛大便秘欲飲水按

之臍腹痛

續隨子 薏苡仁 郁李仁 茵芋

白丑各等分

共爲末水丸桐子大每服五丸用惲濟方薑

茶湯下

疝痛用紫蘇湯浴下部妙更以摩腰膏摩囊上

橫骨端火溫帛以覆之痛隨止暖隨氣行故也

治見腰

癰腫痛敗精惡血結于陰囊所致用阿魏二

兩醋和蕎麥麵做餅裹煨熟大槓榔二枚鑽孔

溶乳香填滿亦以蕎麥麵裹煨熟入硃砂末一

錢赤芍末一兩糊丸桐子大每服酒下三十丸

空心出范氏得効方綱目

苦楝子導小腸膀胱經熱故疝家最要近有四

治七治諸法俱妙用楝子五兩分五分一分破

故紙二錢炒黃一兩小茴香三錢食鹽半錢炒

一入菜菔子三錢炒一入牽牛三錢炒一入斑

治法彙本卷

九

蟄七枚去頭足炒俱去惟留破故茴香同研爲

末酒糊丸桐子大每空心酒下五十丸

本草綱目一方天門冬五錢烏藥三錢水煎空

心服半月即驗疝氣作痛能除根張白門服之

驗者

夫聖丸所絡之筋未必盡由厥陰而太陰陽明

亦入絡也往往見人偏患于左丸者則痛多腫

少偏于右丸者則痛少腫多此便可驗也

昔人嗜啖橘積成飲癖在右脇下隱隱然不敢

數年已一日山行大勞傷遷延極幸

極動舊積芋復滯氣即時右丸腫大寒熱交作因思脾肺皆主右故積飲滯氣下陷太陰陽明之經筋俱傷其邪從而入於囊中著在墨丸筋膜而為腫脹張戴人有言病分上下治雖是木鬱為疝在下則不可吐亦當從下引而竭之竊念病有不同治可同乎今犯饑勞傷脾脾氣下陷必升舉之則胃氣不復下陷而積可消先服調胃藥一二貼次早存想使至下焦嘔逆而上治法彙本卷下疝

九四

覺肋下積到中焦則吐而出之吐後癰腫減半次早又吐吐後和胃氣疎經絡二三日愈此法治飲酒與水飲注右丸腫者皆効

又治一人飲水患左丸痛灸大敦穴外用烏附麝丁香為末磨其囊上抵橫骨灸溫帛覆之痛即止一伯消

天台烏藥散

天台烏藥 木香 茴香 炒 青皮

良薑 炒 五 檳榔 二 川楝子 十 巴豆 四

右捌味先以巴豆打碎同棟實用麩炒黑去巴豆麩共末每服一錢酒下痛甚炒生薑煑酒下

川練子散

木香 川練子 剉碎用巴豆十四粒如上

茴香 鹽一匙炒 各一兩

共為末空心酒下貳錢

木香楝子散 治小腸偏墜膀胱疝氣久藥不効者

治法彙本卷下疝

七五

脫肛

有寒有熱久瀉脾氣下陷者補以升之○瀉痢後虛脫脈象無力倦怠者八珍十全選用○赤腫作痛大腸風熱生地赤芍槐花槐角升麻腸胃燥澀大便秘結努瀆太過因而脫肛宜涼補以潤之外用收肛散塗之良

熊膽

分五孩兒茶分三冰片分一乳調塗肛上

丹溪治久瀉脫肛參苓白朮散加升柴五味子○用力過多者十全大補湯加升提○大腸虛

治法彙六卷

脫肛

而挾熱硝砂湯槐花散薄荷散○大腸虛而挾寒蛭皮散香荆散○日久不上收腸養血和氣湯澀脫龍骨散瀝腸散

無火症瀉久脾虛舉肛丸加減

舉肛丸

半夏 天南星 枯白礬 各五 鷄冠花 炒

白附子 各五 枳殼 訶子肉 煨 黑附子 各二

蛭皮 二枚 瓜蒌 一枚 桃仁 十五個 燒存性

共為末醋糊丸空心酒下三十丸

香附 荆芥 一方加砂仁

每用三錢食前白湯下

又方

五倍子末 三錢 白礬一塊

水煎洗 ○慈湯洗軟芭蕉葉托上

又方

水賊草燒灰搽肛門輕輕按上或加龍骨

又方

治法彙六卷

脫肛

蔓陀羅花連殼一對橡斗十六個搗碎水

煎三五沸入朴硝熱洗其脫自上

內用槐花槐角子等分炒黃色以羊血蘸藥灸

熟食之以酒送下

蛭皮散

蛭皮 一具 燒 磁石 七次 桂心 三錢

鼈頭 一枚 炙黃

右為末每食前米飲下三錢

收腸養血和氣丸治脫肛日久腸虛大瀉不時

脫

白朮 當歸 白芍 潞川芎 槐角

山藥 蓮肉 人參 龍骨 五倍子

赤石脂

右末米糊丸桐子大米飲下七十丸

龍骨散 治大腸虛肛門脫出

龍骨 訶子 沒石子 栗殼

赤石脂 為末每服一錢米湯下

瀉腸散 治久痢大腸

治法彙六卷 脫肛

訶子 赤石脂 各等

右為末茶調搽腸頭 絹帛揉入

參朮芎歸湯 治瀉痢後及產育氣虛脫肛脉

濡而弦者即補中益氣湯去柴胡加白芍用

芎白茯苓生薑煎服

參朮實脾湯 治久瀉滑肛

白朮 人參 肉果 白茯苓

白芍 陳皮 甘草

水二鍾薑三片棗二枚煎服

經云出為虛入為實肛門之脫非虛而何

老人產育小兒久痢瀉後元氣下陷肛門脫出

悉屬虛大劑參朮芪草加製升麻柴胡

用力過多而脫者十全大補湯外以葱湯洗軟

芭蕉葉托上

如脉弦數大腸有熱而脫者必赤腫涼血祛風

為主涼血清腸散 針灸下屏絲刺灸 連麥炒

氣血虛而挾熱者八珍湯加生地赤芍槐角槐

花黃栝藹雞冠花陳風防風羌活荆芥外用五

治法彙六卷 脫肛

活子朴硝煎湯飲之木賊燒存性入麝少許搽

之腫痛用蝸牛加水片點之熊膽水片亦妙

頭燒灰塗

殺道瘻痛

痒痛多因濕熱生蟲欲成痔瘻宜以雄黃和艾

燒烟薰之並納蠅蜋丸此丸專治肛門痒痛或

出膿血有丘傷有孔竅用蠅蜋七箇五月五日

收去翅足多為末新牛屎半兩肥羊肉一兩炒

令香右共膏丸如蓮子大炙令熟以新綿薄裹

納下部半日少喚飯俟大便中有虫三五度
穀道蟲赤腫或痒或痛用杏仁外臺治下部
蟲杵桃菜一斛蒸之令極熟內小口器中坐定
薰之蟲立死

肛門腫痛用木鼈子肉四五枚研泥沸湯泡洗
另用少許塗患處

診隱陰脫其脉虛小者生緊急者灸

痔瘡虫蟲作痒槐白皮濃煎汁浸之冷再換良
久欲大便當有蟲出

治法彙六卷 脫肛

二百

不眠囊膏各二兩研勻捏如囊形綿裹內

汗

平人無分晝夜不因飲食熱湯自然汗出者為
自汗屬陽氣虛腠理不密心火盛所致謂心熱
則出汗也肥白人宜補中益氣倍參芪朮加白
芍酸以收之汗多則亡陽

陰虛陽必湊故發熱而自汗當歸六黃湯加地
骨皮○陽虛陰必乘發厥而自汗黃芪建中湯
甚者加附子或芪附湯

瘦人脉弦數血虛有火宜補陰降火○火氣炎

治法彙六卷 汗

二百

上胃中之濕亦能作汗可用涼膈散○有氣不
順而自汗不止須理氣使榮衛調和小建中湯

加木香○睡中汗出覺則止如盜然屬陰虛六

黃湯最妙亦有酒客多火人睡中汗多者亦宜

滋陰除濕解熱

平人脉弱虛微細者喜盜汗出也

汗多氣血傷故脉濡弱若

不汗出是逆也故云喜

睡醒時別處無汗獨心口一片時心悸者名心

汗屬心虛多思慮所致宜養心寧神古方補文

煎湯調茯苓一錢服不若補心丹○一方用參當歸二兩續猪心一個帶血剖開入參歸經煮熟去藥吃○脾胃不和又挾外濕身重汗出煩躁羌活勝濕湯主之○兩陰汗屬下焦濕熱龍膽瀉肝湯加風藥風能勝濕也常用當歸龍膏丸及二妙丸殊効外用蜜陀僧研極細加蛤粉撲妙傷暑傷風傷濕濕溫風溫吐瀉俱有汗宜憑脈并兼症

一切內傷虛損自汗不止總用補中益氣湯少治法彙六卷汗

加麻黃根製附子浮麥爲響導其効如影響

但升柴須用蜜炙以制其升發悍悍之性又欲其引參芪至表殊不可缺○脾胃素弱食不運化滯于中宮蒸蒸出汗氣口多弦滑只消導健脾不必止汗

兩寸浮洪而自汗者心火炎也本方倍參芪加五味子黃連各五○兩關脈弦而自汗者挾風邪也本方加桂枝芍藥若不陰虛只用桂枝湯寸關浮洪無力而自汗者只宜本方倍參朮

兩尺洪大無力而自汗者相火挾心火之勢而

剋肺金也當歸六黃湯

當歸六黃湯治盜汗陰虛藥也

黃芪 黃連 黃芩 生地黃 熟地黃

水煎服

麻黃根 桂枝 浮小麥 俱能調和榮衛

又引諸藥至肌表所以能止汗也

牡蠣 白芍 五味子 乃酸以收之之義

治法彙六卷汗

玉屏風散

黃芪兩一 白朮兩二 防風兩一 加浮麥 茯神

牡蠣 麻黃根 按黃芪畏防風得防風

而功愈大蓋相畏而相使也製方之妙如此

一人氣血俱虛身羸大汗以十全大補湯倍參

芪加製過附子一片一服知二服已

獨勝散方專治盜汗用五倍子末津調填滿臍

中以絹縛定加枯礬最効

火氣二炎蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主
氣虛自汗用參芪少佐桂枝陽虛附子亦可凡
痰病亦有汗

滑伯仁治一婦暑月自汗口乾煩躁欲臥泥水
中脉浮而數按之豁然虛散素問曰脉至而從
按之不鼓諸陽皆然乃陰盛格陽得之食生冷
乘涼所致以真武湯冷飲之一進汗止再進疎
去三進全安

東垣曰飲酒中風多汗食即汗出如油久不治

必成消渴白朮散主之

四製白朮散 治盜汗

白朮

四兩黃芪兩一石斛兩一麩皮兩一牡蠣兩一

逐味同炒只用朮爲末每服三錢粟米湯下

丹溪曰仲景桂枝湯治外感風邪自汗藥也

黃芪建中湯治外感挾氣虛自汗藥也戴復菴

法用黃芪建中湯加浮麥及黃芪六一湯或玉

解風散

補中益氣湯治內傷自汗藥也甚者六脉浮濡

而虛本方加製附子以治陽虛其効甚捷
汗出如膠之粘如珠之綴及淋漓如雨揩拭不
速者久即三陽絕汗也

丹溪法用桑樹第二葉焙乾爲末空心米飲調
服最止盜汗

傷寒脉緊麻黃湯發之汗出于榮○傷風脉

緩白朮桂枝和之汗出于衛○往來寒熱眩暈

柴胡連翹和之汗出于少陽○體若燔炭地骨

皮秦艽解之汗出于三焦○厥而挹鬱柴胡麻

黃發之汗出于血○熱鬱于胃大黃芒硝下之

汗出于足陽明○陰毒大汗附子乾薑溫之汗

出于三陽

平人脉虛濡而弱或微細必喜盜汗然虛勞之

病或得于大病後陰氣不復遺熱上留或得之

勞役七情色慾之火衰耗陰精或得之飲食藥

味積成內熱皆有以傷損陰血衰憊形氣陰既

虧不能配陽則易亢內蒸外爲盜汗灼而不

已易生久存乎

宜滋劑者六黃湯宜燥劑者正氣湯無內熱者
 防風散白朮散○肝火當歸龍薈丸○虛者連
 翹黃芪湯實者三黃連翹湯○身熱加地骨皮
 柴胡黃芩秦艽○肝虛加酸棗仁○肝實加龍
 膽草○石尺實人黃蘗知母○煩心黃連生地
 當歸辰砂麥冬○脾虛人參白朮白芍山藥扁
 豆浮麥或山藥一味爲末臨睡酒下三錢
 如服藥汗仍出者有熱牡蠣散無熱小建中湯
 加熟附子一錢不去皮或正元散仍以溫粉撲
 治法藥六卷 汗
 之大汗不止于諸藥中加煅牡蠣二錢半并茸
 疎丹常自汗出經年累月久病及大病新愈汗
 出者亦可用此若不宜熱補須交際其陰陽自
 愈常以靈砂丹主之凡此皆無他病而汗出者
 設非謂有兼病者也若服止汗固表藥不應愈
 歛愈出止當理心血蓋汗乃心之液心無所養
 不能攝血故溢而爲汗宜大補黃芪湯加酸棗
 仁有微熱者兼下石斛兼下靈砂丹
 無汗

陽氣虛則不能爲汗丹溪云盛夏浴食無汗爲
 未質治一人夏月無汗久嗽用半夏紫蘇二味
 爲末入香附末枕流末無酸灰哈仁陷末即神
 以括樓穠桃仁泥半兩爲丸先服三拘湯却服
 此○半身出汗夏月止半身有汗皆氣血不足
 所致天之兆也
 頭汗 雜病食滯中脘熱氣上炎則頭汗
 熱聚于胃上炎則頭汗以三陽會于頭也病後
 產後悉屬陽虛候治必久
 治法藥六卷 汗
 大補黃芪湯
 黃芪蜜防風 山茱萸 當歸 白朮
 肉桂 川芎 炙甘草 五味 人參
 每服水二鍾薑三片棗二枚煎八分
 不拘時溫服
 茸疎丹 見頭痛門 涼膈散 見火門
 三拘湯 見喘門 小建中湯 見腹痛門
 靈砂丹 見喘門 元活勝濕湯 見濕門

瀉肝湯

二妙丸 見痛風門

營歸龍薈丸

并見腸痛門 十全大補湯 見虛損門

桂枝湯

真武湯 并見傷寒門

三黃連翹湯

防風散

防風 五錢 川芎 二錢 人參 一錢一分

右為末每服二錢臨臥米飲調下

正氣湯

黃柏 炙一錢 知母 炒一錢半 甘草 炙五分

水煎服

白朮散

白朮 不拘浮麥一升

右用水煮乾如木尚硬又加水一二升煮軟

取出去麥不用切作片焙乾研為細末每

食白湯下一錢

黃汗

黃汗身腫發出汗沾衣如柏汁古云汗自出所致宜分表裏虛實治身腫脉浮作寒熱關節疼者活勝濕湯仍表之

一法以黃子搗末平旦井水下一匙加至兩匙以知為度每日小便中浸少帛子各日色漸退白則瘥不過五升

脉沉外不熱小便赤黃宜分利解熱

根脉弱無力汗多無火症者依古法黃芪白芍

桂枝作湯服

黃疸日久變為黑疸或不利氣實者急以土瓜根搗汁六合頓服黃水飲小便出愈

諸口淡怔忡耳鳴脚微熱小便白濁又當作虛症治之四君子吞八味丸

古方養榮湯不若八物加養心藥隨症增損妙若誤用涼藥分利水枯面黑成

直無熱症小便白屬虛從虛治

茶癖用白朮 炒 蒼朮 米泔浸 軟石膏 煨二兩

白芍藥 少 片苓 各一 薄荷葉 七錢

膽星 陳皮 各一

右爲末、砂糖水調神麴糊桐子大、每服五六
十丸、砂糖水下、一方用石膏升麻爲末、砂糖
水調服、一方花椒爲末、糊丸桐子、每服十九
茶下、

指迷七氣湯 治大人小兒諸般痞積面色痿

黃肌體羸瘦四肢無力皆緣內有虫積

或食生米或好食糖土或好食茶葉炭

治法彙六卷 黃汗

百十

鹹辣等物者是一服除根

蓬朮 三稜 俱醋 薑香 甘草 官桂

桔梗 青皮 益智子 香附 大黃

檳榔

右咬咀水二鍾煎七分再用水煎一次空心
溫服不得些少飲食不然則藥力不到而虫
積不行服後食頃腹必疼當下如魚凍或長
虫或血蟄至日午虫盡下方用溫粥止之服
退黃丸以除其黃虛者大健脾胃

退黃丸

平胃散 六 綠礬 二

右用醋糊丸桐子大每服六十丸棗湯送下

忌生冷油膩濕麵等物

好吃泥壁黃病亦屬虫

黃泥 砂仁 四兩

右爲末黃連膏丸桐子大每服六十丸蜜心

糖湯下

脈洪大大便利而渴者灰 疸毒入腹喘滿者

治法彙六卷 黃汗

百一

疸 疸病渴者難治不渴易治

黃疸灰症

寸口近掌無脈口鼻冷有黑色起俱不可治

戴復菴諸失血後多面黃然面色紅潤者血榮

之也血去則面見黃色譬之竹木春夏葉綠澤

遇秋黃萎潤與燥之別也宜養榮湯枳歸湯十

全大補湯妨食者四君子加黃芪扁豆各一錢

卽黃芪四君湯加陳皮名異攻散亦有遍身黃

者但不及耳目

病瘧後多黃乃脾受困也理脾為先異攻散加

黃芪扁豆各一錢諸病後黃者皆宜

食勞瘵黃 一名黃肝

大黃疸者暴病也仲景以十八日愈食勞黃

者久病也至有久不愈者用大小溫中丸以

針砂伐肝以木米助脾一方以礬醋之酸瀉

肝瘵肉之甘補脾實人及田家作苦之人宜

之虛人膏梁柔脆者宜佐補劑

次勞疸屬脾腎兩傷補脾滋腎補中益氣或四

治法彙六卷 黃汗

百三

君子六味丸選用

年壯氣實脈來有力者易愈年衰氣弱脈來微

濇者難瘥五十以後酒色過度而得額黑者成

疸疾有宜汗者兼身痛者者是濕熱鬱于表

也桂枝加黃芪湯

初起脈有力九味羌活湯妙

吐法瓜蒂散藜蘆散二陳湯探吐上焦阻塞者

宜之

內熱口乾大便不通宜下梔子大黃湯八黃硝

石湯黃連散

小便短少脈實數宜利小便五苓散元散

除濕熱茵陳五苓散摘鼻瓜蒂散

有宜溫者是脾胃有寒飲不運也茵陳附子乾

薑湯

久病脈弱倦怠宜補養榮湯補中湯小建中湯

理中湯

往來寒熱一身盡痛者小柴胡加梔子

治法彙六卷 黃汗

百三

不眠

及汗下後與癰瘍不得眠屬膽虛人參決
神炒酸棗仁陳皮麥冬龍眼肉爲主有火脉數
口乾加花粉知母玄參炒黃連竹茹心煩用炒
黑梔子

脉數實滑有力而不眠者中有宿滯痰火所謂
胃不和則臥不安也心下硬悶屬宿滯不硬悶
兼惡心口乾者屬痰火宜分別治

婦人肥盛多鬱不眠者宜吐之從鬱結痰火治

治法彙六卷六不眠

百五

大抵膽氣宜靜濁氣若火若痰擾之則不眠

治法曰膽虛不眠用熟酸棗仁爲末竹葉湯調

服膽實多眠用生酸棗仁爲末薑茶湯調下

有寐中覺鬼飛蕩驚悸多魘通夕不得安眠是

肝虛受邪也其人易怒平人臥則竟歸于肝也

肝有邪竟不得歸是以飛揚方用珍珠母龍齒

龍齒安竟 虎睛定竟

溫膽湯 治病後虛煩內有枳實半夏乃痰火

不眠之藥用者宜審

諸水腫脹滿不得臥臥則氣上喘分虛實治
虛勞咳嗽形脫不得臥不可治

戴云不寐有二有病後虛弱及年高陽衰不寐

有痰在膽經神不歸舍亦令不寐虛者六君子

加炒酸棗仁炙黃芪各一錢痰者溫膽湯減竹

茹一半加南星炒酸棗仁各一錢下青靈丹

大抵驚悸健忘怔忡失心風不寐皆是膽涎

沃心以致心氣不足若涼心太過則心火愈

微痰涎愈盛病愈劇健理氣爲急導痰

治法彙六卷六不眠

百五

加石菖蒲末半錢

治法

煩躁

有表有裏有虛有實

表症不得汗內外皆熱則躁亂不寧取汗即定
裏實熱鬱大便不通傷寒雜病心神不安脉數
實有力下之定

大客心胞或酒客膏梁上焦不清亦令煩躁黃
連梔子等涼藥妙

病後年高及素弱人脉虛大或微細心煩不睡
為虛煩補心丹加減或臥生脉散加栝子茯神

治法受六卷煩躁
當歸有火口乾加涼藥
一味花粉炒梔子玄

參竹茹

熱病脉按之不鼓躁亂
臥于泥水中口中

和乃虛陽上攻也即陰
陽極發躁冷服

附子理中湯佳

產後悉屬虛煩有惡露上攻者肚腹必痛脹左

關必大實亦有多食不能運化而煩躁者補養

藥加消導

成無已曰煩為擾亂而煩躁為憤激而躁合而

言之煩躁為熱折而言之煩陽也躁陰

熱之輕躁為熱之重

針經五亂篇口氣亂于心則煩蓋熱客于肺則
煩入于腎則躁大抵心火旺則水虧金燥惟火
獨熾故肺腎合而為煩躁

先賢治煩躁俱作有屬熱者有屬寒者治獨煩
不躁者多屬熱唯悸而煩者為虛寒治獨躁不

煩者多屬寒蓋煩者心中煩為內熱也躁者身
體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲在井中為

外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多
是無根之火故屬寒也

虛煩類傷寒乃虛火煩心作熱脉必右氣口大

而無力左脉平和胸中不痞不飽頭身不痛為
真補中益氣加麥冬吞硃砂安神丸

丹溪治一婦素強健六月發煩悶脉沉細而弱

數時妄語用妙香丸以針三孔涼水下稠痰數

升而愈金匱曰昔肥而今瘦者痰也

溫膽湯治大病後虛煩不得眠有飲者宜之庶

人禁用

金匱酸棗湯治虛勞虛煩不得眠

右九法治熱煩入前五法煩熱怔忡知熱在心
肺也故用竹葉石膏朱砂鎮墜其熱使下行也
第六法煩熱下利知熱在上也故用梔子豉湯
吐之第七法煩而汗出不解知表裏有邪也故
用表裏飲湯第八法脉沉口渴知熱在裏也妙
香丸下之第九法溫膽酸棗治有飲煩而不眠
也心虛則煩

治津液才卷八煩躁

百十六

大法津液去多五內枯燥而煩者八瓊湯加竹
葉酸棗仁麥門冬

榮血不足陽盛陰微而煩者人參生地冬地

骨皮白芍竹茹之屬或人參養榮湯硃砂安神

丸

腎水下竭心火上炎而煩者竹葉石膏湯下滋

腎丸

病後虛煩有飲溫膽湯無飲遠志湯

產後一切瘡疽病後虛煩為血液耗散心神不

守危矣宜猛進獨參湯煩而小便不利五苓

散心中熱而煩清心蓮子飲煩而嘔不

喜食陳皮湯胎前煩燥煩渴名曰子煩

產前煩是心肺虛熱或痰積于胸若三月而煩

者但熱而已若痰飲而煩者吐涎惡食二陳白

朮黃芩枳殼內熱者竹葉湯竹茹湯益母丸

氣鬱者紫蘇飲或分氣飲加川芎脾胃虛弱

者六君子加紫蘇山梔

產後煩去血過多虛火泛上而煩與大病後

治津液才卷八煩躁

百十九

同大劑人參當歸散加童便妙古方謂惡露攻

心而煩者用羊血一盞頓服不若芎歸湯加童

便薑汁為佳虛甚加參

經曰諸躁擾狂越皆屬于火又曰陰盛發躁名

曰陰躁欲坐井中惟宜熱藥治之成無已曰雖

躁欲坐井中但飲水不得入口是也東垣曰陰

躁之極口中和舌不燥欲坐臥泥水井中陽已

先亡腎精不悞誤指為熱重以涼劑治也無疑

急煎雷虛散服中湯救之冷服即定

卷八

婦人

三錫曰：婦人性多偏執，陰險以故，病百倍于男。子且難治，大都與男子同，惟經血帶下，胎產乳鬱，差異，今採輯諸名家條分如左。

經水

月經古人命名，月水以月盈則缺，血海盈則下，理可見矣。然陰陽和平則應時，氣血華矣則改度，故曰：血者氣之配，隨氣而行，先期而行者，氣之熱也，法當清之；四物加炒岑連梔子生地，牡

治法卷七

經水

二

丹皮、香附之類，後期而行者，血不足也，法當補之。八珍之類，將行而痛者，氣之滯也，當疎氣和血。芎歸、益母、香附、玄胡索、五靈脂、青陳皮、烏藥、蓬朮、肉桂、炮薑之類，來後作痛者，氣血俱虛也，色淡亦屬虛。八珍四物選用，錯經妄行者，氣之亂也，宜調其氣。紫者氣之熱也，黑為熱之甚，宜涼血和氣。四物加香附、赤芍、柴胡、炒岑連之類，大抵經水將畢，或正行之際，真氣方虧，切忌破氣剋伐，雖有他証，從輕而治乃可。如胃寒、痛表

邪補中湯加表藥

肥盛婦，痰多，經水不調，須兼燥濕化痰。二陳海石、二朮、芎歸、香附等作丸藥。

瘦弱人，身體熱，或潮熱，經水或前或後，且多屬血熱。四物生地、牡丹皮、黃芩、梔子、香附及四製香附丸。

將行作痛，抑氣丸効。四物加玄胡、牡丹皮、陳皮、香附，有火加條岑，作丸服。經後作痛，為虛熱，四物加白朮、炒黃柏、香附。

治法卷二

經水

二

交加地黃丸

生地 老薑 各一斤 玄胡索 當歸 川芎

芍藥 各二兩 沒藥 兩一 木香 兩一 桃仁 去皮 人參

各兩 香附 兩八

右為末，先以生薑汁浸地黃，查以地黃汁浸

生薑，查晒乾，皆以汁盡為度，共十一味，作

一處，晒乾研為末，醋糊丸，空心

薑湯下

大抵經病，肝脾血燥，四物為主，肝脾血虛，補中

益氣為主肝脾鬱結歸脾湯為主肝經怒火加味逍遙散為主

脾虛有脾胃受虧面色痿黃四肢怠墮右寸關脉弦滑無力是食少不能生化氣血血不盈氣閉宜補中益氣開胃進食脾胃和而飲食進久之經自行矣

軀脂滿閉脉沉伏惡心食少肉多色白人屬痰多占住血海所生之血亦少宜化痰燥脾升柴二木二陳導痰越鞠各加芎歸選用不可用地

治法彙七卷經水

三

黃

鬱悒脉弦數身潮熱作痛兩脇脹屬鬱悒肝燥宜平肝氣養肝血是肝燥而不行也四物加香附栢子仁知母青皮之類

不肥不瘦兩手俱細弱身熱倦怠屬氣血兩虛八珍湯主之

胃火胃中伏火消穀善饑形體漸瘦脉數疾屬胃燥不能生血宜瀉火養胃養生血潤燥即東垣二論之一是中焦源竭也

勞心有勞心太過心血耗散火動于中心煩驚悸月事不來宜安心補血降火栢子養心丸或補心丹四物加麥冬栢子仁之類

內經曰月事不來者胞脉閉也胞脉者屬于心而絡于胞中有所勞心心火亢盛心氣不得下通故經閉宜先服降火之藥次服五補丸及衛生湯治脾養血并屬上焦

陰虛火盛脉弦數空心服六味地黃丸妙甚

大便秘結小便雖清不利而經水閉絕不行右

治法彙七卷經水

四

尺脉洪數乃下焦血海乾枯宜調血潤燥瀉胞絡中火邪經自行矣四物紅花桃仁泥二門知母黃栢牛膝作湯日一服屬下焦

月水閉而飲食形容如故或惡心阻隔兩人有力是胎即方書所謂有病無邪脉此孕非病所以不月是也

血枯經閉多身熱身痛脉必澁數肌膚乾燥不澤內無嘔脹四物加桃仁紅花脉弦細陰虛經脉不通小便短澁四物加芎歸陳皮甘草

作湯又用蒼莎丸加蒼耳酒芍藥爲丸就煎煎藥吞下

行經之際浣濯入冷或食冷物熱血得寒凝滯血海中每行經時腹痛不可忍宜芎歸玄胡索五靈脂蓬朮香附炮薑肉桂逐去惡紫血爲佳悲哭思想太甚月水不來宜舒鬱益氣補中益氣湯加青皮貝母香附

大病後經閉屬虛宜補脾養血元氣復自通小腹有塊作痛時白物下經水不通是血瘕宜逐瘀流氣

逐瘀流氣

丹溪方治過期不行杜牛膝搗汁大半碗入玄胡末一錢香附枳殼末各半錢空心湯調下必腰腹痛方是汚血

汚血在血海必痛且有形實者可通虛者慎之多鬱悶人心下脹懣不食經事不調身痛潮熱漸變骨蒸不食忽寒忽熱耳下結核癰癰馬刀形容枯槁脉弦數或細數瀯或沉結久之變成瘰益氣養榮湯神妙方出立齋心法多服自效

乃屢驗者馬刀小兒也圖者爲癰癰長者爲馬刀皆少陽經鬱結所致久成瘰癧

經水過期瘦人責之血少四物加紅花益母子肥人過期責于氣虛有痰六君子加芎歸

過期紫色有塊血熱也四物加牡丹皮炒黃連香附

脉數而弦細倦怠日漸羸弱潮熱月水不通屬陰虛血少陽火旺火逼水涸當養血益陰慎勿以毒藥通之栢子仁丸澤蘭湯妙

栢子仁研炒牛膝酒洗卷栢各半澤蘭葉

澤蘭湯

續斷各二兩熟地用生者三兩忌鐵酒蒸搗膏

右爲末入地黃膏加蜜丸桐子大每服三十

丸空心米飲下

澤蘭湯 治同前

澤蘭三兩當歸酒洗芍藥各一兩甘草五錢

右爲粗末每服五錢水二鍾煎至一鍾去查

溫服

逍遙散用歸芍白朮白茯苓甘草柴胡乃清肝和血之劑婦人肝經血分中有風有火妙品口燥

咽乾發熱盜汗食少皮膚搔痒小便澀滯悉皆治之加丹皮梔子更佳

四物湯 月事不調此方為主而變通之

當歸酒洗白芍酒炒川芎 熟地

吳崑醫方考曰無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女女以坤道用事故治婦人者以陰為主方其二七天癸至月事以時下者女得坤之陰陰中必有陽故以七為紀一七而齒二七而天癸至也人受天地之氣以生故能治津藥七卷經水

七

克肖天地月天之陰也以月而盈以月而虧故女子之血亦以三十日而一下也血之下也同于月故曰月事經曰月事以時下故能有子是以月事不調宜此方為主治隨其寒熱虛實而斟酌加減使月事調勻則陰陽和而萬物生有子之道也是方也當歸芍藥地黃皆味厚之品味厚為陰中之陰故能益血析而論之當歸辛溫能活血芍藥酸寒能斂血熟地甘濡能補血又曰當歸入心脾芍藥入肝熟地入腎乃川芎

者輒上輒下而行血中之氣者也此四物湯所以為婦人調經之要藥

脈數血色紫黑為血熱本方加炒岑連 脈遲腹痛血凝滯為寒加肉桂炮薑重者加附子體厚有痰加導痰湯減地黃 瘦黑有火加炒山梔黃柏知母牡丹皮有悒鬱者加香附蒼朮砂仁神曲 有留滯者加桃仁紅花玄胡索肉桂 氣虛者參耆來少色淡 氣實者加青皮枳朮來澁而痛然亦有不宣者又不可拘泥氣治法藥七卷經水

八

息機微脈弱汗多者忌川芎恐其辛散也大便秘泄忌當歸恐其濡滑益增下注也脈遲腹痛不宜芍藥恐其酸寒益增中冷也病後新產更忌腦膈痞塞不宜地黃恐其粘膩益增泥滯也明者解之昧者誤矣

五補丸 補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟地 人參 牛膝酒洗 白茯苓 地骨皮

各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒

下

衛生湯

當歸

白芍

各二兩

黃耆

三兩

甘草

一兩

右爲粗末每服五錢水二盞半煎一盞空心

服氣虛倦怠加人參一兩

血枯經閉指血少腸胃枯燥者而言故東垣分

三焦治悉以瀉火補血爲王上焦得之勞心治

以三和謂四物涼膈當歸湯是也

以消穀善饑屬胃燥治主中焦用調胃承氣湯

治法彙七卷

經水

九

以瀉胃火

二便秘塞爲下焦四物合承氣名玉燭散後服

五補衛生湯使陽旺生陰也

萬病丸 治經事不來繞臍痛汚血爲患

乾漆

燒烟

牛膝

去鹽酒浸一兩

石爲末

以生地汁一升入二味藥末砂鍋內

熬慢火可丸卽丸桐子大每服十九空心

米飲下

一方用當歸四錢乾漆三錢炒煙盡共爲末煉

蜜丸桐子大每服空心酒下十五丸

又方當歸玄胡索各錢半水煎服

一方血塊痛馬鞭草根苗五斤熬膏空心溫酒

下半匙卽杜牛膝

血極膏 治婦人乾血氣血塊有熱脉弦數川

大黃爲末醋熬成膏丸鷄豆大每服一九酒

化下臨卧溫服大便利一二行紅脉自下

汚血有寒經閉腰腹痛脉沉伏紅花當歸散

紅花

歸尾

紫威

卽凌霄花

牛膝

甘草

治法彙七卷

經水

十

蘇木

細判各二兩

白芷

半兩

赤芍

八兩

劉寄奴

五兩

桂心

兩

右爲細末空心熱酒下三錢痛甚不下紅花

入煎酒下

牛膝散 臨行不利腹痛

牛膝

桂心

赤芍

桃仁

玄胡索

當歸

川芎

木香

牡丹皮

各七錢半

右爲末每服方寸匕空心溫酒下

通經丸

治婦人室女月事不通腹痛血瘕

桂心 青皮 大黃炮 乾薑 川椒

川烏 乾漆 當歸 桃仁 蓬莪朮各分

右爲末先將四錢用米醋熬成膏和餘六錢

杵勻丸桐子大每服二十九淡醋湯下加

至三十九溫酒亦可

痞嘔氣閉作脹氣實脉弦實薑製厚朴一味煎

湯空心服妙

食與痰填塞太陰經閉作痛先以二陳湯探吐

後隨症治

治法彙七卷經水

益母草專一行血熬膏酒調服逐汚血并產後

惡露有妨其子則行中有補養榮調經丸中加

而用之

室女經不行雄鼠屎一兩燒灰爲末空心酒調

下一錢效

掌中金丸 血凝經閉下取法

川山甲炮 甘草 苦丁香 苦葶藶

白附子 川椒 猪牙皂角 草烏頭各分

錢巴豆錢一

右爲細末生葱絞汁和丸彈子大綿包一丸

內陰中一日卽白二日卽赤三日卽經神

效

婦人浮腫先因經水斷絕後因四肢浮腫小便

不通血化爲水是名水分椒仁丸主之必脉沉

實有力乃可

椒仁 甘遂 續隨子去皮 五靈脂研

附子炮 當歸 郁李仁 黑牽牛

蛭青十枚去土炒足同 班猫十個同

治法彙七卷經水

膽礬 人言錢一

右爲末麴糊丸豌豆大每服一丸橘皮湯下

此方藥雖峻利所用不多若畏而不服是

養病害身也嘗治虛人亦不見其悞

先因小便不通後至身面浮腫經水不通水化

爲血名曰血分葶藶丸主之

葶藶炒 續隨子去殼 乾葶藶

共爲末棗肉丸桐子大每服七十九煎匾竹

湯下以利爲度

人參丸 治經脉不利化爲水流走四肢悉皆腫懣名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此

人參 當歸 大黃 酒洗去鹹上蒸桂心

瞿麥 赤茯苓 白茯苓 各五錢 葶藶 炒研

右爲末煉蜜丸桐子大每服十五丸至二十

二三丸止空心米飲下

四製香附丸 治經候不調兼鬱結諸

症

治法彙七卷 經水

十三

大香附子一斤鹽水童便酒醋各浸四兩

春三夏一冬七秋五日微焙爲末醋煮麪

糊丸桐子大每酒下七十丸 瘦人加澤

蘭葉赤茯苓各二兩 氣虛脾胃不和加

四君子料 血虛腸胃乾燥夜熱羸瘦加

四物湯

寇宗奭曰夫人之生以氣血爲本人之病未有

不先傷其氣血者世有童男室女積想在心思

慮過度多致勞損男子則神色先散女人則月

水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則

血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也火

既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金

氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不

暢故多怒髮焦筋骨痠候五臟傳變故卒不

能死者然終死矣此一種勞最難治蓋病起于

五臟之中藥力不可及也若能改易心志用藥

扶接或得九死一生耳

薛立齋曰月水之爲物乃手太陽手少陰二經

治法彙七卷 經水

十四

主之二經相爲表裏在上爲乳汁在下爲月水

爲經絡之餘氣苟外無六淫所侵內無七情所

傷脾胃之氣壯衝任之氣盛故爲月水適時而

至若夫鬱結傷中心脾受虧故面色痿黃四肢

消瘦發熱口乾月水過期且少乃陰血不足也

非有餘瘀閉之症宜養氣血調理脾胃徐而培

之則經氣盛而經水應時矣

婦人良方曰婦人病自古未有言者惟倉公

傳與褚澄啓而論及其言曰孟子謂無夫曰寡

師尼寡居之婦，獨陰無陽，欲男子而不可得，是以鬱悒而成病也。

易曰：天地氤氲，萬物化醇；男女媾精，萬物化生。孤陽獨陰，可乎？夫既處閨門，慾心萌而不遂，致陰陽交爭，乍寒乍熱，有類瘧疾，久則為勞，又有經閉白淫、痰逆頭風、膈氣痞悶、面黧瘦瘠等症，皆寡婦之病也。肝脉弦出寸口，而上魚際，究其脉，原其疾，皆氣滯血鬱而得。經曰：男子精盛而思室，女子血盛以懷胎。

治法彙七卷

十五

補中益氣湯

六味地黃丸

補心丹

八物湯

六君子湯

益氣養榮湯

血崩

三錫曰：經水妄行如山之崩，勢不可遏，有因于氣者，有血熱妄行者，有濕熱相搏者，有汚血阻礙不得歸經而下者，有脾胃氣虛下陷者，宜分而治之。

丹溪曰：婦人崩中，由臟腑傷損，衝任二脉血氣俱虛，乃爾。二脉為經脉之海，血氣之行，外循經絡，內榮臟腑。若氣血調適，經下依時，若勞動過極，臟腑俱傷，衝任虛不能約制其血，故忽然而

治法彙七卷

十六

下謂之崩中，暴下治宜大補氣血，補養脾胃，微

加鎮墜心火之藥，補陰瀉陽，經自止矣。

勢盛者以諸灰遏之。

氣盛用調氣灰，氣盛左脉弦急而數，腹脹下多，

因于氣也。肝火迫血妄行，香附醋炒極黑，或夏

枯草燒灰二錢，空心米飲下。

荆芥用麻油點燈，多着燈草，就燈燒荆芥為末，

童便下三錢。

血熱者涼血灰，脉數身熱，口乾面赤，血熱妄行。

槐花蛾或花燒灰爲末酒下三錢

汚血用消血灰有塊作痛崩不可遏五靈脂炒
令煙盡爲末每服一錢溫酒下一法用水酒童
便各半盞煎服名抽刀散

血寒用炮薑灰服涼藥過多抑遏陽氣于血海
諸藥不應燒乾薑灰童便下二錢或桂心燒灰
一錢亦可方書用治寒崩非治寒取其散結從
治耳

滑脫用澁灰色慾過度衝任傷損亦令淋瀝不
止八物湯主之

治法彙七卷

血崩

久崩不止棕櫚燒爲灰白礬煨爲末酒下二錢
肝脉弦急多慾是肝實而不納血也小柴胡加
山梔芍藥丹皮和之脉弦數是肝火迫血四物
加柴胡山梔岑木

脾家鬱結而不能統血脉必沉弦先須舒鬱香
附芎歸之類後用歸脾加山梔柴胡丹皮

急則治其標白芷湯調有草霜甚者棕櫚灰後
用四物加炒乾薑調理因勞者用人參帶升補

藥因熱者用黃芩因寒者炒乾薑
性急多怒人崩不止或耳前後脹痛逍遙散加
減

食少或吐或瀉或嘔酸是脾胃弱或服寒涼所
致六君子補中益氣歸脾湯選

濁氣盛鬱遏久卽成濕熱迫血妄行故古方用
荆芥灰及諸風藥以風能勝濕也體肥宜之瘦
人只是火盛

右寸關弦滑膈間脹悶惡心不食經水多且痛
治法彙七卷

血崩

大

是痰結胸膈清氣不升下降迫血也宜開痰升
清降濁升柴二朮二陳湯

丹溪曰澁鬱胸中清氣不升故經脉阻遏而降
下非開澁不足以行氣非氣升則血不能歸隧
道此論血泄之意甚明蓋開胸膈間濁澁則清
氣升清氣升則血歸隧道不崩矣故其症或腹
滿如孕或臍腹痛或血成片或血出則快止
則悶或臍上動其治法宜開結痰行滯氣消汚
血升清氣中和調經用茶調散吐之亦是此義

不若以二陳加撫芎香附枳殼等以漸調理爲佳如惡心甚用探吐吐定服藥

東垣益胃升陽湯升陽除濕湯柴胡調經湯俱屬升舉風藥爲脾胃下陷濕熱盛于下焦者設也

紫血成塊湧下血熱四物加黃連柴胡之類以清之

下如屋漏水臍下痛綿綿不止一屬汚血一屬

濕熱色白肉多人濕熱夾痰者多黑瘦人脉數

治法彙七卷血崩

十

兼身熱血虛有帶濕痰宜升散血滯宜和血消

汚

東垣曰經水不止有三婦人脾胃虛損清氣下

陷于膀胱與相火相合濕熱相迫經漏不止右

尺脉沉細而數或沉弦洪大有力寸關亦然其

血紫黑如夏月腐肉之臭中央赤白帶必腰痛

臍下痛臨經欲行先發寒熱往來兩脇急縮或

兼脾胃証四肢困熱心煩熱不得眠心下急宜

大補脾胃升降氣血益胃升陽湯若誤服寒涼

胃氣復損則血無所羈而欲其止不亦難乎
抵脾胃虛損不能攝血調補脾胃爲主

脾胃虛弱食少不化右尺虛大無力時作惡心

六君子加芎歸柴胡或四肢怠墮兼內傷元氣

症者補中益氣加酒炒白芍內有火加山梔或

故貴脫勢始富後貧命曰脫營心氣不足其火

猶熾于血脉之中以致脾胃飲食失節形體肌

肉容顏似不病者此心病不形于診至于飲食

不節則病見矣而經不時下或適來適斷暴下

治法彙七卷血崩

二十

不止治當先說惡候之言勸戒使其懼然而心

不動以大補血氣之藥補養脾胃微加鎮墜心

火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣東垣有說

而無方擬用補中益氣加麥蘖麩炒黃柏知母

香附煎服或吞安神丸

悲哀太甚則胞絡絕陽氣內動發則心下崩擬

四物合生脉加香附立齋法用四君子加升柴

山梔

崩且水瀉是前後二陰之氣下脫也參苓耆朮

山藥扁豆佐升柴大升大補為佳

病者自覺臍下寒如水而復喜暖脉雖洪紫無

力或沉伏悉是濁氣鬱衝任所致下污水色如

屋漏或多白帶以升散開結平肝為要必兼辛

散平以辛涼純寒純熱藥俱不可用蒼朮香附

撫芎炒黃柏半夏青陳皮白芷柴胡肉桂炮薑

之類

脉洪數五心煩熱暴崩是血熱妄行四物合解

毒勢盛者涼血地黃湯

治法彙七卷血崩

丹溪曰凡下血症日久多以胃藥收功以脾胃

為生化之源也四君平補中益氣選用大失血

後母以脉診煎獨參湯救之

涼血地黃湯 治暴崩脉數是腎陰虛不能制

胞胎相火火迫血走藥血兼散即丹溪所謂

火盛者不可驟用寒涼必兼辛散之義

生地黃連黃柏黃芩 羌活

柴胡 知母 升麻 枳殼 防風

藁本 紅花 歸身 甘草 細辛

荆芥穗 蔓荊子

白水煎空心服

暴崩不止用黃芩不拘多少為細末每服一錢

燒秤錘通紅投酒中少時取出錘調下

琥珀散 治暴崩下血

赤芍 香附 枯荷葉 男子髮

當歸 檳榔 存性烏紗帽 皂角水

右等分除檳榔外餘俱新瓦上煨成黑灰存

性細末每服五錢空心童便下

治法彙七卷血崩

一方髮灰一味童便調止諸血皆妙

一方蓮蓬一味燒灰酒下二錢

栢黃散

黃芩 一錢側栢葉 蒲黃 伏龍肝

水煎分二次服

又方 桑沙 伏龍肝 阿膠

右為末溫酒調下空心二三錢以知為度

按伏龍肝乃燥濕之劑性能止血有加赤石脂

者乃澁可去脫之義

通達亦澁一味燒灰細末米飲下

牡礪散 治月水不止眾藥不應者牡礪火煨

研細和醋為丸再煨紅候冷研細出火毒以

醋調艾末熬成膏丸桐子大每服五十九調

醋艾湯下

小煎湯 治崩不止色明如水得溫則煩悶者

此陽傷于陰令人下血當補其陰脉數疾小

者順大者逆

治法彙七卷血崩

小煎莖葉 研取汁 生地 汁一 白朮 半兩

右三件入水三盞煎至一半去查溫服

又方

大小煎根 白茅根 兩

右三味切細用酒五碗煮四碗分四服

血熱勢盛以三補丸加香附龜板金毛狗脊作

丸服

因心氣不足其氣下陷于膀胱衝任之分鬱成

濕熱血崩不止兼白帶污水臍下如水當從治

以散其結前升提不應用丁香膠艾湯

川芎 歸身 艾葉 阿膠 白芍

熟地 丁香

右為細末作一服水二鍾煎至五沸去渣入

膠艾再煎至一大盞空心服

一方

熟艾 如雞 阿膠 半 乾薑 一

水五盞先煎艾薑至二盞入膠溶化空心服

益智子炒為細末入鹽少許米飲調下皆辛散

治法彙七卷血崩

之義

如聖散 治血崩

棕櫚 烏梅 各一 乾薑 一兩 五錢并

右為細末每服二錢烏梅酒下空心妙久病

不過三服

血見黑即止以黑為水化火迫其血令水化制

之故止血諸藥燒灰悉是此意

香礬散 治崩神效帶下亦效

醋浸香附一宿炒極黑為灰仔性每兩入

白礬末二錢米飲下空心止血用荷葉

獨行散 治腹痛下血不止用五靈脂半斤

炒為末童便下二錢林治惡露不淨血暈

益胃升陽湯 血脫益氣先賢之與旨也人之

一身穀氣為寶故先理胃氣以助生長之令

胃氣一升經自止

黃耆二錢人參之嗽去神麴半炒錢升麻 柴胡

各五白朮三錢當歸酒浸甘草炙陳皮

各一生黃芩二錢

治法彙七卷 血崩 三十五

白水煎食遠服腹痛加白芍二分桂少許口

渴加乾葛三分先服此數服胃氣雖回而

血不止用柴胡調經湯大升大舉

柴胡調經湯 治經水不止其中多滑白之物

項筋強腦痛脊骨強痛不思飲食

羌活 獨活 藁本 升麻各五分蒼朮一錢

葛根 歸身 甘草各三分柴胡根七分

紅花少許

水煎熱服得微汗立止濕熱與火鬱于下涼

刺不效者宜此即火鬱發之之義

內減葛根加黃耆蔓荊子名調經升陽除濕湯

治脾氣下陷濕熱盛迫血妄行不止止後大補

獨聖散 治風去蘆一味為末酒煮白麴清湯下

二錢風能勝濕也

立止治家風有風熱而血不止用此

氣血兩虛汚血夾痰為患淋瀝不止及老婦宜

益氣養新血去汚血化痰開結八珍二陳加青

皮香附縮砂玄胡加荷葉側柏葉煎服

治法彙二卷 血崩 三十五

白礬丸 久崩不止澁劑

白礬四兩香附二兩黃狗頭骨燒灰

共末粥丸桐子大每服三十九空心白湯下

脈洪數而血不止是肝火盛也條芩一味炒為

丸以兼症之藥送下

諸法俱古人因病制宜用之合宜無不效第一

止之後須消息之當補則補當調則調務中肯

藥氣血母消虛實寒熱法不可謬

婦人五十後經不止作敗血論用茜根即染紅

者阿膠側柏葉炙黃芩各五錢生地一兩小兒
胎髮燒灰分作六貼每服水盞半煎七分入髮
灰服

書中理經驗方

治法彙七卷

五

帶下

二錫曰婦人多氣陷下抑遏或濕熱盛于下焦
從帶脉而下故名赤者血受病白者氣受病
丹溪曰帶下乃胃中濕痰滲入膀胱爲患宜燥
中宮之濕升柴二朮二陳湯最妙帶下小腹
作痛是鬱結痰與濁氣也須兼辛散茴香炮薑
之類不痛兼辛涼炒黃柏之類須斷厚味酒麪
煎炒

甚者宜吐以提其氣

治法彙七卷

五

肥人多濕痰導痰湯加二朮炒黃柏青黛川芎
久而氣虛倦怠氣口脉虛大加參瘦人多是熱
炒柏蛤粉滑石川芎青黛樗皮黃耆夜熱脉數
加四物養血

羅先生生法或用十棗湯或神佑丸或玉燭散皆
可用之實者乃可虛者不可峻攻

濕盛者固腸丸相火動或洪大面赤口乾心
煩藥中加炒黃柏滑者加龍骨赤石脂氣滯
者加葵花赤用赤白用白性躁加黃蓮寒

月加薑附為響導、黃荊子炒為末酒調下二錢、又治心痛、

帶下與男子精滑大同小異、

痰結白帶、心下悶、脈滑者、小胃丹半錢、半飽、津

液下數九、候積去再補、

白帶用二朮、白葵、白芍、為丸、空心二陳湯下、二

十九、

古方用椒目為末、空心米飲下一錢、治帶亦辛

散結也、

治法彙編卷下

檮皮丸 治赤白帶有濕熱者

芍藥錢五 良薑錢三 黃柏 椿樹皮兩半

右為末、粥丸、粟米大、每服三十九、空心米飲

下

一方

椿根皮兩二 神麴 麥皮麴 黃柏各一兩

芍藥兩半 滑石兩半 枳殼兩半 蒼朮

右為末、糊丸、桐子大、每服五十九、空心白湯

下

固腸丸 見病門

久帶不愈、三葉酸漿草陰乾為末、空心溫酒下

三錢、七葉細如萍、叢生莖端有三葉、俗名布谷

飯、鳩常食之、故名、布地而生、花開黃味酸

帶臨月經甚多、食少倦怠、面黃、經中如有血塊

者、有如筋膜者、宜參朮等大補脾、俟胃氣復

授、檮皮丸、

苦練丸二帶均治

苦練子碎酒浸 茴香 當歸各等分

治法彙編卷下

右為末、酒糊丸、每服五十九、空心溫酒下、如

腰腿痛、四物加羌活、防風、煎湯下、

伏龍肝散 治婦人帶下、久不愈、形瘁黃、

棕櫚燒存性 伏龍肝 梁上塵即吊劍灰、燒煙出火毒各

分等

右研末、和入龍腦麝香各少許、每服二錢、酒

調醋亦可、有久崩不癒、脈濡微、用此頓愈、

補陽固真湯 先崩後帶、兩尺極微、東垣謂血

少、即亡其陽、故滑白之物下流不上、是下焦

血海將枯、津液復亡、周身筋骨失養、痛不可當、宜益津液、以潤燥、補氣以壯陽、瀉火以肅

肺、
郁李仁二錢去 人參 白葵花 乾薑二錢

生黃芩一錢 柴胡 炙甘草一錢 橘皮去

除黃芩外、水二鍾、煎一鍾、再入黃芩煎八分

空心宿食消盡、服少時、以早飯壓之、愚按

此方以人參炙甘草益氣、乾薑散結、葵花

燥濕、郁李潤燥、黃芩瀉火、柴胡引清氣上

升、然既云血枯、非當歸麥冬不能潤血、枯

火必盛、乾薑分兩宜減半、用為嚮導、乃可

酒煮當歸丸 治癰疽、白帶下注、脚氣腰以下

如在水雪中、綿覆火烘、猶冷、面白如枯魚肌

如刀削、小便與白帶長流、而不禁、面白目青

曉曉無所見、身重如山、行步欹側、腿細膝枯

大便秘結、口不能言、無力之極、食少心下痞

心煩懊懣、嘔噦是上中下、真陽俱竭、脉沉紫

而澁、按之空虚、不鼓、宜大補大溫、

當歸一兩 茴香半兩 黑附子七錢 良薑七錢

右四味以好酒升半、煮至酒盡、為度、炭火焙

乾、同為極細末、入

炒黃鹽 丁香各半 全蝎三錢 柴胡二錢 升麻

木香各一錢 苦練子 甘草 玄胡索四錢

合前四味、共為末、酒糊為丸、桐子大、每服二

十九、空心宿食消盡、淡醋湯送下、忌油膩

肉、麪生冷酒、

治法、藥七卷、帶下、

當歸附子湯 治寒痛、臍下赤白帶下、

柴胡七錢 良薑 乾薑 附子各一錢 升麻五錢

當歸二錢 蝎稍分 炒黃鹽三分 炒黃柏少許

甘草六分

水煎服丸亦可

必用炒黃鹽、無不效、蓋寒痼之要藥也、

固真丸 濕熱盛于下焦、勢升散不盡、用此從

治、亦澁可去脫法也、

白赤脂各一錢 乾薑四錢 當歸三錢

黃柏可三錢柴胡錢一白龍骨煮水煎

白芍分五

右爲末酒糊丸鷄子大每服三十九空心
宿食消盡白湯下卽以早飯壓之無令停
滯忌口同上

已上諸方用附子炮薑面香以辛能散結也用
石脂白礬龍骨者澁可去脫也

婦人帶下多起于氣鬱非辛不開鬱久卽成
熱故又佐以黃柏皆有至理妙不可殫輕者只

治法彙七卷

手三

宜升舉正治重者須用奇法不可執一

坐藥龍塩膏

丁香錢一全蝎分五木香錢一良薑錢一玄胡索錢五

川烏頭錢半炒黃塩錢一枯礬錢半歸粉

龍骨錢一茴香錢二厚朴錢一紅豆錢一肉桂

酒防已錢一木通錢一

右爲末煉蜜丸彈子大綿裹雷係在陰外內

陰中

臍下寒痛如水用下薰藥

三奈子各二錢川烏分三大椒各五柴胡錢一

白礬分三全蝎個三升麻分二麝香

大蒜破故紙與蒜同焙各一錢

如上火

回陽丹勢盛者用此

全蝎錢一升麻分三草烏錢一水蛭錢一蜚蠊

破故紙錢一三奈錢一草撥錢一甘松錢一

羌活錢一枯礬錢一炒黃塩錢一

治法彙七卷

右爲末如上法三日內覺臍下暖爲效

有孕白帶

丹溪方用

蒼朮錢一黃白錢一白芷錢一白芍錢一

黃連錢一樗皮錢一黃芩錢一山茱萸錢一

糊丸空心酒下五十丸

戴人玉燭散

四物加砒硝大黃甘草薑三片煎服

十棗湯見痰門神祐丸見瀉門

胎前

三錫曰孕一月名始膏二月名始胎三月名始胎當胎膏之始真氣方遇如桃花凝聚其柔脆易壞也食必忌辛辣恐散其凝結味必稍甘美欲扶其柔脆二氣既凝如泥在釣如金在鎔惟陶治之所成故食氣于母所以養其形食味于母所以養其精形精為滋育氣味為本故天之五氣地之五味母食之而子又食之外則充乎形質內則滋乎胎氣母寒亦寒母熱亦熱母饑亦饑母飽亦飽皆因虛而感隨感而變胎教之說信不可忽膏粱之家縱恣口腹暴怒淫慾飲食七情之火鍾之于內胎氣受之怯者即變諸病壯者毒不即發而痘疹瘡驚遺禍于後呼神籲天咎將誰執故孕婦以脾胃氣血為要如或飲食不節七情內傷脾胃受虧血無助而生諸病隨其所苦以法治之務底于平如護嬰兒三步一回頭中病即止慎無過治今採古今與旨數條以備選用

治法彙七卷

胎前

三十五

惡阻

孕三二月惡心而阻膈飲食是也亦有六七個月尚病嘔者治同
肥人責之痰瘦人責之火俱宜二陳加白朮黃芩或加香附砂仁薑汁竹茹與吐家同因氣者胎必沉兼舒鬱加撫芎香附不可過用辛藥
婦稟受怯弱便有阻病狀如病酒顏色如故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡食好酸鹹物甚者或作寒熱心下憤悶嘔吐痰水恍惚不支古名惡阻治先脾胃清火化痰吐甚者愈止愈急仲景法停藥月餘自安
有因飲食失宜停滯作嘔者當和中消導不可作惡阻治脾胃弱者加參朮惡阻必用大半夏湯加減頭眩痰多加旋覆花有火加薑汁炒黃連竹茹見嘔吐門
日久津液損胃燥乾噦不納湯水二陳合四物加竹瀝薑汁潤以降之右脉必弦數左脉微弱

治法彙七卷

胎前

三十六

昧者謂半夏犯胎，地黃泥隔，乃知常而不知變者。

吐多脉弱，體倦不納穀，六君子湯加麥蘖、生薑，吐而心煩，竹茹、麥冬、前胡、橘紅、蘆根煎湯徐徐飲。

惡阻兼腰痛，胎欲墮，二陳四物、白朮、黃耆、黃芩、阿膠煎服，脹悶加硝砂。

左脉弦急，心下脹悶，惡心不止，挾肝氣上冲也，茯苓湯下抑青丸二十四粒。

治法彙七卷 胎前

三七

孕婦口酸或吐，雖定每食粥則口酸，皆肝火盛，川芎、陳皮、炒梔子、茯苓、生薑煎湯下抑青丸。

火見

吐定之後，須大補，參、朮、歸、芪、陳皮、茯苓，有火加條芩，腰痛加杜仲、續斷，作湯每日一服。

因食冷物及涼藥吐不止，丁香炮薑加半夏湯溫之。

胎痛

不時作痛，或小腹重墜，名胎痛，地黃當歸湯主。

之熟地三錢，當歸一錢，煎服，不應加參、朮、黃芩，因氣者加砂仁，因中氣虛下墜而作痛者，蒲中益氣湯。

胎漏

壯實人兩手脉平和，飲食如故，都無所苦，而經時下，是血氣旺養胎之餘血也，不必治，然亦不可使之多，和血涼血，健脾為主，佛手散加黃芩、白朮，不已加阿膠，去血多八珍湯加膠艾。

有大怒傷肝而動血者，佛手散加炒梔子、白芍。

治法彙七卷 胎前

三八

佛手散 治胎動服之即安，胎損服之即下。

即下

湯歸

當歸

川芎

各五錢

右水酒煎，血崩昏暈，用水煎服。

二黃散

治婦人胎漏下血

生地黃

熟地黃

各等分

右為末，煎白朮枳殼湯下二錢，食前服。

桑寄生散

治胎漏經血妄行，淋瀝不已。

當歸

桑寄生

川續斷

川芎

白朮

香附炒 阿膠炒 人參 白茯苓去皮 甘草炙

薑一片煎服

桑寄生安胎妙品第不得真者巴蜀常有之宜常覓下肢節痛手足攣痺功超他藥若他樹寄生有毒

胎動

下血而腹痛者是胎動欲墮也宜行氣安胎佛手散加硝砂脉大有火加芩木

治法彙七卷胎前

子煩

心中煩懣不寧是也責之心虛有火簡易方竹葉湯主之左寸微弱者相子養心丸或調補心丹臨睡服妙

竹葉湯

白茯苓 防風 麥冬 黃芩 竹葉五片

水煎服

子癰

孕婦痰涎壅盛阻塞或時發搐不省人事名曰

子癰清氣化痰為主此多因于氣有治與癰同惟劑稍小耳惡心甚者以二陳湯煎服探吐吐定理氣化痰兼用芩木保胎古方以羊角散葛根湯藥味偏于辛散因時寒宜可也無故忽然僵仆左脉微數而右脉滑大者是血虛陰火炎上鼓動其痰四物養血芩連降火二陳化痰下氣或加竹瀝薑汁

子腫

面目虛浮四肢作腫如水皆脾虛不運清濁不分所致補脾分利為主多用參朮

治法彙七卷胎前

罕

全生白朮散

白朮 薑皮 大腹皮 白茯苓皮

陳皮

大便不實加澤瀉山藥扁豆秦艽有火加子

芩為末米飲下二錢

五皮散 治胎水尋常脾虛腫懣

大腹皮 桑皮 茯苓皮 陳皮 薑皮

各等分水一盞加水香濃汁半盞煎服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白木五兩 茯苓四兩 當歸 芍藥各三兩

右細剉片以鯉一尾治淨煮汁每用藥四錢
魚汁蓋半薑三片陳皮少許煎七分空心
服

子懸

胎氣不和上湊脹腹滿者謂之子懸紫蘇飲主
之

紫蘇飲

治法彙七卷 胎前 四

紫蘇葉 人參 大腹皮 川芎 白芍

陳皮去白 甘草 當歸酒浸

薑三片葱白一根煎七分空心服

此症挾氣者多疎氣舒鬱兼芎歸和血劑當從
輕勿太猛乃可

子懸是濁氣舉胎而上湊也非紫蘇腹皮陳皮
川芎無以流其氣非歸芎無以利其血氣利血
流而胎自下矣邪之所湊其氣必虛故用人參
甘草補之一補一瀉推陳而致新也

子氣

三月已後兩足浮腫行步艱難食不甘且喘狀
如水氣名子氣古方一主于瀉大率脾虛者多
補脾兼分利與子腫互考夜腫日消血虛健脾
兼養血芎歸苓朮白芍白茯苓陳皮秦艽心下脹
是濁氣礙于上焦加厚朴貝母香附前胡大腹
皮蘇葉一二味喘加杏仁甚者加炒蘇子
天僊藤散

天僊藤洗略 香附炒 陳皮 甘草

治法彙七卷 胎前 四

烏藥各等分

右爲細末每服三錢薑三片紫蘇三葉水瓜

三片同煎空心服三次腫消

子淋

月少而小便淋痛者是悉屬火解熱利小便木
通梔子車前茯苓燈心條芩爲主痰闕上焦寸
關必滑宜探吐以提之必胸膈迷悶乃可
日久倦怠右脉微弱者屬氣虛參耆白朮麥冬
茯苓加梔子知母條芩等清火藥 左脉細數

形羸每使則痛屬血虛四物加黃芩知母

白朮
濟生方安榮散 治子淋用人參麥冬通草當歸
歸心滑石細辛為末煎麥冬湯下但滑石細辛稍峻虛實氣血各有不同達士變而通之可也

冬葵子散專主子淋梔子木通草梢麥冬燈心
應加參朮勢盛實人加滑石瞿麥二者皆犯胎氣用宜酌之

治法彙七卷 胎前

轉胞

聖

孕婦六箇月已後覺胎墜在一邊小便不利者
是

有火有氣虛有血虛有痰滯

兩寸脉弦急或兩尺弦急有力兼口乾心煩等
火症者屬熱宜冬葵子梔子木通滑石條芩白
朮清之外以冬葵子滑石梔子為末田螺為膏
或生葱搗膏貼臍上立通

右三部微弱無力或氣口虛大兼倦怠不食者

屬氣虛補中益氣湯服後探吐以提其氣

左脉不足或瀉而數兼夜熱心煩或大腑秘者
屬血虛宜四物加黃芩知母調益元散

肥盛婦人右寸關脉沉滑症兼惡心心脹小便
不利者屬氣滯二陳加青皮升柴煎服探吐藥
汁與痰出為佳後用參芪大補

大抵有孕小便不利月分淺者當清之兼保胎
月分多而虛者當補兼升提宜分兩途

丹溪參朮飲

治法彙七卷 胎前

聖

四物 人參 白朮 半夏 陳皮

甘草

入生薑水
瀉至心下

丹溪曰轉胞之症胎婦之稟賦弱者憂悶多者
食厚味者庸或有之古方皆用滑利藥鮮效因
思胞不自轉為胎所壓轉在一邊胞係矣不通
耳胎若舉起居于其中胞係自疎水道自利夫
胎之墜下必有其由吳宅寵人患此兩手脉似
瀉重取似弦左稍和余曰此得之憂思瀉為血
少氣多則胎氣弱而不能舉弦為有飲血少則

胎弱氣多有飲則中焦不清而溢胎知所避而墜下乃上藥與服隨以指探喉中出藥汁候少頃氣定又與之次早亦然至八貼安胎恐此法偶中後用治數人皆驗法用四物三陳四君煎服探吐為氣血虛而胎墜下小便不通者設上竅通下竅自利

治婦人諸淋苦杖根俗呼杜牛膝多取洗淨碎之以一合用水五盞煎一盞去渣入麝香乳香少許研調下有人病砂淋十三年每漩痛不可

治法彙七卷

胎前

聖

忍溺器中澄下砂石剝剥有聲百方不效此方啜之一夕立愈有胎不可用

安胎

三錫曰氣血旺脾胃和胎自無虞一或有垂其胎即墮以胎元全賴氣血以養氣血又藉脾胃飲食化生如胎婦脾胃不和食不甘美急宜酌量調理有因飲食不節而致者有鬱結傷中而致者診脈審證理脾進食為要丹溪曰因火動胎逆作喘者急用條實黃芩白朮香附之類

俗以黃芩為寒而不用反謂溫熱養胎殊不知

人之懷孕如鐘懸在梁梁軟則鐘墜用白朮益脾以培萬物之母條芩固中氣瀉火能滋子戶之陰使火不安動與其利而除其害其胎自安所以為安胎之聖藥也縮砂安胎以其止痛行氣故耳勞神動怒情慾之火俱能墜胎推原其本皆因于熱火能消物造化自然古方謂風冷傷于子宮而墮未達病情者也如慣墜之類或中氣不調食少且不必養血先理脾胃次服補

治法彙七卷

胎前

聖

中益氣湯使血氣自生

一法用黃芩為末濃煎白朮湯調一錢服一月餘自安

胎多有在三月分而墜者過時手厥陰心胞絡主養胎元勞心多慮心胞絡虛不能養胎則墮宜兼制火四物加炒黃柏玄參白朮條芩

左脈微弱身痛夜熱腰痛胎不安屬血虛四物加杜仲芩朮秦朮

右脈寸關大而無力似滑而不流利倦怠懶于

言動屬氣虛補中益氣湯加山藥杜仲子芩
兩手脈俱弱胎常墜屬氣血虛八珍加山藥杜
仲續斷芩朮

固胎散常服能養血益氣健脾胃清火四物加參
木賊皮甘草少佐黃連黃柏桑上羊兒藤七葉
完者糯米一錢見血不安加阿膠痛而氣滯者
加確砂仁屢效

東胎丸 七月以後服

黃芩 酒炒夏一兩秋
茯苓 七錢
白朮 二兩
治法藥七卷 胎前

陳皮 二兩

右為末粥丸每服錢半

東胎散 卽達生散妊娠臨月服之易產

人參 陳皮 各五
白朮 白芍 各一

當歸 全用 錢二
甘草 錢二
紫蘇 五
大腹皮 三

詩云誕彌厥月先生如達先生首生也達羊
子也羊子易生而無留滯故先醫以此方名
之然難產之婦多是氣血虛弱榮衛澀滯使
然是方也人參白朮甘草以益氣當歸芍藥

以益血紫蘇腹皮陳皮流其滯氣血不虛
不滯則其生也猶夫達矣

腹脹或痛加砂仁枳殼入青葱五葉黃楊腦七
個待於八九月服十數貼甚得力有火加黃芩
頭目眩悶加川芎隨症加減

孕婦忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛是
氣虛也佛手散加黃耆糯米煎濃汁不痛單著
糯米

下赤汁屬血虛有火正方用子芩芎歸壽兵用
治法藥七卷 胎前

銀芩酒

芩根 去黑皮 銀一斤

水煎入酒少許服無銀亦可

胎動不安取芩根如足指大者一尺薑湯服丹

溪曰芩根能補陰行滯血

臨產服保生無憂散補其血順其氣使易產又

兼治小產瘀血腹痛

南木香 當歸 川芎 白芍 枳殼

乳香 血餘 髮也洗淨煨

各等分水煎日二服

半產多在三個月及五七月除跌撲損閃外若前次三個月而墮則下次必如期復然蓋先于此時受傷故後期必應乘其虛也必多服健脾胃氣養榮藥一有胎口不可缺乃佳

跌撲傷胎

如有所傷逐汚生新為主佛手散神妙腹痛加益母子服下痛止母子俱安若胎已損則汚物併下再加童便浸香附益母草陳皮煎濃汁飲之

治法彙七卷

胎前

四九

從高墜下腹痛下血煩悶加生地黃著補以安之

因使內腹痛下血加參朮陳皮茯苓甘草砂仁末痛時加五靈脂一錢

阿膠散治搗犯胎不安腰腹痛或下紫血或上搶心氣促四物加阿膠黃芪薑棗煎服

妊娠偶有所傷胎動不安痛不可忍硝砂不拘多少和皮炒黑色爲末熱酒下二錢不飲酒者

米飲下腹中覺熱胎自安矣極效

小產

氣血虛者多小產如用前法安不住下紫血多腰痛甚者急投益母草製香附歸芎紅花陳皮煎湯外喚生婆取下爲佳

偶因跌撲使內其胎受傷不動而痛急投佛手散或一二服後痛止覺動胎尚無恙若痛不止或增寒壯熱戰慄是胎已死急催下取出

孕婦忽發寒熱當問胎動否切不可妄指爲外

治法彙七卷

胎前

辛

感而用表藥

小產惡露多于正生如胎雖下不可便睡倒俟胎衣惡露淨一二日方可睡倒多飲童便爲上

惡露不淨腹痛芎歸山查陳皮益母香附煎成加童便服

去血過多昏悶身冷或身熱脉大無力獨參湯加童便

小產因于脾氣血氣素虧而致產後益弱較大生更宜調節飲食徐進不可驟用肉食慎之慎

之

驢馬有孕，壯者近身，則蹄之。父老曰：此獲胎也。所以絕無小產。人惟知慾而不知忌，故往往有之。此說出儒門事親

二錫曰：胎係胞中，全賴氣血育養。靜則神藏，淫火一動，精神走泄，火擾于中，安得不墮。種玉者不可不知。

小產氣血虛，下血不止，人參黃耆湯主之。

人參 黃耆 當歸 白朮 白芍

治法彙七卷 胎前 五十一

艾葉 各一錢 阿膠 炒二錢

右水煎服

難產 催生法

三錫曰：難產悉是平時不善調攝，飲食不節，氣惱過度，或七八月上犯淫，以致氣血虧損，污濁凝滯，不得清順而轉逆下也。然中流之失，不可不預為之防。大率以順氣和血為主。漿水乾而不下，兼滋潤，汚血阻礙者，兼逐瘀，又不可催藥太早。如果漿水下多，其胎陷下，不得出，方可下。

手

丹溪曰：催生只用佛手散最穩，且效。當以黃歸為主，加益母草，製香附，陳皮，葵子煎湯服之。

葵子性滑利，所以能通澀滯。冬葵子殊少，無則以蜀葵子代之。古方如聖散，用蜀葵子半合，研細以酒濾去渣，溫服神妙。或漿盡胎乾，產難痛急者，連進三服，良久腹中氣寬，胎滑即產。括曰：

黃葵子炒七十粒，細研酒調，濟君急。若遇臨產，治法彙七卷 胎前 五十二

危急時，免得全家俱哭泣。

漿水已竭，香油白蜜，小便和勻，各半盞，加益母

濃煎湯一盞，更妙。

三合濟生湯，以枳殼、佛手散，連生拈其精粹而合成此方，治難產一二日不下，服此自然轉動下生。

川芎 錢二 當歸 錢三 香附 錢半 粉草 錢七 蘇葉

腹皮 錢半 枳殼 錢二

水二鍾煎一鍾，待腰腹痛甚，服之即產。

紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之，立下如聖散 治難產胎衣不下，兼治死胎

草麻子七粒，去殼細研成膏，塗腳心，胞衣即下，洗去之，遲則腸出，却用此膏塗頂上，即縮上，一方用四十粒。

張子和曰：大凡難產，皆由燥澀緊歛，故產戶不得開，宜先于降誕之月，用長流水調益元散空心服三次，其產即易。產後亦無虛熱，氣血不足之疾，然此法可施于膏粱奉養太過者，如湖

治法彙七卷 胎前 五十三

陽公主之瘦胎飲，脾胃弱而氣血不足者，恐非所宜。

催生諸藥，乃不得已而用之。古方有用兔腦、豬脂者，油蜜葱白者，有用葵子、牛乳、榆皮、滑石者，有用柞枝者，皆取滑利潤澤，使之易下也。金鳳子催產，取其性急而速下，弩牙取其機發而不括，蛇蠍取其蠃蛻，皆一時古人妙用，惟佛手益母屢屢奏功，至于足貼草麻，手握石燕，雖少效，尤不害事，但諸方有燒灰服者，徒切燥其津液。

久益其澀滯，慎不宜用，故不錄。

催生柞木飲 治難產死胎

大柞木枝一大握長一尺洗淨寸批甘草大者五寸作五段

新汲水三碗煎一碗，難產心下脹，飲一盞，便覺豁然，如覺饑渴，再與一盞，至三四盞覺

下墜便生。

兔腦丸 治難產或橫或逆

十二月兔腦去皮膜研極細錢半麝香另研極細錢半

母丁香末一錢麝香二分半

治法彙七卷 胎前 五十四

右三味拌勻，以腦和丸，雞豆大，陰乾，油紙裹

每服一丸溫水下

乳香速產，以香開竅逐污也，與麝同。

通明乳香一塊，如皂子大，為末，腰痛時，用新汲

水一小盞入醋少許，同煎，令產母兩手握石燕

生婆調藥飲，須臾生。又方：開骨膏乳香研細

五月五日午時滴水丸，雞豆大，每服一粒，無灰

酒下。

又方：催生神效乳珠丹，乳香研細，以豬心血丸

鷄豆大硃砂爲末，曬乾每服一粒，溫酒化下，良久未下，再一丸，甚者以荷葉蒂七個水二盞煎一盞化下一丸，此藥神驗，須于五月五、七月七、三月三合。

一方乳香硃砂爲末，麝香酒下。

一方腰痛難產，乳香人參各一錢，辰砂五錢，同研鷄子清一個調之，生薑自然汁和服，橫生倒養，卽端順。

濟陰還魂丹，催生最妙，取益母草開花時洗淨，治法彙七卷，胎前。

搗汁熬膏轉佳。

括云：三麻四豆脫衣裳，研細將來入麝香，若有艱難生產婦，臍中一貼便分張。用前丹已豆

若胞已破久而不下，其氣已耗，或元氣困憊，急用八珍湯斤許，水煎數飲之，飲盡再製，往往獲安。

死胎

胎死腹中，婦人指甲青舌青，作寒熱，或上搶心悶絕自汗，喘滿不食，二日藥水已盡，不得下，先

用佛手散加益母、葵子、牡丹皮、桂心等煎，劑不應，乃設法逐下爲佳，不可輕用水銀、大黃等猛劑。

勢急湯藥不效者，用肉桂心二錢，麝香一錢，研細童便下，酒亦可，或加佛手散內服亦妙。

一法朴硝細末二錢，溫童便調下。

誤服毒藥犯胎下血，服佛手散，血止胎尚可安，腹連腰痛，卽欲墮矣。

漿水已盡，胎不得下，須用豬脂油蜜酒法，三味治法彙七卷，胎前。

各三碗熬，碗半分二三次，緩緩服之。

身重作寒熱，舌下青黑，其胎已死。

面赤舌青，子死母活。

面舌俱青，口中出沫，子母死。面以候母，舌以候子。

千金神造散，治雙胎，一胎死者，用蟹爪以去其死，阿膠以安其生，甘草和藥性，其說稍玄，亦理之所有者，廣濟生不可不記。法曰：脉三陽俱盛，名曰雙軀，若少陰微紫者，謂腎脉血卽凝澀。

經養不周胎卽偏天其一獨死其一獨生不

其死害母失胎是方主之

黑神散 產經日不下胎死腹中舌青面白脉
沉小時值寒月宜此暑月禁用胎衣不下亦
效

熟地黃 炒蒲黃 炒黑乾薑 當歸

白芍 桂心各二兩 炙甘草 黑豆炒

上件共爲末每服二錢童便和酒下

胞衣不下

治法彙七卷胎前

五十七

汚血浸下于胞中脹大不得下上衝心胸喘急

腹痛急投佛手散加紅花益母草香附山查陳

皮煎成加童便服以逐之古方奪命散用附子

大黃牡丹皮乾漆藥多慄悍不若此法最穩甚

者花薤石散最妙牛膝湯亦妙

牛膝湯 治胎衣不下臍腹堅脹急痛勢危迫

者服此胎卽爛下死胎亦可

牛膝 瞿麥各四兩 當歸三兩 通草六兩 滑石八兩

葵子五兩

水九碗煎三碗分三次服愚按此分兩服

又滑石性寒恐汚血轉凝也不若佛手散

中加牛膝瞿麥等少佐滑石可也用者酌

之

一法熱酒下失咲散佳

一方用葵子牛膝各一合煎湯服

紅花酒

紅花一兩 清酒一盞沃之溫服酒壯氣紅

花逐瘀使胞隨下胞不下熱甚口舌乾脉

治法彙七卷胎前

五十八

大有力腹脹痛諸藥不應千金備急丹最

妙九桐子大醋湯下卽經閉門血極膏大

黃醋煮一味

若臍帶頭在外切須以帛條繫緊不爾則汚血

流入胞中難下矣

兒一下時急掣臍勿驟剪斷胞下乃可剪

氣弱不能送出無憂散佳

交骨不開陰門不開子宮不收

三者皆元氣不足交骨不開者用芎歸湯加髮

方又難催生難產者極妙法用龜甲一個

炙婦人頭髮一握燒灰芎歸各一兩每七錢水煎服如人行五里再一服生胎死胎俱下

陰門不開者十全大補加五味子補而飲之子宮不收者補中益氣湯加醋炒芍藥半夏補而舉之或加五味子

初產腫脹或厥痛而不閉者用加味道遙散若腫既消不閉者當用補中益氣湯切忌寒涼

治法彙七卷胎前

五十九

有人誤以涼藥敷致腫及臂虛症蜂起幾致不救乃以六君子湯先固脾胃更以補中益氣而消

丹溪治一婦子宮腫大二日方入損落一片如猪肝面色痿黃體倦飲食無味潮熱自汗用十全大補三十餘劑而愈

產後子宮受傷久久成癰者托裏為主

臨產

月分既足腰腹陣痛微見漿水是名弄胎尚宜

靜守必待腹痛二陰挺候眼中溜火方為真產脉一呼三至一吸三至

微覺動作家中不可驚慌宜屏除一切穢雜掃室焚乳香勸諭產婦勿慌痛時稍放裙帶吐氣數口

如儼可覓水精母鷄煮汁作粳米稀粥與食不可食雞并諸肉食常令稍饑為佳以饑則氣下

氣下則速產若食肉及多食則礙于上焦氣不得下故產難雖產下食停滯于中則生寒熱

治法彙七卷胎前

卒

醫者不察亂補亂溫多致危殆慎之慎之欲生之時即煎佛手散加益母草一劑以備不虞但覺艱難加童便飲最妙子下而胎衣遲惡露少者亦當服

腹痛宜忍耐站立散步房中或凭几立慎不可攣腰以阻兒路亦不可逼迫須臾欲出時方可

抱腰傍人不可驚擾浪作形勢

體不潔有病及產人孝婦尼姑孤寡俱不可近左右惟老成解事曾經生長過者一二足矣

每見富貴家一見腹痛便驚惶彼此啼哭
產婦精神先已耗散未至產門纔轉身時強
力推逼或有勒腹者有約警者或冷水嚥面
多致橫生倒產是皆猛浪不解事之苦不知瓜
熟自落待時乃佳

一經生下即與童便一盞可免血暈諸疾不肯
飲者少加芎歸湯中肥白人參氣虛濃煎人參
湯加童便

漸進毛米飲取糠氣能降虛火也白粥宜極稀
治法彙七卷 胎前 六十一

以漸調理為上三朝內不可食薑并鷄子及粘
硬之物六七日上胃強者可少與母鷄牛肉鯽
魚羹不可用肉

血暈

難產去血過多而暈脉微弱色白者生脉散對
佛手散加澤蘭葉陳皮煎成加童便薑汁頻頻
灌之脉弱甚者濃煎獨參湯加童便外燒漆器
并打醋炭使鼻口受之醋以收神漆下惡露也
脉孔大數多火人產暈是虛火四物加澤蘭陳

皮益母草童便

丹溪曰血暈是虛火鼓上血未漸漸作暈用鹿
角燒灰出火毒研細用好酒童便灌下即醒此
物行血最妙但一時倉卒難成須預備下不若
佛手散并益母荊芥澤蘭童便為便

血氣虛血汚血隨虛火泛上迷亂心神故眼黑
生花甚者令人悶絕不知人事口噤神昏氣冷
但服清菟散即醒

澤蘭葉 人參 各二錢半 荊芥 一兩 川芎 五錢
治法彙七卷 胎前 六十二

甘草

右為細末童便點湯下一錢灌之產家須預
合下不爾作湯亦可

荊芥治暈是清上焦也性多散須佐以補氣藥
中乃可不可單用去血過多而暈屬虛人參黃
耆為君佐芎歸陳皮濃煎湯加童便

惡露少而暈是惡露攻上宜消汚芎歸益母香
附紅花澤蘭陳皮赤芍亦少佐荊芥童便
一方紅花汁加童便酒各一杯徐徐灌之

暈而大汗是陽暴脫也禁川芎荊芥等辛藥人參黃耆白朮爲君少佐當歸熟地佐炒黑乾薑少許仲景謂血虛而厥厥而必冒且大汗出小柴胡湯主之此一時所見權宜之方非千古確論明者辨之

丹溪方醋墨防暈產時血暈好墨半錠燒赤投醋中如此三遍出火毒研細每服五分淡醋湯下

丹溪治一婦面白素多鬱產後血暈不知人事

治法彙七卷

胎前

卷三

急于氣海灼艾十五壯遂蘇連進參耆歸等補

藥二月安

芸薑散 治血暈極效及治孕婦九竅出血

芸薑子

當歸

各錢半

芍藥

官桂

各錢半

共爲末每服三錢以酒童便各半盞調灌下

立產或童便一味溫飲尤佳

惡露

養胎餘血雜濁漿水兒既下氣血旺者亦隨而下怯者阻碍于小腹爲患最惡上攻卽暈攻胃

則嘔流于大腸則瀉溢

四肢則腫實隨

之

初產小腹痛是名兒枕卽惡露也芎歸益母山查香附陳皮煎服甚者加炒五靈脂

世傳山查一合濃煎湯加砂糖調服治兒枕痛

大效山查去惡血也

紅蘇蘇木牡丹皮赤芍炒蒲黃俱破汚血之物

古方多有有用者病急亦可加之

花蕊石散逐惡最妙藥囊不可不儲之童便下

治法彙七卷

胎前

卷四

一錢兼治吐衄止後餘血悉化爲水

產後血暈不省人事菲葉切入有嘴瓶中熟醋

沃之卽以瓶嘴對婦人鼻令氣透入鼻竅卽甦

古方黑龍丸治胞衣并惡露不下上攻眩暈危

症云極効用芎歸熟地五靈脂良薑各三兩入

砂礮中赤石脂泔洗鹽泥固臍炭火十斤煅通

赤候冷取開着成黑糟色乃佳研細入百草霜

五錢硫黃乳香各一兩花蕊石琥珀各三錢共

細研同上九梧子大第藥多辛散或北土宜之

東南膏梁氣血弱者恐非所宜

產後血久不止多有犯淫慾怒氣傷衛任所致宜審虛實病因大率補養兼升提

已瀰月而惡露淋漓不止只補氣血甚者用髮灰牡蠣龍骨阿膠細末空心米飲下

產後

丹溪曰產後當以大補氣血為主雖有他瘕以末治之乃至精至確大法

左手脉大無力或微弱補血為主

治法彙七卷

產後

李奎

右脉微弱或虛大補氣為主兩手脉俱弱四肢倦怠或作潮熱是氣血俱虛參耆歸朮地黃為主

產後別無他只虛弱倦怠脉微弱參朮耆草歸身陳皮少佐川芎脾胃強者加地黃

產後別無他忌白芍以其酸寒伐生發之氣也如血虛腹痛必用者以酒浸炒過用

產後氣血兩弱者當歸羊肉湯最妙

羯羊肉一斤去脂煮湯去浮油與肉取清

湯煎藥黃耆歸身大劑加生薑三片煎服

妙

血暈并失血

產後元氣虛損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口噤或痰壅盛者急用失笑散主之

若血下多而暈神昏煩亂大劑芎歸湯補之或吳萸散多加童便為佳痰多加二陳若勞心力太過而致者宜補中益氣湯加香附

治法彙七卷

產後

李奎

若氣血虛極不省人事用清暈散繼以芎歸湯及大補氣血之劑

凡產可預燒秤鎚令赤以器盛之急至床前以醋沃之使醋氣入鼻即醒或以醋塗口鼻亦可痰多是氣血俱虛痰火泛上宜二陳對八物去芍加芪

產後發熱狂言奔走脉虛大者四物加柴胡不愈更加甘草生地

腹痛

產後小腹痛三五日內是惡露不淨山查湯或芎歸益母等消汚藥寒月痛加炒黑乾薑卽兒枕痛或失咲散亦佳用五靈脂蒲黃各炒二兩服三錢酒煎下中脘痛屬飲食停滯心下必硬當詢之曾食何物于傷食門中酌用之不可用猛劑有未產之先多食肉食至產後氣弱不能運化而作痛者俱宜運脾消導佐芎歸理氣血

產後氣血脾胃大虧一或有傷病卽加甚常見

治法彙七卷

產後

李七

着惱着驚而心下痛者屬氣鬱按之無形當舒鬱撫芎香附陳皮爲主

有素有胃脘痛之積此時虛而發者理中氣舒鬱結

若去血過多而腹痛者宜四君加炮薑

產後小腹痛是名兒枕塊用失咲散行散之若惡露既去而仍痛四神散調之再不應用八珍湯是氣血兩虛也若痛而作嘔或惡心用六君子湯或作瀉用六君子下四神丸若瀉而後重

是氣下陷也補中益氣湯下四神丸若脾胃虛悶或惡食吞酸或心腹痛心下不可按屬飲食停滯二陳加山查白朮以消導之若食既消而痛不止或按之而不痛更加煩熱作渴惡寒作嘔是中氣被傷也補中益氣爲主若發熱腹痛按之痛甚不惡食不吞酸此是瘀血用失咲散消之止是發熱腹痛或兼頭痛按之不痛乃是血虛四物加炮薑參朮補之

身痛

治法彙七卷

產後

李六

產後手足走痛屬濕痰者多過時因氣血虛不能運行濁氣流于四肢作腫作痛看輕重標本治之甚勿猛浪亦未可驟補一煩月中着惱素體厚多痰臂痛移走兩足且腫以爲虛治服參歸痛益甚惡心迷悶作鬱痰治二陳越鞠秦艽丹皮二服稍減大便四五日不去矣投搜風丸後用化痰舒氣二陳二朮酒芩柏木通澤瀉香附調理而愈

產後發熱

產後熱悉屬虛補養為主左脉孔大無力四物
去芍藥右脉孔大加參芪輕則各佐白朮淡滲
其熱重則加炮黑乾薑或問大熱而用乾薑何
也曰乃陰匿陽無所依浮散于外而為熱此非
有餘之熱陰虛生內熱也素問曰陽在外為陰
之衛陰在內為陽之守邵子曰陰陽相依附此
理可知雖然炮薑止是引浮散之陽以歸于柔
陰必大補為主加佐而用之可也又有食物太
早氣弱不能運而生熱者必兼惡心飽悶必消

治法彙七卷

產後

李九

導為先又不可執一法也

乳結不通作熱輕則用椒湯浴散命稚子吮通
為佳如脹悶用花粉水通芎歸等疎利藥
脉孔頭痛寒熱小腹脹痛是敗血未淨所致佛
手散加五靈脂玄胡索香附益母炮薑煎服如
果寒必兼頭痛拘急等症脉必浮數有力補中
益氣加蘇荳熱服補以散之切忌妄汗
發熱多是虛更宜審酌大抵其因有四有血虛
有停滯有蒸乳有邪因虛襲

產後氣血未復過勞傷中即暴厥不知人事如
瘧狀急煎十全大補加附子令人推正其身
人夾正其面空開口灌之如不得下令側其面
出之仍灌熱者又冷又灌數次即能下少傾甦
立瘳

法

大凡產後以氣血為主病機謂治從厥陰經論
之無犯胃及上二焦有三禁不可汗不可下不
可利小便雖有他症以未治之補氣血為主
左脉虛大如葱管體瘦黑人是陰血虛陽無所

治法彙七卷

產後

李九

依浮散于外而為熱四物加炒黑薑補以收之
右寸脉虛大肥白人自汗體倦屬氣虛大劑參
芪歸木為主

產後氣血兩虧脾胃俱弱或過用暈食不能運
化而作熱寸關必弦滑症兼飽悶噯氣惡食泄
瀉嘔吐等症四君子加厚朴山查若胸膈飽悶
食少發熱或食而難化此為脾氣弱宜六君子
加炮薑若誤用峻劑腹痛熱渴寒熱嘔吐乃中
氣復傷急以六君子加炮薑誤用柴苓立危

遺尿

氣血太虛不能約束宜八珍加升麻柴胡
加熟附子一片

有產後不順候損尿胞膀胱者用丹溪法參芪
爲君芍藥爲臣桃仁陳皮茯苓爲佐猪羊尿胞
煮湯煎藥須百服漸安

癰瘰

經云肝主筋而藏血因產後陰血去多陽火熾
盛筋無所養而然耳故癰疽膿水過多金瘡出

治法集七卷

七

血過甚則陽隨陰散亦多致此治法當用加味

逍遙散或八珍散加丹皮釣藤以生陰血則陽
火自退諸症自愈如不應當用四君芍歸丹皮
釣藤以補脾土蓋血生于至陰至陰者脾土也
故小兒吐瀉之後脾胃損虧亦多患之乃虛象
也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補
中益氣加薑桂陽氣虛敗者用十全大補加桂
附亦有復生者此等症候若肢體惡寒脉微細
者此爲真狀若脉大浮發熱煩渴此爲假象唯

當固本爲善無力抽搐戴眼反折汗出如珠
皆不治

乳

三錫曰衝任血旺脾胃氣壯飲食調勻則乳足
而濃以生化之源旺也若脾胃氣弱飲食少進
衝任素虧則乳少而薄所乳之子亦怯弱多病
然有生之後全賴乳以育養虛實寒熱乳隨母
變子食其乳形亦因之甚哉調攝之方乳母不
可不慎也李時珍曰人乳無定性善格物理
者也

治法集七卷

七

乳以濃白光彩入盞中上面瑩然如玉爲上黃
色清薄爲下不可哺兒乳母宜肥瘦適中無病
經調善食者佳太肥則多痰太瘦則多火兒食
其乳亦復如是貧家不能覓乳母自乳而乳不
佳者審脾胃氣血就虛孰病調理得乳佳母子
俱好如血不足而潮熱子食其乳亦熱兒醫繆
指爲驚爲風妄投丸劑卒至夭枉良可太息向
有一兒昏睡一日不醒舉家驚惶求醫醫指爲

驚痰投藥罔効一高醫診之曰此兒中酒得無乳母曾痛飲乎詢之果然停藥而醒舉此爲例其他可知矣

乳少

心下不舒悶懣食少不能生乳而乳少宜舒鬱健脾香附撫芎枳木神麴麥芽之類潮熱自汗脉數瀉體瘦口乾而乳少是血虛四物加花粉麥冬知母地骨皮之類

氣口脉滑惡心少食體稍肥是胃虛有痰六君子湯加枳實通草不滑但虛大面白多汗者屬

治法彙七卷

乳

氣虛補中益氣湯倍蒼加通草

乳脹大發熱不通是乳結也漏蘆通草川山甲陳皮花粉木通土瓜煎服此血盛而壅滯不行此方疎之

乳不脹四肢軟弱兩手脉微弱是氣血弱不能生乳宜用猪蹄湯煎參朮蒼歸通草等補以助之鍾乳粉生乳極妙鯽魚湯生乳是補胃也氣血旺而乳來遲用土瓜漏蘆各三兩甘草二

兩通草四兩水煎濃服徐徐飲

一方括蔞子洗淨炒香熟瓦上掄令白色爲末酒調下一錢七計少時

乳 一方土瓜爲末酒服一錢日三服皆通乳非生

丹溪方用葛苳子糯米各一合細研末水一碗攪勻入甘草末一字煎之溫呷頻與妙

又方

猪蹄一隻 通草兩

治法彙七卷

乳

以水一斗煮作羹食之

湧泉散 治乳少因氣閉者

瞿麥穗 麥冬 川山甲黃地王不留行

右爲末每服一錢熱酒調下後下猪蹄湯解

用木梳于左右梳之

諺曰川山甲王不留婦人吃了乳長流

又方 治乳少

花粉 薄荷歸身等分爲末先吃羊蹄湯次服藥再吃蔥花羊肉湯少許

有人乳少，家中偶煮紅豆，因吃豆及湯，當夜乳若湧泉出，後屢用皆效。

乳自出

胎前乳自出，為乳注，生子多不育，宜補以止之，用十全大補湯。

乳多急痛而出者，溫帛熨之，漏蘆散亦可。

漏蘆 二錢 蛇腿 一條 瓜萺 十個

右為末，酒調二錢。

通乳湯 治產後氣血不足，乳汁澀少。

治法彙七卷

七五

猪蹄 四隻 通草 二錢 川芎 一錢 川山甲 十四片

甘草 一錢 歸身 一錢

用水五升，煮汁飲之，忌生冷，外以葱椒湯頻

洗為佳。

玉露飲 治乳脉不行，身體壯熱，頭目昏花，用

此以涼膈下乳。

當歸 三錢 川芎 五分 白芍 一錢 人參 二錢

白芷 一錢 白茯苓 半錢 桔梗 五分 甘草 二錢

乳結欲成癰，宜托之，加黃耆、金銀花、甘草稍、白

芷二錢半，入酒半鍾，食後服。

胡桃散 治乳少。

核桃仁去皮十個，搗爛入炒穿山甲末一

錢，黃酒調下。

通草湯

通草 七分 瞿麥 柴胡 花粉 各一錢 桔梗 二錢

木通 青皮 赤芍 白芷 通經連翹

甘草 各五分

水煎細飲，更摩乳房。

治法彙七卷

七六

無子食乳欲消者，古方大麥芽二三兩，熟為

末，分四次湯調服，立消，其耗散血氣如此，何世

悞用于健脾藥中，脾胃弱者，寧不耗氣，又云麥

芽最消腎。

一方神麴。

一方用麻黃 花粉 各三錢 甘草 一錢 水煎服，即消。

吹乳。

世俗皆以為所乳之子，膈上有熱，口氣薰蒸，因而乳腫，恐太穿鑿，乳頭屬厥陰肝，乳房屬陽明。

胃氣從所鬱厚味所釀二經之脉不清汚濁結而成腫硬急須早治緩則潰而成癰當于外科書中求之

初起宜忍痛揉散令大人吮去毒乳如發寒熱用敗毒散散之不寒熱但腫硬者用青皮柴胡疏肝散之滯甘草節活汚濁之血瓜蔓解鬱熱赤芍連翹花粉解散消腫口乾胃火盛加石膏經驗方 治乳初腫作寒熱用蒲公英三科金銀花二兩水酒煎熱服取微汗睡醒即消更

治法彙七卷乳

七

以查敷乳上

最效散 治吹乳

螃蟹去足燒灰存性爲末每服二錢黃酒

下

熨法 連鬚葱搗爛鋪乳上用瓦礫盛灰火蓋

葱上一時蒸汗出即愈

白丁散 下乳通血脉立消腫硬

白丁香與者一味爲末每服二錢酒調下

不過二服

廣嗣

三錫曰廣嗣在男女精血男精壯而女經調有子之道也然稟賦有偏勝或陽虛而氣弱或陰乏而精衰求其所偏而矯正之培養之須藉合宜方藥故藝果必有墜種子必用藥要皆澆灌之得法耳

男女二八三八之時腎氣盛精氣溢泄陰陽和適時勿妄鑿喪一遇經調之女即孕女子十六七天癸旺而無病者上

治法彙七卷廣嗣

七

男女婚姻以時則多子太遲則情蕩而多鬱太早則陰弱精傷故精血篇云精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難壯之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便道澀而爲淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼愈疼則愈欲大小便愈便則愈疼

女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年而情已動亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而爲腫雖合亦難子合

男子多則瀝枯殺人產乳多則血枯殺人

十補心腎丸方論曰種子方主於補心腎者

腎火以主君火一若相成也殊不知腎

相火以主君火一若相成也殊不知腎

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

血而之乃生蓋心之所藏者神之神之所附者

治法彙七卷

廣嗣

牛乳

熟地黃自製者四兩薑汁製乾山茱萸肉

枸杞子兩各二牡丹皮酒洗黃蘗

川牛膝酒洗敗龜板酥炙各一兩五錢以

茯神焙乾淨用三兩以人乳汁浸之

人參兩各一相子仁研極細甘草煎水飛

麥門冬酒浸各一兩五錢辰砂研極細甘草煎水飛

五味子兩各一

天門冬兩各一鹿角膠鹿茸煮者尤佳酒融

鹿角霜鹿角膠化入蜜同煉各二兩

肉苁蓉酒洗去浮腫一重蒸兔絲子酒洗搗

虎脰骨酒浸炙各兩五錢以上

紫河車女得先天之氣補藥中有此自能生精

右除茯神龜板骨辰砂共為末相子仁另研

鹿角霜膠候各末俱完酒融化入煉蜜和藥外

其餘皆咬咀紫河車在淨水內洗去穢血用銀

針挑去紫筋同咀片入砂鍋用陳老酒三碗陳

米醋一碗清白童便一碗米泔水數碗和勻傾

入鍋內浮於藥寸許如少再加米泔以鋪蓋
密桑柴火煮乾爲末和前末加煉蜜九桐子大
每空心鹽湯下百丸各隨人臟腑偏盛偏虛加
減

如夢遺加沙黃栢知母各一兩 如大便秘加
肉苁蓉二兩如素多疝氣加橘核二兩小茴香
一兩 精滑不禁加金櫻膏代蜜更加龍骨牡
礪各一兩

凡腸風下血多者加阿膠一兩爲珠赤白何

治法彙七卷

八十二

男精

體厚脉沉小年雖幼而陽不固是稟來氣不足
宜多服人參膏或加黃耆白朮中年陽道痿弱
身日肥妾雖多不孕是胃中脂膜盛氣內怯也
補氣藥中加鹿角膠枸杞製附子鎖陽從蓉之
類兼補相火宜斷厚味肥甘臨睡或間服搜風
順氣丸及化痰丸

脾胃不和食少倦怠每使內後益甚不能成胎
是中氣弱不能施化多服補中益氣湯

治法彙七卷

八十二

黑瘦脉弦數身多熱腸胃燥澀是陰水不足不
能成胎雖胎亦夭宜六味地黃丸加黃栢知母
歸身枸杞

五子衍宗丸 隨人氣血加減

兔絲子洗淨 酒煮 枸杞子 覆盆子 車前子

五味子

陰虛瘦黑人加六味丸 氣虛肥白人加固

本丸仍用人參膏和丸

時珍曰占人轉女爲男法懷妊三月名曰始胎

血氣未定，象形而變，是時宜服藥，用斧置牀底，緊刃向下，勿令本婦知，恐不信，以鷄試之，則一窠皆雄也。蓋胎化之法，亦理之自然，故食牡鷄，取陽精之全於天產者，佩雄黃，取陽精之全於地產者，操弓矢，藉斧斤，取剛物之見於人事者，氣類潛感，造化密移，物理所必有，故妊婦見神像異物，多生鬼怪，卽其徵矣。象牙犀角，紋逐象生，山藥鷄冠，形隨人變，以鷄卵告龜而抱雛，以若箒掃猫而成孕，物且有感，況於人乎。

治法彙七卷 男精

八十二

女血

肥人軀脂滿溢，占住血海，不能攝精，不能成胎，宜南星二陳、二朮、香附、蛤粉、海粉等作丸服。瘦怯者，血少，子宮乾，亦不攝精成胎，宜四物或二門、知母、黃柏、香附之類，六味地黃丸加香附，瘦婦最宜。

肥瘦二法，乃大關捷，隨人加減。

婦人但凡經不調，絕無生育之理，必先調其經。四製香附丸，隨其前後酌量加減，務抵於對月，乃可望其孕。調經法見婦人門。

治法彙七卷 女血

八十四

經脉既調，宜以人事副之。訣云：三十時中兩日半，二十八九君須笑，落紅滿地是佳期。金水過時，空霍亂，霍亂之時，枉費功，樹頭樹底覓殘紅，但解開花能結子，何愁丹桂不成叢。

月水初過，金水方生，此時子宮正開而虛，惟虛能受，正妙合太和之時，過此則子宮閉而不受矣。然男女之形，雖曰玄妙莫測，若以象理推之，亦可預卜。方書謂經盡一日至三日，新血未感。

精勝其血感者成男四日至六日新血漸長血勝其精感者成女又云陰血先至陽精後衝血開裏精精入爲骨陰外陽內而成坎卦之象男形斯成若陽精先入陰血後參精開裏血血入居本陰內陽外則成離卦之象女形成矣竊以爲二氣交感實冥恍惚孕結而成初非有待于形質也故二五之精妙合而凝自無而有由象得質天地交而萬物亨陰陽和而男女育稟陽氣之偏者成男稟陰氣之偏者成女故曰乾道

治法彙七卷

全五

二說似是

男子宜儲精寡慾 女子宜調經戒性

驗胎法

經脈不行不熱不痛或時惡心或只平平卽是胎如欲知者川芎末空心艾葉湯下覺腹內微動是有胎也若服後一日不動者非乃經滯也

怔忡驚悸恐健忘

怔忡者心跳動不寧止作無時是也屬血虛有火

驚悸者忽然若有所驚而惕惕然心中不寧有時一動是也或聞響卽驚屬痰屬火

恐者似驚悸而實非忽然心中恐懼如人將捕之狀及不能獨自坐臥必須人爲伴侶或夜必用燈燭無則轉甚一屬神傷血少一屬痰火

健忘者轉盼遺忘言動不知首尾是也乃求望

治法彙七卷

全六

高遠所願不遂多有此病悉屬心神耗散當補養雖用藥治不若平其心易其氣養其在已而已亦有痰火爲患者當分而治之

怔忡驚悸恐怖健忘大率屬神勞血少者多有慮便動屬虛時作時止者痰因火動

血虛者左脉必微弱或虛大無力體瘦手心熱面赤唇燥補心丹四物加遠志茯神柏子仁不眠加酸棗仁麥冬之類吞安神丸

痰者寸關必弦滑有力雖病皮肉潤澤不減口

不乾忽熱驚惕有時如常厚味膏粱多有此症
滾痰丸溫膽湯加炒黃連

婦女及鬱悵人氣鬱生涎心神不寧脉必沉結
或弦兼舒鬱加味四七湯或溫膽湯加減

病人渴飲水多心下悸當分參

久思所愛觸事不意虛耗真血心血不足遂成
怔忡養榮湯

陰火上冲怔忡不已甚頭暈眼花耳鳴齒落或
腹中作聲宜壯水滋陰抑火湯久服不愈加附

治法彙七卷

怔忡

子從治或入參芪

病後產後汗吐下後悸及心跳悉屬虛人參麥
冬五味栢子茯神加減

瘦人多是血虛肥人多是痰飲

陽氣內虛心下空虛亦悸右脉大而無力或微
參芪補之

有失志者所求不遂或過悞自咎悵悵嗟嘆不
已獨語書空若有所失宜溫膽湯去竹茹加人
參栢子仁各一錢下定志丸仍佐以酒調辰砂

妙香散

五飲停畜閉于中脘使人驚悸宜蠲飲理氣
若小胃丹

內經曰驚者平之昔戴人治一女子聞水音則
驚先是五驚而得令坐定從下以水擊之其女
驚不自覺戴人曰我以木繫汝何驚遂連擊之
又于門外壁間連擊一夜熟寐而愈所謂平者
平昔所聞見使之習熟自然不驚固是莫若平
心易氣以先之而後藥之也

治法彙七卷

怔忡

驚氣入心時作煩亂蜜陀僧煨赤醋淬研細茶
下一錢妙昔有被蛇狼所迫驚後不能言服之
遂愈

東垣曰外物驚宜鎮平黃連安神丸

心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽
懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸病或短氣悸或
自汗並溫膽湯主之嘔則以人參代竹茹

若驚悸眠多異夢隨即驚覺者溫膽加酸棗仁
蓮肉各一錢以金銀煎下十四友丸或鎮心丹

遠志丸酒調妙香散琥珀養心丹定志丸

下焦濕熱勝臥則多驚悸多驚洩者羌活勝濕湯主之邪在肝膽加柴胡如淋加澤瀉以風能勝濕也

熱鬱有痰寒水石散氣鬱有痰加味四七湯虛而有痰十味溫膽湯養心湯

診寸口脉動而弱動即多驚弱即為悸溫膽湯即二陳湯加枳實竹茹薑棗

治法彙七卷怔忡全九
硃砂安神丸見內傷門

加減四物湯治瘦人血少怔忡無時但覺心跳者

四物去芎用生地加茯神遠志
酸棗仁梧子仁

煎服或加側柏葉黃連硃砂為丸亦妙
加味定志丸治肥人痰迷心膈尋常怔忡

遠志兩一人參兩白茯苓兩
琥珀兩
天花粉
鬱金各一
貝母兩

瓜蒌

右為末薑汁竹瀝丸萊豆大每服二錢硃砂為衣火盛者加炒黃連一兩

脾在志為思思傷脾神不歸于脾多健忘怔忡歸脾湯主之

黃芪圓眼肉酸棗仁炒人參
木香分二甘草分二

薑三片煎服
心血不足怔忡夜多異夢如墮層嵯平補鎮心

治法彙七卷怔忡全九
丹佳

白茯苓五味子車前子茯神
肉桂兩一山藥麥門冬去心一兩五錢

遠志肉兩五錢
熟地黃兩酒蒸各一
天門冬淨一兩一錢

棗仁炒二錢五
人參去蘆五錢
砂飛淨五錢

煉蜜丸空心米飲下二十九
養心湯勤政勞心痰多少睡心神不足

黃連 白茯苓 茯神 麥冬 當歸

芍藥 甘草 遠志 桑皮 人參

栝子仁 半夏 五味子 芎

蓮肉四箇去心煎服

恐傷腎丹溪治一人六十歲心不自安如人將

捕之狀夜臥亦不安兩耳後亦見火光炎上雖

飲食而不知味口乾以人參白朮當歸身為君

佐陳皮加鹽炒黃栝炙玄參月餘而安用鹽酒

玄參者引補藥入腎也

治法彙七卷 怔忡 九十一

天王補心丹 虛悸怔忡健忘妙品 見虛損門

栝子養心丸

栝子仁 揀淨微炙 兩 枸杞 水洗淨晒乾三

麥冬肉 茯神 各一 熟地 酒洗 甘草 去粗皮

黑玄參 酒洗淨 當歸 酒洗五

石菖蒲 去泥洗淨

右為十除栝子仁地黃蒸爛搗泥和末加煉

蜜丸每服五十丸臨睡白湯下

頭眩黃瘦多畏懼脈弦無力屬膽虛人參散王

之

人參 甘家菊 栝子仁 熟地黃

枳殼 五味子 枸杞子 山茱萸

桂心

右為細末每服二錢溫酒調下

膽虛目暗喉痛數唾眩冒五色所障夢見被人

爭訟恐懼面色變者補氣防風湯妙在細辛東

垣曰膽氣不足細辛補之

防風 錢一人參 分七 細辛 芎藭 甘草

治法彙七卷 怔忡 九十一

茯苓 獨活 前胡 各八

棗二枚煎服

二丹丸 治健忘養神定志內以安神外華膝

理

丹參 天門冬 熟地 各半 麥門冬

甘草 白茯苓 各一 人參 遠志 菖蒲

硃砂 研為衣

石為末煉蜜丸栝子大每服五十丸至百丸

風痰煎愈風湯下

思慮過度病在心脾宜歸脾湯有痰加竹瀝
有因精神短少而健忘者人參養榮湯定志丹

寧志膏

有痰迷心竅亦令健忘導痰湯下壽星丸或佐
養心藥

心火不降腎水不升神志不定事多健忘宜朱
雀丸

千金孔子枕中方龜甲龍骨遠志菖蒲四味等
分爲末酒服方寸七日三服常令人大聰明

治法彙七卷

怔忡

九三

一方菖蒲茯苓茯神人參遠志爲末酒調方寸
七日三夜一

有痞塞不飲食心中常有所歉愛處暗地或倚
門後見人則驚避似失志狀此爲卑慄之病以
血不足故爾人參養榮湯脾胃不和者嘉禾散
加當歸黃芪各半分

琥珀養心丹治心血虛驚悸夜臥不安或怔

忡心跳者

琥珀 另研龍齒 煅另研 遠志 黑豆 甘草

石菖蒲 茯神 人參 酸棗仁 妙

當歸 生地黃 各七錢 黃連 三錢

硃砂 另研 牛黃 另研 栝子仁 五錢

右爲細末將牛黃硃砂琥珀龍齒研極細以
猪心血丸如黍米大金箔爲衣每服五十丸

燈心湯送下

真珠母丸 治肝經因虛內受風邪臥則寬散

而不收若驚悸狀

珠母 研細末 錢 當歸 熟地黃 各一兩

治法彙七卷

怔忡

九四

人參 酸棗仁 栝子仁 犀角

茯苓 各一兩 沉香 龍齒 各半

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大辰砂爲衣每
服四五十丸金銀薄荷湯下日午後臥時服

寒水石散 治因驚心氣不行鬱而生涎涎結

爲飲遂成大疾忡悸隕獲不目勝持少

湯驚則發允宜服之但中寒者不可服

寒水石 煅 滑石 水 各 生甘草 二錢

右爲末每服二錢熱則新汲水下寒則薑湯

湯下加龍膽少許尤佳

十味溫膽湯 治證九心氣鬱滯救治四肢浮

重飲食無味心虛煩悶坐臥不安

半夏湯 枳實 炒 陳皮 去白各 白茯苓 去皮

遠志 炒 遠志 去心 甘草 炙 熟地黃 酒洗

五味子 人參 去蘆各 粉草 炙半

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時

服

十四友丸 見狂門 妙香散 見狂門

治法藥七卷 怔忡 九玉

活勝濕湯 見濕門

羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤懼煩悶熱壅

羚羊角 柴胡 黃芩 當歸 羌活

決明子 赤芍藥 炙甘草 各等分

水二鍾姜一片煎八分服無時

酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲

肉苁蓉 怔忡恍惚夜臥不安

酸棗仁 炒 遠志 黃芪 蓮肉 去心

羅參 當歸 白茯苓 白茯神 各

陳皮 粉草 各半兩

咬咀每服四錢水一盞半薑三片棗一枚瓦

器煎七分日三服臨臥一服

遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志 茯神 肉桂 人參 酸棗仁 炒

黃芪 當歸 各一兩 甘草 炙半

煎服同前

黃芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉 梔子仁 黃芩 麥門冬 去心 木通

治法藥七卷 怔忡 九玉

生地黃 黃連 甘草 各等分

每服四錢水一盞薑五片煎服無時

癲狂癇

人事混濁神識不清語言顛倒曰癲屬心血不足乃求望高遠所願不遂者有之心脉及兩寸必虛數或洪大無力當從心治清心舒鬱養神芎藭香附芎歸茯神梔子貝母麥冬橘紅栝子仁之類丸藥用交感丹補心丹

一法用星香散加石菖蒲人參各半錢加竹瀝薑汁下毒星丸痰多者先以湯劑湧去其痰後服安神藥因驚而得者抱龍丸○思慮傷心而

治法彙七卷癲癇

九

得者酒調天門冬地黃膏多服取効○心經蓄熱發作不常或時煩躁鼻眼覺有熱氣不能自由有類心風稍定復作清心湯加石菖蒲○有癲人服七氣湯而愈蓋氣結其痰也○妄歌妄哭登高踰垣罵詈不避親疎曰狂與傷寒熱極發狂同屬痰火內盛有樂極而成者有怒極而成者尋火尋痰分多少而治牛黃瀉心湯滾痰丸遂心丹極對症方須斷厚味酒肉麪食薑蒜煎炒內經所謂奪其食乃已即此義也○久病

必是氣血大虛宜分而治之寧志膏一醉膏辰砂散蓋狂之病少臥少臥則衛行陽不行陰故

陽盛陰虛今昏其神得睡則衛得入于陰而陰得衛填而虛陽無衛助不盛故陰陽和而愈矣

○忽然僵仆作獸聲手足勁強半晌乃甦曰癇

俗名羊兒風是也方書以五畜分五臟我丹溪

先生謂此為痰火乃千古灼見也大法行痰為

主藥用黃連膽星瓜蒌二陳有熱者用涼藥以

清其心有痰氣實者可用吐法虛實在脉上辨

治法彙七卷癲癇

九

不可以肥瘦取以肥人多氣虛乃爾吐後用東垣安神丸及平肝藥青黛川芎柴胡之類○虛而不禁吐下者星香散加人參菖蒲茯苓麥冬各壹錢全蝎叁個入竹瀝下酥角丸楊氏五癇丸犀角丸龍腦安神丸參硃丸琥珀壽星丸一法天南星九蒸九晒為末薑汁打糊丸桐子大每服二十丸煎人參麥冬茯苓菖蒲湯入竹瀝薑汁

大率因痰火結于心胸間宜開痰鎮心神中邪

者虛人庸或有之未必不由痰火○素問治狂奪其食則已使之服鐵落飲夫鐵落者下氣疾也往往用鐵銹水入藥治暴狂殊効

丹溪方治癲症用大蝙蝠壹個以硃砂叁錢填入腹內以新瓦盛火炙令酥爲度候冷爲末每壹個分作肆服氣弱及幼年分伍服空心白湯下此藥慄悍勿輕用

龍腦安神丸 治男女五般癲癇無問遠近發作無時

治法彙七卷 癲癇 九十九

茯神三人參 地骨皮 廿草 半黃 桑皮

麥門冬各二兩 馬牙硝二錢 龍腦 麝香各分

硃砂二錢伍分 烏犀角兩一 金箔三十五片

右爲末煉蜜丸彈子大金箔爲衣風癇冬日溫水化下夏月涼水化下不拘時日進壹丸小兒半丸虛勞發熱咳嗽新汲水下

神應丹

辰砂不拘多少研細末飛過猪心血和得所以蒸餅褻劑蒸熟取出就丸桐子大每

用壹丸食後臨臥人參湯下

逐心丹

甘遂末 猪心血和丸

拔萃妙香丸 治痰壅盛牙關緊急目睛上視

顛癲狂妄

巴豆二百二十五粒取霜 牛黃錢五 金箔九十片

辰砂九兩另研 龍腦 膩粉 麝香錢五

右合研勻

溫膽湯 治膽虛有痰惕驚怔忡等證

治法彙七卷 癲癇 一百

半夏 竹茹 枳實各二錢 生薑 四錢

陳皮錢三 甘草錢一 白茯苓

水煎食遠服

癲病發時項強直視不省人事肝經熱盛也或有咬牙者先用導瀉苦酒湯吐之吐後服瀉膏丸下之次用加減通聖散顯咬牙證者用導赤散則愈如新發者用輕粉代赭石白礬發過米飲調下經口重以鎮之
定志丸 治心氣虛恍惚健忘等證

人參 白茯苓各三兩 遠志肉 菖蒲各二兩

煉蜜丸如桐子大硃砂爲衣每服伍拾丸食遠白湯下

八物定志丸 平補心氣安神鎮驚除膈間痰

熱等症

遠志肉 石菖蒲 麥門冬 茯神

白茯苓各一兩 白朮二兩 人參兩半 牛黃二錢

煉蜜爲丸桐子大每服貳拾丸空心白湯下

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡等

治法彙七卷 癰疽 百一

瘡

白茯苓 白朮 黃耆 龍眼肉

酸棗仁各一錢 人參 木香各半錢

甘草炙二錢

薑參片棗貳枚

經驗方 治憂愁思慮傷心令人惕然心跳動

悸不安

川歸酒洗 生地酒洗 遠志 茯神各五錢

石菖蒲 黃連各二錢 牛黃一錢 辰砂二錢

金箔十五片

右以前陸味研細入牛黃辰砂貳味末入猪心血丸如黍米大金箔爲衣每服伍拾丸臨睡白湯下或猪心湯亦可

大法脉弦滑多肉人或兼心下痞塞有痰時動者溫膽湯晚間間服滾痰丸

瘦人心虛有火補心丹栢子養心丸或安神丸

宜分兩途○若悒鬱生痰動火而致者宜舒鬱

越鞠加減癰病多因抑鬱不遂佗條無聊而成

治法彙七卷 癰疽 百一

精神恍惚言語錯亂喜怒不常有狂之意而不

似狂之甚狂者暴病癰則久病也宜星香散加

石菖蒲人參各半錢加竹瀝薑汁下壽星丸或

以瓜蒂散湧去痰

一僧病狂不睡孫兆以酒一角調藥一服即熟

睡而安衆人知安神矣而不能使神昏得睡乃

靈苑辰砂散也方用硃砂壹兩酸棗仁炒伍錢

乳香光明者伍錢隨量用酒調作一眼酒能皆

入神故用調藥

癰瘰癧結心下涎包絡心竅用四川五加皮
金七兩明礬叁兩經末薄荷九桐子大每服伍
陸拾丸白湯下極効

一妓心癰狂歌痛哭裸裎妄罵瞪視默然詠之
沉璧而結曰得之憂憤沉鬱食與痰交積胃中
湧之皆積痰暴血乃清上膈而愈

藥院使法治狂用辰砂妙香散加金箔珍珠末
經青州白丸末濃薑湯調下吞十四友丸消石
六一湯加珍珠末調下

治法彙七卷四 癰瘰
診癰脉多弦滑者有神可治○無胃氣色天凶
琥珀壽星丸

天南星 壹斤 掘坑深貳尺用炭火伍斤於
坑內燒熱紅去炭掃淨用好酒壹升虎之將
南星燂熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一
夜取出再焙乾爲末

琥珀 四兩另 硃砂 壹兩研飛以壹
兩爲末

右和猪心血叁個薑汁打糊爲丸桐子大每
伍拾丸煎人參湯空心送下

交感丹 見癰門 補心丹 見虛損 安神丸 見內傷

瀉青丸 門 見頭痛

十四友丸 補虛不足益血收斂心氣治怔忡

不寧精神昏憤睡臥不安

栢子仁 遠志 酸棗仁 紫石英 明亮

熟地黃 當歸 白茯苓 茯神 阿膠

人參 黃耆 肉桂 龍腦 硃砂

研二 錢半

右爲末密丸桐子大每服用棗湯送下

治法彙二卷二 癰瘰

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂言妄語心神不

安

腦子 另研 牛黃 另研 硃砂 另研 各壹錢

大黃 生用 壹兩

右末研勻每服叁錢涼生薑蜜水調下

葶藶苦酒湯 治痰狂煩躁面赤咽痛

苦酒 壹升 葶藶 壹兩 生艾汁 無生艾以熱

右煎作叁服

導赤散 見發熱

星香丸 治諸急嗽生痰

南星 半夏各參兩用白礬壹兩入水同

陳皮伍兩未過一週 香附子參兩皂角

時膠乾

右肆味俱不見火碾為細末薑汁煮麩糊和

丸如桐子大每服伍拾丸食遠淡生薑湯下

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜

多盜汗常服補益氣血安鎮心神

山藥五斤 茯苓去皮 茯神去皮 遠志去心

黃芪各壹兩 人參 桔梗去甘 甘草炙各半

木香錢貳 辰砂參錢 麝香壹錢另

右為細末每服貳錢不拘時溫酒調下

星香散

南星 八錢 廣木香 一錢

共末每服四錢加薑煎服

楊氏五癩丸 治癩癧潮發不問新久

白附子半兩 半夏二兩 天南星薑製

皂角二兩 槐花半斤 槐汁去粗與白

白礬生 烏蛇酒浸各 全蝎炒二錢

蜈蚣半條 白僵蠶炒一兩 麝香參半

硃砂二錢半 雄黃一錢

右為細末生薑汁煮麩糊為丸如梧桐子大

每服三十丸溫生薑湯送下食後服

犀角丸治風癩癧發作有時揚手擲足口吐

痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩 赤石脂三兩 朴硝二兩

白僵蠶一兩 薄荷葉一兩

右為末麩糊丸如梧子大每服二三十丸溫

水下日三服不拘時如覺痰多即減數忌油

膩炙燂

參硃丸 治風癩大有神効

人參 蛤粉 硃砂各等分

右為細末豬心血為丸如梧子大每服三

十丸金銀煎湯下食遠服

抱龍丸 見小兒門

瘧

身如角弓反張四肢強直不柔曰瘧暴起屬痰火病後必是血虛以血少不能養筋而然

丹溪曰大率與癰相似瘧為虛切不可作風治而純用風藥多屬氣血虛有火有痰宜補兼降火參芪芎歸竹瀝之類

薛氏曰大凡病一切虛弱用參朮濃煎佐薑汁竹瀝時時啜之不應十全大補加附子

又曰昔之所謂剛柔二瘧者當以虛實論之是

治法彙七卷瘧

一五

也一屬外感一屬內傷屬外感者為剛瘧宜用麻黃葛根湯括蕒桂枝小續命湯在裏者大承氣之類○屬內傷者為柔瘧宜用補中益氣湯八物四物之類如以風濕二事分剛柔恐悞今以虛實分治其理照然無疑矣

常見瘧病多起于產後及傷寒汗下後氣血大虧不能榮筋筋強而然須十全大補少佐附子以行參芪之氣補衛引歸地之性補榮妙甚古方重外感故用續命等藥今人稟受不同故爾

妊娠瘧有初起心肝風熱盛者鉤藤湯肝脾血

虛者加味逍遙散肝脾鬱結加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲二陳加竹瀝薑汁

當歸補血湯治一切去血過多因無血養筋令人四肢攣急口噤如瘧

黃芪兩三錢當歸酒五錢防風羌活各一錢

荆芥穗半錢甘草半錢水煎服

防風當歸散治發汗過多發熱頭暈口噤背

反張能去風養血

治法彙七卷瘧

一五

防風 當歸 川芎 生地各二錢半

作一劑水煎服

一方治少年痘瘡屬後或瘧口噤不開四肢強直時遶臍痛一陣則冷汗如雨痛定汗止脉急強緊如直弦先因勞倦傷血瘡後血愈虛而又感風寒當用溫藥養血辛甘散風歸芍為君川芎青皮鉉籐為臣白木甘草為佐桂枝木香黃連為使加紅花少許水煎服愈

若肝氣盛而發熱脉弦者小柴胡○發熱用逍

通散○若中氣不足補中益氣加芍藥湯
脾家鬱結歸脾湯加香附

活人舉鄉鼓拜散 治新產血虛發瘧汗後中
風亦然

荊芥穗不拘多少微炒爲末每服三五錢外
以大豆黃卷以熱酒沃之去黃用汁調下其
効如神

仲景法病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面
赤獨慄卒口噤背反張者瘧病也 傷寒太陽

治法彙七卷

瘧

重感寒濕則病瘧○無汗曰剛瘧有汗曰柔瘧
剛瘧無汗麻黃葛根湯○柔瘧有汗不惡寒桂
枝瓜薑湯○太陽病無汗而小便多少氣上冲
胸口噤不開欲作瘧活人用葛根湯夫既小便
少而氣上冲此必挾虛症參脈症可也

一婦年三十餘身材小瘦弱月經數日後忽發
瘧口噤手足攣縮角弓反張予知其去血過多
風邪乘虛而入用四物湯加防風羌活荊芥少
加附子行經二貼病減六貼全安

亡血及產後瘡家發瘧自屬血虛

薛氏曰產後病後瘧由亡血過多筋無所養與
傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄變瘧皆敗症也
急以十全大補湯如不應急加附子亦有六淫
七情所致者

紫蘇飲

見氣門

麻黃葛根湯

大承氣湯

小柴胡湯

桂枝瓜薑湯

俱見傷寒

小續命湯

見中風門

八物四物四君

十全大補湯

見虛損

痺

筋骨、肉、皮五者受邪痺而不仁、體虛之人、為風寒濕三氣所傷、留著于身、寒多則痺、濕多則引注、濕多則重著、隨所苦而用藥、與痛風癢厥、腎著門參看、防風湯、治風氣勝者、為行痺上、下行走、掣痛者是、

防風 甘草 當歸 赤茯苓 杏仁去皮炒熱

黃芩 秦艽 葛根 羌活 桂枝

茯苓湯 治寒氣勝為痛痺、腫痛拘攣無汗、

治法彙七卷痺

赤茯苓 桑皮 防風 官桂 川芎

芍藥 麻黃 薑棗煎服

茯苓川芎湯 治濕氣勝者、為著痺、四肢重著、

流注于經、拘攣浮腫、

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂川芎

麻黃 芍藥 當歸各等分 甘草炙

棗三枚、溫服、欲出汗、以溫粥投之、

升麻湯 治濕痺、肌肉熱極、體上如鼠走、唇口

反縱、皮色變赤、諸風熱皆治、

升麻 茯苓 人參 防風 犀角

羌羊角俱銹 羌活 官桂

薑一塊、煎成、加竹瀝溫服、

五痺湯 治三氣客于肌體、手足緩弱、痺痛不

仁、

片子薑黃 羌活 白朮 防已 甘草

薑七片、煎八分、病在上、食後、在下、食前、熱服、

茯苓湯 治多飲停蓄、手足麻痺、多睡、眩暈、即

二陳湯加枳實、桔梗、

治法彙七卷痺

羌活湯 治白虎歷節風毒攻注、骨節疼痛、發

作不定、

羌活 附子炮去皮 秦艽 桂心 木香

川芎 當歸 牛膝酒浸 甘草炙 防風

桃仁去皮尖 骨碎補

石咬咀、薑五片、煎七分、溫服、

虎骨散 治白虎肢節痛、發則痛不可忍、

虎骨酥炙 甘草 全蝎去毒各 麝香一分

天麻 防風 牛膝 蠶蚕 當歸酒洗

乳香研桂心二兩 白花蛇酒浸取肉二兩

右為末每服三錢豆淋酒下

續斷丸 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 川續斷 草薢各一兩 川芎七錢

乳香兩半 天麻 防風 附子各一兩

沒藥五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服四十九溫酒下

按濕熱燒火鬱成血于經絡四肢麻痺或痛或

痒輕而新者可以緩治久而重者必加川烏附

治法彙七卷 癰風 聖

子驅逐痰濕壯氣引經斷不可少大便阻滯必

用大黃昧者畏其峻多致狐疑不知邪毒流滿

經絡非烏附豈能散結燥熱結滯腸胃非大黃

豈能潤燥要在合宜耳

大抵五痺拘攣腫痛治法與癰風同有餘則發

散攻邪不足則補養氣血不痛但麻痺不仁與

痿厥分痰火氣血同所以丹溪略而不言以設

于癰風門也

癰風

薛新甫曰大抵此證多由勞傷氣血腠理不密

或醉飽房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣

相搏濕熱相火血隨火化而致故准楊閩廣間

多患之眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在

肝脚底先痛或穿者毒在腎偏身如癰者毒在

脾目先損者毒在心此五臟受病之重者也一

曰皮先麻木不仁二曰肉先針刺不痛三曰血

先爛潰四曰筋先脂脫五曰骨先鼻柱壞此五

治法彙七卷 癰風 聖

臟受傷不可治也若聲啞目盲尤為難治治當

辨本證兼證變證類證陰陽虛實而斟酌焉若

妄投燥熱之劑膿水淋漓則肝血愈燥風熱愈

熾腎水愈枯相火愈旺反成壞矣

活法機要云先樺皮散從少至多服五七日灸

承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二

聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年病愈此先

治其衛後治其榮也試效方治段庫使用補氣

瀉榮湯此治榮多于治衛也丹溪云須分在上

在下在上者以醉僂散取臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虻蟲於穀道中出所出雖有上下道路之異然皆不外於陽明一經而已看其死瘡上先見在上體多者病在上也下先見在下體多者病在下也上下同得者病在上復在下也再造散治其病在陰者用皂角刺出風毒於榮血中肝主血惡血留止屬肝也蟲亦生於厥陰風木所化必用是治其臟氣殺蟲為主以大黃引入腸胃榮血之分利

治法彙七卷

癰風

一百五

出瘀血蟲物醉僂散治其病在陽者用鼠粘子出風毒遍身惡瘡胡麻逐風補肺潤皮膚藜蘆主惡血身體風痒通鼻氣防風治諸風括簍根治瘀血消熱肝腫枸杞消風熱散瘡毒蔓荊子主賊風苦參治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫八味藥治功固至矣然必銀粉爲使銀粉乃是下膈通大腸之要劑所以用其驅諸藥入陽明經開其風熱佛鬱痞隔逐出惡風臭物之毒殺所生之蟲循經上行至牙齒頓薄之分而出

其臭毒之涎水服此藥若有傷於齒則以黃泥汗揩之或先固濟以解銀粉之毒銀粉在醉僂散有奪旗斬將之功逐成此方之妙用非他方可企及故丹溪取二方分用之如破敵之先鋒至於餘邪未除者但調和榮衛藥中少加驅逐劑爾

本證治法

癰瘍所患非止一臟然其氣血無

有弗傷兼證無有弗雜况積歲而發現於外須分經絡之上下病勢之虛實不可槩施攻毒之

治法彙七卷

癰風

一百五

藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡可也癰瘍當知有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一蓋兼證當審輕重變證當察先後類證當詳真僞而汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之源委而施治焉蓋虛者形氣虛也實者病氣實而形氣則虛也癰瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千針蓋以砭血不如發汗之周徧也然發汗卽出血出血卽發汗二者一律若惡血凝滯在肌

表經絡者宜汗宜刺取委中出血則效若惡毒
蘊結於臟非蕩滌其內則不能瘥若毒在外者
非砭刺偏身患處及兩臂腿腕兩手足指縫各
出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非外砭
內泄其毒決不能退若上體患多宜用醉僊散
取其內蓄惡血于齒縫中出及刺手指縫并臂
腕以去肌表毒血下體患多宜用再造散令惡
血陳蟲于穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一
二日更刺之以血赤爲度如有寒熱頭疼等證

治法彙七卷

癰風

耳七

當大補血氣癰瘍服輕粉之劑若腹痛去後
兼有膿穢之物不可用藥止之若口舌腫痛穢
水時流作渴發熱喜冷此爲上焦熱毒宜用瀉
黃散若寒熱往來宜用小柴胡湯加知母若口
齒縫出血發熱而大便秘結此爲熱毒內淫宜
用黃連解毒湯若大便調和用濟生犀角地黃
湯若穢水雖盡口舌不愈或發熱作渴而不飲
冷此爲虛熱也宜用七味白朮散癰瘍手足
或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛虧損氣血

當用加味逍遙散加生地黃及換肌散煎服
癰瘍生蟲者五方風邪翕合相火制金木盛所
化肉食五臟而證見于外也宜用升麻湯送瀉
青丸或樺皮散以清肝肺之邪外灸承漿以疏
陽明任脉則風熱息而蟲不生矣肝經虛熱者
佐以加味逍遙散六味地黃丸

一貧婦無雜食用醉僊法外又服百餘貼加減
四物湯半年之上月經行十分安愈

加減大造苦參丸治大風瘡及諸瘡赤白癰

治法彙七卷

癰風

耳八

風

苦參一斤白芷兩胡麻半炒防風半荆芥

蒼耳子兩皂角刺各十蔓荊子半牛旁子

黃荊子兩枸杞子兩何首烏兩禹餘糧

蛇床子各三

右爲細末皂角搗爛熬膏和丸桐子大每服

五十丸茶下

醉僊散須量人大小虛實用之症候重而急
者須先以再造散下之候補得氣壯乃投此

藥須斷厚味鹽醋椒果煎炒燒炙等物止可
淡物淡粥及煮淡熟菜茄子亦忌或烏梢蛇
花蛇以淡酒煮熟食之以助藥力也

胡麻子 牛旁子 蔓荊子 枸杞子四味
俱妙黑色 白蒺藜 瓜蒌根 苦參
各一兩 防風 各五錢

右為細末每一兩入輕粉一錢伴勻每服一
錢茶清調晨午夕各一服服後五七日先
於牙縫內出臭涎渾身痛昏痛悶如醉後
治法彙七卷 癰風 夏元

利下惡物臭積為效

通天再造散

鬱金半兩 皂角刺一兩獨生者去尖 大黃炒一兩
白丑頭末六錢半半生半熟

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調面
東服之當日必利下惡物或臭膿或蟲如
蟲口黑色乃是年深者赤色是近日者數
日後進一服無蟲積乃止

愈風丹 治腐疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡

效 疥皮膚癢癰疔之成瘡及一切疥癬風積

苦參一斤切取 土壘蛇一條酒浸 烏梢蛇
頭末四兩 白花蛇如一條

右為末先以皂角一斤剉碎無灰酒浸一宿
去酒以新汲水揉取濃汁去渣銀石器內
熬膏和前丸桐子大每服六七十丸煎防
風通聖散下以粥壓之虛者煎玉屏風散
下日三服三日一浴以大汗出為應三浴
乃安
治法彙七卷 癰風 夏元

浴法

用桃柳桑槐楮五枝濃煎湯大缸坐沒頸一日
湯如油為効

又法紫背浮萍煎湯浸妙

方荊芥大黃梔子鬱金地黃杜仲防風二活
白蒺藜等分為末以大楓油入熟蜜丸桐子大
每服茶清下四五十丸一日二服須守戒三五
年日誦觀音千萬聲以攝其心禁忌乃安

法參五斤、好酒三斗、漬一月、每服一
服常與不絕、覺脾既安、為末服之、亦良、治
癰疹、陶隱居、以酒浸飲、治惡瘡、久服輕身、日華
子以為殺蟲、本草除伏熱、養肝膽氣、予嘗以蒼
耳葉為君、以此物為佐、更以酒煮烏蠱魚代蛇
細研糊丸、桐子大、每服五六十丸、加至七八十
丸、熱茶清下、日三服、一二月而安、入紫萍尤捷
紫萍多水蛭、須寒月於山沼取之、淨洗去泥、略
蒸透乾用、

治法彙七卷 癰風

頁二

一法治手指攣曲、節間痛甚、至漸落、用葶麻子
去殼、黃連挫如豌豆大、各一兩、水一升、小瓶浸
春夏三、秋冬五日、取麻脈破平、且面東以浸藥
水服一粒、漸加至四五粒、微利不妨、忌猪肉魚
腥、宜茹淡、累驗、已上皆丹溪法、
一法先服防風通聖散、大瀉惡毒穢積、又用三
稜針看肉黑處、及委中紫脈、刺出死血、不可令
出太多、恐損真氣、後服神僊紫花丸、

防風

五錢 連翹 五錢

川芎

五錢

白芍

當歸 酒浸各 薄荷 二錢 荆芥穗 五錢 麻黃 三錢
湯 梔子 三錢 桔梗 五錢 枳殼 五錢 炒石膏 五錢
甘草 滑石 黃芩 各三錢 柴胡 五錢
黃連 五錢 黃柏 三錢 生地 三錢 熟地 三錢 半
羌活 五錢 芒硝 一兩 錦紋大黃 兩 皂角刺 一兩
者去 尖
細切、分八服、每服用水碗半、煎至一碗、空
心服、日進二服、五六日、又進二服、待補養
完、又行二次、然後服後丸、

治法彙七卷 癰風

頁二

神僊紫花丸

治癰風及諸般惡瘡、風瘡甚効、

如神、但要藥真、無不効者、

白花蛇 一具、真斷州者、去頭尾、各四五寸、

何首烏 荆芥穗 葳靈僊 各四錢

麻黃 一錢 胡麻子 一錢 蛇床子 二錢

右六味、同蛇用無灰酒一大碗、浸一宿、去蛇

床子、通晒乾、仍入原酒內、再浸再晒、酒盡

為度、晒乾、極細為末、另包、

木香

沉香

各二錢

人參

一兩

當歸

七錢

胡麻

猪牙皂角

各五錢

麝香錢半鼻塞

沒藥

各一明雄黃

辰砂

各五分

大肉

荳蔻

各一錢

定風草

二錢

還瞳子

即草

大明

右麝並雄黃五味另研極細不見火其餘藥

另研為末合一處另包

防風

去蘆

羌活

甘草

細辛

蒼朮

泔浸

川芎

獨活

白芍

枇杷葉

去節

焙乾

白蒺藜

金銀花

五加皮

香白芷

苦參

各五錢

胡麻子

白附子

米泔

麻黃

治法

卷七

太癰風

真

真

真

真

川牛膝

草烏頭

米泔

川烏頭

同上

同上

同上

同上

石菖蒲

各二錢半

右為末另包

總合法用大楓子三斤新鮮者發油黃色不用

去殼以磁罐一個盛之入無灰酒以皮紙箬

葉重重封固勿令氣泄頻滾湯中勿令沒確

口外以盆覆鍋文武火蒸黑爛為度杵成泥

分作三分每一分入第二號藥八錢第一號

藥六錢第三號藥一兩五錢和勻加糯米飯

搗極膠粘丸如桐子大曬乾勿見火每服二

十九漸加至五六十粒雞鳴時午餉臨臥各

一服茶清送下忌房勞鹹酸酒醋醃糟猪羊

雞魚驢馬肉煎炒水果五辛薑椒大料辛辣

熱物若麥菹豆之類若不忘口斷慾則藥無

功雖愈再發其餘肉味病愈後一年可食但

猪羊雞肉終身忌用此法乃治癰之神方也

不可輕忽

風起于八方應其時則物生違其時則殺物人

治法

卷七

太癰風

真

真

真

真

之稟受有殺氣者則感而受之如持虛受物後

又因起居飲食男女游成鬱氣二氣聚于厥躬

脾先受之則為濕病濕病之久火氣出焉火氣

滋漫氣濁血汚伏鬱生蟲以次傳歷臟腑必灰

之病而有可救之理其始病者胃氣微傷脾主

肌肉流行甚緩傳變以漸尚可藉藥之功而免

謂之必死非惟醫不知藥悉是不知禁忌可哀

也夫近見粗工用藥佐以大楓子油殊不知此

藥熟有燥痰之功而傷血病未痊而先失明也

宋洞虛大風有五不治餘皆可救黑色多凶蟲
食肝肩落食肺鼻崩聲啞食心足底穿膝腫食
腎耳鳴啞耳弦生瘡或痺或痛如針刺狀食
身則皮痒如蟲行白頭面來為順風自足心起
者為逆風由濕熱之毒汚結而成先以再造散
下之稀粥調理勿妄動作勞後以醉仙散中間
或吐或利不必怕怯但服喉頭面腫腫吞不得
下涎出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得
或悶絕欲歿難以飲食只以稀粥用匙灌入或
治法彙七卷 癰風 耳聾

散 一句或半月一月面漸白而安重者再與換肌

換肌散 治大風年深不愈者以致眉毛脫落
鼻梁崩壞服此不驗月驗

黑花蛇 白花蛇 皆斬黃米者俱酒浸一宿去頭尾 地龍

去土各 當歸 細辛 白芷 各二兩 天麻

蔓荆子 葳靈僊 荆芥穗 甘菊花

苦參 紫參 沙參 木賊 不灰木

炙甘草 白蒺藜 天門冬 定風草

何首烏 石菖蒲 胡麻子 炒 赤芍

草烏頭 去皮 蒼朮 米泔浸 川芎 木鱉子肉

各一兩

右為細末每服五錢溫酒調下

一法用白花蛇一條先蒸糯米一斗缸底先放
麴次將蛇以絹袋盛之放麴上後鋪飯在袋上
用紙封缸口候三七開取酒澄淨罈中將蛇去
骨焙乾為末每服溫酒一盞蛇末少許服之仍
以酒脚等糟做餅食之

治法彙七卷 癰風 耳聾

蒼耳草 苦參治大風之熱有效

用蒼耳草于五月五日六月六日五更時帶

露採搗汁熬膏作錠子取一斤半重鯉魚一

尾剖開連肚腸入藥在內以線縫之用酒二

碗浸火煮乾為度令患人吃盡魚不過四五

尾即愈忌鹽百日

輕者疎風解熱二聖散佳

大黃 五錢 皂角刺 三錢

先將皂角刺一二個燒灰研細用大黃半兩

煎湯調下二錢早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

栢葉湯 用東南枝上栢葉一秤水一桶煎三

沸去查甕盛旋熬垂沙調服 初服甚苦澁

三五日後甜十日四肢沉重便赤白痢一月

後發出瘡疔瘡破用烏龍散搽之

烏龍散

烏龍尾 即制市 烏鷄子皮

樺皮散 治肺壅風遍身癢疹

治法藥七卷

癩風

百七

荆芥穗 兩二 枳殼 兩二 樺皮 各四兩 甘草 各半兩

杏仁 研一兩去皮尖水煮另

右爲末每服二錢食後溫酒調下

凌霄散 治癩風神效

蟬殼 炒 地龍 炒 殭蚕 全蝎各七個炒

凌霄花 兩半

右爲末每服二錢熱酒調下無時於浴室中

蹲藥湯中一時詐服藥妙

祛風丸 治疥久成癩

黃耆 枳殼 防風 芍藥 甘草

熟地 地骨皮 枸杞子 生地

右九味爲末煉蜜爲丸桐子大白湯下五十

丸

神珍方

嫩蒼耳荷葉各等分爲末每服二錢溫酒

下本草云治風熱大效

風癢癰疹身癢不止蒼耳莖葉子等分爲末每

服二錢豆淋酒下

治法藥七卷

癩風

百八

眉落且痒或周身痒乃血熱之極宜出血毒去

後補氣瀉榮湯

大風神方

苦參 三斤 羌活 獨活各四兩 當歸 半斤 白芷

白欬 白蒺藜各四兩 皂角 刺熾灰存性半斤

天花粉 何首烏 兩四 共爲末聽用

另以皂角五斤切碎溫水浸五日去查砂鍋

熬成膏和上九桐子大每百丸空心酒下

補氣瀉榮湯

補氣瀉榮東垣治癰之妙旨也。衛氣虛邪襲故用參耆甘草以補氣。榮血壞而為癰故蟲水蛭桃仁蘇木以消癰。全蝎地龍引諸至風濕結聚之處。內有麝取其利開竅升麻連翹桔梗取其入氣而解其熱。空入臟而清其氣。歸地入血而調新。若胡桐淚者性能除大熱又能殺蟲癰除頑腫。

消風散 第一日服

治法彙七卷 癰風 百一

香白芷 全蝎 人參 各一兩

右為細末先一日午時吃蔬粥忌薑蒜辛熱

晚間不用飲食次日空心溫酒調下覺身

漸潰為妙

追風散 第二日服瀉毒血追蟲積

大黃錦紋者佳 八兩 鬱金小者 八錢

皂角刺 兩

右為末初服六錢或七錢大楓油錢半淨朴

硝少許入內好酒一碗調化空心溫服至

待晨時又如前調一服入熟蜜少許勿令患人知先以水與患人盥漱淨然後服藥必以蜜解口忌人不可與患者同坐臥良久腹中痛為妙候瀉十數次以薄粥補之中年以後不治少壯者可治體實者十日三服初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸弱者十日內一次弱者十日內三次須記定日數不可漏

治法彙七卷 癰風 百一

磨風丸 第三日服日進二次

川當歸 羌活 獨活 川芎 天麻

細辛 防風 荆芥 威靈仙 麻黃

何首烏 石京子 牛旁子 車前子

雞面草 印地 蒼耳子 各一兩

共為末酒煮面糊丸桐子大每服三十九食

前溫酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮 荆芥 苦參 細辛 各四兩

水煎先薰後洗遍身出血為效

宜浸洗良久乃佳

藥 第四日治瘡大爛遍身塗之

黑狗脊二兩若無以杜仲代之 硫黃

寒水石 白礬 各二兩 蛇床子 兩 朴硝 少許

右為細末猪脂油或香油調敷不爛不必敷

治法 二卷 風

百三

厥症

世以卒然昏不省人事為厥方書以手足冷為厥不可不辨

有陽厥陰厥氣厥痰厥

熱厥素有積熱或酒客輩或傷寒過經不解熱

極忽時昏目手足逆冷脉沉數有力為陽厥

卒連二陳白虎解毒湯下症者大柴承氣增

損用之厥深熱亦深厥微熱亦微

寒厥內有伏陰或過食冷物或食後着寒或吐

治法 卷二 厥症

百三

或瀉面青白手足逆冷上過乎肘下過乎膝

或昏冒不知人脉沉遲無力乃陰經自中寒

邪為陰厥當從陰治理中五積薑附等審輕

重用

氣厥脉沉或弦口中吐沫或時氣急為氣厥乃

暴怒所致審明用藥烏藥順氣木香流氣加

減挾痰加痰藥

痰厥脉沉滑忽然昏倒體肥素有痰火不因暴

怒為痰厥即類中風也二陳導痰加竹瀝薑

汁有火加解毒一二味、

痰涎壅盛必吐之稀涎散或碧霞散揀上好石
綠研細水飛再研取二三錢同水片三四豆許
研勻以鮮薄荷汁合溫酒調下不大嘔吐但口
角涎氣出自醒、若見虛症遺尿自汗不可吐
連服治、

活人書曰陽厥脉滑而沉、陰厥脉沉而細欲
伏、

丹溪曰厥因氣虛者多、氣虛脉細微或氣口反
治法彙七卷厥症

薑

大血虛脉芤大如葱管熱厥脉數外感脉浮而
實有痰者脉必弦滑熱用承氣解毒痰用白朮
竹瀝外感宜解散藥中加薑汁、

活人書云初病身熱頭痛稍久大便秘小便澀
或畏熱喜冷水或揚手擲足煩躁不得寧謐語
昏憤而厥此陽厥也大小承氣大柴胡看微甚
而下之煩渴舌燥白虎湯、

手足厥逆脉乍伏結若心下煩滿饑不欲食瓜
蒂散吐之、

寒熱而厥面色不澤胃味兩手忽無脉或一手
無脉必是有正汗也多用綿衣包手足服五苓
子湯或兼與桂枝麻黃各半湯須更大汗而解
傷寒咳逆心下怔忡而厥宜先治水茯苓甘草
湯主之、

如得病後四肢厥冷脉沉而細手足攣而惡寒
引衣蓋覆不欲水或下利清穀而厥逆者陰也
四逆湯白通湯厥逆脉不至者通脉四逆湯

手足指頭微寒者謂之清、理中湯無熱症而厥
治法彙七卷厥症

百苗

當歸四逆湯加茱萸生薑喘促脉伏而厥五味
子湯吐利手足厥冷煩躁欲飲莫茱萸湯
一種尸厥即中惡之候因觸犯不正之氣忽然

手足厥冷肌膚粟起頭面有黑精神不守或錯
言妄語牙關緊急或昏不知人頭面旋倒此是
卒厥客忤飛尸鬼擊凡吊死問喪入廟登塚爲
陰邪所逼多有此病急以蘇合丸灌之稍醒却
投調氣散和平胃散服秦承祖灸鬼法妙
曉厥是吐出曉鬼胃中有寒則曉上入膈宜理

中湯加烏梅、川椒、蛇胆、酸則靜、見苦則下、
有內傷、食填太陰、往往痛而吐、蛇、濕中、
爲主、詳見食門

厥逆、因飲食醉飽之後、或感風寒、或着氣、
而得、飲食填塞、胃氣不行、乃致卒然昏迷、須先
以鹽薑湯吐之、一吐便醒、後投以和中理氣化
痰藥、若誤作中風治、禍不旋踵

諸中、或醒或未醒、或初病、或久病、忽吐出紫紅
色者、或

治諸藥七卷

百五

厥症

要

口開手撒等五臟絕症、已見一二、不全見者、速
煎參芪膏、灸臍下、亦有得生者、

調氣散

白豆蔻 丁香 檀香 木香 藿香

甘草 各錢八錢 砂仁 錢四

右末每服二錢入鹽少許沸湯調下

五味子湯 治陰厥脉伏、手足逆冷、脉微欲絕、
氣虛之症、

五味子 一人參 麥門冬 杏仁

陳皮 各五錢

右薑一片棗一枚煎服、卽生脉散加陳皮、杏
仁

茯苓甘草湯 治陽厥怔忡、手足冷、心下水氣

茯苓 桂枝 各錢一 甘草 錢一

生薑三片溫服

通脉四逆湯 治陰厥下利清穀、四肢逆冷、心

下有水氣

甘草 六錢 附子 大者一兩 乾薑 一兩

治諸藥七卷

厥症

要

若面赤加蔥九莖、嘔加生薑、咽痛加桔梗、瀉
止、脉不出、加人參、

凡用此丸治卒厥、不省人事、未定風痰氣厥、
先與此藥開竅極妙、

每用一丸以湯調下、灌之、卽醒、醒後審脉察
症用藥、

蘇合香丸 張三錫曰、此丸開竅却痰、一切氣
滯、有餘痰、火急驚初起、用之、無不獲効、虛人
候用立危、

白朮 青木香 烏犀角 香附 硃砂

白檀 訶黎勒 安息香 另研無灰酒

沉香 麝香 蘇合油 入安息內

薰陸香 藁撥 龍腦 各

右末等分入香膏加煉蜜丸桐子大井花水

下等分丸或總作一丸蠟包收之

莫柴通 治陰厥吐瀉煩躁欲臥

莫柴莫 生薑 各五錢 人參 二錢半

棗三枚煎服

治法彙七卷 厥症

丹溪曰熱厥四肢煩熱蓋濕熱鬱於脾土之中

冷東垣升陽散火湯火鬱湯之類

寒厥手足逆冷者多是氣血兩虛補氣血藥中

加附子

飲酒人或肥人手足熱者濕痰鬱火盛也二陳

加芩連梔子之類若忽然手足逆冷卒厥不知

人者多屬痰火亦有陰先虧而陽亢暴熱者宜

多用參膏點竹瀝薑汁與之人瘦弱者雖無痰

火必盛竹瀝最妙以性能養血清金降火

傳心方云男女涎潮於心卒然中倒當即扶入

暖室中扶策正坐當面作好醋炭燻之令醋氣

衝入鼻良久其涎潮於心者自下輕者即時醒

重者亦知人事唯不可灌一點湯水入喉也灌

則涎永繫於心包絡不能去必成廢人

初厥用生半夏末吹鼻或細辛皂角石菖蒲末

吹入鼻取嚏有嚏可治此可以驗其死生及受

病深淺也

脈浮而滑沉而滑微而虛皆虛與痰

治法彙七卷 厥症

大小承氣湯 大柴胡湯

白虎湯 白通湯

四逆湯 理中湯

薑附湯 俱見寒門 稀涎散 見中風門

蘇合丸 見脾胃門 平胃散 見脾胃門

順氣散 見氣門

筋病

張三錫曰經云肝主筋又云諸筋者皆屬于節且人之屈伸動履皆筋使然是知手足攣拘屈而不能伸者病在筋竊常論之筋體堅硬藉血液滋養乃得柔和少壯之與老年筋力可見矣氣虛血弱之人或大病後汗下傷津筋失所養則強瘁或身如角弓變為瘁症有火燔之則痛不可忍夜益甚所以霍亂吐瀉多轉筋者津液暴傷筋燥而然方書謂風動肝熱則轉筋恐未治法藥七卷筋病

重刊

盡病情也大抵四肢拘攣掣痛上下相引皆筋病體肥白責之濕痰傷筋黑瘦人責之血液枯涸宜分兩途老年不能行行則掣痛名筋枯不治

轉筋平人忽然轉筋屬血熱宜用丹溪法四物加黃芩紅花南星蒼木尺脉大而黑瘦大便難者滋陰為主四物加生地二門知母黃柏牛膝木瓜肥白脉沉滑多濕痰者方可加二陳蒼木南星秦艽等燥濕痰藥

有轉筋于足大指上至大腿近腰結了乃痰太過厚味釀成濕熱為寒所鬱而然須加蒼木酒芩紅花南星薑煎服

中年病後產婦足上腰膝筋掣痛均屬血虛四物加牛膝二門知母黃柏木瓜氣虛人脈緩弱加參耆誤認作風濕用辛散藥痛愈甚

夏月或寒月醉飽過度上吐下瀉而筋轉者從霍亂治以渴與不渴分陰陽大法胃苓湯加木瓜妙詳見霍亂門

治法藥七卷筋病

重刊

丹溪法治轉筋入腹痛不可忍麥草煎湯浸若倉卒不可得急煎滾湯泡盪湯浸之

外臺方用綿浸醋中煮熱用包病人脚頻易即止轉筋及攣松節二兩剉豆大乳香一錢同入銀石器中炒令焦止留一分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜湯下但是筋病皆治經曰酸走筋筋病人母多食酸又曰多食辛則筋急而爪枯以燥金剋木也久行傷筋忌之筋攣用酒煮木瓜爛研成粥用裹筋急處冷

嘈雜噯氣

似饑不饑似飽不飽胃中懊懣不定是名嘈雜
良由七情傷脾厚味助火胃中津液不清鬱而
成痰所致其症或兼噯氣或兼痞滿或兼惡心
漸至胃脘作疼甚則為翻胃膈噎皆痰火之為
患也脾傷是本痰火是標治法南星半夏之類
以消其痰芩連炒梔子石膏知母之類以降其
火二朮白芍之類以健脾行濕壯其本元更宜
慎口節慾

治法彙七卷

不

百

中脘有飲則嘈有宿食則酸故常噯宿腐氣逆
噯酸水亦有每晨吐清酸水數口日間無事者
有膈間常如酸蟄皆中宮不清所致平胃散越
鞠加減或咽醋丸

兩寸脉弦滑胃中有留飲

寸口脉橫者膈上有橫積也

右關脉弦急甚者木乘土位欲作翻胃難治

丹溪曰此為食鬱有熱炒梔子薑炒黃連乃必
用之藥也

又曰胃中有痰膈上有痰則噯氣此可論初起
實人久之必是脾陰受虧

肥人宜二陳加撫芎二朮炒梔子

婦人痛此多是鬱悵二陳越鞠加薑炒黃連

濕痰為病脉弦滑者古方用三補丸倍蒼朮香

附不若導痰加二朮香附海石炒連作丸服妙

脛肢身倦息者六君子加越鞠出入之

有用消冠藥過多飽不欲食精神減少四君子

加白芍陳皮薑汁炒黃連

治法彙七卷

不

百

心懸如饑飲食之時且毋與只服三聖丸佳

心下膈雜導飲丸佳

三聖丹 治平時嘈雜效

白朮 兩黃連 錢橘紅 兩

神麴糊丸菜豆大每服伍拾丸津液下

大凡中膈有病惡心欲吐者即宜探吐最妙

方書謂膈雜是肺受火尅不能平水木挾相火

鬱于中焦而然似太鑿且嘈得食暫減墜下其

痰也故治方以補脾為主兼舒鬱化痰若過

寒涼則脾胃復傷變脹滿噎等症矣

腎肝陰虛不能納氣歸元而作噯氣痞滿脉必
濡弱服補中益氣藥不効者四物加沙仁益智
或八味丸

薛氏醫案載壹儒四時喜極熱飲食或吞酸噯
腐或大便不實足指縫濕癢此脾氣虛寒下陷
用六君子加薑桂治之而愈稍為失宜前症復
舉前劑更加附子錢許數服永不發

咽醋丸

治法卷七 雜

吳茱萸 去枝梗 陳皮 去黃芩 炒

蒼朮 炒 黃連 壹兩 細切用陳壁 泥同炒

右為細末神麵糊丸桐子大

胃風

因飲食訖乘風涼而致其症脹滿食飲不下形
瘦腹大惡風頭汗悶塞不通或頭面腫起右關
脉弦而緩帶浮胃風湯主之

胃風湯 治胃經受風麻木肌肉與目蠕動面
腫或牙關緊急

白芷 二分 升麻 二錢 葛根 一錢 蒼朮 一錢 柴胡

甘草 半錢 藁本 羌活 黃柏 草豆蔻

各三 麻黃 半錢 不去 蔓荊子 三分 歸身 一錢

治法卷七 胃風 二百四

薑三片棗三枚煎八分熱服

胃風湯 治風冷入于腸胃泄下鮮血或腸胃

濕毒下如豆汁或瘀血

人參 茯苓 川芎 當歸 桂 白朮

白芍 各等分

加粟米和粒同煎腹痛加水香

脛痛不能任地屬陰虛滋陰降火大補丸
物加知母黃柏牛膝杜仲之類

陽虛脉沉弱或虛大兩足浮腫或大便瀉小水
短少而痛不能動屬命門火衰陽虛之症補
中益氣加桂附

下部道遠非烏附不能達元濕熱濁痰鬱久固
非尋常二妙等所可治者如舟車丸捉虎丹趨
丹當用必用要在用之當耳虛者必加桂附

痛丸 治脚氣上攻兩脚痛不可忍

白耳遂 白芥子 炒 大戟 白麩 各二兩

右滴水捏作餅子瓦上焙黃碾碎作末醋煮
糊丸菴豆大冷酒下十九粒利則止

濕熱腫痛二便阻塞勢盛者大黃左經湯利之
或羌活導滯湯服後用拈痛湯以散病根

羌活 獨活 當歸 大黃 枳實防已

水煎服

一人體瘦質弱性復嗜酒致腰及兩脛痛不可
忍作腎虛治不應予診之左氣者加芍藥乃血

原缺

耳

耳聾耳鳴有痰有火有氣虛有陰虛有肝火

少壯悉屬痰火中年必是陰虛

陰虛兩尺脉大或左脉虛大體瘦色黑棘見口

乾腸燥而耳鳴或聾者手足心必熱屬陰虛六

味丸坎離主之

氣閉耳聾者惱而成通氣散効茴香木香人參

玄胡索陳皮菖蒲各一錢羌活殭蚕川芎蟬腿

各五分穿山甲二錢甘草錢半細末每服三錢

酒法藥入卷耳

溫酒調下

肝火左脉弦急而數屬肝火其人必多怒耳鳴

或聾宜平肝伐木龍膽瀉肝湯不已龍薈丸見

門

痰火右關脉滑而數屬痰火鬱于上焦宜清痰

降火二陳酒芩連柴胡枳殼或竹瀝薑汁下滾

痰丸佳見痰門

氣虛右脉大而無力或濡而細症兼倦怠口中

無味等內傷症者屬氣虛恒見勞碌之人或中

年病後得此宜加減益氣聰明湯

方用黃芪人參之甘溫治虛勞為君甘草之甘平承接和協升麻之苦平微寒行陽明太陰之經為臣葛根甘平蔓荊辛溫升發清氣為佐芍藥酸寒補中焦順血脉黃藥治腎水膀胱不足為使用酒製炒者固熱用也春夏火盛可倍加黃藥胃弱者去之或加白朮

風熱耳根連牙床腫痛屬上焦風熱陽明少陽

二經受病清胃兼辛涼散之升柴芷翹荊防薄荷

治法彙入卷八耳

二

荷甘桔枳殼酒芩連玄參花粉赤芍鼠粘生地

等頻頻緩服勢盛加蒸大黃腫已消但出水膿

不止用紅末子吹之耳門瘡用粘子湯佳

耳中忽大痛如有蟲在內奔走或血出或水或

乾痛不可忍用蛇退燒存性以鷺翎管吹入耳

中立止

大病後及勞碌耳聾或鳴當作虛治須分氣血

一補陰一益氣

虛耳出膿汁或蟬而鳴屬上焦風熱蔓荊子散

佳方用蔓荊生地赤芍甘菊桑皮木通麥冬升

麻前胡炙甘草赤茯苓薑棗煎服

耳鳴聾皆是陰虛火動滋腎丸虎潛丸或滋陰

百補丸俱好

肝火脉弦而濡或數其人多飲屬肝經風熱木

香檳榔丸

耳聾以萊菔烏頭尖大黃三味為末津調貼湧

泉穴以引火下行惟濁氣閉竅者宜之

一方治耳痛以白礬枯吹入耳中及青礬燒灰

治法彙入卷八耳

三

吹之妙

一方治耳痛停耳用桑螵蛸炙黃為末加麝少

許吹入耳中極妙或胭脂胚子蛀竹末加麝少

許吹妙

耳根連及項或腫多在左邊脉弦數屬肝火恒

見于婦女宜平肝降火兼舒鬱柴胡青皮香附

撫芎梔子酒芩連歸芍貝母連翹玄參主之

若腫而發寒熱有表症者荊防敗毒散之

耳下結久硬且脹着惱便甚屬鬱越

凍耳用椒攪核燒灰清油調傅雀腦亦可

又法凍耳瘡用栢葉三兩微焙末杏仁四十九枚湯浸去皮研膏亂髮鷄子大食鹽乳香各半兩細研黃蠟兩半先煎油令沸乃下髮以消盡為度次下諸藥令焦濾淨以慢火煎後下乳香黃蠟等攪勻每以鷺羽塗之

因害耳膿血結韌成核塞耳用生豬脂地龍金下墨研細以葱汁和捏如棗核綿裹塞入耳令潤取之

治法彙入卷八

耳

耳聾多恐者屬肝虛四物加防風羌活柴胡葛蒲茯苓服二十餘貼却以杜壬薑竭散開之

停耳

羅謙甫曰耳者宗脉之所聚腎氣之所通勞傷氣血熱氣乘虛入于其經隨鬱而成膿汁故謂之停耳也內服柴胡聰耳湯通氣散蔓荊子散外用紅綿散等吹藥如壯盛之人積熱上攻耳中出膿水不瘥用無憂散下雄黃丸瀉三四行妙耳瘡同法

耳瘡丸

白枯礬

五錢 麝香 八分 胭脂 二分 陳皮 五分

先用綿枝子纏去膿多用綿裹藥作丸塞入

耳中

通靈丸 治暴聾

松香

巴豆 二十粒 為末

右將松香溶化下巴豆末葱汁丸蓮子大用

綿裹塞過夜左聾塞右右塞左俱聾俱塞

耳通氣散

治法彙入卷八

耳

郁李仁

去皮 各五錢 人參 各五錢 大黃 山芋

官桂

檳榔 三枚 牡丹皮 細辛 去苗 各二錢 木香

炙甘草

各二錢

右末每服一錢空心溫酒下

丹溪方治耳濕腫屬上焦風熱涼膈散加酒炒

大黃酒炒枯荅荊防羌活服之酒客耳聾耳鳴

俱効外以腦多麝少加枯礬吹耳中

犀角飲子 治風熱上壅兩耳聾閉門外腫痛

及膿水流出

犀角 菖蒲 木通 玄參 赤小豆

赤芍 甘菊 花一名一 甘草 五錢

每四錢生薑三片煎服

耳瘡

薛新甫耳瘡屬少陽三焦經或足厥陰肝血虛風熱或肝燥生風或腎經風火若發熱癰腫屬少陽厥陰風熱用柴胡梔子散內熱痒痛屬二經血虛當歸川芎散若寒熱作痛屬肝經風熱小柴胡加山梔川芎若兼內熱口乾屬腎經虛治法彙入卷八耳

火加味地黃丸不應八味丸

婦女多左聾以忿怒勝也

男子多右聾以色慾勝也

左耳聾屬少陽火龍奮九主之

右耳聾屬太陽膀胱六味九主之

俱聾屬陽明通聖散滾痰九主之

三錫曰耳鳴耳聾須分新久虛實忽因大怒大醉而聾或鳴者屬痰火分輕重治中年及體虛或病後有此悉屬虛但分氣血耳古方有用鼠

脂猪尿凌霄花杆汁等滴耳者有用杏仁去皮加鹽蒸熟捻油滴者有用單麻子去皮加棗子一個同搗加乳汁和丸綿裹塞耳者有用蒜瓣挽空納已豆炮熟綿裹塞耳者有用雄黃巴豆末葱涎和錠捲紙塞耳者有用蜀椒巴豆菖蒲松脂以蠟溶作筒子塞耳者有用細辛蒲黃麴末杏仁和丸塞耳者有加龍腦椒目者無非辛散結潤透竅有餘暴起者或可取効若元氣不足腎陰虧損虛火挾痰泛上閉住其竅而聾鳴者雖日滴時塞如蟻撼石終莫能動須大補氣血滋陰制火使大氣上行充塞乎頭則九竅通利聾暗咸除難經曰腎氣通于耳耳和則知五音矣腎氣不得通于耳則耳不和而聾得上通于耳則耳和而聰觀此則虛實判然矣一法石蒼蒲削方條一頭插耳中一頭着艾灸之通氣最妙又法用生烏頭鮮者瀝得乘濕削棗大塞耳日夜一易又法取磁石能吸鉄者豆大川山甲燒存性爲末一

治法彙入卷八耳

內如風雨聲佳，又法甘草甘遂各半寸，寒下將甘草嚼之，皆暴起外截法。

紅綿散 治停耳出膿

白礬 錢 胭脂 胚

右研勻，先取膿淨，吹藥入耳，或即以綿纏藥送入。

壯盛者，病耳膿用通聖散一二服佳，外以枯白

礬吹之，日三次妙。

白蓮散 吹耳

治法 卷八 耳

白礬 烏賊 骨 黃連 龍骨 各一

右搗末，綿裹塞耳中，日三易之。

麝香散 治耳膿

桑螵蛸 一個 火炙 麝 另

右為末，研均，搽耳如有膿，先擦淨。

又方：五倍子焙乾，一兩全蜎燒灰，存性，三分為

末，吹之，膿即乾。丹溪方用貝母為末，擦亦妙。又

方：馬黃散、馬齒莧、黃柏研末，吹妙。大都內宜服

去風熱藥，或外用滑石、石膏、花粉、防風各一兩。

腦子少許，研末吹耳，膿不止，陳橘皮燈上燒灰為末，麝少許，研勻，展淨吹俱佳。

薑蜎散

乾蜎 四十九粒，用糯米半升同炒，再用薑

為細末，向晚勿食酒，調作一服，至二更以來，漸盡量飲，五更聞百十擗，至響便自出。

千金方

芎藭子二升，碎之，浸酒一斗，七日任飲。

蟲入耳

治法 卷八 耳

蟲入耳，丹溪方用椒末一錢，醋半盞，浸良久，少

少滴耳中，蟲自出。

又方：桃葉搗爛，塞耳，蟲自出。

百蟲入耳，麻油灌耳，即出生，慈生薑汁俱可。

諸般惡蟲入耳，搗韭汁灌之。

諸蟲及虱入耳，白膠香燒薰耳，令耳孔暖，自出。

一人臭蟲入耳，痛不可忍，將生薑擦貓鼻，其尿

自出，取滴耳中，隨愈。用麻油滴亦可，不如貓尿

之速也。

蠶入耳最害人速用皂角子研末調生鱉血灌入耳即出

蟻入耳以大韭搗汁灌耳妙又方以川山甲燒灰以水濾過滴入耳中妙

一說蜈蚣及蟻入耳用猪脂一指大炙香塞耳中或耳邊置雞猪膽蟲聞即出料鷄枕耳睡妙蜈蚣入耳礪砂膽礬等分研細鷺翎管吹入耳中蟲化為水

飛蟲入耳用好米醋滴入耳內蟲必出不出者用法藥八卷耳

亦曾有人被焦蟲入耳其蟲口硬如鉄用此滴之蟲灰而出一法用鷺管極氣吸之出或擊銅器于耳邊即出

治蟬蛭入耳用半夏生為末麻油調塗耳門蟲聞即出一方用羊乳灌入即成水牛酪亦効如入腹即飲酪二碗自消為水

治耳中有物不出以細麻繩剪令頭散蘸好膠入耳內物上粘之徐徐引出

治水入耳以薄荷汁點之立効

耳痒

聖惠方曰一人耳痒一旦作可畏直挑出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透水丹勿飲酒啖肉淡滋味一月佳又一人目赤黑珠傍暗赤成瘡耳中痒作腎臟風治用四生散每作二三服即愈時稱為聖散

薛新甫曰聾鳴脉滴數黑瘦人屬血虛四物加

山梔柴胡若右寸關大于左無力倦怠色黃白

屬中氣虛補中益氣加減若血氣俱虛八珍湯

治法藥八卷耳

十一

加柴胡若怒便聾或鳴屬肝膽濁氣小柴胡加

芍歸山梔虛用八珍湯加山梔○若午前甚者

陽氣實熱也小柴胡加黃連山梔若中氣虛亦

上半日劇補中益氣加柴胡梔子○午後甚者

陰虛也四物白朮茯苓○若腎虛火動痰盛作

渴者地黃丸胃中空宗脉虛上氣不足參芪為

君升麻佐之○耳中聞聞然無陰也又液脫

者腦髓消耳數鳴地黃丸○腎虛耳中潮聲蟬

聲無休止時妨害聽聞者當墜氣補腎正元飲

點錫丹間進安腎丸有熱者龍齒散○

風耳鳴夜間如打鼓聲四肢抽掣痛耳內覺有風吹奇痒宜黃芪丸

柴胡聰明湯 治耳中乾耳鳴致聾方用柴

胡三錢連翹四錢當歸人參炙甘草各一錢

水蛭五分炒蝨蟲三個去翅足研末麝少許

除水蛭三味另研外水二盞薑一片煎一盞

下三味再煎一二沸服

柴胡梔子散 治上焦風熱及少陽經火耳內

治法彙編卷八

十一

作痒生瘡出水痛或胸乳間痛寒熱往來方

用柴胡炒梔子丹皮茯苓芍藥白芍牛旁子

甘草白朮煎服

當歸川芎散 治少陽經血虛瘡毒或風熱上

攻耳內痒痛或頭目不清寒熱少食或婦女

經水不調胸膈不利痞滿芍藥白芍柴胡白

朮炒梔子丹皮茯苓蔓荊甘草隨症加減

安腎丸 見喘門 黑錫丹 見喘門 八味丸 見虛損

加味地黃丸即六味丸加柴胡五味子

目病

三錫曰目病悉屬火熱世俗之論也須分

虛實痰鬱氣滯脾胃相火或散或降或開

養榮或滋腎壯水或益氣開痰初無一定方難

執一味者不察一槩施治寒涼傷其脾胃辛熱

耗其神明氣血愈虧火邪愈熾卒至盲瞽良可

太息間有業是科者久眼亦知補養多用地黃

滋陰果陰虛相火盛者固多利益倘中焦氣虛

而有痰因痰生火為目患者服之寧不泥膈增

治法彙編卷八

十二

病耶諺曰眼不醫不瞎此言雖淺實為妄藥者

之戒謹將今古眼科諸書鈎其玄微參以脉症

縷析如左願與無盲于心者同治盲焉

暴發赤腫頭面發熱或時作寒脉浮弦者屬上

焦風熱辛涼散之羌活荆芥升麻白芷薄荷酒

苓枳桔甘草一二服加降火藥酒連梔子連翹

赤芍歸尾白睛紅加豆蔻少許

已經發散而腫痛不減脉弦數者為血熱壅痛

宜涼血降火生地涼血為君赤芍歸尾川芎利

血爲臣酒苓連龍膽草降火爲佐荆防羌活甘
桔薄荷爲使

洗暴發赤腫杏仁去皮四箇歸尾赤芍各一錢
防風黃連五分水半鍾加人乳半盃蒸洗

洗爛眼眶用銅青皮硝淨醃當歸黃連杏仁各
等分如上洗點

年壯氣實之人或酒客膏粱輩積熱上攻于目
痛不可忍連及頭者脉必實數有力涼膈散易
酒蒸大黃瀉之

治法彙編卷八

目病

體厚人發散降火久不愈胸膈痞悶食少倦怠
者右寸關脉必沉而滑當從痰治二陳二木枳
實爲君少佐苓連間投小胃丹或滾痰丸胸坎
一開火自降而明矣

見痰門

目昏赤服涼藥不已心下及兩脇脹悶脉沉而
弦者屬氣鬱肝傷宜舒鬱和肝香附撫芎青皮
柴胡梔子歸芍脉數實有力者當歸龍薈九佳

見痛門

婦人久鬱內脹昏暗者益氣養榮湯妙甚須多

目赤或痛脉數而細澀屬血虛有火宜
火四物易生地加玄參蔓荊連翹苓連稍
當滋陰益腎坎離丸或六味地黃丸俱宜

虛火盛日久病多飲童便爲上
色白體倦怠目昏懶睡食少心下不和脉緩
大無力屬脾胃弱而火盛宜補中益氣湯
加黃荊子玄參中年病後兼耳鳴多眵者益氣

治法彙編卷八

目病

聰明湯

見耳門

目昧不明河間悉主于熱固是的論但未分熱
之虛實爾法曰玄府者萬物盡有乃大氣升降
出入之門戶道路也眼耳鼻舌神識能爲用清
明者其神全也血氣者之神神衰則清明減而
獨火炎上火與元氣不兩立火既熾則玄府塞
故曰攻耳斯曠攻目斯曠而口鼻舌可類推矣
人病目久不能視涼藥盡試不應診之兩手
微熱命服八珍口麥冬一月如舊乃知飲食不

通肝胃枯滿髮落皮皺噎膈淋閉等症目昏耳聾悉由氣液血脈榮衛衰少不能升降出入虛火阻滯而然故玄府閉小濁火炎上則視昏花隔障視物之象也丹溪東垣治目昏用參芪補氣久眼靡不獲効以氣血旺則玄府得利片時清明乃後古方羊肝凡用羊肝引黃連等入解肝經諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則玄府通利而明矣故黃連之類解有餘之火鬱也椒目之類解濕鬱也芫蔚之類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也羌活荆防正辛之類解經鬱也磁石之類解頭目鬱墜邪氣使下降也蔓菁下氣通中皆治氣血鬱結目昏有餘之法

錫曰久病昏暗責于血少所謂目得血而能視也不知血不自生隨飲食化生脾胃一虛則納化艱而飲食少飲食既少是生化之源已泄血何自而旺目何得以養過服四物脾胃轉傷目愈昧矣治必先理脾胃脾胃一回飲食漸常甘美血自生而目有所得昏暗頓愈由根實葉茂

有茂血者木之津脉也神光者木之華葉也胃者木之根也推此則治病必求其本豈欺哉

外障

外障屬風熱上壅上下胞努肉培壙磨蕩其睛久之生翳蔽其精明障之命名以此當消風散熱外用點藥點之稍久當審氣血脾胃

内障

内障屬虛挾氣鬱黑水神光昏翳外似好眼而

治法彙入卷八目病

七

不能照物或外雖有翳膜不痛不痒惟不能睹須分氣血脾胃治左脉不足或瀉或細體羸色蒼是陰虛四物坎離為主右脉不足或虛大氣口大于左或緩或濡屬氣虛四君為主食少或不能運化當健脾和中枳朮九調中益氣湯選用兩尺洪盛或虛大棘頰赤盜汗憂遺者屬腎虛相火四物加知柏牡丹皮宜各加家菊蔓荆荆防升柴等佐使藥多鬱脉沉加香附撫芎見傷及脾胃

子散大風熱所為也火性散挾風益熾神光

須分虛實

酒惡酒之

子散大風熱所為也火性散挾風益熾神光
怯弱力不能支亦隨而散漫猶風起而水波也
亦有過服手散縱恣燂炙而致者皆當視其有
陰不足或除風降火或養血安神脉虛體薄必
於五味子以性寒體浮酸以收之也大法宜收
四物去川芎加苓連炙甘草五味子或六味地
黃丸加當歸味子大忌辛散丹溪芎藭俱禁况
他藥耶惟當歸辛而苦可用耳

丹溪曰諸經脉絡皆走于目而行空竅其清氣
散于目而為精走于耳而為聽若心事煩冗飲
食失節脾胃氣虧心火太甚脉沸騰邪害空竅
而失明矣况脾為諸陰之首目為血脉之宗脾
虛則五臟之精華皆為失所不理脾胃養神血
乃治標而不治本也薛氏醫案載張給事目赤
不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛此
因勞心過度飲食失節以補中益氣加茯神棗

仁山藥山茱五味頓愈又勞役復甚用十全大
補加前藥漸痊

一少年素嗜酒色兩目赤痛或作或止兩尺洪
大按之微弱余謂少年得此當失明翌早索途
而行不辨天日眾皆驚異余與六味丸料加門
冬五味數劑頓明

目分五臟

目之上下胞屬脾 銳眥屬膽與三焦

眥在內眥 眥在內眥 上網屬太陽膀胱小腸 下網屬

陽明胃大腸 黑精神光屬腎 白精屬肺

白睛變赤火乘肺也 目赤腫火乘脾也

黑水腎光被翳火乘肝與腎也

治翳當辨其起自何經及翳形何色各加引經

藥如東垣治一婦綠翳自下而上知其陽明來

也綠非五臟正色殆肺腎相合而為病耶乃就

畫家以墨調膩粉合成色諦視之與翳同肺腎

為病無疑乃瀉肺腎之邪乃以陽明藥為使既

効他日復病者三其所從來之經與翳色各異

曰此必經絡不調目病未已詢之果然用和血藥養陰藥作九服遂永不舉觀此則辨色分經詎可略哉

眼有宜出血而愈者即素問血實決之之義必起初血熱盛者在太陽陽明二經乃可以二經氣血俱多故耳他經出血其病轉劇故曰刺太陽陽明則目愈明刺少陽陽明則目愈昏近世有以草心于上下胞及兩眦打出血絲往往獲功即三稜針刺血之法惟可施之于有餘暴發治法彙入卷八目病

迎風流淚氣血虛而有火火得風而內灼則淚出所謂肝熱則出泣也四君審用或加家菊荆子肝火盛者以貝母大者一枚胡椒七粒研細臨臥點之內服當歸飲柴苓芍藥甘草大黃人參滑石當歸水煎服

東垣曰眼生倒睫拳毛者由目緊急皮縮之所致也蓋內伏火熱而攻陰氣外行當瀉其熱眼皮緩則眼毛立出翳膜亦退用手法攀出內臉

外速以三稜針出血以左手抓甲迎其針立愈又目睚歲久赤爛俗呼赤睛是也當以三稜針刺目眦以瀉濕熱而愈余按此二條乃急

則治其標也苟氣血不清火邪內熾精明失職則隨刺隨愈焉保其不發乎縱清上竇下養血滋陰目不輟口猶當清心寡慾遠風沙戒暴怒均勞逸一切膏粱酒麪悉屏除之內境得以清外竅自爽矣今人不知徒事醫藥不審虛實妄加治療又眯者日用鑷去倒毛毛出風入爛治法彙入卷八目病

赤滋甚猶拔草春園也殊可笑能遠視不能近視屬陰精不足而火盛老人桑榆之象能近視不能遠視屬陽氣不足而火盛一屬氣虛一屬血虛此東垣至論猶當以脉并所兼之症參之庶得肯綮

眼背初生小泡視其背上當有小紅點如瘡以針刺破眼即時瘥故名偷針余以為背皆俱屬太陽經刺背上乃所以瀉太陽經熱也不針眼背而針背偷針之義微矣

夏枯草治目珠痛至夜猶甚者神效蓋目
目係屬厥陰經夜甚及用苦寒藥點之反甚
夜與寒俱陰也夏枯草有補養厥陰血脉之功
能活血行氣故珠痛除眼科宜多畜焉一方用
童便製香附一分夏枯草三兩爲細末食遠茶
清下一錢

木賊能磨蕩器之不光者故用以磨翳蟬蜋蛇
蜋皆取退之義方書云人年五十膽汁減而目
不明余以爲五臟六腑之精華皆上注于目不
治法彙入卷八目病

特膽也得無精衰取

東垣治一人因用猪肉煎餅與醋蒜同食復大
醉臥熱坑中次日瞳子散大視物無的以小爲
大以長爲短卒然見非等之物行走踏空諸方
不應乃以酒芩連泄熱歸身地黃養血涼
血爲臣五味子酸寒體收瞳子散大人參甘草
地骨皮二門甘草枳殼苦甘補中爲佐柴胡引
經爲使頓愈

丹溪治一壯年人早起忽然視不見就睡片時

略見而不明食減倦甚脉緩入重則散而
意其中濕所致詢之果臥濕地半月遂以白朮
爲君黃芪陳皮爲臣附子爲使十貼愈且眼病
而用附子非微妙玄通者烏足以識此妙甚

又一老人忽盲他無所苦作大虛治之急煎人
參膏續續進垂愈一人予磁石藥先生曰今夜
成矣果然

一人形實好飲熱酒忽兩目盲脉滿乃熱酒傷
胃汚濁之血畜于內而然以蘇木作湯調人參
末服二日鼻及兩掌皆紫黑先生曰滯血行矣
以四物加蘇木桃仁紅花陳皮煎調人參末服
數日愈夫眼病因脉滿而知中有畜血精于脉
固可彷彿以四物加蘇木桃仁紅花猶或知之
至于畜血而用人參則非尋常可得而知者惟
丹溪知之且血畜于中則中和胃氣傷矣消痰
藥中佐以人參助正伐邪胃氣得以行畜血因
之而下至妙至神此丹溪所以爲醫聖也

一女年病目，每一月或二月一發，紅腫如此三年，服除風散熱藥，反生翳，從內走外者，少陽病，從下上者，陽明病，乃少陽陽明有積滯也。脈短而實，晨則似短，潔古曰：短為有積，滯抑遏臟腑，宜下之，遂用溫白丸，減川芎附子下之，加膽草黃連，如東垣五積法，從二九加起，每日加一丸，至大便利後減，又從二九起，忽一日于便中下黑血塊，如黑豆大，而堅硬，遂翳去。

治法廣人卷

目病

主中

目明

小兒目病同大人，惟劑差小耳。外有疳疾痘後，班疹餘毒，當別有法，不可不辨。

疳眼

小兒肥甘恣意，寒暑不適，生冷油膩，傷脾，糖粳熱物助火，因循積漸，釀成疳疾，渴而易饑，善食而瘦，髮豎下泄，腹脹鼻乾，作響聲，久久不治，脾弱肝強，肝火自燎，其竅遂成目青，多生翳膜，睫閉不能開，眵淚如糊，久而濃流，乃中州弱而

清陽不升，肝火盛而濁陰不降，所致當升清降濁，以白朮人參先補脾胃為君，柴胡枳殼輔上藥，理脾為臣，蒼朮茯苓澤瀉參濕降濁為佐，羌活蔓荊升麻川芎薄荷諸風藥勝濕為使，乃正治妙法。

雀目

雀目病，方書以為木生子亥旺于卯而絕于申，至酉戌之時，木氣衰甚，故不能睹。至于日出于卯之時，木氣稍盛，故復明。余以為目得血而能

治法廣人卷

目病

主中

視血虛肝失所養，則不能視。夜屬陰，人之血屬陰，陰主靜而惡躁擾，陰虛則火必盛，弱陰不能制強火，故夜轉劇，昏暗而不能睹。天明以陽用事，陽主動，火邪暫開，故稍明。故治必以養血為主，兼理脾胃，久之不治，漸至于盲。上說恐太遠，王節齋曰：眼赤腫痛，古方用藥內外不同，在內湯散，用苦寒辛涼之藥，以瀉其火，在外點洗，用辛熱辛涼之藥，以散其邪，故點藥莫要于冰片，而冰片大辛大熱，因其性辛甚，故借以緩其火。

邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或乾薑末或生薑汁點眼皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻于目故法先順其性而散之此用苦藥降之以治其本乃釜底抽薪也然火邪既客于目從內出外若外寒涼以阻逆之則鬱火內攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發之之義世人不知冰片為劫藥誤認為寒常用點眼遂致積熱入目昏暗障翳生又不知忌寒涼而妄將寒涼水物冷藥挹洗嘗致昏暗者比比皆是

主

勞役飲食不節內障昏暗蔓荆子湯妙參芪炙甘草酒白芍黃柏蔓荆子水煎服

眼痛用生地酒浸搗爛盒眼上又用草烏南星乾薑桂枝為末醋調貼兩足心時以牛膝膏洗眼

肥人風熱上壅眼目疼痛 防風 羌活

荆芥 酒芩 水煎服

瘦人目痛是血少兼熱須養血清上 四物易

生地加 荆防 參苓 家菊 水煎服

血熱壅痛脈數實有力者四物加草龍膽防已防風羌活一云實熱上衝眼痛用黃連瀉火當歸補血

黃連瀉火湯 治暴發赤腫疼痛

黃連 八分 黃芩 七分 生地 各一錢 升麻 五分

柴胡 七分 水煎服

洗肝散 治風熱上攻暴發赤腫隱澁難開

淚 薄荷 當歸 羌活 防風 各去 穗子仁

治法鼻入藥

甘草 大黃 川芎 各二兩

共為末每服二錢食後白湯下

決明散 治日夜則昏暗雖有燈月不能睹之精衰

石決明 二錢 夜明砂 同 猪肝一具 羯羊亦

可二味共為末以竹刀切肝為二片鋪藥

在中繫索勿令藥走泔水一大碗砂鍋煮

至小半碗連肝汁服之意謂決明鎮腎益

精夜明升陽明目肝與肝合方甚有理余

肝血加而用之可也

目昧不明河間一主于熱為熱氣鬱于玄府眼
耳鼻舌身神各失所司升降出入之機廢故視
不見也其理近是但有熱有虛實不可不辨初
起火盛氣濁鬱于上焦邪害孔竅宜散宜瀉是
實邪氣盛也久昏暗清氣不能上升九竅不利
虛火上攻耳鳴目暗宜補宜升是虛正氣奪也
内障先患一目次第相引兩目俱損者皆有翳
治法彙入卷八目病

三十八

在黑暗內遮瞳子按黑睛連目系屬足厥陰足
大陽手少陰三經此三經氣血虛則邪乘虛
入經脉鬱結從目系入黑暗內翳龍木論所謂
腦脂不清流下作翳即足太陽之邪也又云肝
氣上衝成翳即足厥陰之邪也故治法以針言
之則當取三經之腧穴如天柱風府太衝等穴
是也其有手巧心諦者能用針于黑睛裏撥其
翳取効尤捷以藥言之則當補中疎通此三經
之鬱結使濁氣不上攻更審虛實

論羚羊角散治圓翳內障不痛不痒

羚羊角三兩 細辛 知母 車前子 人參

黃芩各二兩 防風二兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分食後服

治肝散 治肝風內障不痛不痒眼見花發黃

白黑赤或一物二形

羚羊角 防風各三錢 羌活 車前一兩

人參 茯苓各一兩 細辛 玄參

黃芩炒各一兩 右為末食後米飲下一錢

治法彙入卷八目病

治綠風內障頭旋目痒眼內痛澀

者

羚羊角 防風 知母 人參 茯苓各二兩

玄參 黃芩 桔梗各一兩 細辛三兩

右為末每服一錢水煎服

治青風內障勞倦加昏重頭旋腦

痛眼內痛澀

羚羊角各一兩 車前子一兩 人參

羌活各一兩 地骨皮 玄參各一兩

右四方皆於羊角玄參細辛羌活防風車前
 若益氣行厥陰經藥丹溪曰羚羊入厥
 陰經甚也玄參細辛行少陰經藥也海
 藏云玄參治胸中氣氣之氣無根之火之聖
 藥羌活防風車前行太陽經藥也醫者宜辨
 其弱從何經來本經藥中加玄參等清解藥
 一升一降更審虛實如氣弱脈緩色黃白多
 肉人必主以參芪朮草如益氣聰明湯補中
 益氣湯相兼服之血虛脈滯蒼黑清瘦人必
 主以地黃丸補腎丸多鬱悶人更加夏枯草
 芫花子香附之類以舒鬱散結更內觀靜養
 不于塵累使陰氣平復藥乃有功
 世俗見久眼動輒用羚羊角若病不在厥陰經
 寧不引邪耶惟翳在黑珠者可用不則開門揖
 盜
 治目用黃連多矣而羊肝丸尤奇効用黃連木
 一兩白羊肝一具去膜同于砂盆內研令細衆
 手丸大每服三十丸溫水下送

者三料障翳青盲俱妙氣虛加參芪血虛加歸
 芍并加家菊
 又方治內障
 羯羊肝一具新熟地半兔絲子 麩仁
 車前子 麥冬 地膚子去 五味子
 澤瀉 防風 黃芩 白朮 桂心三錢
 杏仁炒 細辛 枸杞 蔚子 苦薺麋
 青箱子各一兩
 右為末煉蜜丸桐子大每服三四十九白湯
 送下日三服一人久病目方士為家肝俞
 遂失明服此良愈以餘藥予一盲者服一
 目覺燈下有一線亮如門縫中見火火早
 見翳膜俱烈如線又月餘明如初
 內經曰肝虛則目瞢瞢無所見耳汨汨無所聞
 善恐如人將捕之狀海藏曰目瞢肝氣不治也
 鎮肝明目羊肝丸主之
 羯羊肝一具新熟地半 甘菊 羌活
 柏子仁 細辛 官桂 白朮 五味子

各半 黃連 錢三

右為末煉蜜九桐子大空心食前白湯下三四十丸

補肝散 治肝虛失明

青羊肝 一具新九帶乾為極細末 蓼子 一合炒香

右為末食後服方寸七日二加至三錢不二料可夜讀細字

醫館錄云赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脉盛脾脉弱用涼藥治肝則脾愈虛暖藥燥脾則肝益

治法彙入卷八目病

五

感惟于平和藥中倍加肉桂殺肝而益脾一舉而兩得傳云木得桂而枯是也此與別錄治脇痛之義相符人所不知者

羊肝治目以肝補肝也看所挾而兼用藥本草云細辛益肝膽氣故往往須之第辛散惟少佐乃可如肝血不足必加四物或佐甘菊薤仁清

風熱

素問曰久視傷血肝主血血傷則肝失養而目昏治必補血安神

力過度則傷腎腎主臟精腎傷精耗不能

榮子目多昏暗瞳人失神而生翳當滋腎陰六

味地黃丸加五味當歸甘菊津液不足加二冬

玄參兩尺脉大相火盛者加黃柏知母兩尺沉

弱無火症者兼補右尺相火八味丸加兔絲枸

杞覆盆楮實車前菝葜隨病增損

左三部弦數有力或沉數內障不痛不痒或多

眵淚是肝火被鬱也當歸龍薈丸主之

蘆薈丸

治法彙入卷八目病

三

治黑水凝翳內障不痛不痒

蘆薈 甘草 人參 牛膽 栢子仁

細辛 各兩 羊肝 一斤

右為末煉蜜九桐子大空心茶下十九

堅翳丸 治握月翳棗花翳等病微有頭旋額

痛者

青魚膽 青羊膽 里魚膽 熊膽 牛膽

牛膽 錢五 麝 少許 石決明 兩

右為末麪糊九桐子大空心茶下十九

肝後方療目熱生翳並赤白膜取雀屎細直者
人乳和傳目上卽消

烏賊骨主目中浮翳細研和蜜點之又骨末治主
目中熱有效

膽熱多眵昏暗十月間牛膽浸槐子陰乾百日
每空心吞一粒

又能黑鬚髮草夾明性寒肝虛火盛目常病脉
弦數者宜之外方治失明取二升杵末食後粥

飲下一錢効又方補肝散用白瓜子七升絹袋
治法彙入卷八目病

葛湯中淖三次暴乾以酢五升浸一宿暴乾
爲末調下方寸七日三服可夜讀書按白瓜子

平寒酸人肝亦肝虛有火治法也

能遠視不能近視當補腎滋陰地芝丸或六味

地黃丸亦可

生地兩天門冬兩甘菊花兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服一百二十丸空

心鹽湯下

能近視不能遠視法當補心益氣定志充主之

右爲末煉蜜丸硃砂爲衣彈子大臨睡龍眼
湯化下

大法曰在睛則爲表當除風散熱卽暴發存臟
則爲裏當養血安神久眼有體肥濁氣感而生

痰生熱熱生風風熱上攻目昏澁槐子散主
之此由胸中濁氣上行也重則爲痰厥頭痛久

之能損目常使胸中氣滯自無此病有服涼藥
多損上焦氣目昏倦開者當補益養腎蒼黑瘦

人火盛腎水弱不能上榮于目駐景丸主之
人乳點眼久病昏暗極効以乳卽血變而成月

得血而能視也

槐子散治肥人胸中氣不清上攻頭目

槐子 黃芩 木賊 蒼朮

各等分爲細末臨睡茶清下

上膈痰涎壅盛痞悶上攻目宜茶調散吐之極

効
婦人血盛多鬱肝脉實數多目病宜瀉肝

聰明湯 治內障初起視物漸昏空中有

黑花神水亦淡綠色視一為二或神光變白

不足之病見耳門

退翳丸 治陽蹻邪內皆漸生赤脉縷縷

相生于肉肉生黃赤脂橫浸黑睛漸蝕神水

腎銳亦然俗名攀睛

當歸 川芎各一兩 家菊 荆子各二兩

蟬蛻錢五 蛇蛻錢三 蜜蒙花兩二 木賊草去節兩

治法彙人卷六目病

荆穗 地骨皮各一兩 楮實子 黃連各五錢

白蒺藜去刺炒兩 花粉六錢 甘草炙三錢 薄荷七錢

石煉蜜丸每兩作八丸食後臨睡細嚼茶清

下石為奇經陽蹻為病而設也難經曰陽

蹻脉者起于跟中循外踝上行入風府上

屬于腦故以川芎入腦以治風菊花荆穗

薄荷清上焦黃連降火二蠅木賊蜜蒙退

翳解熱楮實地骨利小便引火下行椒紅

利五臟明目當歸和血

象碧雲散 治腫脹紅赤昏暗隱澁難開

塞頭痛腦酸外翳攀睛淚稠粘

驚不食草錢二 青黛 川芎各一錢

右為細末先嚥水一口每用米許吹入鼻內

以淚出為度不拘時候此開鍋蓋法也當

令邪熱不壅結有出路然力小而銳嚙之

隨應須頻嚙之諸頭目病俱効

駐景丸 治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

車前炒兩 熟地 當歸各五兩 楮實

治法彙人卷六目病

川椒炒各兩 五味子 枸杞 兔絲子酒製半斤

共為細末蜜丸桐子大每服三十九空心酒

下

瑞竹四神丸枸杞揀淨分四分一分川椒一兩

同炒一分乳香苗香各一兩炒一分芝蔴一

合炒炒時先用好酒淘洗透各炒過去椒等

四味止用枸杞加熟地白水茯苓各一兩同

為細末煉蜜丸桐子大每服五七十九空心

溫酒下加甘菊一兩尤妙

風痰眼用九節黃連和槐樹皮燒灰鹿末熬湯
澄清洗眼或以人乳浸黃連洗亦妙

爛眼眶由上膈有積熱嗜酒多鬱人上焦氣不
清而成火火炎上薰蒸沿邊爛腫久生小蟲作
痒內服防風通聖散去硝黃細末酒拌晒乾依
法服之禁諸厚味料物外用紫金膏點之丹溪
方治爛眼二蚕沙用香油浸月餘重綿濾過點
之極効紫金膏飛過號丹蜜多水少以器貯點
之又方用青泥蛆淘淨晒乾末仰臥用一錢
油法藥八卷

入眼中少時去藥

盧甘石散 治爛風眼以盧甘石不拘多少先
用童便煅七次次用黃連濃煎汁煅七次次
用谷雨煎茶濃煎七次又併三汁餘者煅
三次乃放地一宿出火氣細研入冰片射香
點上神妙盧甘石煅時先用紫銷炭極大者
鑿一穴以安盧甘石

瑞竹堂用黃連歸芍薄荷防風蔓荊甘草各等

入煎中

夜光丸 治精衰眼昏

當歸酒洗全用遠志以甘草水牛膝去蘊淮

地骨皮酒洗去骨兔絲子酒洗去心熟地酒洗去心生地酒洗去心

枳殼去穢甘杞甘菊共為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心

鹽湯下食後溫酒臨睡茶清亦可

病目多淚與涕初起清者辛散之久而濁者兼

降是陽明少陽受病也

治法藥八卷

熟地黃丸 治氣血兩虛不能制火相火妄行

上攻于目瞳子散大視物昏花法當養血涼

血收神制火

熟地兩一甘草錢二歸身錢五柴胡錢八黃芩兩半

天門冬錢三地骨皮錢三人參錢二枳殼錢二

五味子錢三生地錢七黃連錢三

右為末煉蜜丸每服一百丸空心鹽湯下忌

辛味

方治爛眼眶

薄荷 荆芥 細辛

右爲粗末如香狀焚之以淨磁碗塗密少許
于內覆香烟盡刮取烟煤磁碗收貯風熱
多淚者皆可點之

目至春夏便發赤腫當舒鬱平肝酒苓童便製

蒼朮製香附各一兩南星黃川芎各半梔子膽草

各一兩陳皮連翹各半羅蔔子青黛各半柴胡錢

共末神麴糊丸服

拳毛倒睫

治法彙八卷 目病

木鱉子一個去殼爲末綿裹塞鼻中左塞

右右塞左一二夜其睫自分

一法摘去拳毛用虱子血點眼數次妙

點方 治火眼

臘月羊膽一枚以蜂蜜灌滿掛陰乾用時

取一粒磁器內水化開點之

二製黃連膏 治暴發赤腫眦粘澀

用雞爪黃連如連珠者不拘多少切碎洗淨

先將薑一大塊切作兩片挖空將連入薑內

紅棗去核將黃連盛入棗內少加礬末亦

可濕紙包裹慢火內煨熟待礬化取出黃連

浸入人乳內點妙不可言

綱目用丁香黃連人乳煎汁注之皆愈此得

辛散苦降乳汁養陰之妙

藥仁膏

藥仁淨仁一兩用紙裹筆管碾去油淨加白

硼砂一錢麝香三分同研極細末收入礬內

貯之專去翳障妙甚

治法彙八卷 目病

努肉攀睛

還睛散 治眼翳膜昏澀淚出瘀血努肉攀睛

川芎 膽草 草決明 石決明 荆芥

枳實 菊花 白茯苓 白蒺藜 麻子

甘草 木賊 川椒炒去子 仙靈脾 茵陳

共五錢 右爲末每服二錢食後茶清下

治卒患赤目努肉作痛取好消梨一個搗汁黃

連三錢碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中

努肉礪睛用礬石最白者納一黍米大千
及努肉上卽冷淚出綿拭之令惡汁盡努翳
退

千金方 治目中急肉翳閉瞳子及生珠管

貝齒七枚燒末真珠分等

共研絕細點翳肉上五六度瘡

夜光膏 治遠年目病昏暗翳膜須用臘月開
日合

白沙蜜四兩白色佳隔年慈一枝去鬚皮切段與蜜同熬去白沫以慈軟爲

治法彙入卷八目病

度以綿濾去渣冷定用黃丹蜜陀僧各

錢研俱水紙干上面收去浮蠟甘石童便淬過者五錢水飛研

赤芍飛過者杏仁湯泡去當歸各三錢川芎五錢

川黃連去蘆頭秦皮淨二兩防風錢訶子皮

石膏 玄精石 井泉石 無名異

玄參 黛赭石 石決明已上十五味各

同慢火熬濃汁二三次去渣將藥蜜一乳香

沒藥 琥珀 硃砂另研麝仁紙搥去油已

錢前四味先研細將麝仁水飛一同研細
方入前紫金藥內同復熬一二沸以藥

滴水中不散爲度人抵不可過與不及取
土中埋七日斷磁器中入後細藥四味各
錢麝分五南硼砂 珍珠 龍腦 珊瑚枝
右五味研細亦以桃柳枝攪勻傾入藥中復
攪勻收確中點眼

飛絲入目用頭垢點入眼內卽出

又方用柘樹漿點了綿裹筋頭蘸水繳拭涎毒

又方用火麻子一合杵碎井水一碗浸攪將膏

浸水中涎沫自流出茄子葉亦可

并溪治飛絲入眼眼腫如珠痛澁難開鼻流清

治法彙入卷八目病

涕用京墨濃磨以新筆塗目中閉目少時以手

掌開其絲自成一塊在白眼上却用綿輕輕惹

下未淨再塗風濕將絲偶然入目內作痛若輕細絲水中之絲是驚風

治眯目鹽與豉置水中浸之視水其塵卽出

稻芒入眼取蟬螬以新布覆目上待蟬螬從布

上行摩之其芒自出

塵物眯眼新筆塗墨自出

視岐亂見

邪中于精則視岐魄散神狂則亂見一驅邪一

安神

諸翳

圓翳

初患時見蠅飛花發垂蟻薄煙輕霧先患
看則少陰滑翳如木翳如油點浮水中陽
看則多陰滑翳如木翳如油點浮水中陽
上細看橫翳橫如劍脊兩邊薄中央厚
方見橫翳宜針于中央厚處撥之

已上五翳皆先患一目向後俱損初患之時

其眼痛澁頭旋額痛雖有形俱難下針獨便

月翳巢花翳黑水凝翳微有頭旋額痛者宜

輕針撥之

治法集人卷八

水翳

初患時頭旋額痛如骨鼻頰骨痛目內赤
過經絡針其翳穴忌月翳初患時微有頭旋
出血外以針撥之

第相牽其翳一處厚一處薄一處花翳初患時微有頭
處薄宜先從厚處撥之

時去其翳先患一處而後俱翳過如翳中時
散翳翳如酥點乍青所過之經針灸其翳

翳凝結驚振翳二三年成翳色白先患之眼不
不定必治牽振後

雖不痛不痺其翳或黃或紅翳狀破散者中
心濃重者俱不宜針撥撥之不動者名翳

心濃重者俱不宜針撥撥之不動者名翳

忌撥獨黃心翳宜先服藥後針之若無翳者
名風赤不宜針

白翳黃心

初患時見蠅飛花發垂蟻薄煙輕霧先患
之若先患一眼烏風無翳但瞳人小三五年內
失治兩目俱損烏風無翳但瞳人小三五年內

宜補肝風無翳但瞳人小三五年內
二眼同患急宜五風變初患時頭旋額痛或一
補治切忌房勞五風變初患時頭旋額痛或一

白如霜子綠風紅或黑黑花青風加重
花見青

已上五風初患時頭旋額角連眼臉眉及鼻

治法集人卷八

目病

額骨痛眼內痛澁先患一眼向後俱損無翳

雷頭風變目次第相牽似損瞳人或先患一
脂結

雀目

蛤粉丸治雀目日落不見物因濕痰在胃中
者

蛤粉研黃蠟各等

右溶蠟搜粉丸棗大每用猪肝一片二兩許
此開藥一丸水線入內水煮熟乘

此開藥一丸水線入內水煮熟乘

此開藥一丸水線入內水煮熟乘

此開藥一丸水線入內水煮熟乘

熱薰目至溫吃肝以愈為度

千金方

地膚子五錢決明子一升

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十九

至三十九至愈止

又法用蒼朮四兩米泔水浸一宿切作片焙乾

為末每服三錢猪肝二兩批開膠末在內用茶

繫定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟薰眼候

連肝服

治法彙八卷目病

治雀目不計時用蒼朮一兩為細末每服一錢

米飲下

小兒雀目屬肝脾二經脾弱者健脾肝虛者養

血宜分兩途飲食面色如常但夜不能見物者

還明飲妙大人亦佳

夜明沙 井泉沙 穀精草 蛤粉各等分

右為末煎黃蠟丸雞豆大三歲一九猪肝一

片切開置藥在內麻扎緊沙瓶中煮熟先

薰後服連肝食

小兒通用甜物口裏牙痛腫氣口脉洪數

胃火瀉黃散妙

小兒肝經濕熱內甚上攻于目眼眵腹脹九味

蘆薈丸妙兼脾虛痿黃瘦弱不食者間肥兒丸

煎來陰弱有相火症者心虛少與六味地黃丸

說見家居醫錄

九味蘆薈丸 治三焦及肝膽經風熱目生雲

翳或癰癰耳內生瘡寒熱作痛或肌燥消瘦

發熱作渴飲食少思肚腹不調或肝脾口內

生瘡牙齦潰爛或牙齒頹落頰頰腐爛食少

下部生瘡

蘆薈五錢胡黃連 當歸 芍藥 川芎

龍膽草酒炒黃芩酒炒木香 甘草炙各五錢

右為末茯神打糊丸麻子大每服五七十丸

滾湯下

肥兒丸 治食積發熱眼目生翳

黃連炒 蕪荑炒 神麴炒 麥芽炒

右另末等分水丸量兒大小加減

海藏云東垣治班後風熱餘毒翳膜氣障遮睛以瀉青丸治之大効保命集云退翳膜妙不特班後減大黃服余以爲肝經久蘊風熱乃生翳膜瀉青丸正所以拔病根也

小兒班疹後毒上攻于目翳膜腫痛脉實強壯能食者羚羊角散加減以解之氣血虛而胃弱者須以補養爲先而佐以解毒斯得之矣丹溪曰犀角性升散較諸角猶甚痘後有餘毒者用之如無餘毒虛虛之禍如指諸掌眼醫不可不知

治法彙編卷八

目病

痘瘡入眼白睛赤者決明散清之不赤但翳膜睛暗蜜蒙散妙翳膜不去通聖散蛤粉散俱佳或加二蛻

決明散

決明子

赤芍

各錢半 甘草一錢

共爲末每服一錢蜜湯調下

蜜蒙散

治小兒痘疹及諸毒入眼

蜜蒙花

錢半 青廬子 錢一 決明子 車前子 各五分

右爲末羊肝一片破開摻藥在內合緊濕紙數重包裹灰火中煨熟空心食之

通聖散 治小兒瘡痘入眼及生翳膜

白菊花 一兩 葇荳皮 一兩 穀精草 一兩

共末三歲一錢乾柿一個生粟米泔一盞同煮泔盡去藥食柿不拘時日用二三個近者五七日遠者半個月佳

蛤粉散 治小兒瘡痘入目

穀精草 蛤粉

治法彙編卷八

目病

右爲末三歲一錢猪肝一兩批開摻藥在內以竹葉包裹線束定水一盞煮熟入確內薰眼至溫取食之

二粉散 治小兒班瘡入目

輕粉 五分 粉霜 一分

右研勻結裏如患左睛塞左耳內右同之左右俱患俱塞眼即開得瘡亦隨愈

二病

三凡內有熱則口苦須分虛實外感寒邪內傷飲食俱口苦乃邪氣實也久病虛熱或勞碌太過相火上炎亦口苦正氣虛也故丹溪以理中湯治口瘡服涼藥不効者為中氣虛而不制游行之火常遵用罔不獲効甚者加附子或翁官桂亦可

寸洪數心熱口苦 寸浮數肺熱口辛 弦

數而虛膽虛口苦 洪數而實肝熱口酸

治法彙編卷八

口病

關沉實脾胃有實熱口甜 兼洪數者口瘡

或為重舌木舌脉虛者中氣不足

丹溪曰脾熱口甘三黃丸此指實火而言若

脉弦滑兼膈雜屬痰火滾痰丸妙

口瘡多涎屬脾熱

平人口甜或渴或小便亦甜而濁俱屬津液不

足陽盛陰虛久之必發癰疽須斷厚味氣惱酒

麪每日服八味丸可保無虞

膽熱口苦謀慮不決所致小柴胡加麥冬酸棗

仁地骨皮遠志隨症加減河間益膽湯治謀慮

不決肝膽氣上溢而口苦者神効用人參炙甘

草黃芩各一錢茯苓神苦參各七分遠志一錢官

桂半分乃從治虛火法也

實火口瘡舌裂涼膈散妙脉數實有力者是

西瓜水亦妙無則燒瓜皮灰傳之

肝膽有實熱口酸苦小柴胡加甘草青皮之類

甚者當歸龍薈丸

謀慮不決肝膽虛而口苦小柴胡人參遠志茯

治法彙編卷八

口病

神甘草為君柴胡膽草為佐甚者錢氏地黃丸

乃虛則補其母也

口淡屬胃熱亦有虛實病後自是胃虛參朮為

主

膀胱移熱于小腸腸不便上為口糜生瘡潰

爛心胃壅熱水穀不化此條出素問東垣有柴

胡地骨皮湯云治此大便實者加硝黃世未知

用姑俟來者飲酒多此易老用五苓導赤相合

服之

胡氏方、用好墨研、螻蛄極細、傳之立効、按此勝、脫移熱于小腸之正治也、螻蛄專走水道、有餘者、宜虛人戒之、

口瘡甚者、含焰硝、研砂、勿開口、外用南星末醋調貼足心湧泉穴、以引熱下行、

又方五倍子一兩、黃柏蜜炙、滑石各半兩、銅絲半兩、麝香爲末、搽之、一法五倍子煎湯漱、或加白礬膽礬、

治唇緊裂生瘡、用青皮燒灰、傳之立愈、又方

治法、藥入卷、口瘡

手一

以皮紙紙燃、于刀上薰、取瀝傳妙、口糜破、野

薔薇根煎漱之、

口瘡不愈、枯礬、黃丹妙、塩霜梅燒存性、各

一錢、人中白錢半、麝少許、研極細、搽之、甚者加

研砂半錢、片腦一分、

赴筵散、治赤白口瘡神効、

黃栢、青黛、蜜陀僧各等分

右爲末、乾貼瘡上、

黑參丸、治久口瘡

黑玄參、大門口、麥門口、俱一、右爲末、蜜丸、彈子大、每服一九、線裏穿、口

既濟丹、治暴起口瘡

乾薑、黃連各等分、右爲末、搽之、涎涎即愈、

升麻散、治上焦壅毒、口舌生瘡、咽喉腫痛、服

涼藥不効、宜升散之、

升麻、人參、研砂、焰硝、生甘草

右研極細、傳之、喉痛用吹、

治法、藥入卷、口瘡

手一

赤口瘡

白礬、沒藥、乳香、銅綠、爲末、搽之

白口瘡

雄黃、沒藥、乳香各一錢、輕粉一錢

一方有巴霜一錢、用者當酌之、如上法、

小兒口瘡不下食、以礬湯浸足、更以黃栢蜜製

僵蚕炒爲末、傳之、

柳花散、治口舌生瘡

玄胡索、黃栢、黃連各半兩、蜜陀僧

青黛錢 共末搽瘡上有涎吐去

口疳臭爛當清胃火外用椒櫚燒灰存性爲末先用米泔水洗淨後搽上藥

口瘡有實火有虛火膏梁厚味釀毒上攻心火自炎脈數實有力者實火也涼膈加減或三補丸金花丸傳綠袍散蜜藥散外用細辛黃柏末傳之胡氏以好墨研螻蛄極細傳之力峻氣猛惟實火則可勞碌費心食少不眠虛火上炎氣口脉大而虛虛火也理中湯參朮甘草補中

治法彙八卷八口病 五十三

氣薑附散虛火接引下行且助補劑成功又有下焦元陽虛冷迫火炎上成口瘡者用巴戟白芷高良薑末猪腰子煨服有用丁香松脂胡椒細辛末蘇木湯調塗瘡上及不任食者有用當歸附子白蜜含嚥者有用生附塗脚心者有用莫菜末醋熬膏人生地龍末塗足心者皆是治龍火按陽虛不能上騰下焦虛火泛上故用熱劑或散或降接引下行也方書虛寒迫火上攻似太鑿

薛新甫曰口瘡屬上焦實火中焦虛寒下焦

火各隨傳變所致如發熱作渴喜冷脉數實實熱也涼膈加減倦怠食少勞役人脉虛大中氣虛也輕則補中益氣湯重則用六君子湯飲食少思大便不實人參理中湯手足逆冷肚腹作痛中氣虛寒也附子理中湯補熱內熱不時而熱血虛也八物加丹皮五味麥冬發熱作渴唾痰小便頻數腎水枯也加減八味丸食少便滑面黃肢冷火衰虛也八味丸日晡發

治法彙八卷八口病 五十四

熱或從腹起陰虛也四物參朮五味麥冬不應加減八味丸若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處或從脚起乃無根之火也亦用前丸及十全大補加麥冬五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若槩用涼劑損傷真氣爲害非輕

口臭

年高水弱奉養太過厚味及服食補陽藥口臭臭不可近甘露飲妙及濃煎香薷汁含之徐徐

燕下口中如膠而臭知母地骨皮桑白皮
麥冬甘草塩煎湯嚥下起早汲第一汲水含漱
吐口中心氣不足益智子加甘草爲末點湯壯
人涼膈散一二服佳痰壅氣濁而臭宜塩湯
探吐

齲唇 謂唇腫如齲也

上唇俠口屬手陽明大腸經下唇俠口屬足陽
明胃經燥則乾熱則裂風則瞶寒則揭若唇腫
起白皮皴裂如蠶繭名曰齲唇有唇腫重出如

治法藥入卷八口病

五十五

齲者有本細末大如齲如齲者或因七情動火
傷血或因心火傳膈經因厚味積熱傷脾大
要審本證察兼證補脾氣生脾血則燥自潤火
自除風自息腫自消若患者忽略治者不察妄
用清熱消毒之藥或用藥線結去反爲翻花敗
症矣腎虛唇齲時出血水內熱口乾吐痰體瘦
宜濟陰黃九肝經怒火風熱傳脾唇腫裂
或思慮宜柴胡清肝散胃火血燥唇裂爲齲
或牙齲潰爛作痛宜清胃散或加芍藥川芎柴

胡可治脾胃肝膽經熱風熱傳脾唇口瞶皴
頭目眩四肢浮腫如風狀宜羌活散風熱客于
唇唇燥裂無色宜瀉黃散于中氣傷損唇口生
瘡惡寒發熱肢體倦怠宜補中益氣湯思慮傷
脾血耗唇皴宜歸脾湯意思過度蘊熱于脾
藩裂無色唇燥口乾生瘡年久不愈內服五福
化毒丹外用橄欖燒灰末猪脂調塗或用核中
仁細研傅之又硫黃白礬灰朱砂水銀麝香黃
蘗爲末和水銀磁器中臘月猪脂和如泥光淨

治法藥入卷八口病

五十六

拭唇却以膏塗之又八月藥絞汁洗不過二
日瘡又訶子胡椒五倍子爲末乾貼又黃連
一分乾薑半份炮爲細末之又大銅錢四文
石上磨以猪脂磨取汁外蛇蛻灰晚蠶蛾末
油調敷又以醃上滴下汁傳之白荷花辦貼之
皆効

瀉黃散于治風熱在干脾經唇燥裂無色

白芷升麻枳殼黃芩防風各一

半夏薑湯泡七石斛一分甘草七分

水二鍾薑三片煎八分食後服

五福化毒丹 治上焦熱毒唇舌生瘡腫破煩

渴

玄參 桔梗各二兩 人參半兩 茯苓半兩 馬牙硝

青黛 麝香各一分 甘草七錢

右爲極細末研勻煉蜜丸皂子大金箔四十

張爲衣每一丸或二丸薄荷湯下

舌

三錫曰心開竅于舌心火盛則舌乾或破脉洪有力者黃連瀉心湯加減

右脉虛大四肢倦怠而舌瘡破不愈屬勞役過度虛火炎上爲患補中益氣湯主之

邪客膏梁積熱內盛上焦痰實舌腫脹防風通聖散或涼膈散瀉之須脉實有力氣壯乃可

舌強腫如猪胞以針刺舌兩邊大脉血卽消勿刺中央令人血不止乃以火烧銅筋烙之或以

治法彙編卷八

又

如草燒鍋綉醋調傳舌上下脫去再傳須臾卽

消此病人多不識失治則死凡舌腫舌下必有如蟲形有頭有尾

喉舌之疾藥不能達惟針刺出血爲上急刺則可

上焦痰熱壅遏勢挾相火則病速而危毒氣結于舌下復生一小舌名子舌脹但腫大而強無

小舌者名木舌脹二者方書皆隸之咽喉十八風今指于此大都痰火爲患耳緩者用辛涼利

氣上痰藥重者無如針刺勞神不睡口舌
自當安神養心作心虛治

經驗方治舌腫大塞口不能飲食用真蒲黃一
味頻刷舌上若能吃藥卽以黃連一味煎濃汁
呷之以瀉心火

舌上有竅出血不止炒槐花末摻之

熱病極者多舌出有病愈而不止者冰片摻舌
卽上

舌暴腫大出外免麻子油蘸紙作撚燒烟薰之

治法彙八卷

舌

卽消牛舌病亦可

七情所鬱則舌腫滿不得息宜舒鬱清上焦外
烏星薑末貼手足心心熱則裂而瘡木舌重
舌宜三黃丸真蒲黃擦之或升麻湯加苦參桔
梗玄參黃芩又白礬大黃朴硝擦漱又醋調五
靈脂末烏賊骨真蒲黃末塗之脾熱則滑而
胎胖閉則白胎如雪宜薄荷汁白蜜薑片揩之
肝壅熱則血上湧宜蒲黃或槐花末摻之服清
肝藥薛新甫曰如口舌腫痛或壯如無皮或

發熱作渴爲中氣虛熱宜清熱補氣湯若

如薰觸體倦少食或午後益甚爲陰血虛清熱

補血湯若咽痛舌乾口乾足熱口晡益甚爲腎

經虛火六味丸若四肢逆冷惡寒飲食或痰

甚眼赤爲命門火衰宜八味丸若發熱作渴

飲冷便秘爲腸胃實火宜涼膈散若惡寒口

乾喜湯食少體倦爲脾經虛熱宜加味歸脾湯

若舌本強腮頰腫痛爲心脾壅熱宜玄參升麻

湯痰盛作渴口舌腫痛爲上焦有熱宜清熱

化痰湯若思慮過度口舌生瘡咽喉不利爲

脾經血傷火動宜加味歸脾湯若恚怒過度

口苦舌腫爲肝經血傷火動宜小柴胡加丹皮

山梔虛者八珍加柴胡丹皮甚者加炮薑

舌出不收

心經熱甚及傷寒熱毒攻心及傷寒後不調攝

往往有之宜珍珠末冰片等分傳之或用巴豆

去油取霜用紙卷之內鼻中舌自收婦人

後舌不收以硃砂末傳其舌乃令作產子

二女被之乃于壁外累盆盎置危處墮地作聲
聲聞而舌上矣。開口角涎不止牛黃清心丸
佳有喜唾者二木二陳芩連梔栝加竹瀝薑汁
炒。病後喜唾胃口寒也六君子加益智或理
中湯。

清熱補氣湯 治中氣虛虛火泛上口舌無故
皮破或發熱作渴或勞神不睡有此四君子
加五味麥冬玄參歸芍升麻水煎服甚則加
炮薑不應加附子右寸關必虛大。

治法彙八卷 舌

李

清熱補血湯 治口舌生瘡體倦食少目腫益
甚或目連熱脈細數四物加黃栢知母玄參
五味子牡丹皮柴胡麥冬水煎服如不應補
中益氣湯加五味子。

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌
腫或連頰兩項腫痛。

玄參 升麻 犀角 赤芍 桔梗
貫衆 黃芩 甘草
各等分水煎食遠服

清熱化痰湯 治上焦有熱痰盛作渴舌腫痛

貝母 花粉 枳實 桔梗 黃芩

黃連 各一錢 玄參 升麻 各七錢 甘草 分

水煎服

六味丸

供見虛損門

八味丸

涼膈散

見火門

加味歸脾湯

原方加當歸
山梔丹皮

治法彙八卷 舌

李

鼻

三錫曰肺開竅于鼻世所共知也然陽明之
按鼻絡目結于迎香左之右右之左去鼻孔
開五分是穴風邪從面而來則入陽明脉道排
鬱氣不通暢故清涕時出久變爲濁所謂外寒
束內熱論極有理須辛散之方書多用升麻葛
根白芷葱白乃陽明經藥也鬱熱既久頓發不
開必加辛涼酒枯苓薄荷之類至如酒客膏粱
辛熱炙燂太過火邪炎上孔竅壅塞則爲鼻淵

治法彙八卷

鼻

三

鼻中濁涕如湧泉漸變鼻鹹衄血息肉鼻痔等
症卽素問所謂膽移熱于腦之義

鼻塞時值寒月必加麻黃細辛于升麻葛根湯
中佐以枯苓蘇葉多加甘桔爲升楫庶易成功
已經發散未得全開脉洪有力口乾鼻燥者君
以辛涼清之酒苓梔子薄荷之屬仍佐荊防升
芷不可驟用寒涼法也

氣虛之人氣弱不能上升則鼻塞滯所謂九竅
不利腸胃之所生是也多服補中益氣湯自通

乃屢驗者

戴復菴曰平人多涕或黃或白或帶血如膿
皆腎虛所生不可過用涼劑亦有痰用南星散
兩寸脉浮洪而數爲鼻衄鼻淵右寸脉浮緩
爲傷風鼻塞清涕

丹溪曰鼻爲肺竅肺家有病而鼻不利也有寒
有熱暴起爲寒久鬱成熱寒傷皮毛氣不利而
壅塞熱壅清道氣不宣通先須表散後以酒苓
連梔子清之

治法彙八卷

鼻

奎

久患鼻膿極臭者冷水調百草霜末服

腦漏氣弱色白人右氣口虛大補中益氣湯加
川芎防風細辛白芷辛夷半飽服

酒齕鼻乃熱血入面爲寒所拂熱血得寒汚濁
凝滯而然服前藥外用梧桐子取油入黃連以
天吊藤燒油熱傳之

又方用山硫黃入蘿蔔內煨乳香輕粉烏頭尖
酥調傳或用膽礬傳之

面鼻紫黑面爲陽中之陽鼻居面之中一身之

血運到面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血為極熱熱血得寒汚濁凝結而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物加酒片苓紅花酒浸陳皮茯苓甘草生薑煎調五靈脂末服氣弱者加黃芪酒浸

上焦火盛酒客膏粱脈洪數有力而面生酒刺及糟鼻山梔仁酒浸微炒為末蜜丸彈子大臨臥嚼一九白湯下或加連翹仁更佳

鼻淵濁涕如淵內經謂膽移熱于腦則入額鼻

淵要皆陽明伏火所致防風通聖散一兩加薄荷黃連各二錢半水煎服一法本方硝黃滑

石石膏減半倍加辛荑

鼻中息肉塞久氣不通用枯礬為末面脂綿裹塞耳中數日自消乃屢驗者又法用木通細辛

附子炮蜜和綿裹塞鼻中又用防風通聖散加

荆三稜山茱萸肉海藻并用酒炒為末每服錢

半酒調下

宣明防風散 治鼻淵濁涕不止久而不已

成効

黃芩 人參 甘草 川芎 麥門冬

防風 右為末每服二錢沸湯調食後服日三

寒月鼻塞不聞香臭晨起者麗澤通氣散

黃芪 蒼朮 羌活 獨活 防風

升麻 葛根 甘草 麻黃

川椒 白芷 薑三片棗二枚葱白三寸水二鍾煎一鍾溫

服忌一切冷物及風涼處坐臥

鼻中流臭黃水腦亦痛名控腦沙有蟲食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調

服即愈 不已灸法妙額會穴在鼻心直上入髮

際二寸再容豆是穴灸七壯通天在額會上一

寸兩傍各一寸灸七壯隨鼻左右灸常灸後

去臭肉一塊從鼻中出臭不可言而愈

塞鼻藥

通草散 治鼻雖氣不通不聞香臭

通草散

治鼻雖氣不通不聞香臭

治鼻雖氣不通不聞香臭

木通 細辛 附子各等分

右為末蜜和綿裹少許納鼻中

舊蒲散 治同上

舊蒲 皂角各等

右為末綿裹塞鼻中

痰火鬱結于上焦胸中盲瘕之上上竅不通則

玄門閉密而鼻不聞香口不知味或耳聾目昏

良由大氣弱不能上衝濁氣得以擅權是虛為

本而痰火為標也當補中益氣加升柴諸風藥

治法集人卷八鼻

李

引上行兼用清上化痰開竅丸藥戒性慎口欠

之自全此錫屢驗者

鼻淵

火鬱上焦氣不通抑遏成涕內經所謂肺熱則

出涕是也方書謂腦滲為涕恐未

防風湯 治同上

防風半兩黃連 人參 甘草炙 川芎

麥冬半兩 各

右細末每服一錢沸湯點服日三

生者然筋抽搐顫掉肢體惡寒脈微細

為虛也是為真象至下脈大發熱煩渴是為假

象嗚呼粗工不知而誤認有餘復瀉之者多矣

若抽搐戴眼反折汗絳如珠俱不治

加味逍遙散

四君子湯

補中益氣湯

全大補湯俱見前門

丹溪治一中年人右鼻管流濁且臭脉弦小
寸滑左寸瀉灸上星三里合谷次以酒苓
蒼朮半夏各一兩辛荑川芎白芷石膏人參
根各半兩分七貼服之全愈乃痰鬱火熱之疾
也

防風通聖散去硝黃減石膏滑石一半加辛荑
先服三五貼再用此為丸早晚白湯下半斤
蒼耳散 治鼻流濁涕不止

辛荑 兩 蒼耳子 錢半 香白芷 兩 薄荷葉 分
治法 鼻

右為末葱茶湯臨睡下

冬月勢盛者辛荑散佳

辛荑 細辛 藁本 升麻 附子

白芷 木通 防風 甘草

右為末每服一錢食後茶清下

鼻熱 謂流清涕也

丹溪曰肥人鼻流清涕乃飲食痰積也要亦濁
液挾火壅塞而然

蒼朮 片苓 南星 川芎 白芷

辛荑 甘草

或末或丸白湯下世傳鼻流臭膿百草霜研
細冷水下三錢効

塞鼻藥 治鼻熱

通草 辛荑 各五 細辛 甘遂 桂心

芎藭 附子 各一

右為末蜜丸麻子大綿裹塞鼻中

又方辛荑膏 治同上

細辛 川椒 乾薑 川芎 藁荑

治法 鼻

辛荑 附子 各三 皂角屑 兩 桂心 兩

猪脂 兩

右煎猪脂成膏先一宿以苦酒浸前八味入
油煎附子黃色止以綿裹少許塞鼻中

息肉

羊肺散 治肺虛濕熱壅塞鼻生息肉不聞香

臭

羊肺 具一 白朮 兩 茯苓 木通 乾薑

川芎 兩

右爲細末水調羊脂煮熱焙乾細研爲末食後米飲下此爲治法也

三錫曰息肉必由上焦鬱塞已久而生然有諸中然後形諸外必內服清火利膈藥二陳涼膈加減須斷酒薄味

韓氏醫通曰雨霽地生菌息之像也

一中貫鼻中肉贅臭不可言痛不可搔束手待斃以白礬末加硃砂少許吹上化水而消內服

勝濕湯加濕白散

治鼻淵

李九

又一方息肉因胃中有食積熱痰流注治本爲佳

蝴蝶礬錢一細辛錢一白芷五分

右爲末綿裹塞鼻孔頻換又方蝴蝶礬三分

號丹一分細辛一錢如上塞之三因方枯

礬一味爲末綿裹塞鼻中數日息與藥俱落

辛夷膏 治息肉時作痛

辛夷二兩細辛 木通 木香 白芷

杏仁湯洗去皮尖各半兩

右用猪脂豬脂二兩和藥于石器內慢火

熬成膏放冷加龍腦麝香合一錢爲丸綿

裹塞鼻中數日內脫落

有人辛食物從鼻中縮入腦中介介痛不得出

以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸入須

更脂消物逐脂出也

輕黃散 治同上

輕粉 杏仁湯泡去皮尖及雙仁各一錢雄黃兩半

治法

七十

麝香

右四味用淨乳鉢先研杏仁如泥後入雄黃

麝香同研極細磁盒蓋定每有患者不拘

遠近夜臥用筋點米大在息上半月効

消鼻痔方

底情妙 廿遂各四錢 白礬枯 螺青妙

草烏尖各五分

右爲末用真麻油搜和令硬些不可爛旋丸

如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔

化爲水日一次妙甚

又方

苦丁香即瓜蒂赤小豆 丁香各四箇

慢火焙乾爲末入腦少許口中先含水次將

小竹管吹藥入鼻中如半鍾茶時覺頭痛

時取下

治鼻

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺

癰疹俗呼肺風以肺主皮毛也

治法藥小毒

硫黃 白礬灰各五錢

右細末入黃丹少許藥與病人面色同每上

五分津液和塗之臨臥洗漱罷行之

赤鼻須內服升麻湯下抑青丸以治其本

又方

枇杷葉乾新者佳 梔子 苦參

蒼木米泔浸

右爲末每服三錢空心服先退左紅臨睡服

先去右邊

一方用硫黃一兩白果燒灰一錢琥珀三分輕

粉五分白礬五分各爲末燒酒一碗入酒浸藥

封固重湯頓一二時放冷日用燒酒塗夜用沉

底藥塗妙

檳榔散 治鼻赤

硫黃各等分 片腦許少 檳榔

右爲細末用粗絹帛包時時于鼻上搽磨妙

又加草麻子肉爲末油調臨睡搽

一法硫黃入大菜頭內煨礬塗之或以白礬研

末洗時置掌中酒滴搽患處數日卽白鹽亦可

烏犀丸

烏犀角鎊 羚羊角鎊 牛黃研 柴胡淨各

天門冬焙去心 丹砂研 貝母 胡黃連

人參各半兩 麥冬焙去心 知母各七錢 黃芩

炙甘草各二錢半

右共末煉蜜丸桐子大每服二十九空心溫

酒下

椿根湯 治疳蝕口鼻

子 46-481

齒痛

齒痛悉屬胃火熱極生風則齦腫痛風熱鬱久亦或生蟲未必如方士所取之大蟲也不知熱勝則肉腐非蛀也暮年齒動疎豁屬腎衰其或相火上炎亦令人痛兩尺必洪大而虛宜培腎陰齒縫脹亦屬陰虛六味丸佳右寸關脈洪弦屬腸中風熱作有餘治

上下牙痛不可忍牽引入腦或喜寒惡熱脈洪數有力者涼膈散倍酒蒸大黃瀉之稍緩乃以

治法彙編

主

清胃散加減胃火清自止

牙根腫痛延及兩腮先以辛涼發散後用涼膈散解之

胃中實熱太甚口臭不可言牙根痺腫脫落血出乃恣食肥甘美酒肉食所致古方用禹功丸余以為不若清胃散加茵陳香薷少佐白豆蔻妙先須用熟大黃瀉一二次妙陽明之濕熱去則牙床清寧而齒自安固矣

胃熱齒痛口臭用黃荊條大者煮瀝入薑汁少

牙痛

牙痛曰牙大痛必用胡椒萆撥能散其中浮熱熱以升麻寒水石佐以辛涼薄荷荊芥細辛之

牙痛用清涼藥轉痛者從治之

萆撥 川椒 薄荷 荊芥 細辛

樟腦 青鹽

右為末搽牙上

潔古方牙痛不止 露蜂房 川椒去目等分

治法彙編

主

右為粗末煎漱禁言語

牙痛百藥不効用荔枝殼包青鹽燒灰存性擦牙痛處累驗一云荔枝核亦可

丹溪方茱萸煎酒含之佳

東垣賊鬼散治牙痛常吸風涼乃止屬胃中濕熱用黃連梧桐淚之苦寒薄荷荊穗之辛涼四味相合作風寒之氣治其濕熱升麻引入陽明經齒為骨之餘以羊脰骨灰補之為佐麝香人肉為引共細末擦牙神効外以調胃承氣湯去

牙痛黃連以酒洗中濕熱行三二次更煎

牙痛不舉梧桐淚清涼太妙第難得耳

清胃散 治厚味炙燥酒麪過度積毒上攻或

過服補味暖藥致牙痛用此清之甚者加大

黃石膏

生地黄三分升麻一分牡丹皮五分歸身三分

黃連六分倍之

水煎服

一方齒斷宜露而痛生地黄一兩水臼內搗入

鹽二合和之外用白麪裹可厚二寸煨干燒火

中以烟斷為度去麪加麝香一分研末用少許

貼牙床

一方附炒黑三分炒鹽一分搗齒妙

青龍散 治同清胃散

大黃 香附

各燒灰存性入青鹽搗勻擦牙

擦牙方

青鹽四兩軟石膏半升白芷 香附末各三錢

為細末早晚擦

方 骨碎補大黃各四兩燒灰存性青鹽二

兩石膏四兩為末擦亦佳更能烏鬚一方用

蒲公英燒灰香附末白芷青鹽為末擦

升麻當歸龍膽散 治寒熱牙痛

升麻 麻黃各一錢生地 白芷 羊脰骨灰

各五 膽草 黃連各一錢歸稍五分草豆寇一錢

右為末擦牙

蟲牙蛀空作痛用黃蜂巢一箇以川椒填滿其

竅更以白鹽一錢封口燒存性入香白芷羊脰

骨灰各一錢同研為細末先以茶清漱口淨後

以此藥擦之及傳蛀處

牙痛用絳雪碧雪擦是治標也內必瀉胃火或

花椒雄黃白芷為末擦一錢

追風散 治諸牙痛

貫眾 鶴虱 荆芥各等分

每用二錢川椒五十粒水煎漱口吐去極効

蒼耳子各等分湯含漱亦妙

軍牙散 去風冷蛀齲宜露之症甚効

槐枝 柳枝 各長四寸 皂角 不蛀者 塩 五錢

人磁礮中塩泥固濟糖火燒一夜候冷取出研細早晚擦牙

甘露飲子 治男婦胃中客熱口臭齒根腫悶

宣露心中煩饑不欲食咽中有瘡並治

黃芩 天門冬 麥門冬 枇杷葉

甘草 枳殼 生地 茵陳 石斛

熟地 煎服先漱

治法入卷八齒痛 辛九

腎水弱火盛膏梁積熱釀毒于中毒隨經血入

于齒中則痛先須瀉火以治其標久之必培腎

陰慎口絕慾使水升火降自無齒病方中用升

麻白芷牡丹皮者引陽明經也用細辛獨活羌

活荆防草寇畢撥者散浮熱鬱火也用川椒鶴

虱蜂房雄黃貫眾者殺蟲解蝕也石膏大黃木

律木黃連生地薄荷者降火清胃也用青塩滋

腎羊脰補骨至如早蓮沒石故紙首烏固齒兼

烏鬚也或服或擦或漱或含無非辛散苦降殺

齒固本神而明之存乎人昧者執一法欲兼治

之難難取効一法用蟾酥銀珠搽和黍米大塞

疔旁引濃涎數口愈又法用川烏末點痛處與

蟾酥意同不過取一時麻住不痛耳

一切齒病久之必培陰水補腎氣則火自降六

味地黃丸加減最妙

一法牙動豁痰蒸燒灰一味搽妙

青塩固齒滋水也食塩亦妙

齲齒悉屬濕熱惟分虛實耳一法用郁李根煎

治法入卷八齒痛 湯含漱之冷即易

猪牙皂角及生薑西國升麻熟地黃木律旱蓮

槐角子細辛荷葉要相當青塩等分同燒煨研

細將來用最良揩齒牢牙髭髮黑誰知世上有

僂方○按西國即沒石子

蛀牙用新燒石灰蜜丸塞蛀孔中痛立止

齒縫中出血不止用燒塩龜突煤二物研勻擦

牙妙塩勝血血見黑則止

牙疳方用五倍子炒焦銅青明礬各二兩磨少

許研末鹽湯醋洗淨搽之

玉池散 治牙痛不牢

地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛

川芎 槐花 當歸 藁本 甘草

煎湯熱漱冷吐去亦可服

血竭散 治牙疳并惡瘡久不瘳如神

寒水石 燒熱四兩研 龍骨 兩一蒲黃兩二血竭錢五

枯白礬 兩一 共末用少許搽之以紙封

一方走馬牙疳

治法彙人卷八 齒痛

全

黃柏 藜蘆 石膏 銅青 膽星

麝香 少許 龍骨 病急多加

共末每五分搽

男子八歲腎氣實而齒生三八真牙生五八則齒稿八八而齒去矣女子亦然以七為數蓋腎主骨齒乃骨之餘隨之所養也故隨天癸之盛衰也足陽明之支者入于上齒手陽明之支者入于下齒若骨髓不足陽明脉虛則齒之諸病生矣何以言之陽明金也齒屬腎水也陽明之

齒間此乃母氣榮衛其子也故陽明實則

陽明虛則齒浮動所以齒痛者乃陽明

風冷濕熱之邪乘虛而入聚而為液為涎

齒間之氣血相搏擊而痛也若熱邪壅盛則

齒而痛也熱不盛則齒斷微腫而根浮也有蟲

牙痛者由濕熱生蟲蝕其根而作痛也有齒間

血出者由陽明之支有風熱之邪入齒斷搏于

血故血出也有齒齲者亦以陽明入風熱之邪

搏齒斷氣血腐化為膿出臭汁謂之齒齲亦曰

治法彙人卷八 齒痛

全

風齲有齒齲者是蟲蝕齒至斷膿爛汁臭也有

齒挺者由氣熱傳入脉至齒斷間液沫為膿氣

血竭肉斷消故齒根露而挺出也有齒動搖者

陽明脉虛氣血不榮故齒動搖也有齒歷蠹者

由骨髓氣血不能榮盛故令牙齒黯黑謂之歷

齒其齒黃黑者亦然以此而言豈非諸齒病皆

因陽明之所致哉

薛新甫曰濕熱甚而痛者承氣湯下之輕者清

胃散大腸熱而齲腫痛者清胃散重則加大黃

六鬱而痛者越鞠丸中氣虛而痛者補中益氣湯思慮傷脾而痛者歸脾湯腎經虛熱而痛者六味九補之腎經虛寒迫火上炎而痛者還少丹重則八味九其屬風熱者獨活散不愈茵陳散大寒入腦者羌活附子湯病原非一因時制宜可也風雨寒濕之氣犯腦項筋急齒痛羌活散冬月犯寒腦痛齒亦痛麻黃湯或加細辛白芷不可用涼藥

獨活散 治風毒牙痛或牙齦腫痛

治法藥入卷八齒痛

獨活 羌活 川芎 防風各五分 細辛

荊芥 薄荷 生地黃各二錢

右每服三五錢水煎漱嚥

茵陳散 治牙齒腫痛及骨膈風熱

茵陳 連翹 半夏 荊穗 麻黃

升麻 黃芩 麝干 二活 牡丹皮

大黃 薄荷 蠶蚕各二錢半 細辛五錢 牽牛一兩

右為末每服三錢水一盞先煎熟下藥攪勻

急瀉出食後連滓服

麻黃散

麻黃根 羊脰骨酥炙 龍膽草酒炒 生地各二錢

羌活半錢 草豆蔻 當歸身 藁本

升麻 熟地黃 黃連 防風各六分

細辛少許 共末搽牙

羌活附子湯 治冬月大寒犯腦令人腦齒連

痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黃 黑附子炮各三分 羌活 蒼朮 防風

黃芪一分 甘草三分 升麻 白殭蚕各五分

治法藥入卷八齒痛

黃藥 白芷各五分 咳嗽加佛耳草

水煎服

越鞠丸 見鬱門

補中益氣湯 見內傷門

歸脾湯 見癰狂門

六味九 俱見虛損門

還少丹

咽瘻

脈法兩手脈浮洪而上溢者喉痺也此痰火上湧脈亦如之脈出寸口上無際為溢

丹溪曰喉痺多屬痰宜用吐法或只以桐油燈腳用鷲探吐病輕者取園中李實根嚼之更研永傳項上暴腫不下食吹藥吹之或用射干和水吐之纏喉風屬痰熱亦用吐之一方志去心為末傳項上又方燈心草燒灰吹之

治法藥水卷本咽瘻

全五

咽喉腫痛甘桔湯加歸身荊芥枳殼漱而服之口乾火盛加花粉炒芩甚者刺少商穴出血立愈去手大指甲一韭菜內側不已前方加玄參薄荷炒梔子或刺照海亦妙

喉乾燥痛四物加甘桔荊芥知藥玄參屬陰虛愈後服六味地黃丸加坎離

喉中生瘡久不愈多屬虛火遊行無製用人參黃柏炙荊芥煎濃加竹瀝陰虛身熱脈數相火盛者四物加竹瀝

陰虛咳嗽久之喉中痛者必有瘡名肺花瘡以離加玄參甘桔不可用水片吹藥恐辛散瘡轉潰也

平人喉中有瘡必是楊梅毒或有染來者或身上已有而延及于喉者並服草薢湯佳一切喉瘡久者多服自効即俗所謂土伏苓是也氣虛加參芪血虛加四物

古方治喉瘡用紅燈籠草炒焦為末酒調傳喉中今人浸水漱亦妙

治法藥水卷本咽瘻

全六

瀉實熱火黃連荊芥薄荷硝石為末薑汁調嚥化

丹溪曰喉舌之病多屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚耳微而輕者可以緩治重而急者惟用針砭刺血最為上策以針刺喉中腫處立愈

喉痺用鴨嘴膽礬三分或五分為細末吹喉中吐痰立愈時氣喉腫用普濟消毒飲

金陵黃泥巷楊馬軍等法以中指蘸藥少許于喉中用力一捻腫處出血并痰涎隨即能下湯水絕妙即前用針刺之意妙在指法藥恐偽也

雙乳蛾方

黑牛膽一個 膽礬三錢 硼砂二錢 山豆根一錢

治法

全

右爲末入膽中用線掛陰乾點喉中吹亦妙

牛旁子飲 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡如有肉腐

牛旁子二錢 玄參 升麻 桔梗去蘆 犀角

黃芩 木通 甘草各一錢

水二鍾煎八分食遠服

甘桔湯 治少陰喉痛諸咽病引經藥

甘桔各等分水煎服或加荊芥當歸熱甚加黃芩枳殼

喉痺喉痛外症惡寒寸脉小于關尺者皆爲表症宜甘桔湯加羌活荊防枳殼川芎辛以散之乃寒鬱火邪在上焦古方用半夏桂枝甘草湯恐太熱果嚴冬聲啞兼咳嗽有表邪者乃可若水漿不得入口者先以解毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却與上藥間以生薑自然汁一蜆殼嚥下取辛散鬱熱之義婁全善喉閉惡寒者是邪氣鬱于表切忌膽礬酸寒等劑吹喉使熱毒不能發越又更忌硝黃治法

治法

全

本連等下劑使毒氣下陷禍不旋踵韓祗和曰

寸脉弱小于關者宜消陰助陽東垣曰寸脉不足乃陽氣微故用表藥提其氣升以助陽也竊

以爲寸脉沉伏而實第小於諸部而有喉病者乃可用此法如果寸脉微小元氣耗于上焦卽

是陽虛應從肺絕喉痺治豈宜辛散耶學者當會其意勿謬其說乃爲上工

喉痺傳染是疫癘先須表散荊防敗毒散從本門出入切忌酸藥吹點閉住毒立見傾危

肺絕喉閉，喉中有痰，如鼾響者是，脉必浮散而微細，速煎獨參湯，加竹瀝薑汁服，遲不救，參膏亦可，早則十全七八次，則十全四五，備急如聖散，治時行纏喉風，漸入咽塞，水穀不入，牙關緊急，不省人事。

雄黃細研 藜蘆去皮 白礬飛 猪牙皂角去皮

右等分，為細末，每用一豆大，搐鼻中立效。

散毒雄黃丸 治纏喉風及急喉閉，卒然倒仆。

牙關緊急，不省人事。

治法 雄黃入卷 咽喉

雄黃研 鬱金各一兩 巴豆去皮十枚

右為末，醋煮麪糊丸，菉豆大，茶清下，七丸吐。

出頑痰立甦，未吐再服，如至死者，心頭上。

熱，即以刀尺鐵匙，幹開口灌之，下咽無有不活，如小兒急驚，用二九或三九量大小。

加減一法，用醋磨灌，吐痰尤速。

急喉痺，牙關緊急，用巴豆去殼，以紙壓出巴豆。

油，將紙作捻子，點燈吹滅，以烟薰鼻中，即時口。

鼻涎流，牙關開矣。

喉閉不惡寒者，及寸脉實大滑數有力，于諸部屬裏症，宜硝石青黛等藥降之，或礬石酸味俱可用，韓祗和曰：寸脉大于關尺者，宜助陽消陰，東垣曰：兩寸脉實為陽盛陰虛，下之則愈。

玉鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風

焰硝半兩 硼砂半兩 腦子二錢 白殭蚕一分

右為細末，以竹管吹喉中立驗。

世方用碧雪絳雪治喉病妙，惟實火更佳，喉痺神驗，因于熱者為宜，朴硝一兩，細細含嚥。

治法 雄黃入卷 咽喉

汁立愈。

丹溪方：喉痺呼吸不通，須臾欲絕，給石草二兩，

水升半，煎出二盞，去查細細呷之，立通。

靈苑方：急喉痺，逡巡不救者，蠶魚膽臘月收陰。

乾為末，每用少許，點患處，藥至即瘥，病深則水。

調灌之。

開關散 治喉風氣息不通。

白殭蚕炒 枯白礬各等分

右為末，每服三錢，生薑蜜水調下，細細呷之。

本草治纏喉風用白礬末半錢烏鷄子清一個
三味調勻細灌喉中立効此法活人殊多幸勿
忽或枯礬一味研吹入喉卽以燈蓋油脚灌之
取吐妙

喉閉一握金一握燒灰拌白礬末炒青色爲度
用筯三四根壓下舌看喉中端的吹入妙此草
一名八角荷一名山荷葉如川芎樣生深山括
曰一葉一枝花深山是我家硫黃怕我灰水銀
化作砂癰疽與喉癰一似手拈拏

治法彙八卷

九十一

又方牙皂和霜梅爲末吹之

喉中腫痛已用吐法不減須消汚血杜牛夕卽
取自然汁和醋呷之或茜草煎汁服能降血
中之火或用紅花搗汁亦妙用乾者浸爛取汁
俱是消汚血之法

丹溪曰咽痛諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中
生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻桃垂掛咽
門而止口中飯食不入須用杜牛夕根直而獨
條者洗淨入好醋三五滴同研細就鼻孔滴二

三點則絲斷珠破其病立安

咽痛

咽痛必用荊芥 陰虛火炎上者必用玄參
氣虛人參竹瀝 血虛四物加竹瀝

勞碌大過陰氣太虛孤陽飛越痰結在上遂成
咽痛脉必浮大重取必濇宜人參一味濃煎湯
細細呷之或補中益氣湯加玄參炒黃柏

虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯主之忌
苦寒鷄蘇葉甘桔荊防人參牛旁子水煎服妙

治法彙八卷

九十二

在參

咽痛有服涼藥不愈宜用姜汁詳見喉門是從

咽瘡多虛火遊行無制客于咽喉宜用人參蜜
炙黃柏荊芥治之

倘急丹 治喉痛痺不惡寒者

青黛 芒硝 白薑各一 甘草四

右爲細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中
增損如聖湯 治風熱上攻會厭語聲不出咽
喉妨悶腫痛並治之

桔梗 甘草各一錢 枳殼 防風各五分

煎成入酥少許攪勻食後服取潤之義一法

加連翹鼠粘子

大抵治法視火微甚微則正治甚則反治療痰出血隨宜而施更刺少商出血行氣若腫達于外者必傳其外地龍主根伏龍肝之類有表症加甘桔荆防羌活枳殼表而出之不惡寒可用酸藥吹喉取痰膏以驚翹煎米醋繳喉中摘去其痰蓋酸以收之隨翹而出即用膽礬義同

小法彙入卷

喉症

九十三

仲景曰婦人咽中如有炙轆半夏厚朴湯主之

此亦痰火客上焦也即四七湯見氣門

切咽中腫痛療痰外利膈湯妙

乳蛾

一邊有白泡腫痛或紅者名單乳蛾兩邊有者名雙乳蛾生于關上者易治關下者難療初起作寒熱須荆防敗毒散散之不作寒口乾燥穢氣熱毒甚者辛涼解毒玄參 甘桔 連翹

薄荷 牛旁子 歸尾 赤芍之類熱浮于

上內以酸味收之雄黃 鬱金各五錢 白礬半錢

膽礬五錢為末吹喉中立能言語便實火盛勢

急者前方加硝黃或用玄參散玄參一升麻

治法彙入卷

乳蛾

九十四

麝香 大黃各半兩 甘草 水煎時時哈呷此

方亦治懸癰痛不下食即會壓垂長懸而壅塞

妨礙飲食是也一法用白礬一兩燒灰塩花一

兩共研細以筋頭點腫處立消俗云吊下咽喉

用塩點上

乳蛾實熱結滯腫塞不開宜從治粉香散主之

白礬三錢 巴豆三粒去油皮 輕粉 麝香各少許

右于鐵器中燒礬沸時入巴豆在礬上待枯

去巴豆和三味研細吹喉中

乳蛾紅腫不消，杜牛夕根紅者，研爛男加女，汁，女用男乳，調納鼻中，即前破汚血法。

黑牛膽一個 膽礬三錢 硃砂二錢 山豆根一錢

右爲末，入膽內懸陰處吹咽中。

華陀危病方，治纏喉風，喉閉，其症先兩日胸膈氣急，出氣短促，驀然咽喉腫痛，手足厥冷，氣急不通，頃刻不治。

巴豆七粒三生四熟生者去殼 雄黃大子

研者一個 鬱金一個 研末

治法八卷 乳蛾

右三味，研細，每服半匙，茶調細呷，如噤咽塞。

用小竹管，納藥吹喉中，須臾吐利，即醒，如

無前藥，用川升麻四兩，剉碎，水四碗，煎一

碗，灌服，又無此，用皂角三椀，槌碎，搗水一

盞，灌服，或吐或不吐，即安。

走馬喉痺，外須臾，用巴豆去皮，綿紙微裹，隨

左右塞于鼻中立透，如左右俱有者，左右各塞

一粒，巴豆乃斬關奪門之將，熱則流通，雖是以

熱攻熱，自不妨也。

面

栗氏曰：手足六陽之經皆上至于頭，而陽明胃脈起于鼻交頤中，入上齒中，俠口環唇，循頰車，過客主人，故人面之面部，陽明經之所屬也。胃中有火，則面熱；中氣虛，則面寒，且不耐寒，畏風，亦有中氣虛，虛火上炎，而面熱者，必息墮，脈大正，補中益氣湯症也。實火脈必數實有力，精神茂，澤升麻湯加黃連，甚者涼膈散。針經曰：面熱者，足陽明病，勢甚者，調胃承氣湯下之。面黃

治法八卷 面

五

白面鼻冷，氣弱，大劑參芪，加附子，升麻，升麻是

陽明經引也。風熱上攻，面目浮腫，或紫黑，或風

刺隱疹，消風散加減。鬱悒不得志，婦女羣面

色慘慘，反生黧黑，舒鬱爲主，越鞠加減。上焦

風熱，則生小瘡，通聖散消風解熱。脾胃虛，或

吐瀉後，面目浮腫者，脈必緩弱，或氣口虛大，參

苓白朮加減。

面青肝虛 面白肺虛 面黃脾虛 兩頰紅

陰虛

素問曰五八陽明脈衰于上、面始焦、故面色
者必用補中益氣湯、一人面色忽黑、乃因
廁臭氣所冲而成、令燒沉檀于座右、及帳中、旬
日如故、以臭腐屬水、香屬土、土勝水也、
洗面藥、七白散、白歛、白朮、白牽牛、白附子、白芷
白芍、白殭蚕、面上細瘡、常為黃水、桃花陰乾
加當歸、或杏仁、作末洗面、指爪破面、用輕粉
生薑自然汁、調傳無癰痕、

頤腫屬風熱、乾葛、甘桔、升麻、薄荷、有火脈洪大
治法、八卷、面、九七

者、羌活勝濕湯、加黃芩、桔梗、甘草、治之、如耳鳴
目黃、頰頰腫、頸肩膊肘臂外廉痛、面赤、脈洪大
者、以羌活、防風、甘草、藥本、通其經血、加芩連消
其腫、人參、黃芪、益氣、而瀉火邪、昨頤同法、外
以赤小豆末、雞子清調傳、

三四方、凡伸欠頰車蹉、但開不能合、以酒飲之、
令大醉、睡中吹皂角末、搐鼻嚏透、即上、

一婦常錯下頤、古謂脫金鈎、兩手脈弱、用八物
加升柴、遂全愈、先用手法、拏上、正骨科當知、

髮

方書曰、髮乃血之餘、焦枯者、血不足也、勞心之
人、未老先黃、黃而白、理可見矣、若忽然脫落、或
頭皮痒、鬚眉亦落、乃血熱生風、風搖落之象、酒
客膏粱、多此、或婦人天癸已行、尚黃悴、其身必
夜熱、屬稟來陰虛、若病後產後、瘡疽後、精血耗
而髮落者、悉屬虛、大補氣血為主、十全湯、補中
益氣湯、選用、若脾胃弱而食少、不運化者、理脾
節食、為上、脾胃壯而多火、六味丸、平人烏鬚

治法、八卷、髮、九七

九七

髮七寶美髯丹、多服妙、一方人參、紫梗、加諸
香、浸油、搽頭、極妙、乃物理之不可曉者、

一儒者、飲食勞役、及惱怒、眉髮脫落、余以為勞
傷精血、陰火上炎所致、用補中益氣、加麥冬、五
味、及六味地黃丸、加五味子、眉髮頓生、

一男子年二十、巔毛脫盡、脈數、先以通聖散宣
其風熱、次用六味地黃丸、不數日、髮生寸許、兩
月復舊、

虫

風字從虫，虫風化也。濕熱鬱久，則生虫。腐草生螢，陳麥為蛾之類，菓實外殼完整，虫生于內，人之腸胃無物不受，豈得無虫？三尸九遁理或有之，其猖狂於腸胃，為痛為嘔，為噎為噎，種種煩苦，須仗醫藥。至蛔虫乃人之消化機運者，偶為食傷，則或吐或瀉，出和中自安，不可攻伐。昧者不知，妄用雷丸、史君之類，禍不旋踵。

仁齋直指云：平時嗜酒，血入于酒，則為酒驚。平時多氣，血凝于氣，則為氣驚。虛勞痼冷，敗血凝痰，則為血驚。搖頭掉尾如虫之行，止上浸胃脘，食人脂膜，或附脇背，或隱胸腹，惟蕪荑炒蘆服之，兼養胃益血，理中乃可殺之。若徒以雷丸錫灰，不能去也。

治法彙編

卷

時多氣，血凝于氣，則為氣驚。虛勞痼冷，敗血凝痰，則為血驚。搖頭掉尾如虫之行，止上浸胃脘，食人脂膜，或附脇背，或隱胸腹，惟蕪荑炒蘆服之，兼養胃益血，理中乃可殺之。若徒以雷丸錫灰，不能去也。

治虫要藥

蕪荑 史君子 鶴虱 檳榔 百部

苦楝根

化虫丸 治諸虫心下痛，得所嗜之物則止者。

是

鶴虱去土 檳榔 苦楝根東行不出者

胡粉炒各一兩 明白礬燒二分

右為末，米糊丸，桐子大一歲兒五丸，量人大小加減。丸數溫漿水入麻油三四點打勻送下。清米飲亦可，不拘時。其虫細小者化為水，大者自下。

丹溪曰：上半月虫頭向上易治，下半月虫頭向下難効。先以糖蜜肉汁、香穢物引起，後用殺虫藥，亦不可令其知。知則虫先迴避矣。一說：上半日向上升，集効丸。

水香 鶴虱 檳榔 訶子麤裏 蕪荑炒

附子水炮去 乾薑各七分 大黃一兩五

烏梅去核 右為末，煉蜜丸，麻子大，陳皮湯或醋湯下。方加黃連、黃柏各七錢半。

萬應丸

子 46-494

橫櫚五兩 大黃八兩 黑丑四兩 共爲末

皂角十條 不姓者 苦楝根皮

右以皂角楝根皮水二大碗熬成膏搜和藥末丸桐子大又以沉香雷丸木香各一兩爲末爲衣先上沉香次上雷丸次上末香服三九四更時砂糖湯下

一方治寸白虫用雞子炒白蠟塵酒糊丸服

黑雞炒成灰橫櫚木等分和勻米飲調下

橫櫚根鶴虱橫櫚濃煎湯飲之

法彙入卷八

橫櫚丸 治小兒疳積氣塊痛腹大有虫

三稜 蓬水細切醋炙 青皮炒 橘紅五錢

蘇美二錢 雷丸五錢 鶴虱三錢 畧炒

乾漆五錢 木香二錢 五錢 薑二錢 陳土

砂仁去殼 麥藥炒 胡黃連三兩

甘草炙 兕君子肉五錢 神麴五錢

醋米糊丸每三五十九 空心淡薑湯下

古方前胡根湯利膈下氣九千金散三聖

飲五鳳丸分治五臟勞虫恐氣血虛者未可試初起壯實可用之大抵不越雷丸貫衆楝根茺莢根鶴虱蕪荑等各加引經藥學者變而通之可也

如或希奇怪病除痰血外百治不効者卽是虫爲患視其經絡虛實泰脉症消息治之

婦人陰蝕瘡濕熱客于肝經而然陰戶生虫痒不可忍入臟腑卽成令人發熱惡寒與勞相似

先用蛇床子煎湯薰洗拭乾付後藥

治法彙入卷八

梓樹皮不拘多少焙爲末入枯礬四分之一磨香少許付之立愈

一法用熟猪肝切長條乘熱內陰中以取虫虫聞腥俱出肝上如此數次妙內服瀉肝和血藥

傷寒過經腸胃虛熱虫上求食上唇有瘡虫食其臟口惑下唇有瘡虫食其肛曰狐豚虛小者

生急疾者成

治惡燒仁湯

槐子 艾各五錢 大棗十五錢

用水二盞半煎盡半分二次服

雄黃銳散 治前症

雄黃 青廂子 苦參 黃連 各二錢

桃仁 錢一

右爲細末新艾搗汁和小指大條納肛中

應聲虫

昔有人得奇疾每語喉中必有物作聲相應

有人教讀本草藥至藍遂默然遂取藍搗汁

飲之少頃吐一肉塊長二十餘人形悉具聲

治法藥八卷

一五

遂已千金翼云藍主痺癰又一人讀至雷丸

不應服雷丸亦愈

虫在肝則令人恐怖眼中赤壅在心則心煩發

躁在腎勞熱四肢腫急在肺則咳嗽氣喘醫者

不察謬指爲時動屬火屬痰寒涼轉傷脾胃卒

至天枉自非垣視一方者烏能辨哉

按古方殺虫如雷丸貫衆乾膝蠟虫百部鉛灰

皆所常用者有加附子乾薑者壯正氣也加苦

參黃連者蟲得苦而安也加烏梅訶子者虫得

酸而靜也加藜蘆瓜蒂者欲其帶虫而吐也

范花黑丑大黃已豆者欲帶虫而下也又雄黃

川椒此灰律腦水銀檳榔治疥虫胡桐淚韭子

蟾酥治齩齒虫川槿海桐皮治癬虫青箱子覆

盆葉治九竅虫敗鼓桃符板虎糞骨灰人枕須

底鶴骨驅療虫或用東引茱萸棟根后榴皮煎

湯吞藥者取其先得天地生長之氣以助吾發

生之氣又性能殺虫皆有至理妙用莫能殫

寸白虫

治法藥八卷

一五

月初叁日先炙猪肉一臠置口中咀嚼其津

而勿食諸虫聞香爭啞如箭攻橫却以檳榔

細末一兩取石榴東引根煎湯調服之虫盡

下有長丈者有蠕蠕能動者

九蟲一曰伏虫長四寸爲群虫之長二曰白虫

相生至形長二寸其母長至四五尺三曰肉

虫狀如爛杏令人煩悶四曰肺虫其狀如蚕令

人咳嗽聲嘶五曰胃虫狀如蝦蟇令人吐嘔逆

六曰弱虫狀如瓜瓣令人多嘔七曰赤虫狀

人腸鳴八曰蟻虫至微細狀如
一尺貫心則成又有三尺虫如馬尾薄筋依脾
而居有頭尾長三寸又有勞虫膈噎虫癰虫蠱
虫狐惑虫未易枚舉推類而治之可也

八仙妙應丹 治男婦小兒外感內傷以致水

穀停留腸胃生虫成積惡心嘔吐若膈

雜瘧痢黃疸水腫鼓脹膈噎蠱胃及婦

人癰瘕積聚心腹疼痛小兒疳積而黃

肌瘦肚大脚細一切蠱積並治

雷丸一兩 錫灰半兩 白蕪夷一兩 木香二兩

錦紋大黃一兩 檳榔十二兩 雞心者 史君子肉一兩

黑丑頭末

右八件共為細末葱白一斤煮沸露一宿為
丸粟米大每服四錢

病深者五錢量虛實加減葱白湯下氣滯用
木香湯下空心妙服後如欲大便須在內房
不可見風泄下如敗絮動不斷或如魚腸或

如雞子黃或如米泔屋漏水或如馬尾或如
血驚或如蚕虫或如蝦蟆樣子一切等物一
服即出有虫即取下虫有積即取下積有氣
即消了氣必効之藥年高弱人小兒減半積
消後用四君湯加減補助胃氣

虱瘕因咬虱嚙下而成時吐下出虱用敗柳莖
燒末另用煮湯調下即淨徐鉉稽神錄云浮梁
李生背起如孟惟瘰不可忍人皆不識一人云
此虱瘕也以藥付之一夕瘰破出虱數升即日

跌打損傷

跌打全仗血氣，傷損必加補養，最忌惡血一絲。攻心即斃。初治消瘀和血為急，在上先消瘀，血在下先補養，更審胃氣去血過多，脈微欲灰，獨參湯加童便服，接住元氣，再處大法，傷損及金瘡去血過多，與產婦同，脈來和緩者生，急疾乳者久宜虛細，不宜數實。

氣血凝滯，肌肉傷損則腫，或紫或青，痛不可忍，宜活血行氣，乳香沒藥歸芍紅花蘇木為主，乳香沒藥入藥酒洗。沒通滯血，傷損疼痛，皆以酒化服，血滯則氣壅，瘀則經絡滿，經絡滿故痛，且腫導而行之，則痛腫消失。

自然銅為接骨要藥，性散而燥，須佐補氣血藥，不可多服。逐瘀血，須分輕重，輕者芍歸桃仁紅花蘇木赤芍酒煎，加童便服，甚者加大黃碎硝打撲跌傷內損經絡吐血不止，童便調白芨末服。

拆傷最忌者惡血攻心，與破傷風二症，凡血上逆者，即以逐瘀為急，口噤牙關緊，即是胃風切，須仔細慎之，慎之。傷損着寒痛不可忍，用葱杵爛入鹽少許，炒熱，罨上其痛立止，冷則溫之。昔一人傷指甲，裂痛不可忍，用葱炮灰火中劈破，取其間有涕者，罨痛處，續續換之，遂止。惡血上攻，薑汁和童便飲半盞佳。

又法，出血不止，薑汁香油各四兩，酒調服之。傷骨出血，用益元散人參湯調服，外用生薑自然汁一盞，米醋一盞，獨核肥皂四個，敲破，接薑汁，米醋中，紗片慮過去，揷入牛皮膠煎成膏藥貼之。

接骨散

沒藥 乳香 各五錢 自然銅 一兩 滑石 一兩 龍骨 三錢 赤石脂 三錢 麝香 一錢 右為末，好醋浸沒，煮乾，就焙燥，入麝伴勻，每以一茶匙，抄舌上，溫酒下，分上下為食前，後，如骨已接，去龍骨赤石脂。

又方

冬瓜皮 阿膠等分

右炒乾為末以酒調下

加味芎歸湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔

黑血如豆汁

當歸 白芍 芎藭 荆芥穗 百合浸水

半日各等分 加酒煎服

紫金散 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或

有瘀血停積於內心腹脹

治法

百九

紫金藤皮二兩 降真香 續斷 補骨脂

無名異 琥珀研 蒲黃 牛膝浸酒 當歸

桃仁去皮尖 大黃煨 朴硝另研各一

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒下連進

二服妙利去惡血

復元活血湯 治從高墜下惡血留于腸胃兩

脇痛不可忍

柴胡 花粉 當歸 紅花 甘草

大黃 桃仁泥 川山甲

酒水煎服以利為度

當歸導滯湯 治瘀血脹悶

大黃一兩 當歸半錢 麝香少許

右為末每服三錢熱酒下

鷄鳴散 治同上

熟大黃一兩 當歸尾五錢 桃仁七粒

右為末酒一碗鷄鳴時煎服利下惡物為愈

從高墜下一切損傷氣欲絕不能言急以熱小

便灌之即醒

治法

百十

奪命丹 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損

瘀血凝積心腹疼痛二便不通

大黃 黑牽牛各二兩 紅蛭用石炭慢火炒

共為末每服三錢熱酒調下如人行四五里

再用熱酒下牽牛末二錢催下惡物為佳

花蕊石散 治一切金刃所傷打撲傷損身體

出血者急于傷處搽藥其血自化為黃水如

有內損血入臟腑熱酒童便入酒少許調一

錢服立效若牛觸腸出不損者急送入用細

絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上摻藥
活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封
瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之後摻藥
婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎
衣不下並用童子小便調服

硫黃

上色明淨者四兩搗為粗末 花蕊石 一兩同上

右二件和勻先用紙筋和鹽泥固瘡瓦罐子

一箇候泥乾入藥在內用泥封口候乾安

在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤

治法

早

龍燈周匝自已午時從下着火漸漸上轍

直至經宿火冷炭銷又放經宿確冷取出

細研以細絹羅子羅極細磁盒內盛依前

法用

沒藥降聖丹

治打撲閃肋筋斷骨折攣急痛

腫不能屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經

絡筋骨緩縱皮內刺痛肩背拘急

川芎

骨碎補

白芍

沒藥

乳香

自然銅

研為末水飛過

當歸

洗焙各

一錢

生地

川芎

各半

共末生薑自然汁蜜丸每一丸二錢五分

每用一丸搥碎水酒各半盞蘇木少許同

煎去蘇木熱服

內傷筋骨疼不可忍

沒藥

乳香

芍藥

川芎

川椒

去目及開

當歸

各半

自然銅

三錢半炭火燒

右為末黃臘二兩溶化入藥末不住手攪勻

丸彈子大每服一丸好酒煎乘熱服之連

進二服

治法

跌撲

百上

乳香定痛散

治打撲傷損落馬墜車一切痛

腫

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

甘草

生地

牡丹皮

右為末每服二錢溫酒並童便調下

沒藥乳香散

白木

製力

當歸

白芷

沒藥

另

肉桂

乳香

另

甘草

炒各

一兩

右為末每服二錢溫酒調下

經方 治打撲傷損服之自頂心尋病至下
兩手過斗過受病處則颯颯有聲覺藥力習
習往來則愈矣

乳香 沒藥 蘇木 降真香 松明節

川烏 去皮 自然銅 火煨醋浸七 龍骨 半兩

地龍 半兩 水蛭 半兩 血竭 三錢 土狗 十個

焙乾為末 即燒貼

右為末每服五錢無灰酒調下隨上下進藥

又方

胡孫薑研爛取汁酒煎服渣傳患處

接骨散 並治惡瘡

金頭蜈蚣一個 金色自然銅 半兩燒紅 我香

一錢 銅錢 五文燒紅 研細 金絲水

錢半每個作三斷瓦 上焙去氣道為度

右為末如瘡腫處津調半錢塗之即止痛如

見膿先用粗藥末少許麻油少半匙同打

勻再入半匙再打勻又入前藥接骨散

錢以銀膠打成膏子用鷄翎掃在瘡上痛

立止痛天明一宿自破

如打骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加

末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服

如骨折損以接定不疼未折但痛服後即止

神效

神聖接骨丹 治同上

水蛭 用糯米于砂鍋 兒絲子 好綿灰

乳香 血竭 各一 半兩錢

一文燒七次醋 射香 另研

右研勻每服三錢熱酒調下隨上下食前後

用約人行六七里聞竹作聲忌聽鐘磬鼓

柝砧聲恐震動生肌節忌驢肉一服見效

續散 治折傷筋骨

半兩錢七個以桑柴火燒紅好醋淬之取

錢上碎末再入珍珠末一分乳香沒藥少

許同研極細酒調下

止痛散

黃麻

二兩 頭髮一兩 乳香五錢

石爲末每服三錢溫酒調下

箇香酒 治打撲肢體凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙

炒

茴香

炒

疎桂

各一錢

每服二錢食前熱酒調下

南京下浮橋梁回回丹藥每用二三厘瓜仁搗

一僧自然銅第製法精爾

魚自然銅第製法精爾

筋斷

丹溪法接筋用旋覆花根杵汁滴傷處將渣封

膠上半月筋自續即金沸草根

接耳鼻法

治擦落耳鼻用髮入礮子塩泥固濟煨過爲末

乘急以所落耳鼻蘸灰綴定以軟絹縛定効昔

一僧爲驢咬下鼻用之効

肩破

肩重肩破者剪猫兒頭上毛不語唾貼之

遠行打破脚起泡調生麪糊貼過夜即乾不可

擦破又法用飯粘貼過夜以紙蓋之次日平復

從高墜下惡血流于脇下痛不可忍復元活血

湯主之脇乃肝膽之位故以柴胡爲君當歸三

錢活血肝苦急甘草二錢緩之炮川山甲瓜蒌

紅花桃仁各三錢行血化滯酒大黃蕩滌敗血

水酒煎服方大有理

從高墜下惡血在骨節間疼不可忍芸臺散主

之

荆芥 藕節各二兩 芸臺子 碎硝

馬齒莧各一兩

右爲末用蘇子半兩酒一大盞煎七分調下

二錢隨上下同

傷損愈後肌膚青腫用茄子種通黃極大者切

片一指厚瓦上焙乾爲末酒調二錢臨睡服一

夜三急用手法拏上遲則惡血填滿白中難

愈無痕

破傷

身體偶有所傷或風從瘡口入名破傷風多火

最急症也其症身體搖擻口噤自汗身熱如火

勢急非常藥可治者必以防風全蝎爲主口不

能開用十個爲末酒調下

破傷風汚血疑心鴉翎燒灰存性研末細酒調

下一錢

已汗而身熱不清用 瓜蔓九錢 滑石 南星

蒼朮 赤芍 陳皮一錢 黃柏炒 黃芩

白芷五錢 甘草 薑一片煎服

防風湯 治破傷風同傷寒傳入裏宜急服

防風 羌活 獨活 川芎各等分

水煎不時服甚者加藁本細辛或調蜈蚣散

大効

蜈蚣一雙 江鰮五錢 左盤龍五錢炒

右爲末每服二錢用防風湯調下如前藥解

不已覺轉入裏當服左盤龍丸服之看臟

腑軟硬加巴豆霜

左盤龍丸 治風毒在裏直視

左盤龍 殭蚕炒 江鯉炒 雄黃一錢

右為末燒餅丸桐子大每服十九酒下如裏

不減將末一半入巴豆霜五分如前丸每

左盤龍一服加一丸漸加至利為度如搐

不止再服羗活湯

羗活湯

羗活 獨活 地榆 防風各錢

水煎服如熱加黃芩有痰加半夏

治法彙八卷 破傷 一百九

若病久氣血漸虛脾胃受邪宜養脾祛邪為主

養血當歸地黃湯

四物湯加藁本細辛防風白芷

水煎服

如汗不止或服發散藥後不止服白朮防風湯

即二味加黃耆是也

破傷臟腑秘小便赤用表藥汗不休宜速下之

先用芎黃湯不已用大芎黃湯

芎黃湯

川芎錢三 黃芩錢二 甘草錢一 溫服

大芎黃湯

川芎二錢 羗活 黃芩 大黃各五錢

煎服利為度

羗活湯 治半在表半在裏者

羗活 菊花 麻黃 川芎 白茯苓

防風 石膏 前胡 黃芩 細辛

甘草 枳殼 薄荷 白芷 蔓荊子

水煎通口服

治法彙八卷 破傷 一百九

白朮散 治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮 葛根 芍藥 升麻 黃芩

甘草 水煎溫服

玉真散 治破傷風及金瘡冒風

天南星 防風等分

右為末破傷風以藥敷瘡口後以溫酒調下

一錢如牙關緊急角弓反張以二錢調下

歐打欲厥內損以溫酒下如已昏絕心口

尚溫者童便灌下二錢連進二服

為防風所製服之不麻衛生寶鑑名

散治風狗咬破先以口噙漿洗淨用細

貼再不發

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼朮六兩川烏頭炮去皮防風 草烏頭炮去皮

細辛各二兩兩頭尖炮去皮天麻 川芎

白芷各兩損骨加乳香

右為細末每服一錢酒調下

經驗方 治破傷風極效

治法錄入卷八

百

初覺有風時急取熱糞堆內蟬蟪蟲二個

用手捏住待蟲口中吐些小水就沫在破

傷處身穿稍厚衣裳待片時瘡口覺麻兩

脇微汗風出立效

如風急速取此蟲三五個剪去尾將肚

內小塗瘡口再滴些水入熱酒內飲之

立効

四照 小可治一頭目青黑二額上汗斑

三服小目瞪四身汗如油又痛不在瘡處

經絡症也

外治初覺瘡腫起白痴身寒熱急用玉真散傳

之或用杏仁去皮細嚼和雄黃飛羅麝傳之腫

消為度○若腰脊反張四肢強直牙緊口噤用

鼠一頭和尾燒灰細研臘猪脂和傳○牙關緊

不能開用蜈蚣一條焙乾研末擦牙吐涎立愈

狗咬破傷風人參不拘多少桑火上燒研末

益子合研為末摻瘡上仍以魚鱉煑封

諸嘔

不啻而候嘔于喉當察明是何物以所勝能
者治之如魚畏椒柳魚刺嘔用之無則用核磨
水服狗涎治骨嘔驚涎治稻芒嘔鴨涎治螺螄
嘔磁石治鐵嘔水銀治金銀嘔要在變而通之
法不若咒由妙金陵秣陵鄉中一人姓李號
守泉符水絕妙遠近求無不立効其法命嘔者
坐自己佛堂中佛前放一盂淨水令親屬往求
燒符用法訖徐以小箋卜之云已愈矣其人歸

重

家看淨水中所嘔之物在內隨愈乃親見者

本草云楮實軟骨諸骨嘔者搗自然汁服或用乾
者為末和水取汁亦可楮皮亦効

玉簪花根爛骨研細取汁用竹管灌喉中不可
着齒犯之齒酥萱草根亦治骨嘔

又法槿樹葉油馬尾勃砂糖三味熬膏為丸食

化屢驗

又法水牛尿上生草晒花為末用砂糖為丸徐

徐禁吞下仍以砂糖為衣不然損齒

金鳳子嘔嘔化無干用根極能爛骨

又法用野苧根洗淨搗泥每用龍眼大如
骨以雞羹化下魚則魚湯鷄骨嘔用水煎
汁飲之骨自下

魚骨在肚中刺痛煎茱萸湯一盞飲之骨軟而
出魚嘔百法不應餵糖丸鷄子大吞之立下
誤吞錢及環錫糖一斤漸漸食之自出

錢嘔艾一把水五升煎至一升頓服便下

又法用竹根燒灰湯調下

治法集八卷諸嘔

重

又法百部根煮酒下

相傳錢銅嘔勃生醫効山居方用加茨菰汁
誤吞錢及金銀物以胡粉兩搗調之分再服

如在腹中不消服水銀自化又法服砂仁湯自
下

諸嘔用雞白煮半熟以線縛定手執線頭少嚼

雞白嚙之度雞至受處便牽引嘔即隨出又法
用絲綿一小塊如上法亦妙

骨嘔外宜燒乳香或用皂角末取嚏出

小兒誤吞一錢在喉中不下諸醫不

出亦不能出亦不能下乃命戴人戴人孰思

忽得一策以淨白表紙令卷實如筋以刀縱

橫剖其端作鬚髭之狀又別取一筋縛鐵線鉗

于其端令不可脫先下咽中輕提輕折探之斂

鈎入錢眼中然後以紙納咽中與鈎尖相抵費

鈞紙入紙卷之端不礙肌肉提之而出

一人誤吞一針刺于喉中不得出想得法用

伯姑衆人卷諸
 茲三能又戲者晉光小衆大下一根泉鑿定

磁石能引鐵者厥方、王云持一印系其下、

乃水則更不下。用多手。東籬竺竺煎湯下。

竹木藥石之用參照所錄各人方論

兄弟者更

以爭器盛新及水、一盞奉之、而東默念云、謹

請太上東岳順水急急如南方火帝律令勅

一氣念隨卽吹一口氣入水中如此七次以

水與麝者立下、或用此水、可以吞針、筋竹刺、

以左手屈中指及無名指作三山印半水盞于

其上右手捏金鎗印脚踏丁字立望太陽或燈

火取氣一口在淨水盞中咒曰吾取太上老君

東流順水老君奉勅擲去毒水吾托太帝尊所

到稱吾者各現帝身急急如律令攝念七遍吹

在盞中虛攪卓三次爲定自與水飲之自愈

取諸骨龍神符

電
電
電
電
電
電
電

電開
電在

咒水此碗化為東洋大海咽喉化為萬丈

龍潭
龍歸洞
吾奉

太上老君急急如律令奉勅吸東方生氣三口

吹入碗中、每行此法、正面朝東、用淨水大碗放

卓上、左手執拳在胸前、右手執劍訣于碗中書

前符號假如魚哽就書上龜字除龜龜二字勿

書再書下八符餘倣此

呪水治諸便

湯火瘡

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍半時卽不痛
惟不可以冷水湯之及井底泥傳之使熱氣不
出則入見肉

火燒以好酒洗之又以鹽傳其上如皮塌以酒
熬牛皮膠傳之如湯傷以淋過二次灰查傳
上立安熱酒傷糯米粉炒黑末調傳之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰鷄子黃和
傳之如成瘡白蜜封以竹中膜貼上日三

治湯火瘡

經驗方湯火瘡麩皮炒黑灰爲末傳神妙此方
有補性始終皆可

千金方火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚
乃佳已成瘡燒白糖灰傳之燥卽瘥

冰霜散治火燒皮爛太痛

寒水石燒牡礪燒朴硝青黛輕粉各等分

共末并水調搽

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂寒水石大黃各等分

石爲末以新汲水調塗

丹溪方火燒用桐油水銀等分二件以柳條
住手攪成膏再入大黃石膏末和以牛皮膠入
少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼之

苦參末油調搽亦佳又方火瘡痛不可忍用
尿坑底下泥加老薑汁麻油十分之一研勻搽
傷處立愈青黛敷亦可

火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水些
少待爛成水傳上神妙

治湯火瘡

熱油傷蜜搽佳火瘡敗壞雲母粉同生羊髓
和塗之湯火瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲

末香油調敷

又方用髮一束香油煎以髮盡爲度放冷搽患
處

又方熱油及火傷定痛以丹參細挫水調和羊
脂煎三上三下敷瘡立愈

又方鷄子十數個石器中熬自然油敷之

竹木刺肉

竹木刺入肉中不出用蟬蛸研敷立出
一方白茅根搗傳亦妙 一方嚼牛膝根卷之
又方竹木刺入深不得出烏羊屎研爛卷傷處
蘆葦刺入肉細嚼栗子查盒痛處 諸刺已出
而痛不止螻蛄研傳 針入肉不出用螻蛄腦
子同礬黃研細調敷以紙花貼定如覺痒時其
針自出 又方車脂攤紙上如錢厚二日一換
三五次其針自出 又方用烏鴉翎三五枝炙
黃色研末好醋調膏塗瘡上一二時針出效
又方薏仁杏仁搗爛以車脂調勻貼自出 已
出而痛不減黃泥卷之 諸骨刺入肉不出水
煮白梅肉研調象牙末傳自軟 咽中刺象牙
水調飲之牙梳爲末亦可 魚骨在肉中不出
者嚼莫茱萸封之
破傷風血凝心針入肉三症如神方烏鴉翎燒
灰存性細研服一錢滾湯下

箭頭入肉

箭鏃入骨不可拔巴豆去殼研爛蠅蝦共研勻
塗所傷處須臾痛定漸痒不可忍使撼動拔之
又法蠅蝦不拘多少麝香共末摻箭瘡上

萬全神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治
之用葭若科卽天僊子苗也於端午前一日持
不語戒於野中尋得揀科根實全者口念先生
爾却在這裡卽以柴灰自東南頭圍了用水篋
掀起週迴土次日端午日未出時依前持不語
用水擦只一擦取出水洗淨不令婦人雞犬見

治法藥八卷 竹木刺肉

五

淨室中石相內搗爲泥丸如彈子大以黃丹爲
衣以紙袋封懸在高處陰乾若遇箭不出者以
緋帛絹袋盛此藥一丸放臍中綿束肚繫先以
象牙末貼瘡上後用此藥若箭瘡口小卽用刀
刮開以象牙末貼之

孫真人治箭頭在咽喉胸膈不出以螻蛄搗汁

滴三五

瓜葉搗傳亦妙

循衣摸床

循衣摸床多是大虛之候乃精神耗散不能主持也不問雜病傷寒以大劑補之多有生者海藏云婦人血風因大脫血崩漏或前後失血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸床閉目不醒揚手掀足推動不寧錯語失神脉浮弦而虛內躁熱之極也氣麓鼻乾不潤上下通燥此為難治宜生地黃黃連湯傷寒熱邪傳裏有此症而脉實者大承氣湯

治法彙入卷八循衣

再二

診法 病人循衣撮空語者不治 病人陰陽

俱絕掣衣撮空妄言者死

哭不休

內經曰神有餘則哭不休所謂神者心火是也火得風而煽哭之象也黃連解毒湯加半夏竹葉竹瀝薑汁戴人用滄塩成塊者二兩火燒赤放冷細研以河水煎服探吐出痰而愈

悲

仲景曰婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作

數欠伸甘麥大棗湯主之甘草三兩小麥一升大棗十枚煮三升溫分三服

邪祟

神見神見鬼皆自己精神飄蕩非真有神鬼也如果山居野處宅近古廟神堂氣血虛者感而作祟正人君子神旺者無有也丹溪曰血氣者心之神神既虛乏邪因而入理或有之若夫氣血兩虛痰滯心竅妨碍升降不得運行以致十二官各失其職視聽言動皆為虛妄以邪治之其人必死

治法彙入卷八邪祟

再二

脉乍疎乍數乍大乍小祟也

丹溪曰俗云衝惡者謂衝斤邪祟而病也如病此者未有不由氣血先虧而致者焉

病人自見五色鬼屬五臟元神神不守舍實非有神也當詢之傍人如不見即是乃元氣極虛之病肺虛見白鬼兼見面青唇青酒浙等肺家病參著大補肺氣自安舉此他臟可類推矣五邪刺法

肝虛見白屍鬼

屍症，昏靜異，其狀面色時五色如含愧赧，語言不倫，或跳躍，時見異症，脈來乍大乍小，是邪氣所逼，而然。古方用死人枕煎湯飲之，以驅邪解類而出，大瀉數行，即愈。仍以其枕送還原處。

素承神灸見法，用排繩將兩手大指相並，令縛緊去甲一韭葉，肉與甲要四處着艾，灸七壯，神效。

效。

經驗辟邪丹 治衝惡怪及九尾狐精為患

人參 茯神 遠志 鬼箭羽 白朮

九節菖蒲 蒼朮 各一兩 當歸 兩一 桃奴 焙乾

雄黃 辰砂各三錢 甘草 另研 金箔 二十片

或加麝香

右共為末，以酒調米粉打糊丸，龍眼大，金箔為衣，用時木香湯化下一丸，諸邪迴避，更以絳紗囊盛五六丸懸之帳中，尤妙。

關格

關則不得小便，格則吐逆，寒在胸中，格絕不通，熱結下焦，津液不行，關者甚熱之氣，格者甚寒之氣。大法宜吐以提其氣之橫格，不必在出痰也。有痰者宜吐，二陳湯吐之，吐中便有降，有中氣虛而不運者，補氣藥中升降之，或用針以升降其氣。兩手寸口俱盛四倍以上，多成婦人久吐不尿，頭汗出，即成，乃氣脫也。

九竅五臟陰極自地而升，是行陽道，乃東方之

法貴入卷六關格

三

金石之變上壅是也，則陽道不行，反閉于上，故令人吐逆，是地氣之不能上行也，逆而下降，及行陰道，故氣填塞而不入，則氣口之脈大四倍于人迎，此清氣反行濁道也，故曰格。下竅六腑陽極自天而降，是行陰道，乃西方之氣，膏粱之物下泄是也，極則陰道不行，反閉于下，故不得小便，是天之氣不得下通也，逆而上行，反行陽道，故血脈凝滯而不通，則人迎之脈大四倍于氣口，此濁氣反行清道也，故曰關。

右脈沉細手足冷既濟丸主之

熟附子

人參

錢各一

麝香

少許

右糊丸桐子大麝香為衣燈心湯下七丸

栝榔益氣湯

治關格因勞後氣虛不運者

栝榔

用多人參

白朮

當歸

黃芪

陳皮

升麻

甘草

柴胡

枳殼

生薑煎服

中脘疼後小便不通兩寸關滑實是痰膈中焦

氣滯下焦用木通二陳枳殼加薑先服後吐更

治法

生地黃

黃連

甘草

炙各等分

每服四錢水一盞薑五片煎服無時

醫學六要十九卷

浙江巡撫採進本

明張三錫撰三錫字叔承應天人是編成於萬厯

乙酉以醫學大端有六分別論列首四診法一卷

次經絡考一卷次病機部二卷次本草選六卷次

治法彙八卷次運氣畧一卷自謂博采羣書各彙

其要然雜錄舊文無所折衷王肯堂叙以醫聖稱

之過矣

刪補頤生微論四卷

〔明〕李中梓撰

中國科學院圖書館藏明崇禎十五年刻本

附《四庫全書總目·刪補頤生

微論四卷》提要

刪補頤生微論序

夫用兵、救亂、用藥、救生、道在應
危、微之介、非神聖不能善中也
故兩者均、自黃帝發之、非黃帝
之獨能、汪精也得道之至者、靡
弗通、靡弗通而兼通於醫者、乃
序一

入神聖、三略云、莫不貪強、鮮能
守微、人能守微、乃保其生、聖人
存之以應事機、何長生之學、偕
於殺機之發乎、蓋靡弗通而通
焉者耳、余少治經生言、及兩親
子俱以藥誤、予又蚤歲多疴、始

惕朕迫于思而以鄒魯之業兼
岐黃家言藥世道之受病而因
以通有生之疾似同源而流矣
自

神廟戊午採輯成是編鐫而懸
之肆乃翕朕徧走天下嗣後非

序二

不究天人叅禪玄詢國政未甘
擅專門學而携挾持扶以請一
刀圭者日且相迫三吳中遂以
長沙氏目相之予豈敢云靡弗
通而通于是抑亦相迫而漸至
使朕者耶今二十五年以來不

無少進階級思一再訂期絲毫
不有誤後世而未可輕與語也
庚辰秋吳門沈子朗仲翩朕來
歸一握手而莫逆於心端凝厚
藏慷慨浩直而不湯齒頰義朕
載道之偉器與語移旦暮鮮弗

序三

神領靈樞諸經典了朕會大意
投藥中窾若朕如庖丁游刃豈
特曰吾道西矣而邈朕弗可量
已于是相與辨幾微叅益損躋
巔極破偏拘皇皇登于大道以
俟百世可以畫一則庶幾其快

我隱謝我過焉嗟乎吾道之不
孤其有賴于朗仲也乎因再付
之剞劂與同事諸君更一改觀
儻云知青于藍雖釋其舊本可
也已

崇禎壬午四月華亭李中梓書

序四

於飛映閣

補願生微論總目并凡例

第一卷

三奇論第一

素問謂聖人治未病則修鍊尚矣故以是篇
爲冠亦內經首叙天真之意也口口秘密固
不形於紙而大意則不妨敷布恐謂旁門所
亂耳外附修養諸瀆雖非至道而習之無間
自有奇徵勿以易而忽之

醫宗論第二

補願生微論

總目凡例

自軒輊以暨熙朝醫之有著述者傳誌之
以便徵稽且見醫典淵多見聞宜廣不得以
空疎之識操司命之權也

先天論第三

物非芝醴必有本源學極治平錄知先後欲
衛生而不知所緣生猶振裘不舉領也生始
維何腎水是已五官百骸持行視聽俱待以
爲命不知節齊而以勞擾耗之男女竭之固
非妄談採補而曰把牢春汛不放龍飛亦非

惟有茹澹節情庶幾還元返本作先天根本論

後天論第四

母腹乍離便知食飲不學而能洵天德也其臟脾其脾胃水穀從而腐熟他臟賴以灌輸配位則坤譬兵則餉安穀絕穀成生懸殊饑飽失調勞逸不節皆非知本者也安僦木餉子金補母火天枉者尙其鮮矣刺後天以續先天深有望于聚灰煉石之聖手

刪補願生後論

總目凡例

辨妄論第五

高陽生本庸下之流撰繆訣以欺世承訛千載雖已漸知其非未能力返其是今以內經證之庶幾有徵可信而晦蝕者重光也

審象論第六

脉有神機不離乎象象之不審妄附于神是無米而炊也故拈其相似者別之相反者列之其四時六氣南北司天平脉或脉則備述之蓋欲約而該耳

宣藥論第七

古人比用藥於兵示其難其慎之意且喻隨時通變也然理義與深筆舌莫罄若能由此篇而推廣之其於處方思過半矣

運氣論第八

窮天之紀自古難之苟或罔知天紀歲氣之說廢矣今寓淵深於簡易俾途轍可循不至驚觀於海若也

○第二卷

刪補願生後論

總目凡例

臟腑論第九

十二經中百病具足五行攸屬職司攸分先聖諄諄指示直可見垣於紙上矣萃而錄之心目了然識病之法無要于此

別症論第十

常病易曉變病難知水火亢承陰陽倒置千里毫釐天傷者有矣特爲分辨數端庶可引伸不匱

四要論第十一

神聖工巧醫之四要可以互參勿得相失恃此而廢彼良醫弗爲也選其要綱以存梗概尤願學者因此而廣稽焉斯善矣

化源論第十二

治病必求于本故古稱神良者莫不以取化源爲第一義此義不彰棄根莖而問枝葉何效之臻故特揭而表明之

知機論第十三

病固有機微而寔顯知其機者間不容髮不

刪補順生微論

總目凡例

四

知其機是以人命爲僥倖也淵乎哉機神而明之母自阻焉

前治論第十四

病之不齊治因以變不盡其道而歸數於天實實虛虛伊誰之愆用微前治以壽吾世此治之不容不明也

風土論第十五

五方異宜法與之變膠而不化是以生道殺之矣謹按五宮以分九州京省區別遐邇同

拯進乎技矣

虛癆論第十六

莫重於癆爲其根本傷也傷在根本治在枝節何惟乎無功況古人分別此症至有百種惟執一途以治之幾何而不夭人之年也此特闡其根本悉其種類願天下爲通變耳

邪祟論第十七

邪祟一症古未有深發其原者故敢表而出之尤明受病之緣自可得治法矣

刪補順生微論

總目凡例

五

傷寒論第十八

長沙垂教立三百九十七法一百一十三方靡有漏矣不諳其書鮮不夭枉嗟乎生歿在瞬息不得不詳爲之論也仁者其重圖之

廣嗣論第十九

一身當絕續之關傾不亟且鉅世之論種育者皆執一端耳茲且集衆論而彙其全原至理而訂其舛蓋欲胥天下而慶壽斯也

婦科論第二十

性主陰柔心多愁悲常失之滯而不能灑落
況望聞問切多所難詳重情輕醫有奇莫展
故婦科之要情志爲先而醫者宜辨也

第三卷

藥性論第二十一

博稽廣收剪繁去復諸賢之說有互相辨難
者並陳之以備考求正錄一百二十品附錄
二十品蓋選其最要者以便精熟耳

第四卷

刪補願生微論

總目凡例

六

醫方論第二十二

輕重奇偶之制君臣佐使之法雖爲發明見
古人立方深意以免妄投如補中益氣東垣
自叙傷寒諸方成氏註釋皆存原文但刪其
浮補其略耳醫方考中有數語可採者仍以
吳氏繫之計方八十首

醫案論第二十三

愚之不敏業攻鉛藥又與知醫能免掛漏之
議乎然一點詳慎之念可對天地質鬼神矣

志拯持罔敢或怠以故往往奏功述案三十
條皆症之變者而常者不贅也

感應論第二十四

古人良相良醫並列而論表其濟世之心也
世俗爲貪心所使每流于薄律以仁壽漠不
關心良可慨矣故錄善惡之報十條殿于篇
末使學者見而惕然共全聖賢之念耳
一內經爲醫學之祖每篇必引援相證願天下
爲有本之學毋以淺近畫也

刪補願生微論

總目凡例

七

一篇中但取詞意顯達未免無文盡欲通乎時
俗令學者不煩轉解耳

一陶節菴錄成家秘的本戒其子曰珍藏勿泄
恐淺陋者妄肆詆訾余何人斯而以諸論彰
醜於世議議其可免耶第傳濟爲懷葵心熱
血自不能已於論耳人言所不恤也

一醫之爲道通天地人義微而費無有紀極茲
撰內經知要昭有熊之秘密集百家之神髓
爲上達者資也同志者尚其鑒諸

凡例終

刪補願生微論卷之一

雲間念我李中樞

吳趨門人沈

男 允恒書臣全閱

三奇論第一

三奇者儒經所謂人有三奇精氣神也聖人治未病則修煉尚矣用冠篇首散啓玄首叙天真之意也玄玄秘密固不形于紙上而大意則不妨數布恐爲旁門所亂耳附修攝法二十五條久習自有奇驗勿以易而忽之

王太僕重次內經移九卷天真論以冠篇首其旨何居有隸氏以絳宮玄府之秘開靈蘭金匱之先分久

刪補願生微論 卷一

視而拯天札安在不忤鼓應耶今談道者牛毛成道者麟角總未夢見內經者也天真論云上古之人其知道者法于陰陽和于術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年又曰恬澹虛無真氣從之精神內守病安從來復有真人至人聖人賢人之別均之修煉而深淺不齊然精氣與神未有或殊者也余因之嗜道詳徵僊典博訪異人幸聞性命之奧獲起沉痾之疴至神奇亦至簡易但明先天祖氣便爲入道之門夫是祖氣始于混沌未開伏于無形無象視之不可見聽之不可聞生天生地生

人生物者也老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮

獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其

名字之曰道者是也胎息經云氣入身來謂之生神

去離形謂之死知神氣者可以長生固守虛無以養

神氣神行即氣行神住即氣住若欲長生神氣須注

僊籍曰人在氣中如魚在水中魚一刻無水即盡人

一刻無氣即亡又曰神是性兮氣是命神不外馳氣

自定又曰陽氣一分不盡則不灰東垣曰氣乃神之

祖精乃氣之子氣者精神之根蒂也悟真篇云道自

虛無生一氣便從一氣產陰陽玄同子曰人未生時

刪補願生微論 卷一

受茲祖氣便能生育此身然則招攝此氣豈不能長

生耶白玉蟾曰鍊形見性憑君作招氣無門老不羣

招之者非口鼻呼吸非津液灌輸非臍內存神非丹

田凝抱非心下腎上非兩腎中間非升坎填離非通

任督督非陰陽一開非眉間一穴非泥丸峰頂非湧

泉海底非窺中極非守陽根非丹爐烹鍊非房中採

取故鍾離曰涕洟津精氣血液七般靈物總皆陰若

將此物爲丹質怎得飛神貫玉京又曰四大一身皆

屬陰不知何物是陽精康節先生一口道破云乾遇

巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三

十六宮都是春。此明明指出人身天地之正中得訣下手。只須一香之項。先天祖氣忽然扯入鼻孔。如迎風之狀。扯入一次。即盜奪一次。三日之後。當源源而來。七日來復。百日工畢。是斗柄招太陽。徑寸混三才之大道也。無奈傍門邪術。訛傳錯教。非徒無益。而又害之。故袁一凡云。隨守一處。皆可收心。苟失其宜。禍害立起。若夫虛勞內損。痼疾經年。雖偏倉神聖。望而却走。倘能積氣開關。猶可回生。起死。積氣非呼吸爲工。開關非搬運爲力。簡易而無繁曠之苦。自然而無勉強之勞。氣足則庶氣上騰。甘露下灌。三關開通。百

刪補願生微論

卷一

三

骸暢遂。從前受病之根。斬刈無遺。嗣後真元之氣。蒸蒸日上。余雖不敏。當事于斯。以起奇疴。雖非久視之大道。實爲却病之神工。否則與道相失。去成不遠。而猶冀以草木生之。何惟其不相及也。王氏首揭天真之旨。其在斯乎。

附修攝法二十五條

桑榆子曰。精化爲氣。氣化而神。集焉。元氣充滿。神必備矣。憂患動中。則知見因而暫虧。蓋氣權有不至者耳。故曰。神能御氣。則鼻不失息。譚紫霄曰。神猶母也。氣猶子也。以神召氣。如以母召子。劉赤脚云。

神氣如子母相親。只爲塵情間隔。若去一分塵情。即有一分升降。

後天氣與先天氣同出而異名。先天網緼于無形。後天有形而可見。其實一而已矣。故曰。採先天鍊後天。相制化作神。僊善養氣者。行欲徐而穩。立欲定而恭。坐欲端而直。聲欲低而和。使此身常在太和元氣中。久久自有聖賢氣象。

呼吸有聲者。風也。非息也。守風則散。雖無聲而鼻中澁滯者。喘也。非息也。守喘則結。不聲不滯而往來有迹者。氣也。非息也。守氣則勞。所謂息者。不出不

刪補願生微論

卷一

四

入之義。綿綿密密。若存若亡。心不着境。無我無人。更有何息可調。至此則神自返。息自定。息相依水火相媾。息息歸根。金丹之母。丘長春云。息有一毫之未定。命非已有。

人身之血。百骸貫通。及慾事既作。撮一身之血。至于命門。化精以泄。夫精者。神倚之如魚得水。氣依之如霧覆淵。不知節制。則百脉枯槁。交接必損腎。外雖不泄。精已離宮。定有真精數點。隨陽之痿而溢。出如火之有烟。焰豈能復返于新哉。腎中陽氣。至子而生。夜半子時。披衣起坐。兩手搓熱。

一手撚外腎。手掩臍而凝神于內腎。久久習之而精旺矣。

金丹秘訣曰。一捺一撚。左右換手。九九之數。真陽不走。戌亥二時。陰陽衰之候。一手撚外腎。一手擦臍下。左右換手。各擦八十一。半月精固。久而彌佳。張成之曰。卧時坐于床。垂足解衣。閉息。舌挂上腭。目視頂門。提縮谷道。兩手摩兩腎。各一百二十多。多益善。極能生精固陽。治腰痛。

每上床時。兩足赤肉。更番用一手握足。一手摩湧泉。多至千數。少亦百餘。能固真去濕。

刪補願生微論

卷一

五

千六字訣曰。一吸便提。氣氣歸臍。一提便嚙。水火相見。不拘行住坐卧。舌攪華池。抵挂上腭。滿口津生。嚙下谷。谷有聲。隨于鼻中吸清氣一口。以意目力送。至臍下一寸三分。畧存一在。調之一吸。隨將下部輕輕如忍便狀。以意目力提起。上夾脊雙關。直至玉枕。透入泥丸。謂之一吐。周而復始。嚙時有津固妙。無津亦谷谷然嚙之。不拘多寡。只要每日母間。久行精神強旺。百病不生。入房即有採補之功。六字訣曰。自子至巳。六陽時。面向東方。勿閉窓戶。又忌風入。解帶正坐。叩齒四九。攪口中濁津。漱鍊一

二百。候成清水。即低頭。谷谷嚙下。送至丹田。開口念呵字。以吐心中毒氣。念時耳不得聞呵字聲。聞即氣粗。反損心氣。念畢。仰頭閉口。將鼻徐徐吸清氣。以補心氣。吸時亦不得聞吸聲。但呵時令短。吸時令長。如是六次。則心毒散而心元復矣。依此式念呼字。治脾。呵字。治肺。噓字。治肝。嘻字。治膽。吹字。治腎。並各六次。是謂小周。

黃素四十四方經云。夜寢欲合眼時。以手撫心三過。閉目微祝曰。太靈九宮。太乙守房。百神參位。魂魄和同。長生不死。塞滅邪凶。此隱寢魂之法。常能行

刪補願生微論

卷一

六

之。魂魄安寧。身中三尺。常以庚申日。錄人罪過。奏聞上帝。減人祿命。每遇庚申。徹夜不卧。三尸不得上奏。上尸名彭居。中尸名彭質。下尸名彭矯。卧時叩齒三七。左手撫心。呼三尸名。令不敢為害。患停滯者。閉息。納氣猛送下。鼓動胸腹。兩手作挽弓狀。氣極滿。緩緩呵出五七。通快即止。患感冒者。盤足端坐。兩手緊攥。外腎閉息。存氣自尾間上夾脊。透泥丸。逐其邪氣。低頭屈抑。如禮拜狀。得汗為度。

患齒疾者晨醒扣齒四九納氣三口。每日呼去脾毒。食後必漱潔。小解必緊咬。永無齒疾。

患目昏者靜坐閉息。垂簾塞兌。兩目輪左轉七遍。右轉七遍。緊閉少時。忽大睜開。

患頭眩者靜坐閉息。兩手掩耳。折頭五七次。存想元神。逆上泥丸。風邪自散。

心靜則神悅。神悅則福生。人能化毒性以救死。養喜神以延生。必去身災。兼除人患。

精欲漏時。提氣守泥丸。或微呵一二次。勿使心氣下。從雖有走漏。可無大傷。切勿于後行房。陽方生而

刪補順生微論

卷一

七

頃滅之一度。傷于百度。

食飽徐行。摸腹解帶。伸腰使食下舒。方可就坐。飽坐發痔。食後曲胸而坐。必病中滿。怒後勿食。食後勿怒。醉後勿飲。飽餘勿便趾。

髮宜多梳。面宜多擦。胸宜常護。目宜常運。耳宜常凝。口宜常閉。齒宜常扣。氣宜常提。津宜常嚥。濁宜常呼。背宜常煖。腹宜常摩。囊宜常舉。肢節宜常搖動。皮膚宜常乾沐。

孫真人曰。大怒交合成癰疽。疲勞入房。虛損少子。身體常欲小勞。流水不腐。戶樞不朽。運動故也。

常當內視五臟。了了分明。勿食一切膾子。損人

忍小便。膝冷成麻。忍大便。乃成氣癰。着濕衣

汗衣。令人生瘡。頭勿向北卧。頭邊勿安火爐。

夜卧魂驚。勿燃燈喚之。亦勿近身急喚。惡夢不

可說。蚤起含水向東噴之。呪曰。惡夢着草木。好夢

成寶玉。凡在家及出行。逢疾風暴雨。震雷昏霧。

皆有惡神經過。宜入室閉戶。靜坐焚香。過後乃出。

方不損人。

却病十法。心如木石。觀四大假合。一也。煩惱現前。以必譬之。二也。常將不如我者。巧自寬慰。三也。造物

刪補順生微論

卷一

八

勞我以生。遇病却開。反生慶幸。四也。痛苦不適宿業難逃。惟歡喜領受。五也。室家和睦。無交謫之言。六也。衆生各有病根。常自觀察克治。七也。風露嚴防。嗜慾淡薄。八也。飲食寧節。毋多。起居務適。毋強。九也。高人良友。講開懷出世之談。十也。

病有十不治。恣縱恣淫。不自珍重。一也。窘若拘囚。無滿瀝趣。二也。怨天尤人。廣生懊惱。三也。今日豫愁明日。一年常計百年。四也。室家聒噪。動成荆棘。五也。聽信禱賽。廣行殺戮。六也。寢興不適。飲食無度。七也。諱疾忌醫。攻補妄投。八也。過服湯藥。蕩滌腸

胃九也以成爲苦難割難捨十也

四時調攝法

春三月此謂發陳夜卧蚤起肝旺脾衰減酸增甘
節情慾以葆生生之氣少飲酒以防逆上之火
正月衣宜下厚而上薄勿驟脫衣勿令犯風夏必
衾泄二月宜煖衣令得微汗以散去冬伏邪

三月勿處濕地勿露體星宿下

夏三月此謂蕃秀夜卧蚤起心旺肺衰減苦增辛
伏陰在內宜戒生冷神氣散越宜遠房室勿暴怒
勿當風至秋爲瘡勿晝卧勿引飲主招百病四

刪補順生微論

卷一

九

月純陽之月忌入房五月毒月君子齋戒薄滋
味節嗜慾露雨濕蒸宜烘燥衣時焚香求常療湯
泉穢以護足六月勿濯冷勿貪風夜勿納涼卧
勿搖扇腹護單食必溫煖

秋三月此謂容平蚤卧蚤起肺旺肝衰減辛增酸
收斂神氣禁吐禁汗七月須取爽氣足與胸宜

微涼八月勿食薑勿沾秋露九月宜養筋

冬三月此謂閉藏蚤卧晚起腎旺心衰減鹹增苦
煖足凉胸曝背避寒勿令出汗目勿近火足宜常
濯十月屬亥純陰之月一歲發育之功實胚胎

于此大忌入房十一月一陽方生遠帷幙省言
語十二月禁疲勞陽汗出

余蚤歲攻儒讀無言無隱之章便覺疑團磨礪壯年
學道頗得真詮洞知不根虛靜者即是邪術晚歲參
禪幸遇明眼尊宿壁立萬仞把箇沒滋味鐵酸餽劈
頭拈示未嘗落草盤桓但與本分草料忽爾轉身豁
開向上大機人用開口不在舌頭擎茶受食何處不
垂指示乃知夫子無言無隱和盤托出老氏虛極靜
篤祇證教家蓋嘗統而論之三教同一心地法門孔
子多從倫常日用處提撕不壞世間相而談實相者

刪補順生微論

卷一

十

也老子長生黃白男女之說悲世貪執順其所欲漸
次導之世尊四十九年說法猶是隨人顛倒至拈花
一着方稱本懷且下一刀兩段坐斷千聖頂額是知
三教聖人心法雖同而直捷痛快未有妙于禪宗者
也

醫宗論第二

夫醫也者近之治身消患于未兆遠之治人廣惠于
無窮然非研求靈素玩味諸家雖至敏者不能闢無
師之智也夫病者聽醫猶聽神明醫誠良而聽之宜
也今醫師徧天下而術未工病者疑信半而姑聽命

焉又以好全惡危之心待之病非在皮膚效期于旦夕旦不效旦更夕不效夕更而醫始不能盡其技矣故天下不尊醫醫亦不自尊急而未醫醫亦急而求術古之藝精而試今之藝試而精古之人法治病今之人病合法醫固如此人于何尤君子慨然以仁壽爲已任非博綜無繇也昔在神農闢本草四卷素寒熱溫平分君臣佐使開萬世之聾瞶救斯民之夭枉黃帝內經十八卷上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身闡發玄機弘開壽域醫師未能諳熟便爲無本庸流第徵辭與義非淺衷者敢窺也商有伊尹作

刪補順生微論

卷一

上

湯液本草明輕清重濁晰陰陽升降及十二經表裏之宜製方之祖也秦越人成難經八十一卷爲有燕之勲臣開後學之師表惜其誤以命門一穴指爲右腎考之明堂銅人諸經灼然見智者之一失也漢之倉公識見超異史稱其神而迴風偕風未詳其旨長沙仲景著傷寒論二十二篇三百九十七法一百一十三方賢金匱玉函等經屬傷寒之鼻祖真濟世之慈航若法與未詳而妄輕投治比之操舟何以異焉至憤激之說以不服藥爲中醫令讀者酸鼻矣魏有華佗鍼灸湯丸應手取效剗腹煎臍神惟百端內藏

圖說其遺意也晉有王叔和脈經十卷分三部九候辨人迎氣口聞靈素之微集諸家之要奈何高陽生以偽訣竊名禍蒼生也久矣皇甫謐獨抒微渺直闡軒岐著甲乙鍼經精確可徵曠越前古所有諸證謂廣嗣祈男可以必得師尼寡婦療各不同頗著卓識至謂女人脉反于男以心肺列于兩尺此其謬也隋有巢元方撰病源論五十卷條分縷析得未曾有然但詳風寒不及濕熱毋乃偏乎楊上善以太素名家徵休徵咎幾于神靈而還按內經終終無此旨意其神于風鑒假以托名耳全元起內經訓解即非字字印

刪補順生微論

卷一

上

泥而深心體會已得大旨宜當時以爲得則生失則死也唐有孫思邈千金方三十卷脉經一卷論粗工禍人至爲憤切用心仁厚何以加焉王肅玄奘元聖册三十卷玄珠十卷昭明隱旨三卷內經詳解二十四卷推運氣之微窮經絡之理靡有闕遺亦一時之傑也宋有錢乙著傷寒指微嬰孩雜論扶內經之秘分五臟之方調肝挾相火有瀉而無補腎爲真水有補而無瀉大哉斯言獨發奧旨惜其遺書散墜未可多見也龐安常立言精邃述人迎氣口在手在喉上下齊等引繩曰平過勝即病而有三陰三陽之分二

千年晦蝕之旨。一旦昭明。豈曰小補。金之成無已。祖述長沙。詳加註脚。著傷寒論明理論。庶幾傳洽精詳。識超辭達。然未免隨文順釋。其于分別較正。實多闕畧。劉完素撰述六書。發明亢制之理。洞如觀火。然偏主于熱。豈能盡六氣之變乎。遂令後世喜用寒涼。伐天和而罔悟伊誰之咎也。潔古張元素洞徹病機。活潑施療。嘗言運氣不齊。古今易轍。舊方新病。難相附合。仁人之言。其利甚溥。拘方之士。庶有悟焉。憾其書多不傳。無從私淑耳。元李李東垣發明內傷。極類外感。實有分別。而以土為萬物之母。多注意于扶脾。確

補補順生微論

卷一

主

然元本曠古未發之旨也。張子和儒門事親。惟主汗吐下三法。當固有起死之功。誤即有傷生之慘。是惟氣強者宜之。稍挾虛者。在所痛禁。大抵貧賤之人。合用此法。富貴之人。肺腑柔薄。可不重為之慮耶。王好古著元戎十卷。大法三卷。仲景詳辨傷寒辨惑。活人節要。湯液本草。此事難知。痼疹論。光明論。標本論等書。非一代大儒。儻能辨此。羅天益潛心篤學。撰衛生寶鑑二十四卷。亦醫林之白眉也。吳恕以傷寒頭緒繁多。括為歌訣。名曰指掌。令學者無高深之嘆。良有裨也。隱君王珪。幼壯至老。分欸調攝。五痰諸飲。悉究

精詳號為春定養

生論

方

神。奇。至今賴之。丹溪朱震亨著格致餘論。局方發揮。附餘心法等書。謂陽易于動。陰易于虧。獨重滋陰降火。蓋補東垣之未備也。後世不知其故。妄意其殿四家之末後。集諸氏之大成。群然宗法。輒以寒涼損真。此非丹溪之悞。不善學者悞丹溪也。又言六氣之中。暑也燥也火也。熱居其半。獨不思寒也濕也風也。冷亦居其半耶。倪惟德論方論證。靈通變化。讀微諸論。而知款山老人非常人也。滑伯仁診家樞要。十四經發揮。本草會韻。深心特見。殊可嘉尚。王履學究天人。文章冠世。有海潮集

刪補順生微論

卷一

主

傷寒考諸刻。嗜炙人口。更有鈞玄韻鏡二書。則未之見也。顧其真書淪沒。而脉訣鈴法。偽書滿世。豈天不欲使斯民躋于壽域耶。戴起宗究內經之奧。抒運氣之旨。慨脉訣誤人。起而正之。有德醫門。非淺鮮矣。近世名家如節庵陶華著書六種。遂究傷寒良有苦心。獨其畏仲景峻方。輒以數方代之。則亦登堂而未能入室者矣。節齋王綸名醫雜著。以二陳療痰。止宜于濕。而老痰者不合也。其老痰九方。真出獨創。惜夫過謂參能殺人。虛勞禁用斯言一出。印定後人眼目。至今膠執其說。互相傳戒。而虛虛之禍。曷可勝言。向非

李頤河力挽其訛幾何不使虛癆之症坐而待斃乎
薛立齋敏而多聞謂十三科一理概外科固執成方
不窮病本特發內外合一之旨又以風會不齊今人
虛薄痛戒寒涼多行溫補拯救絕靈驗若桴鼓著述
計十六種誠邇來名醫之冠而多功于先哲後昆者
也。歷考前代醫籍之傳者五百九十六部一萬有九
十二卷而吾 熙朝之彥續有萬餘卷不能枚舉茲
特述其尤者亦說約之意也。諸眼孔未富執一得以
自封章句未融泥筌蹄而多端則于衛生博濟之道
隔去萬重司命之謂何而甘為庸下也方且慚汗無
刪補順生微論 卷一 五

○先天根本論第三

夫玄黃未兆天一之水先生胚體未成兩腎之元先
立僑經曰借問如何是玄牝嬰兒初生先兩腎未有
此身先有兩腎故腎為臟腑之本十二脉之根呼吸
之主三焦之源而人資之以始者也故曰腎水者先
天之根本也而一點元陽則寓于兩腎之間是為命
門蓋一陽居二陰之間所以位乎北而成乎坎也人
非此火無以運行三焦腐熟水穀而經曰少火生氣
釋經曰兩腎中間一點明逆為丹母順為人夫龍潛

海底龍起而火隨之元陽藏于坎府運用應于離宮
此生人之命根也乃知陽火之根本于地下陰火之
源本于天上故曰水出高原又曰火在水中夫水火
者陰陽之徵兆天地之別名也獨陽不生孤陰不長
天之用在于地下地之用在于天上則天地交通水
火混合而萬物生焉古之神聖察腎為先天根本故
其論脉者曰人之有尺猶樹之有根枝葉雖枯槁根
本將自生傷寒危篤寸口難稽猶診太谿以卜腎氣
夫精也者水之華也神倚之如魚得水氣依之如霧
覆淵方其為嬰孩也未知牝牡之合而勃然峻作精
刪補順生微論 卷一 六

之至也純純全全合于天玄冥冥清清合于無倫年
十六而真精滿始能生子精泄之後乾破而為離真
體已虧不知節制則百脉空虛不危何待世有以固
精採補者是夫不然男女交接必擾其腎外雖不漏
精已離宮有真精數點隨陽之痿而溢出如火之有
烟燬豈能復返于薪哉是故貴寡慾然損精傷腎是
非一端若目勞于視精以視耗耳勞于聽精以聽耗
心勞于思精以思耗體勞于力精以力耗隨事而節
之則精與日積矣是故貴節勞腎司閉藏肝主疎泄
二臟皆有相火而其系上屬于心心君火也怒傷肝

而相火動則疎泄者用事而閉藏者不得其職雖不
交合精已暗耗矣是故貴息怒酒能動血飲酒則身
面俱赤是擾其血也數月不近色精已凝厚一夜大
醉精隨薄矣是故宜戒酒肉經曰精不足者補之以
味然膏粱之味未必生精恬澹之味最能益腎洪範
論味而曰稼穡作甘世間之物惟五穀得味之正滯
食五穀大能養精吳子野云芡實本溫平不能大益
人而謂之水中丹者何也人之食芡也必枚嚙而細
嚼之未有多嚼而亟燕者也舌頰齒唇終日嚙嚙而
芡無五味腴而不膩是以致玉池之水轉相灌注積

剛補脾生微論

卷一

七

其功力雖過乳石可也以此知人能淡食而徐飽者
大有益于脾腎經曰胃為水穀氣血之海化榮衛而
潤宗筋又曰陰陽總宗筋之會而陽明為之長故胃
強則腎克而精氣旺胃病則精傷而陽事衰也蓋樞
回生之來調之精此先天元生之精也素問曰食氣
入胃散精于五臟此水穀日生之精也然日生之精
皆從元精所化而後分佈其臟盈溢則輸之于腎故
曰五臟盛乃能瀉若飲食之精遇一臟有邪則一臟
之食味化之不全不得與元精俱藏而時自下矣故
腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固若遇陰邪

容于竅與所強之陽相感則精脫而外淫矣陽強者
非真陽之強乃肝之相火強耳夫五臟俱有火惟相
火之寄于肝者善則發生惡則為害獨甚于他火其
陰器既宗筋之所聚乃強于作用皆相火充其力也
若遇接內得陰氣與合則三焦上下內外之火翕然
而下從百體玄府悉開其滋生之精盡會于陰器以
躍出豈止腎所藏者而已哉任恭惠公年老彌健或
問其故曰曾讀文選石韞玉而山輝水含珠而川媚
于斯二語悟得葆精之道故足于精者百疾不生窮
于精者萬邪蜂起先哲洞窺根本力勉圖全遇症之

剛補脾生微論

卷一

七

虛者亟保北方以厚生命之根其于水火之間又有
分別水不足者壯水之主以制陽光六味丸是也火
不足者益火之元以消陰翳八味丸是也祇于年方
方剛尺脉獨實者微加炒枯知母黃柏以抑其亢炎
昧者以為滋陰上劑救水神方不問虛實而槩投之
不知知母多則腸胃滑黃柏久則腸胃寒陽明受賊
何以化營衛而潤宗筋將髓竭精枯上嘔下泄而幽
潛沉寃尚忍言哉此皆守河間有熱無寒之論丹溪
陽常有餘之說貽禍如此其烈耳致東華錄云劉朱
之言不息則軒岐之澤不彰誠斯道之大魔亦生民

之厄運也。雖其言未免過激。然補偏救弊。為後學頂門下針。良有苦心也。古之至人。知金為水母。氣為水源。坎可填離。舌水為活。綿綿納嚥。汨汨有聲。今豈崙峯頂。山澤氣通。則水源所發。泥混乎。不舍晝夜。水精所奉。洋洋乎。為露為淋。故知氣即水。水即氣。因以明火即水。水即火也。水中有火。火出高原之義。不亦彰且著乎。

。後天根本論第四

夫人因地一聲之後。命曰後天。而後天之根本。脾胃是也。脾胃屬土。土為萬物之母。故易曰。至哉坤元。萬

刪補順生微論

卷十

九

物資生。經曰。脾胃者。倉廩之官。五味出焉。又曰。食入于胃。散精于肝。滯氣于筋。濁氣歸心。淫精于脉。脉氣流經。氣歸于肺。飲入于胃。遊溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合于四時五臟。陰陽揆度。以為常也。是知水穀入胃。灑陳于六腑。而氣至焉。和調于五臟。而血生焉。行于百脉。暢于四肢。充于肌肉。而資之以為生者也。故曰。安穀則昌。絕穀則亡。一日不食則饑。七日不食則腸胃竭絕而矣。人之有脾胃。猶兵家之有餉道也。餉道一絕。萬眾立散。脾胃一敗。百藥難施。上古聖

人見土為後天之根本。故其著之脉者曰。四時皆以胃氣為本。有胃氣則生。無胃氣則死。是以傷寒當危困之候。診衝陽以察胃氣之有無。衝陽應手。則回生。有日。衝陽不應。則坐而待斃矣。東垣先生深窺經旨。獨著脾胃論。以醒提聾瞶。其言胃中元氣盛。則能食而不傷。過時而不饑。脾胃俱旺。能食而肥。脾胃俱虛。不能食而瘦。善食而瘦者。胃伏火邪于氣分。則能食。脾虛則肌肉削也。七情戕其內。六氣攻其外。皆足以致虛。惟飲食與勞倦兩端。其關尤巨。經曰。飲食自倍。腸胃乃傷。又曰。水穀之寒熱。感則害人。蓋脾夫飲者

刪補順生微論

卷十

五

水也。無形之氣也。經曰。因而大飲。則氣逆。或為喘咳。或為飲癰。或為水腫。或為嘔吐之類。食者。物也。有形之血也。經曰。因而飽食。經脉橫解。腸澼為痔。或為脹滿。或為積聚。或為諸痛。或為吐利之類。此所謂飲食傷也。經曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣薰胃中。故內熱。又曰。勞則氣耗。勞則喘息汗出。內外皆越。故氣耗矣。有所勞倦。皆損其氣。氣衰則虛火旺。旺則乘脾。脾主四肢。故困熱無氣以動。懶于語言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。此所謂勞倦傷也。蓋人受水穀之氣以生。所謂清氣

營氣衛氣皆胃氣之別名也。胃為水穀之海。五臟六腑皆受滋輸。若起居失度。飲食失節。未有不傷脾胃者也。脾胃一傷。元氣必耗。心火獨炎。心火即下焦陰火。心不主令。相火代之。火與元氣勢不兩立。一勝則一負。陰火上冲。氣高而喘。身熱而煩。脾胃之氣下陷。穀氣不得升浮。是春生之令不行。無陽以護其營衛。乃生寒熱。雜曰。勞者溫之。損者溫之。又曰。溫能除大熱。大忌苦寒。反傷脾胃。東垣于勞倦傷者。立補中益氣湯。純主甘溫。兼行升發。使陽春一布。萬物敷榮。易老于飲食傷者。立枳朮丸。一補一攻。不取速化。但使

補補順生微論

卷一

主

胃強不復傷耳。此皆炎黃之忠。蓋後進之標的也。羅謙甫善發其旨。故云。脾虛食少。弗可攻伐。補之自能食。進是則更有法焉。東方之仇木宜安。恐木實則侮土。而厥張也。西方之子金宜顧。恐子虛則竊母以自救也。若夫少火實為生氣之元。中央之士。虛則補其母。故許學士云。腎虛不能化食。譬如釜中水穀。下無火力。其何能熟耶。嚴用和云。房勞過度。真陽衰弱。不能上蒸脾土。以致飲食不消。須知補腎。腎氣若壯。丹田火克。上蒸脾土。土溫自治矣。愚嘗統而論之。脾胃者。具坤順之德。而有乾健之順。故坤德或慙。補土以

培其卑監。乾健稍弛。益火以助其轉運。此東垣謙甫以補土立言。學士用和以壯火。再訓蓋有見乎土強則出納自如。火強則轉輸不怠。火為土母。虛則補其母。治病之常經也。每見世俗。一遇脾胃虛滯。便投麝香。查朮。香砂。枳朮。甚而用黃連。山梔。以為脾胃良方。而天枉者。更僕難數矣。不知此皆實則瀉。子之法。因脾胃有積聚。有實火。元氣未衰。邪氣方張。用破氣之劑。以瀉肺金。主氣之藏。誠有功效。若虛而伐之。則愈虛。虛而寒之。遇真火生化之元。有不敗其氣而奪其穀乎。况可異者。以參朮為滯悶之品。畏之如砒。錫

補補順生微論

卷一

主

不聞經云。虛者補之。勞者溫之。又云。塞因塞用。平又不聞東垣云。脾胃之氣。實則枳實。黃連。瀉之。虛則白朮。陳皮。補之。乎。又不聞丹溪云。實火可瀉。參連之屬。虛火可補。參芪之屬。乎。且飲食初傷。元氣未敗。或有濕熱。黃連其選也。若病稍久。元氣必虛。陽氣不克。陰寒為祟。反服黃連。無異于入井而反下石耳。經曰。飲食勞倦。損傷脾胃。始受熱中。末傳寒中。則始宜清熱。終宜溫養。灼然有辨。故能辨虛實。善識寒溫。醫之能事。竟矣。更有說者。聖人治未病。不治已病。則居恒無病之時。便當早為之所。觀既濟之象。曰。君子以思患

而預防之隨之象曰君子以嚮晦入晏息順之象曰君子以節飲食豈非明飲食勞倦之足以傷生耶養生家知勞倦之禍人也亟于養氣行欲徐而穩言欲定而恭坐欲端而直聲欲低而和常于動中習靜使此身常在太和元氣中久久自有聖賢氣象長生秘典曰內勞神明外勞形質俱足天折惟房勞較甚為其形與神交用精與氣均傷也又曰久之久坐久行久卧皆能傷人已上皆防勞倦元氣勝穀氣其人瘦而壽穀氣勝元氣其人肥而夭泰西水曰飲食有三化烹煮糜爛名曰火化細嚼緩嚥名曰口化蒸變傳送名曰胃化二化得力不勞于胃醫說云飲食到胃俱以溫和為妙不問冷物熱物但細嚼緩嚥自然溫矣秘典曰食飽之後解帶摸腹伸腰徐行作噴以通其秘用呵以去其滯令飲食下行方可就坐飽坐發痔曲胸而生成中滿醉後勿飲冷飽餘勿便卧食後勿怒怒後勿食冷熱之食不宜互食導生編云飲以養陽食以養陰食宜常少亦勿令虛不饑強食不渴強飲則脾勞發脹朝勿令饑夜勿令飽淡食則多補五辛善助火調食法云寧少毋食多寧饑毋食飽寧遲毋食速寧熱毋食冷寧零毋食頓寧軟毋食硬此六者調

剛補順生微論

卷十

重

理脾虛之要法也以上皆言飲食語云修養不如節勞服藥不如忌口斯言雖鄙頗切理要誠能于此精勤則土強而臟腑俱安後天之根本不損營衛冲和長有天命矣

辨妄論第五


蓋聞診候者通神達微之事也而登高自卑必取諸脉象惜高陽生偽訣訛傳久汨于陰靈之域雖開之者代不乏人素習之者恬不知改余欲起而正之固知微塵無足音之能然天下萬世豈無明眼余言或不足信將內經亦不足信耶今以內經脉法為圖擬

剛補順生微論

卷一

重

內經分配藏府診候圖



尺內兩旁則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候肓右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候膻中

此兩經之候法也。府不及臍者，寄于肝部也。不及大
小腸膀胱者，統于腹中也。高陽生以大小腸列于寸
上，三焦配于左尺，命門列于右尺，臍中置而不言，男
女易位，以數差訛，形脉不分，圖象妄設，不可不為之
辨也。夫寸主上焦，以候胸中，關主中焦，以候臍中，尺
主下焦，以候腹中，此生身之定位，古今之通論也。大
小腸皆在下焦腹中，此生身之定位，古今之通論也。大
理哉。滑伯仁以左尺主小腸膀胱前陰之病，右尺主
大腸後陰之病，可稱千古隻眼。偽訣之誤，特因心與
小腸為表裏，肺與大腸為表裏，不知經絡相為表裏。

刪補順生微論

卷一

三

診候自有定位，何可混耶？叛經者一也。金匱真書
篇白：肝心脾肺腎五藏為陰，膽胃大腸小腸三焦膀
胱六府為陽。此止十一經耳。則手厥陰之一經，竟何
在乎？靈蘭秘典篇曰：心者君主之官，神明出焉；肺者
相傳之官，治節出焉；肝者將軍之官，謀慮出焉；膽者
中正之官，決斷出焉；臍中者，臣使之官，喜樂出焉；脾
胃者倉廩之官，五味出焉；大腸者傳道之官，變化出
焉；小腸者受盛之官，化物出焉；腎者作強之官，伎巧
出焉；三焦者決瀆之官，水道出焉；膀胱者州都之官，
津液藏焉，氣化則能出矣。此以臍中足十二藏之數。

是則配手厥陰者，寔臍中也。及靈樞叙經脉，又有胞
絡而無臍中。然曰：動則喜笑不休，正與喜樂出焉之
句相合。夫喜笑者，心火所司，則知其與心應也。獨臍
中稱臣使者，君主之親臣也。由是則胞絡即為臍中。
斷無可疑。臍中以配心藏，自有確據。乃偽訣竟不之
及，則手厥陰為虛懸之位矣。叛經者二也。靈樞曰：
上焦出于胃上口，並咽以上貫鬲而布胸中；中焦亦
並胃中，出上焦之後，泌糟粕，蒸津液，化精微而為血
下焦者，別迴腸，注于膀胱而滲入焉。水穀者居于胃
中，成糟粕，下大腸而成為下焦。又曰：上焦如霧，中焦如

刪補順生微論

卷一

三

灑，下焦如瀆。由是則明以上中下分三焦矣。偽訣列
于右尺，不亦妄乎？又曰：密理厚皮者，三焦厚；粗理薄
皮者，三焦薄。又曰：勇士者，三焦理橫；怯士者，三焦理
縱。由是則明有形象矣。偽訣以為無形，不亦妄乎？叛
經者三也。心肝脾肺俱各一候，惟腎一藏而分兩
尺候者，為腎有兩枚，形如豇豆，分列于腰脊之左右。
偽訣以左為腎，右為命門，考諸明堂銅人等經，命門
一穴在督脉第十四椎下陷中，兩腎之間，蓋一陽居
二陰之中，所以成乎坎也。且脉之應于指下者，為有
經絡循經，朝于寸口，內經並無命門之經絡，何以應

說而可列之右尺乎叛經者四也。夫男之異惟
莖戶精血及胞門子戶耳。若夫脉象自有定位如左
尺水生左關木左關木生左寸火君火付權于相火
故右尺火生右關土右關土生右寸金五行循序相
生萬古不易之理偽訣乃曰女人反此背看之甚且
以左尺候心右尺候肺而五行之理紊亂極矣叛經
者五也。經曰腎絕四日死肝絕八日死心絕一日
死肺絕三日死脾絕十二日死乃偽訣云四十一止
一臟絕却後四年多命沒夫人豈有一臟既絕尚活
四年者乎叛經者六也。內經曰形氣有餘脉氣不

刪補順生微論

卷一

七

足死脉氣有餘形氣不足生仲景曰脉病人不病號
曰行屍以無王氣卒眩仆不知人則死人病脉不病
名曰內虛雖困無苦而偽訣云健人脉病號行屍病
人脉健亦如之是脉病與人病無別矣叛經者七也
脉理淵微可以神領難以言求而況可以圖示乎
如大小長短固可圖也而遲數結促皆以至數爲名
豈可得而圖乎勉強牽合幾堪捧腹叛經者八也
夫是八者特舉其謬之尤耳若按字而求其疵更僕
難數狀蔡西山辨之于前戴同父正之于後無待贅
舉願後之學者詳味經言翻其錯悞使千年晦蝕之

詩一旦昭明指下井狀而證治無惑斯民無夭折之
嗟矣

審象論第六

夫證之不齊難以枚舉而盡欲以指下得其情則憂
憂乎難之矣先哲有言曰脉有神機微而莫顯胸中
了了指下難明况胸中昧昧而思指下全生庸可幾
乎脉固有象不能比類以晰其似割舉以別其殊辨
兼至以定名察平脉以昭治分六氣以測證按運政
以觀應審真贋以知亡則咕呬雖勤而臨視莫適輕
言談笑亂說是非禦人口給言不由衷試一觀之真

刪補順生微論

卷一

七

堪愧絕余是以不揣鄙陋畧陳其概云
凡類者所以明相類之脉洪與虛皆浮也浮而有力
爲洪浮而無力爲虛沉與伏皆沉也沉脉行于筋間
重按即見伏脉行于骨間重按不見必推筋至骨乃
可見也數與緊皆急也數脉以六至得名緊則不必
六至惟弦急而左右彈狀如切緊繩也遲與緩皆慢
也遲則三至極其遲緩緩則四至徐而不迫實與牢
皆兼弦大實長之四脉也實則浮中沉三取皆狀牢
則但于沉候取也洪與實皆有力也洪則重按少衰
實則按之亦盛也革與牢皆大而弦也革則浮取而

得平則沉取而見也。濡與弱皆細小也。濡在浮分重按即不見也。弱主沉分輕取不可見也。細與微皆無力也。細則指下分明微則似有若無。模糊難見矣。短與動皆無頭尾。短為陰脉其來遲滯動為陽脉其來數滑促結濇代皆有止者也。數時一止為促緩時一止為結往來遲滯似止非止為濇動而中止不能自還止有定數為代。

對舉者所以明相反之脉。浮沉者脉之升降也。遲數者脉之急慢也。滑濇者脉之通滯也。虛實者脉之剛柔也。長短者脉之盈縮也。洪微者脉之盛衰也。緊緩

刪補順生微論

卷一

七

者脉之張弛也。促結者脉之陰陽也。濡弱者脉之窮于進退者也。乳弦者脉之見于盛衰者也。經曰前大後小前小後大來疾去徐來徐去疾去不盛來反盛去盛來不盛乍大乍小乍長乍短乍數乍疎是又二脉之偶見者也。

兼至者各衆脉以成一脉也。浮而細且軟為濡沉而細且軟為弱。浮而極細極軟似有若無為微。浮而且大且弦且長之合為革沉而且大且弦且長之合為牢。且大且長中沉皆有力為實。

平脉者各部之本脉也。足厥陰肝沉而弦長足少陰

腎沉石而滑足太陰脾中和而緩足少陽膽弦大而浮足陽明胃浮長而濇足太陽膀胱洪滑而長手少陰心洪大而散手太陰肺浮濇而短手厥陰心胞絡浮大而散手少陽三焦洪大而急手陽明大腸浮短而滑手太陽小腸洪大而緊。

時令者四時之變脉與之應也。十二月大寒至二月春分為初之氣厥陰風木主令經云厥陰之至其脉弦春分至小滿為二之氣少陰君火主令經云少陰之至其脉鉤小滿至六月大暑為三之氣少陽相火主令經曰少陽之至大而浮大暑至八月秋分為四

刪補順生微論

卷一

七

之氣太陰濕土主令經曰太陰之至其脉沉秋分至十月小雪為五之氣陽明燥金主令經曰陽明之至短而濇小雪至十二月大寒為六之氣太陽寒水主令經曰太陽之至大而長。

六氣分合六部

右寸	浮	小至十五日	金
	中	立冬至十五日	明陽氣之五
	沉	霜降十五日	土
右關	浮	秋分十五日	陰太氣之四
	中	白露十五日	火
	沉	處暑十五日	少氣之三
右尺	浮	大暑十五日	
	中	小暑十五日	
	沉	夏至十五日	

時日診候之圖

左寸	浮	小至十五日	左尺
	中	立冬至十五日	
	沉	霜降十五日	
左關	浮	秋分十五日	
	中	白露十五日	
	沉	處暑十五日	
左尺	浮	大暑十五日	
	中	小暑十五日	
	沉	夏至十五日	

火君除少氣之二木風陰脈氣之初水寒陽太氣之終

刺補願生微論

卷一

三

以平治之紀爲例。若太過之紀。其氣未至而至。從前十三日爲度。不及之紀。其氣至而未至。從節後十三日爲度。太過之歲。從左尺浮分起。立春不及之歲。從左關中分起。立春依次而推之。此六氣至理。而方書所未發者。必于平旦。陰氣未散。陽氣未動。飲食未進。言語未吐之時。清心調息。逐部細究。則時令之病。可以前知。診得六部俱平。則已。若有獨大。獨小。獨浮。獨沉。獨長。獨短。與各部不同。依圖斷之。無不驗者。假如左關中候。脈獨弦大。已知雨水後驚蟄邊。有風熱之病。蓋弦主風。而大主熱也。且左關又爲風木之令。刺補願生微論 卷一 三

故也。如右尺沉分。脈獨緩滯而寔大。已知芒種後夏至邊。有濕熱之病。蓋緩滯主濕。寔大主熱也。若緩滯虛大。及濕熱相火爲患。蓋緩滯爲濕。而虛大爲相火也。且在沉分。沉亦主濕。又在相火之位。故也。久病之人。六脈俱濁滯。惟右寸中候。脈得從容和緩清淨。無滯。已知霜降後。立冬邊。必愈。其餘倣此。而推之。百不一失也。

夫按政運者。所以明不應之脈。蓋不應者。沉細也。反其診。則見矣。凡值此不應。乃歲運合宜。不必求治。若悞治之。反伐天和。

土運爲南政。土位居中。而南行令。故也。其餘四運。以臣事之。北面受令。故爲北政。

甲巳二年。爲上運南政。如運少陰司天。則兩寸不應。厥陰司天。則右寸不應。太陰司天。則左寸不應。○少陰在泉。則兩尺不應。厥陰在泉。則右尺不應。太陰在泉。則左尺不應。

乙丙丁戊庚辛壬癸八年。皆爲北政。如遇少陰司天。則兩尺不應。厥陰司天。則右尺不應。太陰司天。則左尺不應。○少陰在泉。則兩寸不應。厥陰在泉。則右寸不應。太陰在泉。則左寸不應。

刪補願生微論

卷一

七

如尺當不應而反浮大寸。當浮大。而反沉細寸。當不應而反浮大尺。當浮大。而反沉細尺。是謂尺寸反。經曰。尺寸反者死。○如右當不應而反浮大。左當浮大。而反沉細。左當不應而反浮大。右當浮大。而反沉細。是謂左右交。經曰。左右交者死。

真臟者。所以明不治之脉。蓋人以胃氣爲本。胃氣脉者。應于中和。意思忻忻。難以名狀是也。太過不及者。病。但得真臟脉。不得胃氣者死。

經曰。真肝脉至中外急。如循刀刃。責責狀。如按琴瑟絃。色青白不澤。毛折乃死。真心脉至。堅而搏。

如循薏苡子。累累狀。色赤黑不澤。毛折乃死。真脾脉至。弱而乍疎乍數。色黃青不澤。毛折乃死。真肺脉至。大而虛。如以毛羽中人膚。色白赤不澤。毛折乃死。真腎脉至。搏而絕。如指彈石。辟辟狀。色黃黑不澤。毛折乃死。

○七絕脉

一曰彈石。如指彈石。在筋肉間。劈狀硬尋。即散者。腎絕也。二曰雀啄。如雀啄食。連連搏指。忽狀止絕。良久復來。肝絕也。三曰屋漏。如屋殘漏下。良久一滴。胃絕也。四曰解索。如索之解。指下散亂。無復次序。脾絕也。五曰蝦遊。如蝦之遊。在于皮膚。始則冉冉不動。少焉而去。久之忽狀一躍。大腸絕也。六曰魚翔。如魚之翔。本不動而末強搖。似有似無。心絕也。七曰釜沸。如釜湯沸。在于皮膚。有出無入。湧湧如羹上波。肺絕也。

刪補願生微論

卷一

七

○宣藥論第七

附方十劑

慨自用藥之弊也。始于執流而忘源。信方而遺理。採有劑已大謬。猶懸懸而計效。方或偶當。反忽忽而自疑。病已藥傷。尚嫌處劑之輕。功本將臻。乃欲更端以治。泥成方之驗。不解隨人活潑。膠章句之跡。未能廣。

會靈通如斯愚昧皆由格理之功疎而尋源之學淺也。王太僕曰：粗工偏淺，學未精深，以熱攻寒，以寒療熱，治熱未已而冷疾已生，攻寒自深而熱病更起，熱起而中寒尚在，寒生而外熱不除，欲攻寒則懼熱不前，欲療熱則思寒又止，豈知臟腑之源有寒熱溫涼之主哉？夫藥有君臣佐使，逆從反正，厚薄輕重，畏惡相反，未得靈通而慢於施療，許學士所謂微不知兔廣絡原野，術亦疎矣。君為主，臣為輔，佐為助，使為用，製方之原也。逆則攻，從則順，反則異，正則宜，治病之法也。必熱必寒，必散必收者，君之主也，不宜不明，不

刪補順生微論

卷一

寒

受不行者，臣之輔也，能受能令，能合能公者，佐之助也。或擊或發，或劫或開者，使之用也。破寒必熱，逐熱必寒，去燥必濡，除濕必泄者，逆則攻也。治驚須平，治損須溫，治留須收，治堅須潰者，從則順也。熱病用寒藥，而導寒攻熱者，必熱，如陽明病發熱大便鞭者，大承氣湯瀉製大黃熱服之類也。寒病用熱藥，而導熱去寒者，必寒，如少陰病下利服附子乾薑不止者，白通湯加人尿猪膽之類也。寒病用通藥，而導通除塞者，必塞，如胸滿煩驚小便不利者，柴胡加龍骨牡蠣之類也。通病用塞藥，而導塞止通者，必通，如太陽中

風下利，心下痞鞭者，十棗湯之類也。反則異也。治遠以大治近，以小治主以緩，治客以急，正則宜也。輕清成象，重濁成形，清陽發腠理，濁陰走五臟，清中清者，榮養于神，濁中濁者，堅強骨髓，辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰，氣為陽，氣厚為陽中之陽，氣薄為陽中之陰，薄則發泄，厚則發熱，味為陰，味厚為陰中之陰，味薄為陰中之陽，薄則疏通，厚則滋泄，親上親下，各從其類也。畏者畏其制我，不得自縱，惡者惡其異我，不得自知，畏惡之中，亦可相成，在因病制方，輕重多寡之間也。至于相反，兩仇不共，狀大毒之病，又須大毒

刪補順生微論

卷一

寒

之藥以劫之，雖相反之中，亦有相成之妙，而謂神化在是，顧良工用之耳。狀非以博洽之才，運其神靈之識，將見驚眩妄錯，靡知統宗，匪肆即拘，曷中效會。夫狀後智盡能索，祇計書方。若曰：方非吾方，上古聖人之方，異人秘密之方，人即不信醫，能不信聖人與異人哉？至有秘而不宣，雖父子不相授受，吁！何其愚也。不知夫有不同者，運氣異也；地有不同者，方宜異也；人有不同者，稟賦異也；時有不同者，風會異也；境有不同者，貴賤異也；病有不同者，標本異也。方果可執乎哉？奈何舍至靈至變之理，而就不靈不變之方也。

此無他。初得之聞。而神奇過告。繼試之用。而功效偶臻。遂以為無踰其右。獨不計方果若斯之奇。則上古聖賢。千言萬卷。祇為餘餘。而今之學者。神聖工巧。一切可廢矣。不知方之為言。倣也。倣病而有方也。其將立也。因是病而後成。融通不滯。其既立也。匪是病則勿用。確狀難移。是以素問無方。難經亦無方。非無方也。謂倣為活法也。漢世纔有方。為倣于倣也。今奇方療疾。可以發無不中。則昔者軒岐偏倉。神靈之智。慈濟之仁。豈不及此。何不每一病。只立一方。使後之人彰明顯著。用無不當。而乃廣為昭析。多立文詞。使後

刪補順生微論

卷一

三

之人紛贖難窮。效無十全哉。雖狀方不可泥。亦不可遺。倘藉口變通。而古法未諳。有心立異。而審症未詳。去拘方之失。未有以大相懸也。而其過有五。夫子毋虛實。鬼邪微正。治病之本也。明此之故。病在上而治反在下。病在下而治反在上。病同而藥異。病異而藥同。症端蜂起。而線索井狀。變現多危。而執持不亂。此旨未達。遂近尋求。既治其上。又攻其下。既療其彼。復顧其此。本之不揣。藥無精一。如著百家衣。為識者笑。救頭救脚之議。所不免已。過一也。氣血虛實。寒熱邪正。灼狀明辨。則益心之陽。寒亦通行。強腎之陰。熱之

猶可。發舒陽氣。以生陰精。滋養陰精。以化陽氣。或養正而邪自除。或驅邪而正始復。或因攻為補。或借補為攻。苟臨症狐疑。則進退交戰。姑以輕和之劑。冀其萬一之功。非有直入之真。收其捷得之效。則兩騎之請。所不免已。過二也。或讀本草類方。刻意求蘭。以為精專。不知制之小者。君一臣二。制之大者。君一臣三。佐九。聖人初無從蘭之心。惟是合宜以治耳。仲景東垣。共稱醫聖。而用多用寡。兩不相侔。王節齋謂東垣如韓信將兵。多多益善。丹溪不過能將十萬。不敢效其多。是以多寡分優劣也。將置仲景于何地耶。故得

刪補順生微論

卷一

三

其要者。多亦不難。不得其要。少亦不專。不究確狀之理。而以品味多寡為衡。是崇末而遺本已。過三也。未能宏博。炫狀自矜。好為奇僻。不可一世。原其立異之初心。不過思假此以要尊信耳。究也治而弗動。反深沉困。其尊信果安在哉。過四也。仲景云。觀今之醫。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯劑。動數發息。不滿五十。明堂闕庭。盡不見察。夫欲視死別生。實為難矣。如斯鹵莽。且圖速效。則寒熱溫涼。行散補瀉。能無過當乎。不知藥無次序。猶兵無紀律。雖有勇健。適足債事已。過五也。省此五過。務圖

去之。惟當尚友千古。毋多自遜。以阻進階。則天地之理得。而見垣非難。願天下惕狀于生死之故。慨然爲窮原之學。則四家可五。而軒岐且至今存矣。

○七方 大 小 緩 急 奇 偶 復

○大方之說有二

病有兼證。不可以一二味治者。宜君一臣三佐九。品味數多。故曰大。

病有在身半以下。而遠者。處劑宜多。而品味宜少。以分兩數多。故亦曰大。

○小方之說有二

刪補願生微論

卷一

素

病有在心肺以上。而近者。宜分兩微。而徐徐呷之。

病有無兼症。可以一二味治者。宜君一臣二之小方。

○緩方之說有六

病有在胸膈。宜甘以緩之。

有緩則治其本。治本者。須優游漸漬。不可責效旦夕。

有丸以緩之。之緩。蓋比湯散。氣力難化。而宣行遲也。

有品味衆多之緩。蓋藥味衆。則各不得自騁。如萬病九七八十味。互相拘制。

有無毒治病之緩。蓋性無毒。則功自緩。

有氣味薄之緩。蓋氣味薄。則主用在上。治上者。制以緩。緩則氣味薄也。

○急方之說有六

心腹暴痛。洩便不通。用備急丹之類是也。

中風牙關緊閉。漿粥不入。用急風散之屬。

有湯散蕩滌之急。蓋湯主蕩。而散主散。如風雨之疾迅也。

刪補願生微論

卷一

卑

有藥性有毒之急。蓋有毒。則能上涌下泄。可以奪病之大勢也。

有氣味厚之急。蓋氣味厚。則直走于下也。

有治標之急。擇其甚者。急救之也。

○奇方之說有二

有獨用一物之奇。

有一三五七九之奇。如君一臣三。亦奇制也。故宜下不宜汗。

○偶方之說有三

有兩味相配之偶。

有兩方相合之偶。

有二四六八十之偶。如君二臣四亦偶制也。故宜汗不宜下。

○復方之說有二。

有二方三方相合之復。如桂枝二越婢一湯。有分兩勻平之復。如胃風湯各等分也。

○十劑

宣 通 補 瀉 輕 重 滑 澀

○宣者。升而上也。內經曰。高者因而越之。即涌劑也。

○通者。流通之義也。凡壅滯閉結。非通劑弗愈。

○補者。五臟各有補法。夫虛有六者。表裏上下陰陽。

刪補順生微論

卷一

聖

也。經曰。形不足者。補之以氣。精不足者。補之以味。須達症之所起。分經療之。為善。

○瀉之義與通倣。但不專主于下。如黃芩瀉肺。黃連瀉心。黃柏瀉腎。龍膽瀉肝。石膏瀉脾之類。經曰。

實者瀉之。凡清利之劑。總名曰瀉。

○輕者。言藥之性也。如風寒之邪。始自表入。頭痛身。

熱。腰脊強。內經曰。宜輕劑以揚之。本草曰。輕可去實。宜麻黃葛根升麻之屬。

○重者。亦藥之性也。如久病咳嗽。痰涎不利。形羸。不可峻攻。用硃砂金箔木銀沉香之屬。內經曰。重。

者。減之。責其漸也。

○滑者。取其潤也。周禮曰。滑以養窻。如麻仁郁李仁。冬葵子滑石之類。

○澀者。收之義也。如牡蠣白礬龍骨栗殼之屬。

○燥者。取其去濕也。如久瀉澄清。宜姜附以燥之。虛。

濕。宜用黃連大黃燥之。

○濕者。與滑義相類。而少有不同。滑兼通意。而濕則但主于濡。經曰。血主濡之。當歸地黃之屬。

○運氣論第八

嘗讀申經。至天元紀論七篇。推申運氣。其義難解。未。

刪補順生微論

卷一

聖

嘗不廢書三嘆也。夫是天地之綱紀。變化之淵源。非通于大易洪範。曆元律法之說者。其敢據心以解。矢口而談哉。無惑乎當今之人。置而弗講久矣。先哲有言曰。不明五運六氣。檢遍方書。何濟。故弗醫則可。業已志醫。反掌生殺。能不猛畏。博學多聞。沉思力索。神將通我。幸勿憚焉。朕知天知地。先于知人。丹溪曰。先識病機。變化處治。純攻運氣。恐流于馬宗素之徒。妄謂某生人于某日。病于某經。用某藥。某日當瘥。某日當危。悖亂經旨。涉于怪僻。茲特撮其大綱。提其切要。令學者析其簡便。為行遠登高之自。至于窮神達變。

則內經而下。代有發明。其可以為書耶。五運者。金。木。火。土。也。六氣者。風。寒。暑。濕。燥。火。也。合十干為五運。如甲巳合為土運。乙庚合為金運。丙辛合為水運。丁壬合為木運。戊癸合為火運是也。對十二支為六氣。如子與午對。俱為君火。丑與未對。俱為濕土。寅與申對。俱為相火。卯與酉對。俱為燥金。辰與戌對。俱為寒水。巳與亥對。俱為風木。是也。運乃五年一週氣。則六卦環會。五運有太過。有不及。有平運。有大運。有主運。有客運。太過者。甲丙戊庚壬。五陽干也。不及者。乙丁巳辛癸。五陰干也。太過之年。大寒前十三日交。名曰先天。不及之年。大寒後十三日交。名曰後天。平運者。司天與運同氣也。或太過而司天剋氣。或不及而年支相合。謂之歲會。或月干與之相符。或交初氣日。干時干與之相合。謂之干德符。值之者。物生脉應。無相後先。皆平運也。正大寒日交。名曰齊天。大運者。本年年干也。主運者。每年皆以木運從大寒日始。以次相生。至水而終。每運各主七十二日零五刻。歲歲皆狀者也。客運者。假如甲年。即以土起運。亦從大寒日始。以次相生。至水而終。每運亦各主七十二日零五刻。逐歲變遷者也。六氣有司天。有在泉。有正化。有對

化。有主氣。有客氣。正化者。午未寅酉辰亥之年也。對化者。子丑卯辰巳之年也。正司化。令之實。對司化。令之虛。又以子午卯酉為一律。子午君火。司天。則必卯酉燥金在泉。卯酉燥金。司天。則必子午君火在泉。寅申巳亥為一律。辰戌丑未為一律。例皆同也。主氣者。每年皆以木氣從大寒日始。以次相生。至水氣而終。每氣各主六十日奇八十七刻半。歲歲皆狀者也。客氣者。以本年年支後第三支起運。如子年。子後第三支是戌。戌屬水。就以水氣從大寒日始。為初之氣。即在泉左間也。木為二之氣。即司天右間也。火為三之氣。即司天大氣也。土為四之氣。即司天左間也。金為五之氣。即在泉燥金也。水為終之氣。即在泉石間也。每氣各主六十日奇八十七刻半。每年一易者也。以客加主。客勝主。則從主。主勝客。則逆。凡司天主歲半以前。在泉主歲半以後。此客氣之大者。加于主氣之上也。司天居上。在泉居下。運氣居中。或司天剋運。生運。以上臨下。為順。順分生剋之殊。或運剋司天。生司天。以下臨上。為逆。逆有大小之異。其中有司天與運同者。名曰天木。如丁巳年。支與運合者。名曰歲會。乙卯年。在泉與運同者。名曰同天。金。如庚子年。與運與

在泉合者名曰同歲水會辛丑辛未之類司天與運與氣三

合者名曰太乙天符戊午乙酉乙未乙丑之類天符為執法中執

法者其病速而危歲會為行令中行令者其病徐而

持太乙天符為貴人中貴人者其病暴而死嗟乎風

寒暑濕燥火者天之陰陽三陰三陽上奉之木火土

金水者地之陰陽生長收藏下應之戊巳土也狀

化氣必以五故甲巳化土而居其首土生金故乙庚

次之金生水故丙辛次之水生木故丁壬次之木生

火故戊癸次之此化氣之序也五行各一而天獨有

君相二者上應天之六氣也蓋木旺于東火旺于南

刪補順生微論 卷一

金旺于西水旺于北而土旺于四維戊附于戌而在

乾巳附于辰而在巽未之對冲在丑而丑未屬坤艮

之鄉故辰戌丑未寄旺之位也假如太角壬之化為

啓拆而變為摧拉太徵火之化為暄燠而變為炎烈

正化之變也少角丁木氣不足清勝而焚復少徵火

火氣不足寒勝而雨復邪化之復也寒甚而陽熾為

火鬱焚甚而妻清為金鬱却而不伸也水鬱而發則

為水電土鬱而發則為飄驟鬱而怒起也風淫所勝

則剋太陰熱淫所勝則剋陽明侮其所勝也相火之

下水氣承之濕土之下風氣承之亢則制也摧拉之

變不應普天悉皆大風炎烈之變不應薄海悉皆燔

灼清氣之勝不應宇宙無不明潔雨氣之復不應山

澤無不蒸騰聖人反復諄諄蓋欲入法于陰陽和于

術數勿為運氣所中也即使偶中亦知其受病之因

不令妄投藥餌而有天傷之嘆凡主客之氣皆能

致疾下為主氣上為客氣經曰木位之主其瀉以酸

其補以辛厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之

火位之主其瀉以甘其補以鹹少陰之客以甘瀉之

以酸軟之少陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹軟之

土位之主其瀉以苦其補以甘太陰之客以甘補之

刪補順生微論 卷一

以苦瀉之以甘緩之金位之主其瀉以辛其補以酸

陽明之客以酸補之以辛瀉之以苦緩之水位之主

其瀉以鹹其補以苦太陽之客以苦補之以鹹瀉之

以苦堅之以辛潤之凡客勝瀉客補主主勝瀉主補

客而本經更有六氣司天在泉濕勝之治法有司天

在泉反勝之治法有歲運上下所宜藥食之治法而

五運之中又必辨其氣先取化源啓玄子以為太

陽司天取九月為水之源陽明司天取六月為金之

源少陰少陽司天取三月為火之源太陰司天取五

月為土之源厥陰司天取年前十二月為木之源經

曰無失天信無逆氣宜無翼其勝無贊其復是謂至治者此也夫人稟五行之氣而生亦從五行之數而盡故王冰曰蒼天布氣尚不越乎五行人在氣中豈不應乎天道隨氣運陰陽之盛衰理之自狀也經曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣雖狀運氣之理亦有不可泥者如肝木素虛脾土太盛運值太角肝氣稍實脾氣方平五臟類狀又內外兩因隨時感觸雖常太過之運亦有不足之時不及之運亦多有餘之患倘專泥運氣能無實實虛虛損不足而益有餘乎况歲氣之在天地亦有反常之

刪補順生微論

卷一

聖

時故冬有非時之溫夏有非時之寒春有非時之燥秋有非時之暖犯之者病又如春氣西行秋氣東行夏氣北行冬氣南行卑下之地春氣常存高阜之境冬氣常在天下不足西北而多風地不滿東南而多濕又況百里之內晴雨不同千里之外寒暄各別方土不齊而病亦因之此皆法外之遺也蓋言運氣者隨機觀變方得古人未發之旨幸毋膠執而爲程馬之續也

○按運氣之理在在弗遺雖有微病罔不由斯至本年時疫左爲喫緊即七情不齊亦皆默範自奧理

微詞卒難得悟非累功探索至靈慧者莫之能強况魯鈍寡學寧敢窺其藩籬哉是篇刪其繁蕪爲下學楷櫟以免其浩汗之苦高博者有完義具于胸中視茲筌蹄幾同咀雪知我罪我其在斯乎

刪補順生微論

卷一

果

十六年氣運相臨之圖

六十年中紀運
歌運剋氣者爲
不和氣如生運
名順化運被氣
剋大州多小逆
見之運生氣氣
運合則天符過



理氣相同名曰天符。○戊子戊午戊寅戊申運氣皆

火。○丙辰丙戌運氣皆水。○巳丑巳未運氣皆土。

○乙卯乙酉運氣皆金。○丁巳丁亥運氣皆木。

天氣生運名曰順化。○甲子甲午甲寅甲申火下生

土。○壬辰壬戌水下生木。○乙丑乙未土下生金。

○辛卯辛酉金下生水。○癸巳癸亥木下生火。

天氣剋運名曰天刑。○庚子庚午庚寅庚申火下剋

金。○戊辰戊戌水下剋火。○辛丑辛未土下剋水。

○丁卯丁酉金下剋木。○巳巳巳亥木下剋土。

運生天氣名曰小逆。子臨父位故云小逆。○壬子壬午壬寅壬

刪補順生微論

卷一

巽

申木上生火。○庚辰庚戌金上生水。○癸丑癸未

火土生土。○巳卯巳酉土上生金。○辛巳辛亥水


上生木。

運剋天氣名曰不和。○丙子丙午丙寅丙申水上剋

火。○甲辰甲戌土上剋水。○丁丑丁未木上剋土。

○癸卯癸酉火上剋金。○乙巳乙亥金上剋木。

子午
二年
客氣
定局
熱化
之圖




刪補順生微論

卷一

事

丑未
二年
客氣
定局
濕化
之圖



寅申二年客氣定局火化之圖




刪補順生微論

卷一

三

卯酉二年客氣定局燥化之圖



辰戌二年客氣定局寒化之圖



刪補順生微論

卷一


三

巳亥二年客氣定局風化之圖




五音建運圖

商強也象金性之堅強也羽舒也陽氣將復萬物舒生此角觸也象陽氣觸動而生也徵止也物盛則止也



太過不及平運之圖

發生委和敷和角赫曦伏明升明徵敷敷甲監備化宮流衍涸流順靜明堅成從革審平高太過不及平氣紀



刪補願生微論

卷一

五音

刪補願生微論卷之

雲間念義李中樞

吳趨門人沈

○臟腑論第九

古之聖醫若見垣若內昭神靈莫測不爽絲毫豈真有異人之具可以洞徹皮毛映見焦臍哉亦惟是望外以知內耳內經藏象諸篇揭藏府以開來無殊對鑑而學者未別未彰往往托玄微于脉理而昧顯察于當機尙得謂之醫乎經曰皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有度量別有分部左右上下陰陽所在病

刪補願生微論

藏腑論

一

之始終可得而見又曰治之要極無失色脉用之不惑治之大則彼望齊侯之色者望真而已矣後世遂艷傳其奇以為絕世抑孰知顯而可徵有如是者苟未辨藏府之故而第曰指下能得之則以色合脉之說其謂之何故云不謂十二經絡開口動手便錯良有以也圖說數則搜掇成篇啓玄所謂將升伏機非運奚為欲請扶桑無舟莫適此蓋師其意云

手太陰肺經


肺者相傳之官治節出焉肺者氣之本魄之處也為陽中之太陰通于秋氣肺配胸中與大腸為表

裏其母脾土其子腎水其尅肝木其賊心火其象金
 其歲魄其旺秋其絕夏其色白其位西其卦乾其惡
 寒其性義其音商其數九其味辛其臭腥其華毛其
 候鼻其充皮其液涕其聲哭其氣咽其不足則太息
 其有餘則喘嗽其平脉浮短其賊脉洪其死丙丁日
 其畜馬其穀稻上爲太白星其見症也善嚏悲愁
 欲哭洒淅寒熱缺盆中痛腹痛肩背痛臍右少腹脹
 痛小便數澹泄皮膚痛及麻木喘少氣頰上氣見
 秋胃欲毛口毛毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛
 而有弦曰春病弦其曰今病脉來厭厭聶聶如落
 刪補順生微論 卷二 手太陰 二
 榆莢曰肺平脉來不上不下如循鷄羽曰肺病脉來
 如物之浮如風吹毛曰肺死真肺脉至大而虛如
 以毛羽中人膚色赤白不澤毛折乃死手太陰氣
 絕則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮
 節傷則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日篤丁日死
 肺絕三日死肺至懸絕十一日死白欲如白
 壁之澤不欲如壁白如豕膏者生白如枯骨者
 死形寒飲冷則傷肺實則夢兵戈驚擾虛則夢
 田野平原憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷
 皮毛苦勝辛鼻走氣氣病毋多食辛多食苦則

皮膚槁而毛拔肺欲收急食酸以收之以酸補之
 以辛瀉之肺苦氣上逆惡食苦以泄之小麥半
 肉杏薤皆苦肺手太陰之脉起于中焦下絡大腸
 還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循肅內行
 少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上
 魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內
 廉出其端多氣少血寅時氣迎注此
 補 人參 黃芪 五味子 麥門冬 山藥
 紫苑 百部 茯苓 阿膠
 防風 葶藶 桑皮 枳壳 澤瀉 蘇子
 刪補順生微論 卷二 手太陰 三
 溫 乾薑 生薑 款花 白豆蔻 木香
 涼 沙參 天門冬 玄參 貝母 桔梗
 兜鈴 瓜蒌 枯苓 山梔 人溺
 東垣報使引經 白芷 升麻 茺白

肺之臟圖

肺重三
肋三兩
六葉兩
耳凡八
葉附春
第三推



危言曰
肺者茂
也茂茂
然居五
上為華
臟之華
絡餘曰
肺者勃
也言其
氣勃勃

刪補願生微論

經圖

四



左右共二十二穴

以下十四經共六百六十六穴

○手少陰心經 丁火

心者君王之官也神明出焉。心者生之本神之變也。為陽中之太陽通于夏氣。主明則下安以此養生則壽主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃。心以膻中為腑與小腸為表裏其母肝木其子脾土其剋肺金其賊腎水其象火其藏神其旺夏其絕冬其色赤其位南其卦離其惡熱其性禮其音徵其數七其味苦其臭焦其華面其候舌其充血其液汗其聲笑其氣呼其不足則憂其有餘則笑不休其平脈洪其賊脈沉其死壬癸日其

刪補願生微論

手少陰

五

畜羊其穀黍上為熒惑星其見症也消渴兩腎內痛後廉腰背痛浸淫善笑善驚善忘上咳吐下氣泄眩仆身熱腹痛而悲夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病脈來累累如循琅玕曰心平脈來喘喘連屬其中微曲曰心病脈來前曲後居如操帶鈞曰心死真心脈至堅而持如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則色澤去故面黑如魚此血先死壬日篤癸日死心絕一日死心至懸絕九日死心微如魚

衷朱不欲如赭。赤如鷄冠者生。赤如衄血者死。

憂愁思慮則傷心。實則夢驚恐怖。虛則夢烟。

火煩明。喜傷心。悲勝喜。熱傷氣。寒勝熱。苦傷氣。酸

勝苦。苦走血。血病毋多食苦。多食鹹則脉凝泣

而變色。心欲軟。急食鹹以軟之。以鹹補之。以甘瀉

之。心苦緩急食酸以收之。大肉麻仁李韭皆酸。

心手少陰之脉起于心中。出屬心系。下膈。絡小腸。

其支者從心系。上挾咽。繫目系。其直者復從心系。却

上肺。出腋下。下循臑內後廉。行大陰心主之後。下肘

內。循臂內後廉。抵掌後銳骨之端。入掌內後廉。循小

刪補願生微論

手少陰 木

指之內出其端。多血少氣。午時氣血注此。

藥 棗仁 麥門冬 遠志 山藥 當歸 天竺

黃

貝母 黃連 木香 玄胡索


溫 石菖蒲 藿香

涼 竹葉 牛黃 朱砂 連翹 犀角

東垣報使引經 獨活 細辛

心之臟圖

形如蓮花。有七孔。有兩毛。三精。附三。第。附。五。



兩雅曰：心纖也。雲纖細微。無物不貫。應言曰：深也。深居高。云相火代之行事也。

刪補願生微論

心經圖

手少陰心經 左右共十八穴



足太陰脾經 已上

脾者倉廩之官。五味出焉。脾者倉廩之本營之居也。此至陰之類。通于土氣。脾以胃為腑。其母心火。其子肺金。其剋腎水。其賊肝木。其象土。其藏意。其旺長夏。及四季之末。其絕春。其色黃。其位中央。其卦坤。其惡濕。其性信。其音宮。其數五。其味甘。其臭香。其華在唇四白。其岐口其克肉。其液涎。其聲歌。其氣呵。其不足則少氣。其有餘脹滿。其平脈緩。其賊脈弦。其死甲乙日。其畜牛。其穀稷。上為鎮星。其見症也。五泄注下五色。大小便不通。面黃舌本強痛。口甘。食即吐。

卷二 八

食不下咽。怠惰嗜卧。捨心害儀。善味不嗜食。不化食。尻陰膝膕脂足背痛。煩悶心下急痛。有動氣按之石。牢當臍痛。心下痞。腹脹。腸鳴飧泄不化。足不收行。善惡。脚下痛。九竅不通。溇泄水下。後出餘氣。則快。飲食中滿。食減。善噫。形體皮膚潤而短氣。肉痛。身體不能動搖。足脣腫若水。長夏胃微弱。口平。弱多胃少。曰脾病。但代無胃口死。更弱有石。曰冬病。弱甚口今病。脈來和柔相離。如鷄踐地。曰脾平。脈來實而盈。數如雞果。足曰脾病。脈來堅銳如鳥之啄。如鳥之距。如屋之漏。如水之流。曰脾死。其脾脈至。弱而乍疎。

乍數。色黃青不澤。毛折乃死。足太陰氣絕。則脈不榮。其口唇。口唇者肌肉之本也。脈不榮。則肌肉不滑。澤。肌肉不滑。澤。則肉潰。肉潰。則唇反。唇反。則肉先死。甲日黃。乙日死。脾絕十二日死。脾至懸絕四日死。黃欲如羅。畏雄黃。不欲如黃土。黃如蟹腹者。生。黃如枳實者死。飲食勞倦。則傷脾。實則夢。歌歌快樂。虛則夢。飲食相爭。思傷脾。怒勝思。濕傷肉。風勝濕。甘傷肉。酸勝甘。甘走肉。肉病母多食甘。多食酸。則肉眊。胸而脊折。脾欲緩。急食甘。以緩之。以甘補之。以苦瀉之。脾苦濕。惡食鹹。以燥之。

卷二 九

人。豕肉粟藿皆鹹。脾足太陰之脈。起于太指之端。循指內側白肉際。過核骨後。上內踝前廉。上臑內。循脰骨後。交出腋。陰之前。上循膝股內前廉。入腹屬脾。絡胃。上膈。挾咽。連舌本。散舌下。其支別者。復從胃別。上膈。注心下。少血多氣。已時氣血注此。

補 人參 白朮 黃芪 蓮子 芡實 陳皮

瀉 扁豆 甘州 山藥 蒼朮 茯苓

溫 枳實 青皮 石膏 丁香 荳蔻 胡椒 良姜 附子 官桂

吳茱

東垣報使引經 白芍藥 升麻


鼎重二觔二兩
扁廣三寸。長五
寸。有散膏半觔。



中梓曰、脾胃屬土、故僕從田字、
田者、土也、胃居正中、故田字居
正中、脾屬於右、故田字亦偏右、

足太陰
卷二

足太陰脾經



刪補願生微論

足少陰腎經 癸水

腎者作強之官。伎巧出焉。腎者主蟄封藏之本。精之處也。爲陰中之少陰。通于冬氣。腎以膀胱爲腑。其母肺金。其子肝木。其尅心火。其賊脾土。其象水。其藏志。其旺冬。其絕長夏及四季之末。其色黑。其位北。其卦坎。其惡燥。其性智。其音羽。其數六。其味鹹。其臭腐。其華在髮。其候耳。其充骨。其液津。其聲呻。其氣吹。其不足則厥。其有餘則腸澼。其平脉沉。其賊脉緩。其死戊己日。其畜彘。其穀豆。上爲辰星。其見症也。面如漆。眇中清。面黑如炭。口渴。咳嗽。多血。胸中滿。大小

腹痛大便難。臍左脇下背脊間痛。饑不欲食。心懸如飢。腹大腫。腫咳嗽。脊脊股後痛。臍下氣逆。小腹急痛。泄足痿厥下腫。足胫寒而逆。腸癰陰下濕。四指黑。手指青。厥足下熱。嗜卧坐而欲起。凍瘡下痢。善思善恐。四肢不收。四肢不舉。又胃微石曰平。石多胃少。曰腎病。但石無胃曰死。石而有鈎曰夏病。鈎甚曰今病。脉來喘喘累累如鉤。按之而堅曰腎平。脉來如引葛。按之益堅曰腎病。脉來如牽索。辟辟如彈石曰腎死。真腎脉至。搏而絕如綿石。辟辟然色黃黑。不澤毛折乃死。足少陰氣絕則骨枯。少陰者冬脉也。伏行而溫于骨髓。故骨髓不溫。即肉不着骨。骨肉不相親。即肉濡而却。肉濡而却。故齒老而枯。髮無潤澤者骨先死。戊日黃。巳日死。腎絕四日死。腎至懸絕七日死。黑如炷者死。入坐濕地。強力入水。則傷腎。實則夢腰脊解軟。虛則夢涉水。恐懼。恐傷腎。思勝恐。寒傷血。燥勝寒。鹹傷血。其勝鹹。鹹走骨。骨病毋多食鹹。多食其則骨疼痛而齒落。腎欲堅。急食苦以堅之。以苦補之。以鹹瀉之。腎苦燥。惡食辛以潤之。黃黍雞肉。枕葱皆辛。腎足少陰之

刪補順生微論

足少陰

卷二

脉起于足小指之下。邪走足心。出然谷之下。循內踝之後。別入跟中。上膈內。出膈內廉。上膈內後廉。貫脊。屬腎絡膀胱。其直者從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。其支者從肺出絡心。注胸中。多血少氣。酉時氣血注此。

補

芡實 地黃 龍骨 虎骨 牡蠣 桑螵蛸

龜板 山藥 五味子 瑣陽 牛膝 枸杞

山茱萸 杜仲

瀉

澤瀉 知母

溫

附子 肉桂 破故紙 鹿茸 沉香 臘胸

刪補順生微論

足少陰

卷二


臍

京 黃柏 知母 牡丹皮 地骨皮

東垣報使引經 獨活 肉桂

腎之臟圖

父母構精，未有形象，先結河車，中間透起一雙，如蓮蕊初生，乃腎帶也。蓋中一點，實生身立命之原，即命門也。自此，天一生水，先結兩腎，大命處於中，兩腎左右，中間正，如命門，蓋一陽，以於二陰之間，則以成乎坎也。此見辨妄篇及八卦丸方論中。



甲子經曰：腎者，引也。能引氣通於骨髓，通於骨節，通於神也。腎者，神也。腎者，物而為言。形如兩枚，重一兩，長四寸，附脊上，兩側各一，下兩後，前直，後與臍平。

刪補願生微論

足少陰

古

足少陰腎經

左右共五十四穴



○手陽明大腸經 唐金

大腸者，傳導之官，變化出焉。其見症也，大指次指難用，耳聾，輝輝焮焮，耳鳴，嘈嘈，耳後有膿，肘臂外皆痛，氣滿皮膚堅而不痛。大腸手陽明之脈，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷兩骨之間，上入兩筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上臑外前廉，上肩，出髃骨之前廉，上出柱骨之會，上下入缺盆，絡肺，下膈，屬大腸，其支別者，從缺盆上頸，貫頰，入下齒縫中，還從俠口，交人中，左之右，右之左，上俠鼻孔，氣血俱多，郊時氣血，注此。

刪補願生微論

手陽明

圭

補

壯陽

肉豆蔻

訶梨勒

五倍子

龍骨

蓮子 粟穀

瀉

枳殼

桃仁

麻仁

芒硝

大黃

枳櫛

石斛 葱白

溫

乾姜

肉桂

吳茱萸

涼

槐花

條芩

東垣

銀使引經

葛根

白芷


升麻

行上

石膏

大腸之圖

大腸重二
 旬十二兩
 長二丈一
 尺廣四寸
 徑一寸當
 臍右迴疊
 積十六曲
 盛穀一斗
 水七升半



危言曰腸者轉也貴通暢也

大腸上
 口小腸
 下口大
 腸下接
 直腸
 為穀道
 門下

刪補顧生微論

手陽明大腸經

大腸圖
 卷二

去



○手太陽小腸經 此清別濁水液分子
 小腸者受盛之官化物出焉 其見症也面白耳前
 熱苦寒額頰腫不可轉腰似折肩膈肘臂外後廉腫
 痛膈臂內前廉痛 小腸手太陽之脉起于小指之
 端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下連出肘內
 側兩筋之間上循膈外後廉出肩解繞肩胛交肩上
 入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺
 盆循頸上頰至目內眦斜絡于顙 多血少氣未時氣血
 注此

刪補顧生微論

手太陽

手太陽
 卷一


去

補 乳麤 石斛
 瀉 荔枝子 葱白 紫蘇 木通
 溫 小茴香 大茴香 烏藥
 涼 天花粉 黃芩
 東垣報使引經 藥本 羌活 行上 黃柏 行下

小腸之腑

小腸重二觔
十四兩長三
尺二寸廣二
寸半徑八分
分之少半左
迴右積十六
曲容穀二斗
四升水六升
三合合之大
半

小腸
上口
胃下口



小腸
下口
大腸
上口

刪補願生微論
手太陽小腸經

小腸圖

太

左右共三十八穴



○手少陽三焦經

水穀之道，氣之所終始也。上焦在胃口，其治在膈上，以治
三焦者，決瀆之官，水道出焉。其見症也，耳鳴、喉痺、

腫痛、耳後、連目銳眦、汗自出、肩膊痛、內外皆疼。小
指次指如廢。三焦至少陽之脈，起于小指次指之
端，上出兩指之間，循手表腕，出臂外兩骨之間，上貫
肘，循臑外，上肩，交出足少陽之後，入缺盆，布臑中，散
絡心包，下膈，循屬三焦。其支者，從臑中，上出缺盆，上
項，挾耳後，直上出耳上角，以屈下頰，至頤，其支者，從

刪補願生微論

卷二

末

耳後入耳中，出走耳前，過客主人，前交頰，至目銳眦。

多血少氣，亥時氣血注此。

補黃芪 甘草 益智仁

瀉澤瀉

溫附子

涼石膏 地骨皮

東垣報使引經 柴胡 行上 川弓 行上 青皮 行下

三焦獨無圖者，上焦如霧，中焦如澀，下焦如瀆，有

氣無質，即上中下三部，腑臟空處是也。

手少陽三焦經

左右共四十六穴



刪補廣生微論

卷二

手

○手厥陰心胞絡經 丙火

胞絡者胞絡與心也。即腹中也。為心之所從來。諸說不一。承訛已久。今考正之。說見辨妄篇。

腹中者。臣使之官。喜樂出焉。其見症也。笑不休。手心熱。心中大熱。面黃。目赤。心中動。手厥陰心胞絡之脈。起于胸中。出屬心包。下膈。歷絡三焦。其支者。循胸出脇。下腋三寸。上抵腋下。下循臍內。行太陰少陰之間。入肘中。下臂。行兩筋之間。入掌中。循中指。出其端。其支者。別掌中。循小指次指出其端。多血少氣。戌時氣血注此。

補地黃

溫桂

刪補廣生微論

卷二

重

鴻枳壳 烏藥

涼梔子

東垣報使引經 柴胡 行上川弓 行上青皮 行下

心胞絡獨無圖者。以其在心下橫膜之上。豎膜之下。與橫膜相結。而黃脂聚者。心也。其脂膜之外。有細筋膜如絲。與心肺相連者。心胞絡也。觀其命名。即可思義。乃叔和配諸尺中。因其為臣使之官。應心主而為相火。故誤耳。參玩內經。昭然可辨。

手厥陰心包絡經 左右共一十八



刪補願生微論

○足陽明胃經 戊土

心經絡 卷二

至

官與脾同。其見症也。惡烟火。聞木音。則驚。在上登而歌。棄衣而走。顏黑。不能言。唇唇嚔。呵欠。消穀善飢。頸腫。膺乳冲股伏兔。肝外廉足。跗皆痛。胸旁過乳痛。口滑腹大。水腫奔嚮腹脹。肝內廉跗痛。解不可轉。胸如結。脇如裂。膝腫痛。遺溺失氣。善伸數欠。顛疾濕浸。心欲動。則開戶。獨處驚悸。身熱。身後不熱。胃足陽明之脉。起于鼻。交頰中。旁納太陽之脉。下循鼻外。入上齒中。還出頰口。環唇。下交承漿。却循頰後。下廉。出大迎。循頰車。上耳前。過客主人。循頰至額顙。

其支別者。從大迎前下。人迎。循喉嚨。入缺盆。下膈。屬胃。絡脾。其直者。從缺盆。下乳內廉。下挾臍。入氣街。其支者。起胃口。下循腹裏。下至氣街。而合以下。解開抵伏兔。下入膝膑中。下循胫外廉。下足跗。入中指內間。其支者。下廉三寸。而別下入中指外間。其支者。別跗上入大指間。出其端。多血多氣。辰時氣血注此。

補 白木 蓮子 芡實 陳皮 扁豆 黃芪
山藥 半夏 百合 蒼朮

瀉 枳實 礞石 大黃
溫 藿香 厚朴 益智 丁香 吳茱萸 草豆

刪補願生微論

足陽明 卷二

至

菴 白豆蔻 肉豆蔻 良姜 乾姜 生姜

木香 香附 胡椒

涼 滑石 石膏 玄明粉 石斛 黃蓮 黃芩


天花粉 山梔子 升麻 連翹 乾葛 竹

茹 知母

東垣張使引經 葛根 白芷 升麻 行上 石膏 行

胃 之 腑

胃重二筋十四兩、紆曲屈伸、長二尺六寸、大一尺五寸、徑五寸、容穀二斗、水一斗五升。



色言曰胃者榮也、所不容、萬物歸土之義、


刺補順生微論

胃經圖

卷二

足陽明胃經

左右共九十六



足太陽膀胱經

王水

膀胱者、州都之官、津液藏焉、氣化則能出矣。其見症也、頭苦痛、目似脫、頭兩邊痛、淚出、臍反出、下腫、便膿血、肌肉疼、項似拔、小腹脹痛、按之欲小便、不得、膀胱足太陽之脉、起于目內眦、上額交巔、其支別者、從巔至耳上角、其直行者、從巔入絡腦、還出別下項、循肩膊內、挾脊、抵腰中、入循膂絡腎、肩、膀胱其支別者、從腰中下挾脊、貫臀、入膂中、其支者、從膂內左右別下貫胛、挾脊內、過解體、循解外、從後廉下合膂中、以下貫膂內、出外踝之後、循京骨至小指外側端。

刺補順生微論

足太陽

卷二

多血少氣、申時氣血注此。

補 橘核 菖蒲 龍骨 續斷 益智仁

瀉 芒硝 滑石 車前子 澤瀉


溫 茴香 烏藥

涼 生地黃 甘艸梢 黃柏

東垣報使引經 梹木 行上 羌活 行上 黃柏 行下

勝腕重
九兩二
銖縱廣
九寸盛
溺九升
九合廣
二寸半。

○勝脈上下俱有只上口
絡于闌門下口裹胞乃胞
外脂膏也形與綿絨相似




通身虛鬆。可以畜水。漸清而參入胞中。胞滿而溺出也。

刪補願生微論

足太陽膀胱經

一十六穴



○足少陽膽經 甲木

臍者中正之官。決斷出焉。異見症也。口苦馬刀扶
 瘦。足外熱。寢寒。憎風。体無膏澤。胸中脇肋髀脇外至
 胛絕骨外踝前諸節痛。善太息。瞻足少陽之脉起
 于目銳眥上。抵頭循筋。下耳後。循頸。行手少陽之前
 至肩上。却交出少陽之後。入缺盆。其支者。從耳後入
 耳中。出走耳前。至目銳眥後。其支者。別目銳眥。下大
 迎。合手少陽。抵于頰。下卽頰車。下頸。合缺盆。以下胸
 中。貫膈。絡肝。屬膽。循脇裏。出氣街。統毛際。橫入髀厭
 中。其直者。從缺盆。下腋。循胸。過季脇。下合髀厭中。以

冊補願生微論

足少陽
卷二

下循髀外出膝外廉下外輔骨之外直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指循岐骨內出其端還貫入爪甲出三毛多氣少血子時氣血注此

補
草龍膽
木通

青皮 柴胡

溫
半夏
生薑
陳皮
川芎

黃連 竹茹

東垣報使引經
川行上柴胡木經
青皮行下

膽之圖

膽在肝之短葉間重三兩三銖
 兼精汁三合狀如瓶

危言曰膽者膽也清淨之府無所受輸淡淡然者也




中粹曰膽者擔也中正之官決斷出焉言有擔當也

刪補願生微論

膽經圖

卷二



左右共八十六穴

足厥陰肝經

肝者將軍之官謀慮出焉。肝者罷極之本魂之居也。為陽中之少陽通于春氣。肝以膽為腑其母腎水其子心火其剋脾土其賊肺金其象木其藏魂其旺春其絕秋其色青其位東其卦巽其惡風其性仁其音角其數八其味酸其臭臊其華爪其候目其充筋其液泣其聲呼其氣嗟其不足則悲其有餘則怒其平脉弦其賊脉澀其死庚辛日其畜雞其穀麥上為歲星其見症也頭痛脫色善潔耳無聞頰腫肝逆面青目赤腫痛兩脇下痛引小腹胸痛脇腫婦人

刪補願生微論

足厥陰

其

小腹腫脹痛不可俛仰四肢滿悶挺長熱嘔逆暴瘁足逆寒疝善癰遺溺淋瀝便難癰疽疝瘕胃脘轉筋陰結筋攣善恐胸中喘噓衄血在脇下喘春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰个病脉來更弱招招如揭長竿未梢曰肝平脉來盈實而滑如循長竿曰肝病脉來急盛勁如新張弓弦曰肝死真肝脉至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌卷筋者聚於陰器而絡于舌本故脉不榮則筋縮急筋縮急即引卵

與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日驚辛日死肝絕

八日死肝至懸絕十八日死青如翠羽者生青如草莖者死

不飲如藍青如翠羽者生青如草莖者死

怒氣逆上而不下則傷肝實則夢山林大樹虎則

夢細草蒼鷺怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷

筋辛勝酸酸走筋筋病毋多食酸多食辛則筋

變急而爪枯肝欲散急食辛以散之以辛補之以

酸瀉之肝苦急急食甘以緩之糲米牛肉棗葵

皆甘肝足厥陰之脉起于大指叢毛之際上循足

跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈

刪補順生微論 足厥陰 主

內廉循股陰入毛中過陰器抵少腹挾胃屬肝絡胆

上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頑顙連目系上出

額與督脉會于巔其支者從目系下頰裏環唇內其

支者復從肝別貫膈上注肺多血少氣丑時氣血

注此

補 木瓜 阿膠 薏仁 酸棗仁

鴻 青皮 芍藥 柴胡 青黛

溫 木香 肉桂 吳茱萸


涼 甘菊 龍胆草 胡黃連 車前子

東垣報使引經 柴胡 本經 青皮 行下川弓 行上

肝臟之圖

肝重四
筋四兩
左三葉
右四葉
附脊第九椎

危言曰肝者幹也
屬木象木枝幹也




刪補順生微論

足厥陰肝經 左右共二十八穴

肝經圖

主



督脉


督脉起于下極之俞。金于脊裏。上至風府。入腦。上巔。循額至鼻柱。屬陽脉之海。其見症也。脊強而腰厥。督者。都也。行背部中。為陽脉之都綱。奇經脉也。

刪補順生微論

督脉 二十八穴

卷二 督脉

十一



任脉

任脉起于中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至喉嚨。屬陰脉之海。其見症也。苦內結。男子為七疝。女子為瘕聚。


任者。妊也。行腹部中。為生養之本。亦奇經脉也。

刪補順生微論

任脉 二十四穴

卷二 任脉

十二



衝脉

衝脉起於氣衝。金陽明之經。夾臍上行。至胃中而散。其見症也。氣逆而裏急。

衝者通也。言下至足。上至頭。通十二經之氣血。

帶脉

帶脉起於季脇。迴身一周。其見症也。苦腹滿。腰溶溶。如坐水中。

帶者束也。總束諸脉也。季脇在肋下。接髓骨之間。

陽蹻脉

陽蹻脉者起于跟中。循外踝上行入風池。其見症

刺補履生微論

雜脉

毒

也。陰緩而陽急。

「蹻者健也。是人動足之所由也。」

陰蹻脉

陰蹻脉者起于跟中。循內踝上行至咽喉。交貫衝脉。其見症也。陽緩而陰急。

義與陽蹻同。

陽維脉

陽維起于諸陽之會。維者維持之義也。為諸脉之綱維。

陰維脉

陰維起于諸陰之交。義與陽維同。三經之見症

也。悵然失志。容容不能自持。驚即失志。喜忘恍惚。

○任督二脉導引秘旨

夫人身之有任督。猶天地之子午也。人身之任督。以腹背言。天地之子午。以南北言。可以分。可以合。分之。以見陰陽不離。合之以見渾淪無間。此脩真者之周行也。惜夫舉世昏昏。盡趨岐蹊。或默朝上帝。或內視腑臟。或存神閉息。或服氣吞霞。或運氣機。行火候。或鍊日月。採精華。或日運臍輪。夜運泥丸。或朝呼三魂。暮攝七魄。或按周天。而二搬運。或指手板。而轉化机。

刺補

任督旨

毒

或守中黃絳宮。而待神凝氣聚。或運三華五炁。而用洗骨伐毛。種種旁門。豈離任督。獨惜其舍正路。而不由耳。知之者。四門外閉。兩目內觀。心如止水。身似空壺。締觀黍米之珠。權作黃庭之主。不施搬運。自妙轉旋。含光嘿嘿。調息綿綿。握固內守。注意玄關。頃刻而真元內還。未幾而一陽來復。兩腎如湯煎。膀胱似火熱。任督循車輪。四肢若山石。鼓巽運坤。天機自動。微以意定。則水火自然升降。如桔槔之呼水。稻花之凝露。謂之乾坤交姤罷。一點落黃庭。到此地位。意不可散。散則不成丹矣。故紫陽翁曰。真永生于離。其用却

在坎。姤女過南國。手持玉椒。攬身心渾沌。與虛空等。不知身之爲我。我之爲身。神之爲氣。氣之爲神。不規中而自規中。不胎息而自胎息。虛室生白。黑地引針。亦不知任之爲督。督之爲任也。此是最上一乘。慎勿身中摸索。真志于脩者。其知所務哉。

別症論第十

蓋聞治適病者易。治失病者難。今工者盡難。難易者偶中。非若淳于長沙之見。隔世不笑。錮錄而投治如合符節也。雖先聖立教詳明。而陰陽虛實。元會運氣。七情六淫。四時寒暑。錯互不齊。況臟腑有合起之病。

別症論

美

而感受無偏至之形。千端萬緒。寧能悉諸簡編。卽載籍極博。尤必先夫靈敏善手。丹溪有言曰。醫者臨機應變。如對敵之將操舟之工。自非隨時取中。寧無愧乎。按前人已成之跡。應今人無限之病。何異按圖索驥。幸其偶中也難矣。大無先生曰。用古法治今病。如拆舊屋改新屋。不世祖匠氏之手。其可用乎。潔古云。運氣不齊。古今易轍。舊方新病。難相附合。許學士曰。予讀仲景書。守仲景法。未嘗守仲景方。乃爲得仲景心也。王履曰。醫術之要。先尋大毒。大意既曉。則條分縷析。脈絡分明。內經曰。知其要者。一言而終。不知其

要。流散無窮。歷觀名論。皆以別症爲先。吁。噫。症固難別。別症亦未易也。脈有雷同。症有疑似。水火亢制。陰陽相類。臟之發也。混于腑。血之變也。近于氣。太實有羸狀。悞補益疾。至虛有盛勢。及瀉含冤。或辨色已真。而診候難合。或指下既察。而症狀未彰。欲按古今法。而功效弗臻。欲師心處療。而狐疑莫決。展轉進退。毫厘千里。獨不計人以死生寄我。我以嘗試圖功。彼補人者。無論矣。卽偶中者。詎可對衾影哉。丹溪有叔祖年七十患泄漏。身溪口。病久而不悛。便瀉而不赤。脈瀼而帶弦。詢其喜食鯽魚。遂以菜史陳皮生姜砂糖。

刪補順生微論

別症論
卷二

美

等藥。探吐膠痰而瀉止。又有隣人素患疳瘕。夏初泄瀉。脈瀼而弦。丹溪曰。此下疳之重者。瀉與歸蘆會此去。麝四劑而瀉止。夫此兩人。症似脉同。而治之迥別者。求其本也。一人勞倦發熱。口乾煩躁。面目皆赤。東垣曰。脉來鼓指而按之。豁然內真寒而外假熱也。取參朮薑附煎就。使之冷服者。以真熱假寒之劑治之。一貼而熱勢盡退。一人惡寒發戰。兩脉細微。按之甚數。以石膏黃連清火之劑。乘熱頓服。而寒勢遂止。此皆水火亢制。而有兼化之象。設不從脉按症治之。禍不旋踵。江右袁啟莘平素勞心。處事沉滯。時當二氣。

小便不通。醫者與六一散不效。再用木通。澤瀉。茯苓。車前等藥。又不效。診得兩寸洪數。知為心火刑金。故氣化不及。州都也。亟用黃連。茯苓。神人參。牛膝。麥門。五味。一劑而愈。閩中周東志。形麻。善飯。忽患腹痛。脹悶。衆皆泥其脾虛多食。不能運化。治以枳實。陳皮。青皮。神麴。白朮。茯苓。脹勢轉增。右寸關洪滑。知為胃火上冲。惟用石膏。陳皮。山梔。甘草。升麻。黃芩。二劑而脹止。再用四君子。加姜汁炒山梔。十劑而康。夫臍本不相懸。而用藥若斯之異。倘泥而不通。其不致天札者幾希。一婦人多鬱多產。肢體漸瘦。四肢微腫。嘔吐。

別症論
卷二

支

痰稍有動作。頭眩耳鳴。有與八珍湯者。久而無功。此肝脾鬱傷血分。先用逍遙散。加木香。龜膠。熟地。二十劑而症減。其七。仍用八珍湯。加丹皮。香附。兩月而瘳。汪望洋之孫。年方舞象。發熱吐痰。頭眩羸弱。醫皆以二冬。二母。四物。芩。柏。治之。似瘳非瘳。倦怠異常。診其右三部。不及左者兩倍。乃知脾肺氣虛。火不生土之候也。遂用補中益氣。加姜。桂。至三錢。十劑而安。四十劑而平復。大治氣者。主陽而升。治血者。主陰而降。現症頗煩。而治之之法。適不相作。焉可以疑似之見。賈禱耶。樂元忠妻。因免乳後。病驚。身翻。翻如在浮雲。

中舉目。則旋轉。持身不定。四肢酸軟。皆以安神補虛治之。前症轉甚。戴元禮獨曰。左脉北且濇。神色不變。是驚氣傷心。胞絡積血耳。乃丁血如漆者。一斗遂愈。大實似虛者。此也。留守衛陸仲容之內病大熱。妄見鬼神。手揚足擲。改用黃連。清心湯。困苦垂斃。元禮視之曰。形瘦而色不澤。乃虛極耳。卓與參。幾而安。至虛似盛者。此也。此兩症者。元禮不起。而反劑。難投幽潛沉寃矣。雖然。難明者意。難盡者言。姑舉一二。俾綱類相通。惟急志仁壽者。卽病機淺易。必審察昭昭。標本彰明。必小心翼翼。明矣。慎矣。又毋以疑懼。起固循之。

論
別症論
卷二

支

弊必以精設。操獨斷之權。設有未確。關疑以待高明。慎勿輕狂。嘗試以圖僥倖。庶無負于仁者之初心耳。不然。利心溺而名心深。機心起而仁心隱。毋乃自居于卑庸。而品節一壞。終世莫償。貽害日多。噬臍何及。其可不痛切深戒哉。

四要論
第十一

按醫學之要。有要于望聞問切者乎。無之也。東。夫叔季之世。惟賴問之一端。況其素問。未必能悉。遵前訓。止求病端。不察病本。又况士大夫。多秘所患。以驗醫之能否。問惡。可以窮病之情哉。或有攻苦之士。留心。

候診而偽訣訛傳皆泥于左心小腸右肺大腸之說浸淫而莫悟經位不別尚何以察死生虛實之機取夫醫之四要猶人之四肢也一肢廢不成其為人一要缺不成其為醫經曰望而知之謂之神聞而知之謂之聖問而知之謂之工切而知之謂之巧六十一難曰望而知之者望見五色以知其病之所處也聞而知之者聞其五音以別其病之所出也問而知之者問其所欲五味以知其病之所起所在也切而知之者診其寸口視其膚實以知其病在何腑臟也故夫初近患人先望而問次問而切誠不易之次第而刪補

論

四要論
卷二

望

醫者願可忽乎彙其要列錄於左知言君子將有擇焉

○望

靈樞經曰色青者其脈弦赤者其脈鉤也黃者其脈代也白者其脈毛黑者其脈石見其色而不得其脈反得相勝之脈則死矣得相生之脈則病已矣五色篇曰赤色出於天庭大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出於天庭大如拇指必不病而卒死黃帝曰青黑為痛黃赤為熱白為寒是為五官也脈要精微篇曰夫精明五色者氣之華也赤欲如白裹朱不

欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼五色精微象見矣其壽不久矣青如草茲黃如枳實黑如烟煤赤如赭血白如枯骨皆死青如翠羽赤如雞冠黃如蟹腹白如豕膏黑如烏羽皆生夫五藏者身之強也頭者精神之府頭傾視深精神將奪矣背者胸中之府背曲肩隨將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則筋解筋將憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨將憊矣得強者生失強者死左頰屬

刪補

微論

四要論
卷二

望

肝額屬心鼻屬脾右頰屬肺左頰屬腎青色見於太陰太陽及魚尾正口角如大青藍葉枯惡之狀者肝氣絕主死若如翠羽柏皮只是肝邪有怒病驚病風病目病之屬赤色見於口唇及三陰三陽上下如馬肝之色死血之狀者心氣絕主死若如橘紅馬尾色者只是心病有火熱怔忡驚悸夜卧不寧健忘之屬白色見於鼻準及正面如枯骨如擦殘汗粉者為肺氣絕主死若如膩粉梅花白綿者只是肺邪氣虛中寒咳嗽哮喘之屬黃色見於鼻乾燥者土偶之形為脾氣絕主死若如桂花雜以黑暈只是脾

刪補願

論

四要論
卷二

望

病飲食不快四肢倦怠脈閉泄瀉嘔吐之屬黑色見於耳或輪廓內外命門懸壺若汚水烟煤之狀為腎氣絕主死若如蜘蛛網眼鳥羽之澤者只是腎虛火和乘水之病病者目睛不了了鼻中呼不出吸不人氣短促而冷者陰病也目中不了了鼻中呼出入能得能來口鼻息長而皆熱者陽病也病人及健人黑色或白色起入目及口鼻三日中死及病人耳目及顏骨赤者五日死病人目無精光面若土色不受飲食四日死病人兩目皆有黃色起者將愈病人面目俱黃者不死病人面唇青黑者

○聞

經曰言而微終日乃復言者此奪氣也聲如從室中言此中氣之濕也因於暑汗煩渴而喘靜則多言衣被不斂言語善惡不避親疎者此神明之亂也仲景曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲暗喑然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病息搖者心中堅息引胸中上氣者欬息張口短氣者肺痿吐沫病人王薺已奪神明不識人聲

刪補願生微論

四要論
卷二

望

者死喉中有聲謂之肺鳴火來乘金不得其平則自鳴此壞症也虛勞痰嗽漸至聲啞者必死大氣不止心病也喘氣太息肺病也怒而罵詈肝病也氣不足以息者脾病也欲言不言語輕多畏者腎病也病人陰陽俱絕失錯不能言者三日死病人妄言錯亂及不能言者不治惟無病者可以治倦不欲言縱使強言之聲怯弱而低微者內傷不足也語言前輕而後重其言高其聲壯厲而有力者外感有餘也言啗如從甕中出傷風也言語無力不欲言難布息者內傷也言而不厭者外傷也

○問

素問疏五過篇曰凡未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精凡欲診病者必問飲食居處暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣暴怒傷陰暴喜傷陽診有三嘗必問貴賤封君敗傷及欲侯王故貴脫勢雖不中邪精神內傷身必敗亡始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿痺為變微四失篇曰診病不問其始憂患飲食之失萌起居之過度或傷於毒不先言此卒持氣口何病能中厚乙經曰問病者所思何也所懼何也所欲何也所

刪補願生微論

四要論
卷二

四

疑何也。問之。要察陰陽之虛實。辨藏府之寒熱。疾病所生。不離陰陽藏府。寒熱虛實。辨之。分明治。無悞矣。
五十一難。問病欲得寒。欲見人者。病在府也。病欲得溫。不欲見人者。病在藏也。問其痛處。按之而痛止者。為虛。按之而痛甚者。為實。痛不移者。為血。痛無定者。為氣。凡百病。問其晝則增劇。夜則安靜。氣病而血不病也。夜則增劇。晝則安靜。血病而氣不病也。晝熱夜靜。陽氣旺于陽分也。晝靜夜熱。陽氣下陷入陰中也。晝夜俱熱。重陽無陰也。亟瀉其陽。峻補其陰。晝靜夜寒。陰血旺于陰分也。夜靜晝寒。陰氣上溢于陽中也。晝夜俱寒。重陰無陽也。亟瀉其陰。峻補其陽。晝寒夜熱。病名陰陽交變而死矣。移精變氣篇曰。閉戶塞牖。繫之病者。數問其情。以從其意。得神者昌。失神者亡。產後須問坐草難。易惡露多少。飲食遲早。生子存亡。蓋形傷血傷之不同。補氣補血之有異。飲食失節。宜調中。生子不存。事關鬱。問其所欲。以知其病。欲熱者。知為寒。欲冷者。知為熱。好靜惡動者。知為虛。煩躁不安者。知為實。惡食知傷食。惡風知傷風。好食甘為脾虛。好食辛為肺病。好食酸為肝虛。好食鹹為腎弱。好食苦為心病。此皆順應而易治。若乃

心病愛鹹。肺傷欲苦。脾弱喜酸。肝病好辣。腎衰嗜甘。此為逆候。病輕必危。危者必死。王海藏曰。常人求診。拱默惟令切脈。試其知否。殊不知氣血附于經絡。熱則脈疾。寒則脈遲。實則有力。虛則無力。若得病之由。及所傷之物。豈能以脈知之乎。故醫者不可不問其由。病者不可不說其故。羅東坡曰。吾疾必盡告醫者。使胸中了然。然後診脈。疑似不能惑也。吾求愈疾而已。豈以困醫為事哉。

一切

刪補願生微論

四要論
卷二

望

經曰。必審其所始病。與今之所方病。然後各切循其脈。視其經絡浮沉。上下逆從。三部之中。獨小者病。獨大者病。獨遲者病。獨疾者病。獨熱者病。獨寒者病。獨陷者病。脈從四時。謂之可治。脈逆四時。為不可治。所謂逆四時者。春得肺脈。夏得腎脈。秋得心脈。冬得脾脈也。熱則脈數。寒則脈遲。沉主在裏。浮主在表。虛者脈虛。實者脈實。清為陽氣。有餘為陰氣不足。此八者。脈之綱領也。長則氣治。短則氣病。數則煩心。大則病進。上盛則氣高。下盛則氣脹。代則氣衰。細則氣少。濡則心痛。心脈循血脈而行。持脈指法。如六絃之重。按至血脈而得者為浮。稍稍加力。脈道粗

者為大又稍加力脉道潤軟者為散肺脉循皮毛而行持脉指法如三菽之重按至皮毛而得者為浮稍不加力脉道不利為濤又稍加力不及本位曰短肝脉循筋而行持脉指法如十二菽之重按至筋而脉道如筆絃相似為弦次稍加力脉道迢遞者為長脾脉循肌肉而行持脉指法如九菽之重按至肌肉如微風輕颯柳稍之狀為緩次稍加力脉道敦實者為大腎脉循骨而行持脉指法按至骨上而得者為沉次重而按之脉道無力為濡舉止來疾流利者為滑經曰先識經脉而後識病脉此之謂也

刪補願生微論

四要論
卷二

異

堅者病在外脉實小而堅者病在內脉小弱而滿者謂之久病浮滑而疾者謂之新病脉急為疝瘕小腹痛緩而滑曰熱中盛而堅曰脹來疾去徐上實下虛為厥顛來徐去疾上虛下實為惡風寸口之脉中下短者曰頭痛中手長者曰足脰痛中手促上擊者曰肩背痛浮而盛者病在外沉而堅者病在中沉而弱者寒熱推而內之外而不內身有熱也推而外之內而不外有心腹積也推而上之上而不下腰足清也推而下之下而不上頸項痛也按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也

黃帝曰脉從面而

反者其診何如曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然諸陰之反何如曰脉至而從按之鼓甚而盛也

化源論第十二

自人心不古膠泥藥性拘惑成方而化源之義廢而不講久矣夫不取化源而逐病求療譬猶草木將萎枝葉踈擻不知固其根蒂灌其本源而僅僅潤其枝葉雖欲不稿焉可得也人第知枝葉踈而救枝葉者之近而切救根莖者之遠而迂亦曾知根莖澤而枝葉靡不向榮根莖戕而枝葉靡不受憐乎陰陽應象論曰治病本求于本至真要論曰諸寒之而熱者取

刪補願生微論

化源論
卷二

異

之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也六元正紀論曰資其化源訓誥諄諄光如日月罔非重源本耳苟舍本從標不惟不勝治終亦不可治故曰識得標只取本治于人無一損如脾土虛者必溫燥以益火之源肝木虛者必濡濕以壯水之主肺金虛者必其緩以培土之基心火虛者必酸收以滋木之宰腎水虛者必辛潤以係金之宗此治虛之本也木欲實金當平之火欲實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之此治實之本也金為火制滿心在保肺之先木受金殘平肺在補肝之先土

常木賊。損肝在生脾之先。水液上乘清脾在滋腎之先。火承水尅。抑腎在養心之先。此治邪之本也。金太過則木不勝。而金亦虛。火來為母復仇。木太過則土不勝。而木亦虛。金來為母復仇。火太過則金不勝。而火亦虛。土來為母復仇。水太過則土不勝。而水亦虛。水來為母復仇。皆亢而承制。法當平其所復。扶其不勝。經曰。無翼其勝。無贊其復。此治復之本也。得其本。則生上之本不闕。而化化之源無窮。謹道如法。萬舉萬全。氣血正平。長有天命。不然者。膠藥執方。用之不一。一旦敗傷。動輒委命。即以循環相制之微。惘然自疑。刪補願生微論

化源論

卷二

失。猶為通詞以欺世。良足慨矣。

知機論第十三

古之論病。不曰病形。不曰病體。命曰病機。夫機之義微矣哉。昔者養由氏懸楊葉于旋風之間。矢無虛發。人皆異之。養由氏曰。矢之發也。不離乎機。機之發也。不離乎心。我方不知心之為葉葉之為心。雖欲不中。胡可得也。機者。毫厘之間。間不容髮。秒末之差。相懸無算。夫以至微至活之理。非有至著至確之識。其可謂之知機耶。內經曰。審察病機。無失氣宜。本草曰。欲療治者。先察病機。病機未請。豈能變化處治。徒循死

句。守株待兔。不可以為工矣。若諸風掉眩皆屬肝木。諸痛瘡瘍皆屬心火。諸濕腫滿皆屬脾土。諸氣喘咳皆屬肺金。諸寒收引皆屬腎水。此病機之屬于五運者也。諸暴強直皆屬于風。諸嘔吐酸皆屬于熱。諸躁狂越皆屬于火。諸產強直皆屬于濕。諸澀枯槁皆屬于燥。諸病水液皆屬于寒。此病機之屬于六氣者也。然運氣之道。亢極則復。反兼勝已之化。故河間嘗曰。夏熱太甚。林木流津。火板似水也。冬寒太甚。流水冰堅。陰極似陽也。仲景曰。陽病十八。陰病十八。五臟之病。各有十八。合為九十病。又有六微微有十八病。合

刪補願生微論

知機論

卷二

為一百八病。五勞七傷六極。婦人三十六病。不在其中。則病機之繁。未易枚舉。病機之變。未易測識。奈何甲溜者流。捕風捉影。以依稀為實據。膠柱鼓瑟。以硬套為神良。如虛癆發熱吐血痰嗽。輒用一冬二母四物。苓連。款花紫苑之屬。中風痿痺。輒用三生二陳。秦苑天麻之屬。傷寒發熱。輒用柴胡黃芩。陳皮耳聾之屬。水腫腹脹。輒用五皮五子。枳殼澤瀉之屬。瘧疾寒熱。輒用青皮草果柴胡乾薑。厚朴常山之屬。痢疾腹痛。輒用芍藥當歸黃連木香。枳殼枳實之屬。嘔吐。輒用蘇茹山梔。橘皮半夏之屬。泄瀉。輒用甘草白朮。

參陳皮之屬小便不利輒用猪苓澤瀉木通車前之屬精氣不固輒用蓮鬚芡實金櫻牡蠣之屬不卧輒用棗仁遠志之屬口滑輒用花粉門冬之屬頭痛輒用川芎白芷藁本之屬足痛輒用木瓜牛膝苡仁之屬目疾輒用四物三黃蔓荊其菊之屬婦科輒用香附烏藥四物陳皮之屬諸若此類不可勝舉果爾則醫亦何難之有耶夫運氣參差標本緩急臟腑陰陽貴賤貧富虛實邪正南北東西活若荷中之蠶實難捉摸不知因病以用法乃欲因法以合病效之不獲則曰有命詎然乎哉豈謂法盡可廢必趨奇異正恐

刪補順生微論

知機論
卷二

三

法之可合者十三不可合者十七粗工末醫謂專恣一旦告窮伊誰之咎嗟乎皆由不知病機專執病形之失也昔者齊中尉滿滿如小腹痛余公診曰病得之酒且內其脉深小弱氣口緊小兒瘕瘕也中尉不復自止于內二十八日當溲血死居二十五日果溲血三日死王仲宣年二十仲景謂之曰君有病四十歲當眉落眉落半年而死服五石湯可免仲宣嫌其言受湯弗服居數日見仲宣曰服湯否曰已服仲景曰色候固非服湯之診君何輕命也後二十年果眉落至一百八十日而死古稱知機其神者庶幾其

人歟學者每以此案自反當得愧汗通身抑此神奇豈別有術數之辨祇熟理而已理熟則機得機得則言中奈何不察其機自居于闇而動以先哲為不可幾也亦知先哲之勤求古訓典今日之醫甚懸絕哉

明治論第十四

醫門之理廣而難窮莫先乎見其大意大意見則條理在我由此尋繹究何條窮粗工錯繆如盲人逢野不辨東西又如羅雀于江魚目混珠其幸而得之豈理也哉夫三法四因五治六淫八要十氣最宜早

刪補順生微論

明治論
卷一

一

辨三法者初中末也一曰初法當用峻猛藥病新暴感之輕發之重以峻猛之藥亟去之二曰中法當用寬猛相濟緣病非新非久須緩急得中養正去邪相兼治之三曰末法當用寬緩藥性平養廣服無毒取其安中補益緣病久邪去正氣日微也四因者有始因氣動而內有所成病者癰疽瘡瘍掉痺之類有始因氣動而外有所成病者癰疽瘡瘍掉痺之類有不因氣動而內有所成病者留飲宿食喜怒想慕之類有不因氣動而外有所成病者瘴氣邪魅蠱毒蟲咬獸傷墮墜刀斫刺射捶扑之類五治者和取從新偏也

曰和假令小熱之病當以涼藥和之種之不已次用
取二曰取為熱勢稍大當以寒藥取之取之不已次
用從三曰從為熱勢既甚當以溫藥從之從之不已
次用折四曰折為病勢極甚當以逆制之制之不已
當以下奪之下奪不已次用屬五曰屬為求其屬以
衰之如熱陷骨髓鍼藥之所不及故必求其屬屬者
生尅之本王太僕所謂壯水之主以制陽光是也六
淫者陰陽風雨晦明也陰淫寒疾則怯寒此寒水太
過別淺深以溫之陽淫熱疾則惡熱此相火太過須
審虛實以涼之風淫末疾末謂四肢也必身強直此

刪補順生微論

明治論
卷一

聖

風木太過頂和冷熱以平治之在陽則熱在陰則寒
寒則筋攣骨痛熱則委緩不收雨淫腹疾則濕氣濡
泄此濕土太過以平滲燥之兼看冷熱之候晦淫感
疾晦邪所干精神惑亂此燥金太過當滋養之明淫
心疾心氣鼓動狂邪譫妄此君火太過當鎮以歛之
八要者虛實冷熱邪正內外也一曰虛脉細皮寒氣
少泄瀉飲食不進此為五虛二曰實脉盛皮熱腹脹
前後不通問督此為五實三曰冷陽氣衰微府藏積
冷四曰熱陰氣衰弱藏府積熱五曰邪非藏府正病
也六曰正非外邪所干也七曰內情慾所傷不在外

也八曰外外物所傷不在內也十失者病在驕恣背
理不遵醫戒不自珍愛一失也輕身重財治療不早
診視不勤二失也聽從師巫廣行殺戮不信醫藥三
失也憂思想慕怨天尤人廣生懊惱四失也諱疾忌
言言不由中藥不合症五失也不能擇醫或信佞言
或憑龜卜六失也室家不和處事乖戾羣成荆棘七
失也不明藥理旦暮更醫雜劑妄投八失也但索速
為方藥林濫惡妄為加減九失也奉持匪人煎丸失
法怠不精詳十失也工醫者不可不知此數則物理
論自古之聖醫知天地神祇之妙性命吉凶之數處

刪補順生微論

明治論
卷二

聖

虛實之分定順逆之節買微通幽不失細火然而雖
高必以下為基夫豈獵等可造學者果有是志請從
此平適始

○風土論第十五

蓋聞一病而治各不同者地勢使然也五方之氣不
齊而粗工雜合以治豈知大體者哉壽蒼生者不分
畛域有事四方男婦之常奈之何不亟為定也東方
之域今之南直隸江山東福建是也干象為木于時
為春天地之所始生也京東方之風氣者多風魚鼈
之地濱海傍水其民食魚而嗜鹹其利豐故安其處

其味美故恣其食魚者假濕熱而生令人熱中。溫入腎腎屬水水制火火屬心心主血。溫勝血令人發熱而陰傷其民黑色而疎理其病皆為癰瘍宜培土之基以御邪風其治宜砭石故砭石者亦從東方來西方之城今之陝西四川是也于象為金于時為秋天地之所收引也。稟西方之風氣者多燥地方高阜陵居而多風金氣肅殺水土剛強其民不衣布帛衣褐薦食酥酪形體脂肥膚腠封閉血氣壅實故外邪不能傷其病也皆內七情飲食男女之過其治宜毒藥峻攻可使遙已故毒藥者亦從西方來北方之域今

刪補願生微論

風土論

卷一

之北直山西是也于象為水于時為冬天地之所閉藏也。稟北方之風氣者多寒地高陵居風寒冰冽其民樂野處而乳食其病多寒中宜益火之源以消陰翳其治宜灸焫故灸焫者亦從北方來南方之域今之江西兩廣雲貴是也于象為火于時為夏天地之所長養也。稟南方之風氣者多熱其地卑下水土孱弱靈氣所聚。瘴瘴乘人其民嗜酸食不芬香陽盛之處故多赤色味酸主飲故皆緻理熱氣內傷濕氣外薄加之嗜酸肝經受損故病癰痺宜壯水之主以制陽光其治宜微鍼故九鍼者亦從南方來中央之域

今之河南湖廣是也于象為土于時為長夏天地之所以生萬物也。稟中央之風氣者多濕其地平以濕四方輻輳萬物交歸故民食雜而不勞陰陽應象篇曰地之濕氣感則害皮肉筋故其病多痿弱氣逆及寒熱也。當扶木之主以制土邪其治宜導引按蹻故導引按蹻者亦從中央出也。丹溪曰西北之地多風寒故患外感者居多東南之地本卑濕故患濕熱者恒衆蓋北方高阜天不足西北而多風南方卑下地不滿東南而多濕方土之候各有不齊所生之病多隨土者西方氣厚飲食倍常居室儉素元氣不戕一

刪補願生微論

風土論

卷二

有疾病輒用疎利其病如脫若夫東南體質柔脆腠理不密飲食色慾與西北迥別舉用疎利不幾干捺必殺人耶雖然西北固厚安能人人皆實東南固薄安得人人皆虛必觀其人因症而藥斯無一偏之弊耳。倘盈虛消息之故茫然而欲強勉圖功不亦遠乎。虛癆論第十六。蓋聞人之生也。負陰而抱陽兩者和則四體強兩者虧則萬病作。三因之症多端而根本之傷獨重經曰有所勞倦則氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故內熱此言氣虛之癆也。又曰

陰虛生內熱。此言血虛之病也。內經之言虛癆。惟是氣血兩端。至巢氏始分五藏之癆。七情之傷。又分氣血筋骨肌膚之六極。甚而分藏府筋骨爲二十三蒸。本事方語傳屍鬼症。至于九十九種。鑿空生蔓。使學者惑於多岐。靡所適從。伊誰之咎乎。蓋以內經爲式。第於脾腎分主氣血。約而實該確而可守也。夫人之虛。不屬於氣。卽屬於血。五藏六府。莫能外焉。而獨舉脾腎者。水爲天一之元。土爲萬物之母。二藏安和。諸經各治。百疾不生。蓋脾具土德。脾安則土爲金母。金實水源。且土不傷水。水安其位。故脾安則腎愈安也。

刪補願生微論

虛癆論
卷二

素

腎兼水火。腎安則水不挾肝。上泛而凌土濕。火能益土。蒸腐而化精微。故腎安則脾愈安也。救腎者必本于陰血。血主濡之。陰本下降。虛則上逆。當飲而抑。六味丸是也。救脾者必本于陽氣。氣主煦之。陽本上升。虛則下陷。當升而舉。補中益氣湯是也。近世治癆專以四物三冬黃柏知母。不知皆行秋冬之令。非所以生萬物者也。且血藥常滯。必妨痰而減食。血藥常潤。必滑腸而洩瀉。況黃柏苦寒尤能減食。知母甘寒尤能滑腸。二味俱瀉腎經實火。肝溪有言曰。實火可瀉。虛火可補。癆症之火。虛乎實乎。瀉之可乎。卽知其宜補。

而用藥頗多疑難。如補脾保肺。法當兼行。然脾喜溫燥。肺喜清潤。保肺則妨脾。保脾則妨肺。須知燥熱而甚。能食而不瀉者。潤肺當急。而補脾亦不可缺也。若虛癆而甚。食少腸滑。雖多嗽喘。但當補脾而清潤宜戒矣。脾有生肺之能。肺無扶脾之力。故補脾尤要于保肺也。嘗見癆症多死于泄瀉。泄瀉多由于寒涼。此至著至確者也。又如補腎扶脾。法當兼行。然甘寒補腎。又恐不利于脾。辛溫快脾。又恐愈傷其水。兩者並衡。較重脾土。以土能生金。金爲水母故也。若腎大虛者。又不可拘。但補腎之中。不脫扶脾。壯脾之中。不忘養

刪補願生微論

虛癆論
卷二

素

腎可耳。又如補氣補血。均不可少。然氣藥有生血之功。血藥無益氣之理也。故古之名論。或曰獨陰不長。或曰血脫補氣。或曰甘溫能除大熱。或曰陽生陰長。聖賢之意。皆以春夏之令。可以發育。秋冬之氣。不能生長。且虛癆証。受補者。可治。不受補者。不治。故朱丹溪專主滋陰。其治癆方案。用人參者。十有六七。萬可久神於治癆。其垂著十方。多人參。自好古。肺熱傷肺。肺應服參。必死之說。印定後人眼目。遂至畏人參如畏砒鴆。其用苦寒。直至上嘔下泄。猶不悔悟。良可憾矣。李湛石山。李瀕河。深指其誤。詳爲之說。而宿習

沿流極重難返。貽禍至今未有抵止。余所以不禁婆心。為之慮肝膽而揭日月也。須知肺經自有熱者。肺必洪數。按之必軟。金氣大傷。非參不能保之。前哲洞窺元本。預知流弊。而為之說曰。土旺而金生。勿拘拘於保肺。水壯而火熄。毋汲汲於清涼。奉此兩言。開萬世之聾聵。濟無窮之天枉矣。倘受病日深。中氣已壞。藥餌不可施功。針灸無所用巧。亟求胎息之工。鼓巽運坤。通任會督。發身中之造化。蓋既敗之陽和。定操奪命之奇。永致康和之福。厚生者。其可以藥木無功。遂委之命也哉。

刪補顧生微論

虛癆論
卷二

妄

邪祟論第十七

按內經十八卷。未嘗有片語及邪祟。其言邪氣盛則實者。指六淫之邪耳。非世俗所謂神鬼妖怪也。丹溪云。虛病痰病。有似邪祟。蓋血氣者。身之祟也。神既衰乏。邪因而入。理或有之。若夫血氣兩虧。察客中焦。妨碍升降。不得運用。以致十二官各失其職。視聽言動皆為虛妄。以邪治之。其人必死。或心靈虛損。驚惕如痴。如中鬼邪。或陽明內實。登高而歌。棄衣而走。殺人。不避水火。罵詈不避親疎。此皆神明搖亂之症。古雖

有祝由一科。龍樹呪法之治。皆移精變氣之術。但可解疑癘惑。使心神歸正耳。何邪祟之可祛哉。雖然。山谷幽陰。時有猿精狐怪。庄房日久。或多怨鬼愁魂。魘勝已行。妖禍及於生命。形家未善。魘魅因而肆淫。頑如花木。取精多而為孽。微如雞犬。歷歲久而與妖。然有犯有不犯者。抑又何也。一則曰。因虛而入。正氣虛則陽明之氣不足以勝其幽潛。一則曰。因心而客。邪心起。則淫亂之神適足以招其類。聚畏俱深。則疑似之念大足。以惑其心神。或面黃肌瘦。或奇夢驚心。或昏倦嗜卧。或異症蜂起。或語言錯亂。或驚悸失常。或

刪補顧生微論

邪祟論
卷二

妄

飲食久絕。而神色未變。或危篤垂斃。而忽爾康強。或妄言禍福。而明徵不繆。或叫號震擊。而猛悍非常。或兩脉而如出兩人。或一脉而浮沉不等。乍疎乍數。乍大乍小。或促或結。或滑或實。凡遇此症。但以補虛安神為主。祛邪逐祟為佐。有痰者吐之。消之。有積者下之。攻之用禁咒灸法。以治其外。用正言激論。以醒其心。未有不瘳者也。一旦張皇純用攻擊。不求其原。妖乃愈甚矣。如八毒赤丸。藕合香丸之屬。僅可施于一時。久而弗已。藥且為祟。寧能去祟耶。昔有灸鬼定法。以絹帛縛病人兩手。大拇指取艾炷。置于其中。兩介

甲及兩指角肉四處着火。一處不着則不驗。七壯神效此屢試不誣者也。果患邪崇者蓋先從此治。

○傷寒論第十八

夫六氣皆能害人而傷寒為甚。殺厲之氣其來甚毒。況六經之變不齊。陰陽之間疑似表裏與半表半裏。審視須審兩感與合病併病辨別毋混投劑稍有差訛殺人速于用刃。故自古有難明之嘆也。冬月嚴寒萬類潛藏。君子固密則不傷于寒。若腎虛之人。太陽不固。偏易感寒。或卒受非常之冷。寒毒乘于肌膚。在冬三月發者。名正傷寒。伏而不發至春始發。名曰溫。

刪補顧生微論

傷寒論卷二

卒

病春猶不發至夏始發。名曰熱病。總是冬令之寒。隨時令而更名也。獨不言至秋為涼病者何也。寒水之氣與火偏仇。遇仇不發。已為火氣所勝。而長夏濕土又制水邪。況至金令金得寒而愈堅。故至秋則無傷寒也。仲景于傷寒獨精而遺言久遠。廢墜頗多。王叔和收集散亡為之詮次。惜以己意潤經。未免穿鑿成無已。順文註釋。並無校正。致將冬令傷寒之方。通療春夏溫熱之病。遺禍至今。未有能改溫熱之變。必別有方。今皆失而無徵。宋學士所以嘆傷寒無全書也。陶節菴以麻黃桂枝等劑難于輕投。愀以平和之劑代之。

太達仲景之旨。夫傷寒病緒多端。萬難輕忽。得其要

領。易于拾芥。脈証與理而已。求之多岐。則支離繁碎。如涉海問津矣。脈証者。表裏陰陽虛實寒熱也。理者。知其常通其變也。多岐者。變演之方書也。余故約六法以盡之。曰汗吐下溫清補。○汗者治在表也。而汗法有三。一曰溫散。天遇寒勝之時。人逢陰勝之臟。夫陽氣不克。則表不能解。雖身有大熱。必用辛溫。一曰涼解。炎熱熾盛。表裏枯涸。陰氣不勝。亦不能汗。宜用辛涼。一曰平解。病在陰陽之間。既不可溫。又不可涼。但宜平。用期于解表而已。○吐者治在上也。吐中有

刪補顧生微論

傷寒論卷二

卒

發散之意。可去胸中之實。經曰在上者。因而越之是也。○下者攻其裏也。而下法有五。痞滿在氣。燥實在血。四証俱具者。攻之宜峻也。但滿燥實者。攻之稍緩。但見痞實者。攻之更緩。或行畜血。或逐水停。輕重緩急。隨証變通也。○溫者。溫其中也。臟受寒邪。不溫則死。夫氣為陽。氣虛則寒。故溫亦是補。又名救裏者。以陽虛大危。亟當救援也。有直中陰經之寒。正虛邪湊。多在冬月大寒之勝。不分經絡。而一于虛寒。且無表証之兼。有傳經至三陰而寒者。其寒也。久而後變。且有表証之兼。雖與直中相類。而所傷所治。則有別矣。

刪補願生微論

傷寒論
卷二

奎

○清者清其熱也。有熱無結。不合下症。若不清之。邪氣盤踞。熱何由散乎。或下後有未盡之邪。亦宜清也。○補者救其虛也。古人言之頗詳。今人畏而不敢使。傷寒犯虛者。坐而待斃。大可憾也。○至若屢行發散。而汗不能透。陰氣不能達也。人知汗屬於陽。升陽可以解表。不知汗生于陰。養陰可以發汗也。又如內熱不解。屢清而火不退。陰不足也。人知寒涼可以去熱。不知壯水可以制火也。又如正虛邪旺。久而不痊。但與補正。其邪自除此。必見虛衰之陰脈者也。傷寒論曰。陰症得陽脈者生。陽症得陰脈者死。人皆奉其言。未

刪補願生微論

傷寒論
卷二

奎

虛症而攻之。無不死者。柴曰。傷寒無補法。誤矣。獨不觀仲景立三百九十七法。而治虛寒者。一百有奇。垂一百一十三方。而用人參桂朮者。八十有奇。東垣丹溪。前菴。有補中益氣。回陽。這本溫經。益元等湯。未嘗不補也。獨不可經投于不虛之症耳。而柴謂傷寒無補法。豈仲景之遺言不足信乎。○傷寒傳變。先自三陽後入三陰。此常序也。而變例不可不知。東垣曰。太陽經病。若渴者。自入于本也。名曰傳本。太陽傳陽明者。名循經傳。太陽傳少陽者。名越經傳。太陽傳少陰者。名表裏傳。太陽傳太陰者。名誤下傳。太陽傳厥陰者。名經得度傳。陶節菴曰。或自太陽始。日傳一經。六日至厥陰而愈者。或不罷。再傳者。或間經傳者。或傳二三經而止者。或始終只在一經者。或越經而傳者。或初入太陽不發熱。便入少陰。而成陰症者。或直中陰經者。或兩經三經齊病。不傳而為合病者。有一經先病未盡。又過一經之傳。而為併病者。有太陽陽明合病者。有太陽少陽合病者。有少陽陽明合病者。有三陽合病者。若三陽與三陰合病。即是兩感。○劉革憲謂。傷寒傳足不傳手。非也。人之氣血。運行周身。豈邪遇手經。而有不入者。寒之傷人。必先皮毛。皮

毛者。肺之合外則寒慄鼻塞。內則喘嗽短氣。非傳肺乎。舌胎昏亂。非傳心與胞絡乎。洩瀉秘結。非傳大腸乎。瘕閉非小腸乎。病滿上下不通。非傳三焦乎。且內經云。五臟六腑皆病。豈手經不在內乎。然經言傳變不及手經者何也。足之六經可盡周身之脉絡。手經已在其內。不必復言矣。○未滿三日。其邪在表。汗之而愈。滿三日者。其邪在裏下之。而愈。此特道其常。并須知脉大浮數在表。可汗。脉實沉數在裏。可下。日數雖多有表症者。必汗。日數雖少有裏症者。必下。第當以表裏為辨。不可以日數拘也。以上數則詞雖簡約。刪補順生微論

傷寒論

卷二

奇

傷寒之要訣已無遺漏。倘能本此而精求之。可以升仲景之堂矣。

廣嗣論第十九

夫嗣續者。上接亘古之傳。下衍無疆之脉。願不甚重哉。夫祖宗及今。不知幾千百世。一旦至我。而斬孝子慈孫。所以顯天福地。而莫可誰何也。不知天地之大德曰生。生之氣固流行遍滿。何獨至我。而獨斬乎。此其故可得而想矣。丁凡先生曰。愛者生之本。忍則自絕其本。只此二句克義之盡。便是聖賢從來無絕嗣之聖賢。人亦奈何。不強為善也。強為善則生機克益。

刪補順生微論

廣嗣論

卷二

麟趾鍾祥。天豈能限。數豈能拘。星相豈能阻。風水豈能阻。夫然後調神以養氣。養氣以生精。勤事玄功。綿綿罔間。靜心絕慾。嚴戒七情。功到藥生。勃然峻作。譬如天地之閉藏。一遇陽春。靡不發育。故素問曰。道者能却老而全形。年皆百數。能有子也。雖然藥餌之功。亦不可少。如女子稟界羸孱。性情暴戾。尺脉微細。血海敗傷者。固無論已。即性和而脉旺者。猶必平其陰陽。使月事無愆期之患。而子宮無阻塞之虞。一意固其天真。壯其胃氣。勿泥婦人多氣。而以香附之類。損其血。縮砂之類。殘其氣。倘能知書明理。亦教之以養氣有神。則其奏功捷于桴鼓。如此者。謂之有其地矣。男子精衰。多由于七情不能致慎。五臟不能相生。故素問曰。腎者主水。受五臟六腑之精而藏之。故五臟盛乃能寫。靈樞經曰。五臟主藏精。藏精者不可傷。由是則五臟各有特隨用。而灌注于腎。腎不過為都會關司之所。非腎之一臟獨有精也。奈何舉世不察。不能別臟腑之有餘不足。而乎之。但以補腎為功。不知熱則害水。寒則伐火。即使腎氣得補。而四臟未平。終無相生之理。曷成孕育之功。若曰某有秘授奇方。發無不中。遂欲執一以治萬。豈理也耶。必察其症狀。通

變用之則病可必除精可自足如此者謂之有其種矣。天地生物必有氤氲之候。萬物化生豈無樂育之時。世之言三十時辰兩日半二十八九君須臾特言其概耳。非的論也。居恒必兩家寡慾。至經行一度必有一日細繼之候。于一時辰時間氣蒸而神昏而悶。有動而莫遏之狀。此的候也。逆而取之則成丹順而施之則成胎。其曰三日月出庚又曰溫溫鉛鼎光透簾幃皆言其象也。如此者謂之知其時候矣。褚氏謂陰血先至陽精後冲而成男。陽精先入陰血後入而成女。然世有精先至而生男。精後至而生女者。獨

刪補順生微論

廣嗣論
卷二

五

何欽東垣曰。經斷一二日血海始淨。感者成男。四五日血脉已生。感者成女。六日以後雖感無胎。然世有經始斷。交合生女。經久斷。交合生男。亦有四五日以前交合無孕。八九日以後。交合有孕者。獨何欽俞氏謂微陽不能射。弱陰不能攝。然世有羸夫弱婦屢屢受孕。血氣強盛者。反艱於育。獨何與。丹溪專以婦人經水為王。然富貴之家。侍妾衆多。寧無月事。當期者乎。有已經首夫頻頻生育。而娶之以圖嗣者。竟亦無胎。更與它人轉盼生子。獨何與。故欲生子者。只以百脉齊到為善。百脉齊到者。暢遂之極。而無一毫勉強

是也。至男女之分。只以精血各由百脉之齊到者。以別勝負。然而有意種子。兢兢業業。必難結胎。偶意為之。不識不知。成胎甚易。如此者。謂之結其子矣。自此而半產可虞。甚至一月而墮胎。人皆莫覺。一次墮他。次亦墮。只以為為經行耳。寧知其胎已墮哉。故播種之後。勿復交接。以擾其子宮。勿令勞役。勿令食冷。勿令疾行。勿令跌躐。勿令洗浴。勿令過醉。勿令之怒。勿令之驚。多服健胃和中。平肝養氣之藥。隨時調護。可無遺墮之虞。既固其胎。宜遵胎教。巢氏曰。初。胎時未有定儀。因感而變。欲子端正莊嚴。口談正言。身行

刪補順生微論

廣嗣論
卷二

五

正事。欲生男者。宜佩弦執弓矢。欲生女者。宜佩韋施環珮。欲子美好。宜佩白玉。欲子賢能。宜看詩書古人轉女為男之法。或以絳紗囊佩雄黃于左者。或磨以夫髮及手足甲。置簾下者。或潛以斧置床下。緊亦向。下者。或潛以雄雞尾尖長毛三莖。置簾下者。此皆外象內感。有妊者宜亟聞也。由是觀之。則世之無嗣者。靡非自戕自賊。以絕其生之本。豈其自然之性哉。愚嘗謂造物有不毛之地。人應之。故婦人有無子宮者。造物無不雨露之。天人應之。故男子皆能施化。往往自失其道。致斯萬世之傳耳。嗟乎。人就無心。讀此章

者可以猛然醒。翻然悔矣。

婦科論第二十

病之情一也。而療婦人。最難。所謂寧醫十男子。莫醫一婦人。此何說也。凡病皆始于七情。而後六氣之邪。乘虛來犯。婦人女子之性。陰濁勝而陽明微。慈戀愛。憎嫉妬。憂悲。性情鬱滯。染疔堅牢加之。不出閨戶。無可遣解。不習詩書。無可寬憫。義命之理。茫然怨尤之心。橫起。或有懷不能暢達。或有病不可告人。含羞謹疾。偏信師巫。鄙吝恣睢。及疎藥餌。所以受病之處。蒂固根深。卒難全愈。况乎產蓐帶下。三十六病。損氣傷

刪補順生微論

婦科論

束

血。挾症多端。故曰。女人嗜慾。過于丈夫。感病倍於男子。誠非虛語。寇宗奭曰。豪貴之家。居奧室之中。處帷幔之內。既不能行望色之神。聽聲之聖。又不能盡切脈之巧。兼帶口。凡治病者。察其形氣色澤。形氣相得。調之可治。色澤已平。調之易已。形氣相失。謂之難治。色天不澤。謂之難已。又曰。診病之道。觀人勇怯。骨肉皮膚。能。其虛實。以為診法。若婦人脉病。不相應。既不得見其形。惟據脉候藥。其可得乎。醫者慎重。不免盡理質。問患者。見所問繁多。以為醫學不精。往往得藥不信。昔者扁鵲見齊侯之色。尚不能取信。况其未

之見者耶。是四診之術。不得其一矣。自古高士。為之別立一科。而重嘆其難也。至于師尼寡婦。及違時未笄之女。鬱情尤甚。奉教尤難。諸證所以有療各不同之說。然不達其情。而專責諸草木。是以江河填漏卮。雖多亦以奚為也。夫久鬱生火。火賊元氣。元氣受賊。外邪僉侮。現症即有百端。惟鬱傷元氣。可一言以蔽之也。曰。鬱則芳香達氣。似不可少。曰。傷元氣。則養衛和營。又安可緩哉。前賢以歸脾湯為補。庶散鬱之聖藥。為其養心則神和。疏氣則鬱解。非。九司方操者。故表而出之。

刪補順生微論

婦科論

刪補願生微論卷之三

雲間念義李中

吳趨門人沈

茂苑後學吳

藥性論第二十一

神農三品數應重卦增衍至今馬渤牛溲亦無遺用
欲窮其類雖一千八百九十二種掛漏猶多要皆聖
賢好生之念博聞以壽斯民然質非甚敏藥繁則感
能不悵多岐之莫適乎因考察古老人珍珠囊止論
百品丹溪僅以隨身七十二味所在活人與其多而
刪補願生微論 卷三

饋孰若少而察也乃選四大家恒用最切要者一百
二十種附錄二十二種新補二十種悉以時珍綱目
為主剪繁去複獨存精要採集名論竊附官窺比之
舊本十更四五蓋借天下于燎原而免妄投之失耳
草部

人參味甘性微溫無毒入肺脾二經茯苓爲使惡鹵
鹹反藜蘆畏五靈脂白中微黃大而肥實者佳去
蘆用補氣安神除邪益智消食開胃止渴除煩療
腸胃冷止心腹痛善理勞傷最清虛火
按人參味甘合五行之正性溫得四氣之和虛人

服之譬如陽春一至萬物發生昔賢嘉其功懸群
草良非虛語虛勞賴之如饑渴之飲食惜乎王節
齋泥好古肺熱傷肺之說妄謂參能助火陰虛忌
服自斯言一出印定後人眼目凡遇勞症堅不敢
用病家亦以此說橫於膏肓其受苦寒至死不悟
豈非一言而傷天地之和哉漆古謂其瀉心肺脾
胃中火邪東垣謂其血脫補氣陽生陰長之理丹
溪謂其虛火可補參耆之屬且言陰虛潮熱喘嗽
吐血四物加人參或用瓊玉膏甚則獨參湯主之
古今治勞莫妙于芎可久用參之劑十有六七由

刪補願生微論

卷三

是則古之神良未嘗不以人參治陰傷而世醫爲
節齋所誤牢不可破殊不知虛勞吐血古人屢言
其受補者可治不受補者不治故不服參者不能
愈服參而不受補者必不能愈敢陳臆見俟正于
後之君子若血虛驟起肺脉獨實脹症暴成尤候
堅強痧疹初發斑點未彰傷寒始作熱邪昌熾惟
茲數者不可輕投也

沙參味甘性微寒無毒入肺經惡防己反藜蘆白
而實者佳去蘆微焙用理胃中結熱結血治虛勞
肺痿肺癰定心內驚煩退皮間邪熱

按沙參氣輕力薄非有弘任大之品也人參補陽而生陰沙參補陰而制陽一行春氣一行秋氣不相侔也。

去參味甘苦鹹性微寒無毒入腎經惡黃芪乾薑大棗山茱萸反藜蘆忌銅器蒸過晒乾黑潤者佳補腎明目滌熱除驚理傷寒狂邪痲毒療虛勞燥渴骨蒸外科治瘰癧瘰癧女方主產乳餘疾。

按玄參色黑味鹹本為腎經之劑古人多用以治上焦火症者正為水不勝火亢而僭上宜壯水之主以制陽光滋陰劑中須用蒸晒差減寒性然亦

刪補顧生微論

卷三

三

不可久用也。

丹參味甘微寒無毒入心經長鹹水反藜蘆潤而鹹者佳微焙用安神散結益氣養陰去瘀血而生新血安生胎而落死胎理帶下崩中療胎前產後新補按丹參色合南離獨入心家專主血症古人稱丹參一味兼四物之功嘉其補陰也胃氣虛寒者斟酌按之。

黃耆味甘性微溫無毒入肺脾二經茯苓為使惡雞中白蘚皮性軟嫩色綠而潤者佳家炙用補肺氣而實皮毛飲汗托瘡解渴定喘益胃氣而去膚熱

止瀉生肌補虛治勞理大瘋癩疾治帶下崩淋按黃耆為補表要藥肺主皮毛脾主肌肉故入此二經黃耆得防風其功愈大為其助達表分表有邪氣方實者勿用。

甘草味甘性平無毒入脾經白朮為使惡遠志及大戟芫花甘遂海藻忌豬肉赤皮堅實者佳酒炙用補脾和中潤肺治痿止瀉退熱堅筋長肌除咽痛定欬逆解一切毒和一切藥生用瀉火熱熟用去裏寒梢止莖中痛節主腫毒瘡。

按甘草外赤內黃俗坤離之色味甘氣平資虛

刪補顧生微論

卷三

四

之功甘味居中而能兼乎五行可上可下可內可外有和有緩有補有泄理中湯用之恐熱劑僭上其熱寒藥用之緩其寒甘能滿中故中滿者勿用甘能緩急故筋急者宜之頭入吐藥有功梢達腎家清火嘔病酒病脹病俱禁用也。

白朮味甘苦性溫無毒入脾胃二經防風為使忌桃李雀肉青魚荏菹產於潛者佳米泔浸半日去皮切片曝乾蜜水拌炒至褐色用健脾胃消穀進食化胃家痰水利心下急瀉利腰臍間血結祛周

身濕癰。君枳實而消痞。佐黃芩以安胎。

愚按白朮甘溫得土之冲氣補脾胃之第一品也。木贊云味重金漿芳踰玉液百邪外禦六府內充。察草木之勝速益於已者。金不及木之多功也。俗醫往往嫌其滯。一半未讀本草。一坐炮製未精耳。但臆間有動氣築築者禁之。

蒼朮味苦甘辛性溫無毒入脾胃二經畏惡惡同白朮。產茅山梗細皮黑其鬚蒼茂內有紅點者佳。米泔浸一日土蒸半日刮去皮晒乾切片米糠拌炒。糠枯爲度發汗散邪燥脾逐水消痰下氣益胃和

刪補願生微論

卷三

五

中除山嵐瘴氣辟鬼邪瘟疫。

按蒼朮爲濕家痰家要劑辛溫辟邪得天地之正氣者數但陰虛便燥渴而火亢者忌之。

當歸味甘辛性溫無毒入心脾胃三經惡藺茹濕麩畏菖蒲海藻生薑白而肥大堅實者佳酒洗去蘆用去瘀生新舒筋潤腸溫中止心腹之痛養營療肢節之疼治痢排膿生肌止痛調經祛風理崩帶淋瀝。

按當歸爲血分要藥辛溫而散血中氣藥也頭止血而上行梢破血而下流身養血而中守全活血。

而不走氣血昏亂服之而定能領諸血各歸其所。當歸之經故名當歸若入吐衄崩下藥中須醋炒過少少用之多能動血耳泄瀉家禁與。

川芎味辛性溫無毒入肝經白芷爲使畏黃連形實色白潤者佳醇酒微煨用王頭癰面風淚出多涕寒痺筋攣去瘀生新調經種子長肉排膿小者名撫芎能止痢開鬱。

按川芎亦血中氣藥痘疹家不起發者往往用之然亦不敢多用爲其上升也寇宗奭謂久服川芎令人暴亡以其辛喜歸肺肺氣偏勝金來尅木肝

刪補願生微論

卷三

六

必受侮久則偏絕若君臣佐使配合得宜寧致此害哉虛火上炎嘔吐欬逆者禁與。

白芍藥味酸苦微寒有小毒入肝經雷丸爲使惡石斛苦硝畏鱉甲小蘗反藜蘆犬而色白者佳醇酒浸半日煨透切片微炒制肝而主血熱目疾腸下作疼安胎而主中滿腹痛瀉痢不和飲肺而主脹逆喘欬膝理不固赤者行惡血利小腸。

按芍藥收斂下降行秋金之令猶未若平通之寒而寇氏云減芍藥以避中寒丹溪云新產後勿用芍藥恐酸寒伐生生之氣蓋以藥之寒者行殺伐

之氣適生長之機雖微寒如芍藥古人猶諄諄告戒況大苦大寒之藥其可肆用而莫之忌耶

地黃味甘性寒無毒入心肝脾腎四經當歸為使惡貝母畏蕪荑芴蒜蘿蔔忌銅鐵器產懷慶每隻重五六錢者佳砂鍋杓甑視以荷葉將地黃酒潤用縮砂末拌蒸蓋覆極密蒸半日取出曝乾如前又蒸又晒九次為度令中心透黑即成熟地矣○生者涼血補陰去瘀生新養筋骨益氣力理胎產主勞傷通二便消宿食心病而掌中熱痛脾病而痿屢食眠○熟者滋腎水封填骨髓利血脉補益真

刪補願生微論

卷三

七

陰久病餘脛股酸痛新產後臍腹作疼

愚按地黃為補腎要藥養陰上品六味先以之為首天一所生之本也四物以之為君乙癸同源之義也九蒸九晒方製每見世人一煮透便以為熟地誤矣票北純陰之性而生非太陽與烈火交鑄則不熟也所以固本膏雖經日煎熟必生熟各半用之即此可以知地黃非一煮便熟者矣以薑酒拌炒生者不妨胃熱者不滯腸者凝氣鬱食少瀉多者不可用也

何首烏味甘苦澁微溫無毒入肝腎二經扶本為使

諸血無鱗魚蘿蔔葱蒜鐵器選大者赤白合用清浸竹刀切如板榔大黑豈拌蒸二時晒一日如前又蒸九次為度補真陰益精髓理虛勞能多嗣強筋壯骨黑髮悅顏消諸種瘡癰瘰癧陰傷久瘡治崩中帶下調產後胎前

按何首烏補陰而不滯不寒強陽而不燥不熱票中和之性而得天地之純氣者也昔有老人何姓者見藤夜交掘而服之鬚髮盡黑故名首烏後陽事大舉屢生男子改名能嗣則其養陰益腎可想見矣

刪補願生微論

卷三

八

山藥味甘性平無毒入肺脾腎三經喜麥門冬惡甘遂色白而膩者佳飯上蒸透切片炒黃用補中益氣長肌強陰安神退熱止瀉固精

按山藥得土之冲氣稟春之和氣比之金玉君子無往不宜但性緩非多用不效與麴同食不能益人

芡實味甘性平無毒入肺脾腎肝四經畏鹵鹹色白而肥大者佳潤肺主嗽補脾去熱養肝而理背傷淚出益腎而除腰痛脛寒新補

按芡實滋益陰精與地黃同功增長陽氣與人參

同力潤而不滑和不偏譬諸威德之人無處不宜故神農收而為上品自予拈出近來用者稍多矣。

貝母味苦辛性微寒無毒入心肺二經厚朴白薇為使畏秦艽莽草礬石反烏頭選白而大者去心糯米拌炒米熟為度消痰潤肺熱清心療喘嗽紅痰除育中鬱結下胞衣傳人面瘡散項下瘰癧按貝母本功惟入肺治燥痰久服非脾家所喜汪機云俗以半夏燥而有毒代以貝母不壞貝母治肺金燥痰半夏治脾土濕痰何可代也脾為濕土

刪補順生微論

卷三

故喜燥肺為燥金故喜潤若痰屬脾經懷殺貝母可翹首待斃又詩云言采其蘭即貝母也作詩者本以不得志而言今用以治愁鬱者其說蓋本於此脾虛食少者禁用

知母味甘性寒無毒入肺腎二經忌鐵器肥白而潤者佳去毛制刀切片鹽酒炒透清肺經熱消痰損飲瀉腎家火利水潤腸除傷寒煩熱理肢體浮腫

按知母瀉腎經有餘之火惟狂陽亢甚者宜之若腎虛而瀉之則愈虛而虛火愈甚況寒能傷胃潤

能清腸其害人也隱而深譬諸小人陰柔異順似平有德至國祚已移人猶莫覺其非者近世治勞尊為上品往往致上嘔下泄遂至不救良可慨也瀉相火是其本功至太清金止嗽蓋相火不炎自當馴致也腸滑食少者避之當如鴆毒

桔梗味苦辛性平有小毒入肺經畏白芨龍膽草忌豬肉白而堅實者佳去蘆米泔浸切片微焙清肺熱除癰瘰通鼻塞理咽喉清頭目消痰下氣散風排膿定痢疾腹痛止胸脇煩疼

按桔梗為舟楫之劑引諸藥上至高之分以成攻

刪補順生微論

卷三

既以上行又能下氣者為其入肺肺實主氣肺金得令則濁氣自下行耳古稱開提氣血鬱症中宜用亦同此義丹溪云乾欬乃痰火鬱在肺中痰痼腹痛乃肺金之氣鬱在大腸之間均宜桔梗開之觀其開字及止痛則其下氣洵有神功也若病不屬肺者用之無益

半夏味苦辛性溫有毒入肺脾胃三經柴胡為使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭忌羊血海藻錫糖白而大者佳水浸七日每日換水去蠟每觔用生薑五兩明礬二兩同煮二時水乾為度

消痰燥濕開胃健脾除欬逆嘔吐定頭眩昏迷傷寒心下滿堅痰厥頭疼消瘴墮胎

按汪機曰脾胃濕熱涎化為痰此非半夏可治乎若以貝母代之則首待斃李時珍曰脾無濕不生痰故脾為生痰之源肺為貯痰之器半夏治痰為其體滑辛溫也涎滑能潤辛溫能散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是已丹溪謂半夏能使大便潤而小便長成無已謂半夏行水氣而潤腎燥為方伴疏虎治老人虛閉皆取其滑潤也俗以半夏為燥不

剛補顧生微論

卷三

十

知利水去濕故土燥非性燥也但恐其濕熱之邪而用之是重竭其津液誠非所宜古人半夏有三禁謂血家渴家汗家也

南星味苦辛性溫有大毒入肝脾二經蜀漆為使惡莽草畏附子乾薑生薑淡湯泡過研細入牛膽中懸風處經年用換膽而再經年者尤佳王中風癱痺痰氣堅積口噤身強破血利水墮胎

按南星氣溫而泄性緊而毒故能攻堅去濕然半夏辛而能守南星辛而不能守其性烈于半夏也然南星主風痰半夏主濕痰功雖同而用有

別也陰虛燥痰在所禁忌

六門冬味甘苦性寒無毒入肺腎二經地黃貝母為使畏白朮忌鱉魚肥大如地黃者佳去心用潤燥保肺定喘定嗽消血化痰治肺癆肺癰殺三虫通二便

按天門冬清金降火益水之源故能下通腎氣而滋補腎王五液燥則凝而為痰得潤劑則肺不苦燥而痰自化故濕火之痰半夏主之燥火之痰天門冬主之二者易治鮮不危困若脾胃虛寒卑服久服必病腸滑而成痼疾

剛補顧生微論

卷三

十一

麥門冬味甘微寒無毒入心肺二經地黃車前為使惡欬冬苦瓠畏苦參青蘘木耳鍾乳忌鯽魚肥大者佳去心用退肺中伏火故止咳止渴益精美顏清心氣驚煩故寧血養營安魂定魄

按麥門冬稟秋令之微寒是以清肺多功夫心火焦煩正如盛夏秋風一至炎蒸若生矣大約與天門冬功用相倣但甘味稍多寒性差減較勝一籌然專泄而不專收火盛氣壯者相宜氣弱胃寒者何可餌也

五味子肉味甘酸核中苦辛而鹹性溫無毒入肺腎

二經菴藥爲使惡蕤經勝烏頭北產肥而肉厚者佳嗽藥生用補藥炒用必打碎核方五味倍也滋腎經不足之水強陰滋精除熱解渴收肺氣耗散之金療欬定喘欬汗固腸

按潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣云收腫神散大乃火熱必用之藥有外邪者不可驟用丹溪云收肺補腎乃火嗽必用之藥寇氏謂其食之多虛熱者蓋收補之驟也黃昏嗽乃火浮于肺宜五味子飲而降之若風邪在表疹疹初形一切停飲皆當禁絕

刪補顧生微論

卷三

十三

大黃味苦性大寒有毒入脾胃肝大腸四經黃芩爲使忌冷水惡乾漆錦紋滋潤者佳主瘀血癥瘕留飲宿食結熱停痰水腫痢疾蕩滌腸胃推陳致新按大黃乃血分之藥若在氣分是謂誅伐無過矣仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者乃心氣不足而胞絡肝脾與胃邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四經血中伏火也又心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃濕熱非瀉心也病發於陰而下之則痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故曰瀉心實瀉脾也病發于陽而

下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘大陷胸湯湯法皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯成氏註釋未能分別此義大黃誠有撥亂反正之功然峻利猛烈苟非血分結熱六脉沉實者其可輕試哉

黃連味苦性寒無毒入心經黃芩龍骨連翹爲使惡菊花玄參芫花白蠟皮白蠟蚕屎欬冬花牛膝解巴豆附子毒忌豬肉太如指色鮮黃而堅重者佳上焦酒炒中焦薑汁炒下焦吳茱萸拌炒瀉心除

刪補顧生微論

卷三

十四

痞滿明目理瘡癰痢疾腹痛心痛驚煩殺虫安臥利水厚腸天行熱病嬰兒疳積按潔古曰黃連與肉桂同行能使心腎交於頃刻肺珍曰古人治病用黃連水香木火散用黃連乾薑在金石用黃連吳茱萸薑黃散用黃連生薑口瘡方用黃連細辛皆是一冷一熱寒因熱用熱因寒用最得制方之妙所以有成功而無偏勝也兩經曰五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常氣增而久天之由也王冰註云增味益氣如久服黃連及從火化也蓋大苦大寒行隆冬肅殺之令

譬如臯陶明刑執法是其職也。稷契夔龍之事非其任矣。近世不明此義，見古人用以治痞滿、治疳積、每遇腹中不寬快者，輒用枳實黃連，以為寬中消食之劑，獨不問脾胃之氣虛則白朮、陳皮補之，實則枳實黃連瀉之。若不分虛實，一槩用之，殺人必矣。故脾虛血少，以致驚煩、痘瘡氣虛作瀉，行漿後洩瀉、腎虛五更瀉、陰虛煩熱、氣虛蒸熱、脾虛發瀉，法咸禁之。

龍膽草味苦、性大寒，無毒，入肝膽二經。黃芩小豆為使，惡地黃、防葵、酒浸炒。主肝膽熱邪，下焦濕火。

刪補願生微論

卷三

五

殺虫明目，小兒客忤疳氣、癰腫瘡瘍。

按龍膽草大苦大寒，譬之嚴冬，點淡慘肅，水凌盈谷，萬卉凋殘。人身之中，詎可令此常行乎？先哲謂苦寒伐標，宜暫不方久，如聖世不廢刑罰，所以佐德意之窮，苟非氣壯實熱者，率爾輕投，其敗也必矣。

黃芩味苦，性寒，無毒，入肺大腸二經。山茱萸龍骨為使，惡葱實、貝母、砂丹、皮、藜蘆、沙參、丹參、蒸透曝乾。中枯而人者，清肺止咳，化痰目赤、疔瘡、堅實而細者，瀉大腸火、除濕治痢、安胎利水。

按陶隱居云：療腹痛，利小腸。仲景云：少陽症腹中痛者，去黃芩。加芍藥。心下悸，小便不利者，去黃芩。加茯苓。似與隱居之說不合。不知受寒腹痛，心下悸，小便不利，脈不數者，禁用黃芩。若熱厥腹痛，脈熱而小便不利者，可不用乎？善讀書者，先求其理。附子味辛甘，性熱，有毒，入脾腎二經，畏防風、黑豆、甘草。黃耆人參童便犀角，身矮乳稀重一兩五錢者，佳。滾湯泡，去皮臍，切作四片，重便一碗，甘草湯一碗，同煮汁盡為度。新瓦上烘乾，主藏府沉寒三陰厥逆，心腹冷痛，積聚癥瘕，寒濕痿痹，暴瀉脫陽，噎

刪補願生微論

卷三

七

膈嘔噎瘕，瘕不斂，小兒慢驚，痘瘡灰白，胃寒嘔動，強陰墮胎，堅筋骨，益氣力，為寒濕聖藥。

按附子，稟雄壯之質，有斬關之能，引補氣藥，追散失之元陽，引補血藥，養不足之真陰，引發散藥，以驅在表風邪，引溫煖藥，以除在裏寒濕。丹溪曰：氣虛熱甚，稍加附子，以行參芪之功。肥人多濕，亦用。集驗曰：腫因積生，積去而腫再作，若再用利藥，小便愈閉，醫多束手。蓋中焦氣不升降，為寒所隔，惟服附子，小便自通。吳綬曰：傷寒傳變三陰，及中寒夾陰，身雖大熱，而脈沉者，必用附子。厥冷腹痛，脈

沉細唇青囊縮者急用之有起死之功近醫多畏不敢用直至陰極陽竭而後議用遲矣若陰虛內熱及內真熱而外假寒者不可悞服

麻黃味辛甘苦性溫無毒入肺膀胱二經厚朴爲使惡辛夷石薺去根節水煮一二沸去沫用至冬三
月寒邪頭痛身熱春強去營中寒邪泄衛中風熱按麻黃輕可去實爲發散第一藥惟當冬月在表真有寒邪者宜之或無寒邪或寒邪在裏或傷風有汗等症雖發熱惡寒其不頭痛身疼拘急六脈不浮緊者皆不可用雖可汗之症亦不宜多服

刪補順生微論

卷三

七

爲心液不可汗而汗與可汗而過汗則心氣爲之動矣或亡陽或衄血而成大患可不慎哉

葛根味甘辛性平無毒入胃大腸二經王消渴大熱解肌發表嘔吐頭痛開胃下食解諸毒化酒毒止血痢散鬱火生者能墮胎

按葛根種種治效祇在陽明一經仲景治太陽陽明合病桂枝加麻黃葛根又葛根芩連解肌湯用以漸太陽入陽明之路非即太陽藥也頭痛乃陽明中風可用葛根葱白湯若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服以發之是引賊入陽明也東

垣曰葛根鼓舞胃氣上行治虛瀉之聖藥夫風藥多燥葛根獨止渴者以其升胃家下陷上輸肺金以生水耳麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌肉發散雖同所入迥異

紫蘊味辛性溫無毒入肺經忌鯁魚鱗面紫者佳開胃下氣溫中達表通大小腸殺魚肉毒梗主下氣安胎子可潤腸定喘

按紫蘊本散風之劑俗喜其芳香且暮餐食不知泄真元之氣所謂芳草致豪貴之疾者是也氣虛

刪補順生微論

卷三

八

表虛者禁用葉腸潤肺虛者禁用子

防風味辛甘性溫無毒入肺經畏草薢惡藜蘆白欬乾薑羌花殺附子每堅實而潤者佳瀉肺散風赤眼冷淚通利關節頭眩頭面遊風

按防風能禦風邪故名乃風藥中潤劑也卑賤之卒隨所引而至爲去風去濕之仙藥肺虛者勿服之

羌活味甘苦性平無毒入小腸膀胱肝腎四經主風寒濕痺筋骨攣疼頭旋掉眩頭項難伸別有獨活功用相同中國爲獨活可理伏風西羌者爲羌活

可理遊風。

按羌活治肢節痛因于風者宜之。若血氣虛而痛者，慢用之，反致增劇。

柴胡味苦甘，性微寒，無毒。入肝膽二經。半夏為使。惡皂莢。惡女茺藟蘆。忌見火。主傷寒瘧疾，寒熱往來，嘔吐脇痛，口苦耳聾，痰實結胸，飲食積聚，心中煩熱，熱入血室，目赤頭疼，濕痺水脹。別有銀州柴胡，理肝勞，五疳羸熱。

按柴胡少陽經，半表半裏之藥。病在太陽者，服之太早，則引賊入門。病在陰經者，復用柴胡，則重傷

刪補願生微論

卷三

十九

其表。世俗不明柴胡之用，每遇傷寒傳經，未能辨別，以柴胡湯可藏拙，輒混用之，殺人不可勝數矣。勞症惟在肝經者，用銀柴胡。若氣虛者，不過用些小助參耆，非用柴胡退熱也。若遇勞症，便用柴胡，不死安待，惟此一味，貽禍極多，故特表而詳言之。前胡味苦甘，辛，性微寒，無毒。入肺脾胃大腸四經。便與畏惡俱同。柴胡主下氣，散結，消痰，定喘，消食安胎。

按前胡主降，與柴胡上升者不同。長於下氣，氣下則火降，痰亦降矣。若不因外感之痰，及陰虛火動

者，俱當遠之。

升麻味甘苦，性平。無毒。入肺脾胃大腸四經。堅實而綠色者佳。解百毒，殺精鬼，辟瘟瘴，蠱毒，中惡腹痛，頭痛齒痛，口瘡癰疹，散陽明風邪，升胃中清氣。按升麻稟極清之氣，升于九天，故元氣不足者，用此于陰中升陽，如瀉痢崩淋，脫肛遺濁，須其升提，夫虛人之氣，升少降多，經曰：陰精所奉，其人壽，陽精所降，其人夭。東垣摘入補中湯，獨窺其微矣。凡氣逆嘔吐者，切勿輕投。

白芷味辛，性溫，無毒。入肺胃大腸三經。當歸為使。

刪補願生微論

卷三

二十

疑覆花微煨，王頭風目淚齒痛，眉疼，風痺搔癢，止痛排膿，蛇傷金瘡。

按色白味辛，行手陽明庚金，性溫氣厚，行足陽明戊土，芳香上達，入手太陰辛金，故主治不離三經。燥能耗血，散能損氣，有虛火者勿用。

藁本味苦辛，微溫，無毒。入膀胱經，惡藺茹，畏青箱子。太陽顛頂作痛，女人陰腫，痼疾，胃風泄瀉。

按內熱頭痛及春夏溫暑之病，不宜進也。

排薊花味甘，微寒，無毒。入肺腎二經。枸杞桑白皮為使。味甘而不苦者佳。去蒂，清頭面風熱，明月止淚。

胸中熱氣死肌濕脾新補

按甘菊花獨稟金精等制風木且氣性輕揚故主用多在上部同枸杞便能助腎矣

細辛味辛性溫無毒入心小腸二經惡黃芩山茱萸

畏滑石反藜蘆主風寒濕痺頭痛鼻寒下氣破痰

頭面遊風百節拘攣齒疼目淚新補

按細辛稟升陽之氣辛香開竅單服未至一錢令

人悶絕則其燥烈可知血虛頭痛者痛戒之

秦艽味苦辛性微溫無毒入大腸胃二經當蒲為使

畏牛乳左紋者佳祛風活絡養血舒筋骨蒸黃疸

剛補願生微論 卷三

辛

利小便

按秦艽風藥中潤劑散藥中補劑故養血有功中

風恒用之者治風先治血血行風自滅之意乎

天麻味辛性溫無毒入肝經大而透明者佳酒浸煨

透主風虛眩暈麻痺不仁語言塞澀腰膝軟疼殺

精鬼蠱毒理驚氣風癇

按天麻雖不甚燥畢竟風劑助火若血虛無風者

不可妄投

荆芥味辛性溫無毒入肝經反驕肉河豚蟹黃鱧魚

主風熱癩疹癰癰結聚血濕癰清頭目利咽喉

按荆芥治風賈相國稱為再生丹評學士謂有神

聖功戴院使命為產後要藥蕭存敬呼為一捻金

一求無擇隱其名為舉輕古拜散夫豈無故而獲此

隆譽哉雖然用者須審察的當今人但遇風症輒

用荆防此流氣散之相沿耳不知風在皮裏膜外

者荆芥主之非若防風之入人骨肉也

薄荷味辛性溫無毒入肺肝二經產蘇州者良忌見

火去風熱通關竅清頭目定霍亂消食下氣猶咬

蛇傷蜂螫傷寒舌胎和室察之

按薄荷辛香善疏結滯之氣多服損心脾

剛補願生微論 卷三

辛

玄胡索味苦辛性溫無毒入心肺脾胃四經破血下

氣調經利產止腹痛心疼血暈崩淋

按玄胡索行氣中血滯血中氣滯庶幾仙劑虛人

須與參朮同行不爾損真

鮮金味辛苦甘性溫無毒入肺肝胃三經主血積氣

滯生肌定痛

按鮮金能開肺金之鬱物罕值高肆中多以薑黃

偽之必光明脆紫苦中帶甘味者真虛人斟酌投

之

天花粉味苦性寒無毒入心肺二經枸杞為使惡乾

薑牛膝乾漆反烏頭白如雪者佳王退熱止渴消痰利膈消腫毒散撲損瘀血通月經實名枯樓主療結胸子能潤肺化痰

按天花粉稟清寒之氣舊稱補虛以熱退為補非真能補也脾胃虛寒者禁之

厚瀉味甘鹹性微寒無毒入腎膀胱二經畏文蛤去皮酒潤焙主水道不通淋瀝腫脹催生除濕止洩精去肝中留垢

按種種功能皆由利水何以又止洩精乎此指濕火為殃不為虛滑者言也其性善瀉古稱補虛者

剛補願生微論

卷三

毒

誤矣扁鵲謂其害眼者確也其味左用之者古人用補必兼瀉邪和去則補自得九專一于補必致偏勝之害如病人無濕腎虛精滑目虛不明法咸禁之

車前子味甘淡性寒無毒入肺肝小腸三經酒拌蒸服主利水止瀉解熱催生益精明目開竅通淋其根葉長于行血逐水新補

按利水之品乃云益精何也男女陰中各有二竅一竅通精乃命門真陽之火一竅通水乃膀胱濕熱之水二竅不並開水竅開則濕熱外洩相火常

寧精竅常閉久久精足目明雜錄云服固精藥久服此行房即有子若陽氣下陷腎氣虛弱者勿用木通味辛甘淡性平無毒入肝心小腸三經色白而細者佳去皮用三五淋瀝閉關格腫脹殺重宜竅醒睡止痛破血通經催生墮胎散腫下乳

按木通以疏通肝木得名又甘淡能助西方秋氣下降品通氣滯肺受熱邪氣化之源絕則寒水斷流宜此治之脚氣症足膝腫痛用木通一味二兩水煎頓服一日後當發紅瘡便愈夾以他藥即不効也其性宜通精滑氣虛內無濕熱者及孕婦均

剛補願生微論

卷三

毒

常山味苦辛性寒有毒入肝經忌葱醋蒜菜細實而黃鷄骨者良酒浸一宿切極薄片炒透主痰結瘧疾項下癭瘤

按常山有劫癰之功須發表提出陽分之後用之神効用失其宜真氣必傷酒浸炒透則力緩不發吐若是虛癰須與參朮同行然亦不可多也

草果味辛性溫入胃經主瘴癘瘧疾消痰化食亦能散邪新補

按草果氣猛而濁如仲由未見孔子時氣象若氣

不實則不甚者不必用之。

香附味苦微溫無毒入肺肝二經發散者生用調經者童便浸炒開鬱化氣發表消痰胸腹脇痛。

按香附子氣分爲君藥乃氣病之總司女科之王帥也雖然味辛性燥多用損氣血。

蒼蒲味辛性溫無毒入心肺二經秦皮秦艽爲使惡地膽麻黃忌飴糖羊肉勿犯鐵令人吐石上產梗細而節密者良去毛切片微炒宣五臟通九竅明目聰耳開心益智除欬逆上氣風寒濕痺止小便利治疥癬瘡。

刪補順生微論

卷三

毒

按芳香利竅心脾之良藥也能佐地黃天冬之屬資其宣導臻于太和多用獨用亦爲氣血之殃。遠志味苦辛性溫無毒入腎經畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤殺附子毒甘草湯浸半日去木曝過焙乾補腎強志益精定心止驚治皮膚中熱令耳聰明療瘧疽數服皆奇。

按遠志入腎非心藥也強志益精治善忘精與志皆腎所藏也精虛則志衰不能上通于心故善忘。靈樞經曰腎藏精精合志腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘人之善忘者上氣不足下氣有餘腸

胃實而心虛虛則營衛留于下久之不以時上故善忘也味中兼辛故下氣而走厥陰經以辛補之此水木同源之義前古未發也。

牛膝味苦酸性平無毒入腎肝二經惡龜甲畏白前白蘚皮忌牛肉產川中肥而長三尺餘者良酒浸蒸用壯筋骨利腰膝除腰脊痛寒濕痿痺強陰益精通經墮胎理膀胱氣化遲難引諸藥下行甚捷。卷竹木刺入肉。

按牛膝爲陰能降而不能升脾虛下陷因而腿痛膝腫太非所宜。

刪補順生微論

卷三

毒

補骨脂一名破故紙味辛性溫無毒入腎經惡甘草忌羊肉諸血胡桃肉拌炒達命門興陽事固精氣理腰疼止腎泄新補。

按補骨脂煖補水藏壯火益土之要劑宜丸不宜煎但性過于燥陰虛火動大便秘結者戒之。

兎絲子味辛甘性平無毒入腎肝二經山藥爲使酒煮竟日打糜爛作餅烘乾再到入磨方成細末續絕傷益氣力強陰莖添精髓堅筋骨悅顏色理勞傷除夢泄王寒精自出溺有餘瀝去風明目新補。按兎絲子稟中和之性凝正陽之氣爲補腎要藥。

溫而不燥。補而不滯。服食家多珍之。單服一味末。飲啖如湯沃雪。補土之母。故進食如神。

續斷味苦辛。性溫無毒。入肝腎二經。地黃爲使。惡雷丸。產川中。色赤而瘦。折之有烟塵者良。酒浸煨。補勞傷。續筋骨。通血脉。利關節。縮小便。止遺泄。理崩帶。主一切腫毒。一切胎產病。煖子宮。去一切面黃虛腫。

按續斷氣性中和。補而不滯。行而不洩。外科女科。需爲上劑。但草萊根似續斷。誤服令人筋軟。

石斛味甘。性平。無毒。入胃腎二經。惡巴豆。畏蠶絲。

補補順生微論

卷三

七

酒浸酥拌。蒸一時用。清胃熱。生長肌肉。逐皮膚虛熱。強腎添精。壯骨。主脚膝冷痛。骨髓中痛。厚腸止瀉。安神定驚。

按石斛性平。主用宏多。但氣力淺薄。得參芪便能奏功。專倚之。無提得之効也。選擇味甘者佳。煖用本煎。其味大苦。餌之損人。

百合味甘。微苦。性平。無毒。入心肺二經。白花者良。補中保脈。止嗽安神。除百邪鬼魅。顛狂邪叫。一切癰瘡。通大小便。

按金匱要略云。行住坐卧。不定。如有神靈。謂之五

合病。以百合治之。則其清心安神。從可想見。久服使人心志歡和。但腸滑者勿用。

紫菀味苦辛。性微溫。無毒。入肺經。洗去沙土。蜜酒微焙。主欬逆喘嗽。虛勞多痰。煩渴。吐膿血。

按紫菀能下達。辛可益金。故吐血虛勞。收爲上品。入至高之藏。使氣化及于州都。小便自利。人所不知。性滑不宜多用久用。

款冬花味辛。性溫。無毒。入肺經。杏仁爲使。惡皂莢。硝

石玄參。畏貝母。辛夷。麻黃。黃芩。黃連。青葙。含英。而不吐者良。去蒂。蜜水微焙。主欬逆上氣。喘急。

補補順生微論

卷三

八

喉痺。消渴。肺癰。肺痿。除煩化痰。

按款冬賦云。冰凌溢谷。雪積披崖。頗見款冬。燁然華艷。想見其純陽之稟。故其主用。皆辛溫開豁之力也。世多以枇杷花僞之。故功無効耳。溫而不助火。可以久任。

慧苳仁味甘。性平。無毒。入脾肺二經。色白而糯者良。

水淘曝乾。炒透用。健脾進食。保肺止嗽。解渴消水腫。療濕熱筋攣。去乾濕脚氣。

按苳仁屬土。本是脾藥。虛則補母。故肺病用之。筋骨之病。以治陽明爲本。故筋病用之。土能勝水。故

泄利水腫用之受熱使人筋攣受濕使人筋緩者
可用受寒使人筋急者不可用也妊娠久服能墮
胎兒

白豆蔻味辛性溫無毒入肺經老而光統者佳去衣
微炒主冷氣吐逆消食下氣寬胸進食去白睛翳
膜脾虛瘧疾

按白豆蔻感秋燥之令得乎地之火金味辛氣溫
為脾家所喜然元氣虛須與參朮同行不爾損氣
肉豆蔻一名肉果味辛性溫無毒入胃大腸二經米
粉裹煨去油忌鐵器止瀉痢溫中消食開胃止嘔

刪補顧生微論

卷三

辛

辟鬼殺虫

按肉果屬金與土下氣者心脾得補而營運氣自
下也非若陳皮香附之泄耳瀉利初起者不可早
服

縮砂仁味辛性溫無毒入肺脾大小腸胃腎膀胱七
經微炒去衣下氣化食醒酒止心腹脇痛理奔豚
霍亂吐瀉鬼瘡安胎

按芳香歸脾辛能潤腎為脾胃要藥若腎虛氣不
歸元非此向導不濟然性燥火炎者忌之胎婦氣
虛不可多服反致難產不可不知

蓬莪朮味苦辛性溫無毒酒浸煨透切片炒主積聚
氣凝心腹疼痛消食通經

按蓬莪朮峻猛之性誠為磨積之藥但虛人服之
積不去而與已竭重可虞也每見世俗治積塊巨
暮用之反成痼疾元氣虛者須與參朮同行乃無
損耳

京三稜味苦性平無毒入肺肝二經醋炒用主積聚
血結心腹癰腫胎

按昔有患癰癰死者遺言令開腹取之得塊乾硬
如石文理有五色削成刀柄後刈三稜忽化為水

刪補顧生微論

卷三

辛

故療積塊如神蓬莪朮破氣中之血京三稜破血
中之氣主用頗同微有氣血之別東垣五積方中
用此二味皆用人參贊助故有成功而無偏勝也
若專用尅伐胃氣愈虛不能運行積反增大矣謹
之

芫花味辛苦性微溫無毒入脾肺肝腎四經苦酒香
附為使陳久者良安胎煖子宮止血痢理腸風吐
衄筋中灸百病

按芫花辛可利竅苦可疏通故氣血交理胎產多需
之

香香味辛、性微溫、無毒、入肺脾二經、主溫中、開胃、行氣、止嘔吐、定心腹痛、

按交州記、此香於燕合、楞嚴經謂之兜婁婆香、皆取其芳香、今售者不甚芳香、或非真種耳、

澤蘭味苦、性微溫、無毒、入肝脾二經、養新血、破宿血、消癥腫、瘡膿、產前後百病、

按澤蘭補而不滯、行而不峻、爲產科要藥、

紅花味辛、性溫、無毒、入心肝二經、酒噴微焙、主活血、止痛、產後血暈、

按紅花色赤、宜爲血症所需、多則行血、少則養血、

刺繡順生微論

卷三

主

然力薄、不能獨自成功、須歸地同行爲妙、

香薷味辛、性溫、無毒、入肺胃二經、石生硬梗者良、發散夏月、淒愴寒邪、下氣、定霍亂、腹痛、利小便、治水腫、其捷、

按香薷味辛、性溫、爲夏月發散陰寒之劑、如納涼、過度、飲冷太多、陽氣爲陰邪所遏、以致頭痛發熱、煩燥、口乾、吐瀉、霍亂、互用之、以發越陽氣、散水和、

脾則愈、若勞役受熱、反用香薷、是重虛其表、反助其熱、害人不淺、近世市人、多煎流售、嘿受其禍者、

曷可勝數、

曷可勝數、

單藨味苦甘、性平、無毒、入胃肝腎三經、薏苡仁爲使、畏莢、根大黃、柴胡、前胡、牡蠣、忌牛肉、主風寒濕痺、腰膝作疼、去膀胱宿水、止失溺便頻、

按藨薢主用、皆祛風濕、補下元、楊子建曰、小便頻、莖內痛、必大腑熱閉、水液只就小腸、大腑愈加燥、

竭、因強忍房事、有癰腐、墮於下焦、故痛、此與淋症、不同、宜鹽炒、藨薢一兩、煎服、以芎藭湯洗穀道、卽愈、

腎受土邪、則水衰、肝挾相火、而凌土濕、得藨薢以、溼、則土安其位、水不受侮矣、

威靈仙味微辛、鹹、性溫、無毒、入十二經、忌茶、茗、麪、主

刺繡順生微論

卷三

主

宣通五臟、理痛風、散皮膚、大腸風邪、化瘰行水、

按威靈其猛、靈仙喻其効速、氣壯者服之、神効、虛弱人、不宜用也、

釣藤味甘、性微寒、無毒、入肝經、舒筋除眩、下氣寬中、

主小兒驚癇、客忤胎風、新補

按釣藤祛風、而不燥、爲中和之品、但久煎便無力、

俟他藥煎就、後投釣藤、一二沸、卽起、頗得力也、去梗、純用嫩鈞、其功十倍、

茵陳味苦、性寒、無毒、入膀胱經、主濕熱黃疸、利小腸、

補

按茵陳雖去濕熱須五苓之類佐助成功中病即已若過用之元氣受賊

馬兜鈴味苦性寒無毒入肺經去梗微焙主欬逆上氣消痰定喘新補

按兜鈴體性輕揚故功在至高之藏根名青木香疝家要藥可塗諸毒熱腫若肺虛挾寒者不宜多用

連翹味苦性寒無毒入心胃胆大腸腎五經主心經客熱諸經血結消瘰癧腫毒清六經邪火新補

按連翹手少陰主藥也心為火主心清則諸熱皆

刪補願生微論 卷三

毒

清諸瘡痛痒皆屬心火故瘡家以為要藥性極苦寒多用即減食

茴香味辛性溫無毒入胃腎二經主腹痛疝氣霍亂吐逆通命門助陽氣新補

按茴香辛香宜胃溫煖宜腎故主治不越二經若陽道數舉上有火症者禁用八角者名大茴香藥大者名小茴香主用相做小者力差薄耳

白茯苓味甘淡性平無毒入心脾肺腎小腸五經馬蘭為使畏牡蠣地榆秦龜甲忌醋產雲南皮蓬

色白而堅重者佳去皮膜乳制用補胃利小便消痰去濕止嘔吐泄瀉安神定驚保胎定欬止渴安胎抱根者為茯神主用相做職品安神赤色者利水之外無他長

按茯苓假土之精氣松之餘氣而成無中生有得坤厚之精為脾家要藥素問曰飲入于胃遊溢精氣上輸于肺通調水道下輸膀胱則利水之藥皆上行而後下降也潔古謂其上升東垣謂其下降各不相背也小便頻多其源亦異經云肺氣盛則便數虛則小便遺心虛則少氣遺溺下焦虛則遺

刪補願生微論

卷三

毒

溺胞絡遺熱于膀胱則遺溺膀胱不約為遺厥陰病則遺溺所謂肺氣盛者實熱也宜茯苓以滲其熱故曰小便多者能止也若肺虛心虛胞絡熱厥陰病皆虛火也必上熱下寒法當升陽膀胱不約下焦虛者乃火投于水水泉不藏必肢冷脉遲當用溫熱皆非茯苓可治故曰陰虛者不宜用也茯苓抱根而生有依守之義故覓不守舍者用以安之赤者入丙丁但主導赤而已

魏珀味甘性平無毒入心脾肺小腸四經主安神殺鬼消瘀血通五淋明目去翳止血生肌合金瘡

核琥珀感水土之氣而兼火化故有功于脾土脾能運化肺金下降小便自通若因血少而小便不利者誤用之反致燥急之苦。

肉桂味辛甘性熱有小毒入腎肝二經忌火生惹石脂去皮用王元陽病冷脾胃虛寒溫中降氣堅筋骨強陽道定驚通血脈制肝邪下焦腹痛奔豚疝瘕宣通百藥善墮胞胎。

桂心入心脾二經理心腹痛五勞七傷殺三虫宣氣血利關節托瘰疽痘毒能引血成膿。

桂枝入肺膀胱二經無汗能發有汗能止主心腹

刪補願生微論

卷三

辛

痛皮膚風橫行爲手臂之引經直行爲奔豚之向

按肉桂乃近根之最厚者故治下焦桂心卽在中之次厚者故治中焦桂枝卽頂上細枝又名薄桂故治上焦此本乎天者親上本乎地者親下之道也王好古云本草言桂發汗而仲景治傷寒有當汗凡數條皆用桂枝又云無汗不得服桂枝汗多者用桂枝甘草湯此又用桂閉汗一藥二用何也本草言桂辛甘能通脈出汗者是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛

故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此爲營弱

衛強陰虛陽必濇之故皆用桂枝發汗乃調其營

則衛自和風邪無所容遂自汗而解非桂枝能開

腠發汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從

汗出而汗自止非桂枝能閉汗也昧者不知其意

遇傷寒無汗者亦用桂枝誤甚矣曾世榮曰小兒

驚風及瀉宜五苓散瀉內火滲土濕內有桂能抑

肝風而扶脾土也醫餘錄云有人患眼痛脾虛不

能食肝脈盛脾脈弱用涼藥治肝則脾愈虛用煖

藥治脾則肝愈盛但於平藥中倍加肉桂殺肝益

刪補願生微論

卷三

辛

脾一治兩得之傳云木得桂而枯是也若血症非

扶寒日疾非脾虛者禁用。

丁香味辛性溫無毒入肺胃腎三經畏鬱金忌見火

去丁蓋用主脾胃虛寒反胃呃逆胸腹痛疰癰奔

豚鬼疰蠱毒壯陽煖腰膝小兒吐瀉慢驚痘瘡灰

白犬者名母丁香拔白鬚塗孔中卽生黑。

按丁香祛寒開胃之劑同柿蒂止呃同黃連乳汁

煎日此得辛散苦降之妙有火者忌服。

木香味辛性溫無毒入心肺脾胃肝膀胱大腸六經

入理氣藥忌火入止瀉藥麝畏煖行肝氣泄肺氣

健脾氣散滯氣止瀉痢定嘔吐健脾消食除心腹脇痛脹滿積聚開鬱殺鬼安胎

按木香乃氣分第一藥也肺實主氣肺氣調則金能制木而肝平怒則肝氣逆上忤其元氣心有縱肝之情而不能制則肝盛得木香則心暢而正氣亦暢肝氣何逆之有哉實心之行肝非肝之自行也氣虛及陰虛火亢者禁與

沉香味辛性微溫無毒入腎肝二經外黃內黑紋直而無夾木者佳主鬼疰惡氣脹滿心腹諸痛鬱結癥瘕補脾益氣壯陽大腸虛閉小便氣淋

刪補願生微論

卷三

五

按沉香色黑下墜故達腎諸木皆浮此獨沉水故入肝木而治逆上之氣行氣而不傷氣溫中而不助火誠良劑也氣虛下陷者忌入

柏子仁味甘辛性平無毒入心脾腎三經畏菊花羊蹄草忌服微熱養心益智安神定悸益血興陽去邪魅除風濕美顏色耳目聰明

按柏子仁不寒不燥甘而補辛而潤其氣芬芳能透心腎而益脾胃仙家收為上品或瀉或多痰者勿用柏葉養陰止血屬金善守春採東夏採南秋採西冬採北方得節候生氣

桐杞子味甘性平無毒入肺腎二經產甘州色紅潤圓細核少而甘美者良補精強陰明目安神主熱消渴利大小腸

根名地骨皮補腎養陰治在表無定之風邪傳屍有汗之骨蒸

按枸杞地骨均為腎家之劑然淫于內瀉以甘寒地骨皮是也精不足者補之以味枸杞子是也腸滑者禁枸杞子中寒者忌地骨皮

益智仁味辛性溫無毒入心脾腎三經縱滿者佳去殼益水炒研細溫中進食補腎扶脾安神開鬱攝

刪補願生微論

卷三

六

涎唾止小便餘瀝及夜多小便夢泄精滑

按益智行陽退陰之藥三焦命門氣弱者宜之楊士瀛云心者脾之母進食不止于和脾火能生土當使心藥入脾藥中庶幾相得古人進食多用益智土中益火也血燥多火及因熱而遺濁者法咸禁之

訶子一名訶黎勒味苦澁性溫無毒入肺大腸二經清痰生用止瀉煨用俱去核固腸止瀉斂肺止咳降火消痰利咽喉通津液下食積除脹滿破結氣開胃止嘔吐久服令鬚髮變黑主腸風瀉血崩中

帶下胎漏（新補）

按訶子能瀉腸然下氣太急虛人不可獨用同人參能補肺同白朮能益脾同五味能斂肺同橘皮能下氣滅斯國人遇大魚放涎滑數里舟不能行乃投訶子其滑化為水則其化痰消涎從可想見矣咳嗽未久瀉痢新起者皆在禁例

吳茱萸味辛苦性熱有小毒入肝脾腎三經芡實為使惡丹參硝石白朮畏紫石英產松江開口者佳陳久者良去梗鹽湯泡半日漉起曝乾用溫中下氣開鬱止瀉去痰消食除濕起陽止吞酸疝氣水

刺繡順生微論

卷三

五

腫治心腹冷痛如神殺鬼去虫

按吳茱萸辛散燥熱入厥陰居多脾腎其旁及也冠氏曰下氣最速腸虛人服之愈甚咽喉口舌生瘡以茱萸末醋調貼兩足心一夜便愈引熱下行也性極燥極惡其大寒者不可輕投虛泄者必與參朮同投亦須少少用之不爾損人

山茱萸味酸微溫無毒入肝腎二經芡實為使惡枯梗防風防已色鮮肉厚者佳酒潤去核隔紙焙乾用補腎助陽事止腰膝酸疼閉精縮小便主月事多耳鳴响

按山茱萸性溫而潤故于水木多功夫四時之令春生而秋殺萬物之性喜煖而惡寒腎肝居至陰之地非陽和之氣則陰何以生乎小便不利者勿用

杜仲味辛甘性溫無毒入肝腎二經惡玄參蛇蛻去皮鹽酒炒去絲益精堅筋骨止腰膝痛主肝燥風虛陰濕痒小便餘瀝

按腎苦燥惡食辛以潤之肝苦急惡食肝以緩之

杜仲所以多功于腎肝也溫而不助火可以久服金櫻子味酸溫甘性平無毒入肝腎二經去刺及核

刺繡順生微論

卷三

四

刷毛令淨瀉精止遺泄脾泄久痢便頻

按金櫻子味濇久服多服能藏人食丹溪曰經絡隧道以通暢為和平味者取其濇精煎膏常服自不作諸咎將誰執須經霜後將熟時採太生令人利大熱功力薄也平黃者佳

酸棗仁味甘性平無毒入心肝膽三經惡防已炒熟用主煩心不眠虛汗煩渴四肢酸痛補中益肝堅筋骨助陰氣

按聖惠方云膽虛不眠寒也炒棗仁為末竹葉湯調蓋以肝膽相依血虛則肝虛膽亦虛得熟者以

旺肝則木來制土。脾主四肢又主困倦故令人睡。滿衆方云但實多睡熱也。生研爲末薑茶湯調服。蓋棗仁秋成者也。生則全金氣而制肝脾不受侮而運行不睡矣。滑瀉者不宜多用。

竹葉味甘苦寒無毒入心胃二經清心滌熱止嗽化痰竹茹即竹之刮去青皮用第二層者主逆氣嘔呃噎膈吐衄血熱崩中痰氣。

竹瀝味甘薑汁爲使主中風痰涎壅盛神氣昏冒凡痰在皮裏膜外經絡四肢者非此不能達。

按竹有多種惟取大而味甘者爲勝生長年許嫩

制補順生微論

卷三

聖

而有力竹能損氣故古人以筴爲刮腸筴竹瀝久服滑腸脾虛泄瀉者勿用寒痰濕痰食積痰並非竹瀝所能治。

桑白皮味甘性寒無毒入肺經續斷桂心麻子爲使蜜炙分令涎落忌鉛鐵器下氣消痰瀉肺除喘滿去肺中水氣水腫脹。

桑可止汗去風。

子可補腎養陰生津安神。

桑可祛風養筋。

桑寄生和血舒筋堅齒長髮療痺安止崩漏。

按桑之爲用甚弘凡根枝幹葉若子若灰若寄生均有奇功根較寒子較煖用者須斟酌之。

猪苓味淡性平無毒入膀胱經去皮用利水去脹滿主帶下淋濁亦能發汗。

按猪苓感楓根之餘氣而生利水諸藥無如此快術義謂多服損腎昏目潔古謂淡滲亡津液無濕症者勿用。

厚朴味苦辛性溫無毒入胃經乾薑爲使惡澤瀉寒水石硝石忌豆厚而色紫有油者佳去粗皮薑汁浸透焙用溫中平胃消痰下氣除脹積食去水破

制補順生微論

卷三

聖

血腹痛嘔逆。

按厚朴苦能下氣走而不守太損真氣虛人及孕婦不可輕用也。

黃芩味苦性寒無毒入腎經惡乾漆肉厚深黃者佳去粗皮鹽酒洗至焦褐色用瀉腎火有餘利小便去下焦濕熱腫痛口瘡女人漏下赤白。

按黃芩性寒行降冬肅殺之令故獨入少陰瀉有餘之相火昔人稱其補陰者非其性補蓋熱去則陰不受傷雖謂之補亦宜也若腎虛脾薄之人畏之甚于刀錐今天下極其崇尚以爲去熱治勞之

妙藥而不知陰寒之性能奪人食損人氣命門真元之火一見而消亡脾胃運行之職一見而阻喪獨不聞實火可瀉虛火可補之說乎元氣既虛不用苦寒直行而泄奚啻雪上加霜遏絕生機莫此為甚受其害而斃者十人而九冤哉生俞何辜而遭此慘伐哉必尺中洪大按之有力可炒黑暫用不然便當痛絕

山梔子味苦性寒無毒入肺經炒黑用清肺熱吐上焦邪氣除心中懊惱去膈下血滯利小便引火屈曲下行

刪補顧生微論

卷三

聖

按梔子輕熾象肺故獨入肺家泄有餘之火種種功用皆從肺旁及者也大苦大寒損胃伐氣虛者畏之世人每用治血不知血寒則凝反成敗症治胃火之吐血服氣為先氣行則血自歸經治虛火之吐血養正為先氣壯則自能攝血此治療之大法不可少違者也悞用梔子其害也必矣

牡丹皮味辛苦性微寒無毒入肝經畏貝母大黃鬼絲子忌蒜胡荽和血生血涼血行血除風痺主無汗骨蒸清相火

按丹皮清東方雷火是其本功北方龍火因而下

伏此乙癸同源之治也古人惟以此治相火故以味壯用之後人專用黃柏不知丹皮去功更勝也千載秘奧人所未知

木瓜味酸性溫無毒入肝經忌鐵去穢王一切筋病濕痺脚氣

按木瓜稟東方之酸故職治筋轉筋時但念木瓜二字及書上作木瓜字立效東垣曰氣脫能收氣滯能和故筋急筋緩無所不宜孟詵謂多食木瓜損齒及骨經曰陰之所生本在五味陰之所榮傷在五味五味太過即有增勝之憂也

刪補顧生微論

卷三

聖

檳榔味苦性寒無毒入胃大腸二經下氣性如鐵石治後重如神消穀逐水除痰殺虫解毒醒酒諸瘡瘻

按檳榔表多食積瘴癘之作率因食積此能消食下氣故也南方地溫腠府不密久食積榔臟腑疎泄一旦物積不可救豈非伐氣之禍歟氣虛下陷者所當遠避

大腹皮味辛性溫無毒入肺脾二經豆汁洗去沙穢微炒主攻心腹水腫悶脹通大小腸去蠱毒

按大腹皮去水主氣之劑病虛者勿用即用須以

補劑監制大腹樹上多棲鴉鳥宜以大豆汁多洗令黑汁去盡方可用也

〔藥部〕

橘皮味辛性微溫無毒入肺脾二經產廣中者良陳久者良去蒂及膜用開胃健脾消痰理氣止咳定嘔消食開鬱小者名青皮破氣達下焦消痰治瘧平肝去積理小腹痛

按橘皮能溫能補能散能和其功當在諸藥之上採時色已紅熟如人至老成則烈性漸減收藏又復陳久則多虛霉夏而躁氣全消故稱中和之品

剛補順生微論

卷三

聖

為脾胃重藥青皮猛銳不宜多用市中以小橘中空易腐難判多以小柑小橙小香櫟之類偽之此近來通弊不可不察也

枳殼味辛苦性微寒無毒入肺脾胃大腸四經去穢熱炒破至高之氣除咳定喘止嘔消食化痰逐水治脹小者名枳實破氣瀉痰衝墻倒壁之勢

按枳殼枳實上世未嘗分別自東垣分枳殼治高枳實治下海藏分枳壳主氣枳實主血然究其功用皆利氣也氣利則痰消積化矣人之一身自飛門以至魄門三焦相通一氣而已又何必分上與

下氣與血乎但枳實性惡枳壳性緩為確當耳昔湖陽公主苦難產方士進瘦胎飲用枳壳四兩甘草二兩為末每服一錢自五月後一日一服合以施人無不受害者夫氣壯則子有力而易生枳壳破氣胎子無力反致難產惟在奉養太過北方氣實者或有相宜否則決當謝絕時醫不察虛實不辯補瀉往往聚施損害真元為厲不淺雖以補劑救之亦難挽其剋削之害也近來多蹈此弊故特表以為戒

杏仁味苦甘性溫有毒入肺大腸二經惡葷葷黃芪

剛補順生微論

卷三

聖

為根葉草滾水泡去皮尖炒透雙仁者有毒能殺人須揀去至上焦風心下熱氣逆喘嗽瀉大腸解錫毒消狗肉索粉

按東垣云杏仁治氣桃仁治血俱通大便若虛人便閉不可過泄脈浮者屬氣用杏仁陳皮脈沉者屬血用桃仁陳皮手陽明與手太陰為表裏貴門主往來魄門主收閉為氣之通道故金用陳皮佐之市中所售多有杏仁梅仁夾雜用須細辨

桃仁味苦甘性平無毒入肝大腸二經香附為使湯泡去皮尖炒透雙仁者勿用王痧血血閉心下堅

心腹痛潤大腸辟邪殺鬼。

按桃仁苦重于其氣薄味厚沉而下降苦以行滯甘以生新成氏曰肝者血之源血聚則肝燥肝苦急急食甘以緩之桃仁之甘緩肝散血故抵當湯用之傷寒八九日內有畜血發熱如狂少腹滿痛小便自利又有當汗失汗熱毒深入吐血血結煩躁譫語俱用此湯。

山查味酸性平無毒入脾胃二經去核消肉積乳積疝氣兒枕痛發小兒痘疹理下血腸風。

按山查善去腥羶油膩之積與麥芽消穀積者不

刪補願生微論

卷三

聖

同核主催生山氣仲景治傷寒一百一十三方未嘗用麥芽山查何也爲其性緩如治世之良吏非亂世之能臣故但用大小承氣不用山查麥芽近世不同有食無食一槩用之以爲醫當眞堪捧腹天棗味甘性平無毒入脾經思生葱解烏附毒王養厚生津潤肺止嗽定驚和百藥。

按素問言棗爲脾之菓又言脾病毋多食甘仲景建中湯心下痞者減飴棗然則脾不足者可用而有餘者不可復增其氣以致偏勝耳素問所謂脾病非不足蓋有餘也田氏曰齒病虫病疳病不宜

啖棗補遺曰婦人臟燥悲傷欲哭狀若神靈東垣曰溫以補不足甘以緩陰血仲景治奔豚用大棗扶土以平腎也水飲脅痛有十棗湯益土而勝水也胸嘔神書曰執棗一枚呪云我有棗一枚一心歸大道優他或優降或劈火燒之念七遍與瘡者食卽截每試必效亦神異也紅棗功相倣力少薄耳。

龍眼味甘性平無毒入心脾二經肥大而綠色者佳補心益脾安志強魂聰明長智。

按方外服龍眼法五更將不見水乾龍眼以舌在

刪補願生微論

卷三

聖

齒上取肉去核卽是舌脫華池之法細細嚼至查細膏連口中津汨汨然嚥下如嚥甚硬物畢又如前法食第二枚共服九枚約有一時許服畢方起辰巳二時又服九枚未申二時又服九枚臨卧服九枚一日四次服有半日之工服龍眼則氣和心靜且漱津納咽是取坎填離之法勞症者勤行一月無不愈者方士大秘余表之以公同人。

龍眼味甘性平無毒入心腎二經補中養神止瀉痢遺精安靖上下君相火邪耳目聰明止赤白濁帶。

藕能止渴解渴止怒令人心懽

藕能止渴解渴

蓮花清心固精悅顏止血

藥助脾進食止血固精安胎止瀉

藥治雷頭風

按蓮花產于泥水而不染泥水節節含藏生生不息

根鬚花葉節皮心品皆為良藥蓋神物也

稟芬芳之氣合稼穡之味為脾之菓脾為中黃所

以交媾水火會合本金者也土旺則四藏皆安而

蓮之功力巨矣

刪補願生微論

卷三

聖

胡桃味甘性平無毒入肺腎二經潤腸悅顏斂肺補

腎同補骨治痿強陰同胡粉按白變黑新補

按胡桃連命門之品也大三焦者元氣之別使命

門者三焦之本源蓋一源一委也命門指所居之

府而名乃藏精係胞之物三焦指分治之都而名

乃出納熟腐之司以體名一以用名在兩腎之

間上通心脈為生命之原相火之主靈樞已詳言

而命門不知原委體用之分以右腎為命門以三

焦為有名無狀承訛至今莫之能正胡桃仁頗類

其狀而外之皮汁皆黑故入北左通命門命門既

通則三焦利故上通於肺耳昔幼兒痰喘五日不

乳夢大士授方令服人參胡桃湯數口喘即定明

日夫胡衈衣喘復作仍連皮服遂愈蓋皮有斂肺

之功也空腹時連皮食七枚能固精命門火熾者

勿服

芡實味甘性平無毒入脾腎二經補腎固精止遺瀉

益脾實腸新補

按芡實止瀉固精獨于脾腎得力則先後天之根

本咸賴焉芡子野云人之食失必枚齒而細嚼之

未有多噉而噉噉者也舌頰齒唇終日嚼噉而芡

刪補願生微論

卷三

辛

無五味脾而不膩是以致玉池之水轉相灌注積

其功矣雖過乳石可也老人服之延年當矣嬰兒

食之難長豈其難化歟

烏梅味酸性平無毒入肺脾二經定嗽止渴清音去

痰止血止利安眠退熱消酒毒餘惡肉

按梅生於春曲在作酸其用以收斂為功病有當

發散者候食必為害若過食而煎燥者嚼胡桃肉

解之瘡痼愈後有肉突起烏梅燒傳一日減半兩

日而平

○穀部六種

麥芽味甘。鹹性溫。無毒。入脾胃二經。烏冠砂仁烏梅木瓜芍藥五味子爲使。炒焦去芒留芽用。消食和中。化痰催生落胎。

按麥性粘滯。水漬生芽。氣雖少清。性猶未化。全在多炒。至于焦色。反有功力。專主五穀之積。與山查異。古人有麥芽消腎之說。爲其伐胃故也。經云。胃爲水穀氣血之海。化營衛而潤宗筋。又曰。陰陽總宗筋之會。而陽明爲之長。故胃傷者。陽事衰也。豈非消腎之確証歟。李時珍曰。有積消積。無積消元氣。前賢于攻伐之劑。雖平善如麥芽。恐人過用。損

補順生微論

卷二

五

真。猶諄諄告戒。况硝黃巴礪之屬。其可嘗試而浸爲哉。世之喜于消導者。至此亦當瞿然矣。

神麴味甘。苦性溫。無毒。入脾胃二經。陳久者良。研細炒。至褐色。用酒釀健脾胃。治赤白痢。閃挫腰痛。產後回乳。

按神麴消穀。勝于麥芽。第須修造如法。收藏陳久。炒令焦色爲善。造法。擇五月五日。或六月六日。白麴五觔。象白虎。蒼耳草汁一碗。象勾陳。野麥汁一碗。象騰蛇。青蒿汁一碗。象青龍。杏仁五兩。及北方河水。象玄武。赤小豆者。熟去皮四兩。象朱雀。一如

造麴法。羅黃懸風處。經年用。

淡豆豉味苦甘。性寒。無毒。入肺經。主傷寒瘧氣煩悶。溫毒發斑。嘔逆。

按豆豉能升能降。能散能和。得熱則發汗。得鹽則吐。越得酒。則治風。得雞則治痢。得蒜則治血。炒熟又能止汗。須如法自造爲勝。

白蘗豆味甘。性微溫。無毒。入脾經。炒黃去殼。研用。補脾止瀉。消暑除濕。止渴解毒。

按蘗豆甘溫。與太陰相方。故能通理三焦。升清降濁。須入他藥爲佐使。單食多食。反能滯氣。

補順生微論

卷二

五

飴糖味甘。性溫。無毒。入脾經。主脾虛腹痛。痰多喘嗽。瘀血腸鳴。新補

按飴本米穀腐化。味極甘溫。爲中州所喜。痰嗽方中。用少許加入。潤肺化痰。頗著奇功。然用之太過。反能動火生痰。凡中州吐逆。酒病牙疳。腎病俱不可服。

麻仁味甘。性平。無毒。入脾胃二經。畏牡蠣白薇茯苓。細包置沸湯。至冷取出。懸井中一夜。勿着水。曝乾。新瓦上接去殼。潤五臟。通大腸。宣風利關節。催生。

按麻仁、木穀也。而治風同氣相求也。陳士良云：多食損血脈，滑精氣，痿陽事。婦人多食，即發帶疾，以其滑利下行，走而不守也。

○菜部

生薑味辛，性溫，無毒。入肺、胃二經。隔年老者良。通神明去穢惡。主咳逆嘔吐，痰氣解鬱，開胃消食，散風寒，脹滿，冷痢，腹痛，轉筋，殺虫解毒。生用發散，熟用和中，安熱去皮，要冷留皮。

按生薑辛溫之品，而張鼎謂其除壯熱，何也？夫壯熱之原，非外感風邪，即內傷飲食，薑能發散，又能

剗補願生微論

卷三

三

清導故也。東垣曰：生薑爲嘔家聖藥，蓋辛以散之，薑乃氣逆不散也。或問辛溫入肺，何云入胃？曰：明門之下，受有形之物及胃之系，便是胃口，與肺系同行，故能開胃。夜勿食薑者，夜則主斂，反開發之，違天道矣。秋勿食薑，亦同此義。有病則不論也。夫辛能入肺，肺則則一身之氣皆爲吾用，中焦之元氣定，而脾胃出納之令行，邪氣不能容矣。凡中風中暑，中氣中毒，中惡中酒，食厥痰厥，屍厥冷厥，霍亂昏暈，一切卒暴之病，得之立救，且開鬱回陽，鬼魅不敢近，藥中之神聖也。

薑味辛，性溫，無毒，入肺、脾二經。切薄片炮紫色，經年後用之良。溫中補脾，消食去滯，主腹痛脹滿，風寒濕痺，腸癰下利，反胃吐瀉，痰多，腰腎冷疼，止血散風寒。

按乾薑生則逐寒邪而發表，炮則除胃冷而守中，多用散氣，須生甘草緩之，多服僭上，令人目暗喉痺。孕婦食乾薑，令胎內消。丹溪曰：血虛發熱，產後大熱用之，止吐血痢，血須炒黑用。時珍曰：能引血藥入血，氣藥入氣，去惡養新，有陽生陰長之意，故血虛吐衄下血者用之，乃熱因熱用，從治之法也。

剗補願生微論

卷三

三

夫乾薑本辛，炮之則苦，守而不移，非若附子行而不止也。其止血者，蓋血虛則熱，熱則妄行，炒黑則能引補血藥入陰分，血得補則陰生熱退，且黑爲水色，故血不妄行也。然血寒者可多，血熱者不過用三四分爲向導而已。

白芥子味辛，性溫，無毒，入肺經。解肌發汗，利氣疏痰，溫中去滯，辟邪療反胃。

按丹溪曰：痰在皮裏膜外，非白芥子不能達。煎湯不可太熟，熟則力減。大辛大散，用須中病即已。久用損真氣，令人眩運損目。肺經有熱，陰虛火亢，當

遠謝之、

萊菔子即蘿蔔子、味辛、性溫、無毒、入肺胃二經、微炒

研細、下氣定喘、消食除脹、祛痰消腫、毒、新補

按丹溪曰、萊菔子治痰、有推牆倒壁之功、虛弱人

服之、氣凌難以布息、昔胡僧入中國、見人食麵、驚

曰、食之安得不病、及見食萊菔、乃曰、賴有此耳、又

洞微志云、有人病狂、夢中見紅衣女子、引入宮殿

中、小姑歌云、五雲樓閣曉玲瓏、天府由來是此中、

惆悵悶懷言不盡、一丸萊菔火吾宮、一道士云、此

犯大麥毒也、紅衣女、心神也、小姑、脾神也、萊菔制

刪補願生微論

卷三

五

麴毒、故曰、火吾宮也、遂以藥及萊菔子治之、果愈

嗣是用萊菔子治麴積、頗著神異、

底菔味苦、性寒、有小毒、入肺經、去胃中邪氣、水停食

積、痞癰懊懣、新補

按瓜蒂極苦、而性上湧、能去上焦之疾、所謂高者

因而越之是也、最能損胃傷血、耗氣奪神、上部無

實聖者、不敢輕投、

人部

乳汁味甘、性平、無毒、入心肝脾三經、色濃白而不作

氣者佳、補五臟、潤腸胃、悅顏色、止消渴、退虛熱、潤

壹臘、祛日、止淚、

按乳從血化、主于脾胃、攝于衝任、未受孕則下為

月水、既受孕則留而養胎、產後則變赤為白、轉降

為升、上成乳汁、此造化玄微之妙、却病延年之藥

也、世俗多以乳汁能消腸、果爾、天下無不瀉之嬰

兒矣、有是理哉、特與食混進、誠能發瀉、故于夜半

時進、前後皆與食遠、此為良法、服乳歌曰、仙家酒

仙家酒、兩箇葫蘆盛一斗、五行釀出真醞、醞不離

人間、處處有、丹田若是乾涸時、嚥下重樓潤枯板

清晨能飲一升餘、返老還童、天地久、驟製作、板名

刪補願生微論

卷三

五

乳金丹、尤佳、惟脾胃泄瀉者、不宜用也、

並使味鹹、性寒、無毒、入膀胱經、色白者佳、玉勞弱煩

蒸、天行狂亂、撲損瘀血、吐衄、產婦血運、

按經云、飲入于胃、游溢精氣、上輸于脾、脾氣散精、

上歸於肺、通調水道、下輸膀胱、小便入胃、仍循舊

路而出、故丹溪以為降火甚速、陰虛火動、非此不

除、諸證曰、喉有痰、則瘀血、喉不停物、毫髮必然、血

既滲入、愈滲愈瘀、服寒涼、則百不一生、飲溲便、則

百不一死、時珍曰、人之精氣、清者為氣、濁者為血、

濁之清者為津液、清之濁者為小便、便與血同類、

同鹹故治血多功也。熬鍊成秋石去濁留清補正
祛邪還元復命為虛勞者第一靈丹。人中白降火
散血化痰治疳同饅頭食之謂之烏龍丹。

金汁味苦性寒無毒入肺胃大腸三經入土經年者
佳。王傷寒陽毒發狂痘瘡血熱傳癰疽解百毒。
按金汁濁陰歸下竅有降無升入土既久去濁留
清身中諸火逆上仍用身中降火之品治之。此竹
破須將竹補抱雞還用卵為之法也。陽明實熱發
狂痘瘡紫黑乾枯非此莫能治療。

人胞一名紫河車味甘鹹性溫無毒入心腎經米泔

刪補願生微論

卷三

五

洗淨銀針刺出毒血童便浸半日用醋酒洗至色
白為度。人胞能中加蜜半觔仍以鉛錘口隔湯煮
十沸待冷方開選首胎無病者良。陽人使陰陰人
使陽。王一切虛損痼疾骨蒸脊腰酸疼足膝痠軟
驚悸羸乏。

按崔氏云胎衣宜藏古方若為重獸所食令兒不
育此亦銅山西崩洛鍾東應之理。蒸煮而食不顧
損人長厚者弗忍為也。

獸部

龍骨味甘性平無毒入肝腎二經忌鮑及鐵器畏乾

漆蜀椒理石石膏火煨水飛酒煮曝乾。王鬼魅泄
精泄瀉瀉血小便頻胎漏腸風小兒驚癇女子漏
下赤白。生肌斂瘡脫肛止汗安寢龍齒專王安理
狂熱。

按龍為東方之神故其骨多肝疾腎主骨故又益
腎也。須火煨紅水飛每觔用黑豆一斗蒸過否則
著人腸胃。晚年作熱許叔微曰肝藏魂能變化故
竟遊不定者治之以龍齒性太瀉飲非虛滑脫陷
者勿用。

虎骨味辛性溫無毒入肝腎二經畏酒漆蜀椒磁石

刪補願生微論

卷三

五

去髓酥炙黃脛骨最良壯筋骨去風毒學急走注
疼痛。

按虎者西方之獸通于金氣風從虎虎嘯而風生
風木也。虎金也木受金制焉得不從故可入骨搜
風然虎之強勇皆在于脛故脛骨勝也骨百倍也
中藥簡者有毒損人必有微黑不可不辨。虎膽醫
翻胃有功虎爪王辟邪殺鬼。

犀角味苦酸鹹性大寒無毒入心胃肝三經松脂升
麻為使惡雷九烏頭烏喙忌蠶絲開紙畏納懷虫
乘熱搗之應手如粉清心去煩熱鎮驚明目消痰

散風清肝。辟邪解毒。主傷寒發狂譫語。發黃發癰。痘瘡大熱。

按犀食百草之毒。故能解百毒。然大寒之性。胃必受傷。妊婦多服。能消胎氣。

冷辛。角味鹹。性寒無毒。入肺肝二經。清肺平肝。明目去熱。定風安魂。主驚憂狂越。傷寒時氣熱在肌膚。產後惡血攻心。

按犀羊角。外有二十四節挂痕。內有天生木胎。有神力。抵于牛。入藥不可單用。須到細。避風搗篩。更研萬匝。如飛塵。剉人服。入厥陰。伐生生之氣。不

刑補順生微論

卷三

犀

宜久用多用

牛黃味苦微甘。性平。有小毒。入心脾肝三經。人參爲使。惡龍骨地黃龍膽草菰藶常山畏牛膝乾漆體輕微香。麝甲色透。置舌上先苦後甘。清涼透心者真。清心利痰。安重定驚。除邪逐鬼。痘瘡紫色諸語。按東垣曰。牛黃入肝。凡中風入臟者。必用牛黃入。骨透髓。引風自內而出。若中府及中血脉者。用之引邪入髓。如油入麯。莫之能出。至於脫絕症。極宜參附。牛黃不足倚也。

牛肉和中養脾。丹溪倒倉法。用肥賴牡黃牛肉。

千觔。去筋膜。長流水煮爛。去渣。取淨液。再熬如琥珀色。病者先斷淫慾。食淡。前一日不食晚飯。入密室中。明快而不通風者。取汁飲之。寒月隔湯溫之。

病在上者。欲吐多。則惡飲之。病在下者。欲利多。則緩飲之。病在上中下者。欲吐利俱多。則時緩時急。渴則自飲小便利。饑則先與粥湯。次與淡稀粥。三日

後。方與菜羹糜粥。調養一月。沉痾悉去。此後忌牛肉十年。丹溪自序曰。半坤土也。黃土色也。以順德配乾健者。壯之用也。肉者胃之藥也。液者無形之物也。故由腸胃而透肌膚毛竅。無所不入。夫積聚

刑補順生微論

卷三

牛

久而成形。粘着于迴薄曲折之處。可以九散犯受。此則踵其曲折。如洪水泛漲。陳朽順流而下。其法得之西域異人。謂補爲瀉。因浮爲補。大有再造之功。真奇法也。

鹿茸味甘鹹。性溫無毒。入腎經。杜仲爲使。畏大黃太如荊子。不使。剉去毛。酥炙。透生精益陽。強筋健骨。補髓養血。少胎殺鬼。主便數洩精。溺血虛癆。腰脊膝痛。鹿角主用相。微功力差緩。

按鹿乃仙獸。能督脈。稟純陽之質。含生發之氣。其性極淫。一牡常御百牝。腎氣有餘。足于精者也。

其角不兩月長太至一二十觔生長神奇無過於此。茄茸所以貴重者功力既宏取之極難當其初生不過一茶之項已成茄形稍遲半日便如馬鞍岐起愈小則愈嫩雖絹帛觸之亦損破也一破其力大減然鹿性好觸纔捕便抵一抵便破故不破損者其值隆也。鹿與麋又富有別鹿山獸也屬陽夏至解角陰生陽退之象也。麋澤獸也屬陰冬至解角陽生陰退之象也。王用有陰陽之別可不察乎。

何膠味鹹性平無毒入肺肝腎三經。藟黃為使畏大

刪補顧生微論

卷三

李

黃明徹質脆色綠通者蛤粉炒成珠用。主勞損肢體酸疼吐衄崩淋尿血痢腸風帶下經水不調。咳嗽喘急肺痿肺癰潤燥化痰安胎療腫毒利小便調大腸。

按阿井乃濟水之眼附經以濟水為天地之肝故入肝多功。烏驢皮合北方水色順而健行之物故入腎多功。水充則火有制火熄則風不生故木旺風淫火盛金衰之症莫不應手取效。然邇來真者絕罕。誤用偽者反為滯痰傷胃不可輕忽也。

麝香味辛性滑無毒忌大蒜及火微研用。主開竅通

經穿筋透骨辟鬼殺邪催生墮胎殺蟲去風痰。治驚癇理客忤。蝕潰瘡之膿。消爪菓之積。新補

按麝香走氣飛揚內透骨髓外徹皮毛草木見之黃落。凡菓兒之腐爛孕婦佩之墮胎。東垣云麝香搜骨髓之風風在肌肉者誤用之反能引風入骨。丹溪云五藏之風忌用麝香以瀉衛氣故症屬虛者。禁勿輕用。務怯人切忌佩帶。

獬廌味甘性溫有毒入肝經。主傳屍鬼疰疫毒蠱災。

獬廌搜逐癘虫。新補

按葛洪云屍疰鬼疰使人寒熱沉沉嚙齧而不知

刪補顧生微論

卷三

李

所苦而無處不惡積月累年殭癘至死死後傳染。乃至滅門惟用獬廌肝陰乾為末水服二錢。每日三服。藥下腹中有虫漸漸瀉出以瘥為度。

重魚部

龜甲味鹹性寒有毒入心腎二經。惡沙參蜚蠊。自敗者良。去肋及背刮去黑皮酥炙。補腎除蒸養心益智。續筋骨去瘀血止瀉痢及漏下赤白。瘰癧瘰癧。小兒顛門不合諸瘡久不收口。

按龜甲非方之至陰故能補陰。若入丸散須研極細。恐着人腸胃變為瘕也。夫龜鹿皆永年龜首龜

向腹能通任脉取下甲以補腎補血皆陰也庭鼻
反向尾能通督脉取上角以補火補氣皆陽也格
物考云人有先春之震山多自死之龜龜聽雷音
則口中所含以蟄者便吐而昂首時令尚早無虫
可食多致餓死血肉腐爛滲入下甲此真敗龜板
也又陽龜殼圓板白陰龜殼長板黃陰人用陽陽
人用陰

鱉甲味鹹性寒無毒入肝經惡熱石理石九肋者良
未經湯煮者佳酥炙王瘳熱骨蒸心腹癥瘕瘕母
瘀血漏下陰魚痔核

刺補顧生微論

卷一

七

按鱉色青主治皆肝症龜色黑主治多腎症同歸
補陰實有分別性皆至陰太寒多用必傷土也
狂鱉味鹹性寒無毒入腎經耳母嚙使畏麻黃辛美
另若更醋調黃泥固濟煨透童便淬之溢精止帶
化痰軟堅去熱止渴鯨汗消痼固二便化燥燥
按牡蠣鹹寒安其歸腎壯水之主可制陽光久服
必有寒中之患

五靈脂味甘性溫無毒入肝經畏人參酒飛去沙曝
乾生者行血炒者止血王破血下氣一切心腹脇
痛祛冷滯

按五靈脂乃寒號虫之糞也氣味俱厚獨入厥陰
主血滯大有神功其止筋帶者非但治血乃去風
之劑風動物也衝任經虛被風傷襲不能藏血與
荆防治崩相似濁陰有歸下之功兼能降火人所
未知氣極猶惡虛薄人弗能勝也

穿山甲味鹹性寒有毒刮去膜打碎炒黃再研用搜
風逐痰破血開氣療癰瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧
按穿山甲古名鱗鯉甲穴山而居寓水而食善走
竄經絡無處不到直達病所成功如患在某處卽
用某處之甲此要訣也性頗峻猛不可過用

刺補顧生微論

卷二

七

石部

硃砂味甘性寒有毒入心經惡磁石畏鹹水忌一切
血研細水飛狀如箭頭者最上狀如石榴子鮮紅
透明者亦佳安心神療顛狂去結痰解煩熱辟邪
氣殺鬼崇清胎毒痘毒止目痛牙疼

按硃砂色赤應南離爲心經主藥多服令人寐悶
水銀卽硃砂之液殺虫蝨下死胎滲入肉內使人
筋攣若近男陽陽痿無氣惟以赤金緊莖造患處
水銀自出陽便起也

輕粉卽水銀昇鍊者去風殺虫追毒生肌若楊梅

瘡初起便服輕粉或以輕粉根硃點之毒氣退伏
骨髓如油入麝莫之能出迨十年廿載之後毒發
關竅重者喪生輕者癰敗世之蹈此而死者不可
勝數醫者取其一時捷效計利忘命亦與于不仁
之甚者也痛切戒之

赤石脂味酸溫辛性大寒無毒入心胃大腸三經畏
官桂芫花惡大黃松脂煅透水飛固腸止泄長肉
生肌主崩漏痢疾脫肛腸痔新通

按仲景三物桃花湯用赤石脂為君治少陰下利
膿血取其酸澁之性也痢症新起者忌用

刪補顧生微論

卷三

李

食鹽味鹹性寒無毒入腎經擦牙止痛沈日去風納
導可通二便探吐心腹煩疼停痰霍亂中暑疝症

補

青鹽功用相同其力更倍

按潤下作鹹鹹走腎凡喘嗽水脹消渴太忌食鹽
或引痰生或凝血脉或助水邪多食傷顏色傷筋
力故西北人不那鹹少病多壽東南人嗜鹽少壽
多病所以脩養家云淡食能多補匪浪說也

和味辛鹹性大寒有小毒入胃大腸二經天黃為
使惡苦參苦菜女苑畏三稜下氣破血攻積聚癥

瘕老痰宿食煩熱形氣明日清躁推陳致新

按經曰鹹味下泄為陰又曰以軟之又曰熱淫
於內治以鹹寒又曰氣堅者以鹹軟之皆合用硝
仲景只用芒硝不用朴硝惡其太峻也朴硝在下
最粗而濁芒硝在上其質稍清再經煎煉為玄明
粉尤為清粹然終是攻擊之劑方士濫誇玄明粉
可以却病延年不根之說也若施之于有虛無火
人殺人慘于刀劍矣

石膏味辛甘性大寒無毒入肺胃二經雞子為使惡
莽草巴豆馬目毒公畏鐵光明嫩者佳清胃火除

刪補顧生微論

卷三

李

頭疼齒痛逆氣驚喘三焦熱皮膚熱腸胃結氣消
渴發汗解肌

按石膏沉陰下降有肅殺而無生長須適事為故
毋恣意用之致伐資生之本也潔古云能寒胃令
人不食非有極熱不宜用血虛發熱有類白虎湯
症誤用之不可救也寇氏云孫兆言四月後天熱
時宜用白虎湯但四方氣候不齊歲中運氣不一
亦宜兩審東垣謂立夏前多服白虎必小便不禁
此陽明津液不能上輸肺之清氣亦復下降故爾
滑石味甘淡性寒無毒入胃膀胱二經甘草石韋為

使惡胃青白膩而嫩者佳研細水飛利小便令行積
滯逐瘀血解燥渴宜九竅通六腑。

按潔古云滑則利竅不與淡滲藥同時珍曰滑石
利竅不獨小便也上能利毛腠之竅下能利精溺
之竅多服使人小便多精竅滑腠虛下陷者勿用

補脾生微論卷三

七

刪補脾生微論卷之四

雲間念菴李時珍父著

吳趨門人沈頌明父校

茂苑後學吳進石虹參閱

○醫方論第二十二

上古因證處方初無膠執故內經翻造化之玄機而
不設方劑不欲以一定之跡應無窮之變也庸下者
流苦其與變於是漢世以降方法繁興如藥之有勢
不過畧陳間架對局之變無窮吾亦與之俱無窮若
執一定之勢以應千變之局其有不敗者幾希今名

刪補脾生微論卷四

方具在藥之勢也反正逆從勢之用也運氣不齊古
今易轍風土異宜強弱異稟貴賤異境老少異軀新
久異法內外異因局之變也先哲熟曉陰陽故其處
方良有精理不解其理妄試之用是棄者執勢之故
智也所以智者用方如獵不知兔廣絡原野術亦疎矣用
考名方最切要者計一百首令千載而下猶能見先
哲之心不蹈執方之弊庶幾展博濟之仁耳

九方拾捌首凡者緩也緩則治其本也上焦宜

而

六味地黃丸 治腎經不足發熱作渴小便淋瀝氣

瘳痰嗽頭目暈眩眼花耳鳴燥舌痛齒牙不固
腰膝痿軟自汗盜汗諸血失育水泛為痰血虛煩
躁下部瘡瘍足跟作痛等症

熟地黃 八兩酒洗 山茱萸 酒洗 乾山藥 炒各

牡丹皮 酒洗 白茯苓 乳製 澤瀉 去毛焙

右為末煉蜜丸如桐子大空心淡鹽湯下

腎者水臟也水衰則龍雷之火無畏而亢上故唐
玄曰壯水之主以制陽光地黃味厚為陰中之陰
主補腎填精故以為君山茱萸味酸歸肝乙癸同

刪補願生微論 卷四

一

治之義且腎主閉藏而酸飲之性與之宜也山藥
味甘歸脾安水之仇故用為臣丹皮亦入肝其用
主宣通所以佐茱萸之澁也茯苓亦入脾其用主
通利所以佐山藥之滯也且色白屬金能培肺部
又有虛則補母之義至於澤瀉有三功焉一曰利
小便以清相火二曰行地黃之滯引諸藥速達腎
經三曰有補有瀉無喜攻增氣之虞故用為使此
方為益腎之聖藥而味者薄其功緩蓋用藥者有
四失也一則地黃非懷慶則力淺一則地黃非九
蒸則不熟一則疑地黃之滯而減之則君主弱一

則惡澤瀉之滲而減之則使者微暗是四失而願
咎藥之無功毋乃愚乎

七味地黃丸 八味丸加減 治腎水不足虛火上炎發

熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體
憔悴發汗發熱

即六味五加 肉桂一兩 去皮

腎水不足虛陽僭上必用此方引火歸原夫五志
之火可以濕伏可以直折龍雷之火惟當從其性
而伏之肉桂性熱與火同性雖在下焦壯水藥中
能引無根虛火降而歸經此方以類聚之義也且

刪補願生微論 卷四 三

肉桂之質在中半以下故其性專走腎經本乎地
者親下之義也況相火寄於甲乙之間肝膽木旺
則與風動而烈火焰明古人謂北方不可濕濕肝
即所以瀉腎本草曰木得桂而枯乃伐肝之要藥
也經曰熱因熱用從治之妙法正與從其性而伏
之之義相合或者畏其熱而遺之豈達造化升降
之微乎黃柏知母治相火僅可施於壯實若虛火
而誤用之則腎因瀉而愈虛愈虛而虛火愈熾矣
素問氣增而勝久用寒涼反從火化之說獨不聞
乎

八味地黃丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺或陰盛格陽內真寒而外假熱等症

即七味丸加 熟附子一兩如法詳製

腎有兩枚皆屬於水雖有左右之分初無水火之別考之內經昭然可曉愚說已詳見辨妄篇前經曰兩箇一般無二樣中間一點是真精又曰兩腎中間一點明夫真精也明也即命門相火也命門乃穴名而其穴在兩腎中間益一陽生於二陰之間所以成乎坎而象天之北也經曰少火生氣人

刪補脾生微論 卷四 四

無此火生化之源或幾乎息矣非附子健悍不足以熾既稿之陽春王太僕曰益火之原以消陰翳此方是也

金匱腎氣丸 治脾胃大虛腰重脚重小便不利肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱證其效如神

熟地黃四兩 白朮三兩 山茱萸去核

乾山藥炒 川牛膝酒炒 牡丹皮酒洗

車前子炒 澤瀉炒 肉桂去皮半兩

附子製熟五錢

右為末煉蜜丸如桐子大空心白湯下

先哲謂土為萬物之母水為萬物之源身中所最重者脾虛則土不能制水腎虛則水不能安位故逆行而泛溢於皮膚之間因而攻逐虛虛之禍殆不可言八味丸脾腎要藥以車前泄太陰之水佐以牛膝開少陰之竅故服之則小便如泉而脹可過已又無損于真元之氣也

枳朮丸 治痞消食強胃健脾

白朮二兩土蒸 枳實一兩去穢炒

右為細末荷葉煨陳米飯為丸如椒目大白湯下東垣曰白朮苦甘溫其苦味除胃中之濕熱其甘

刪補脾生微論 卷四 五

溫補脾家之元氣多於枳實一倍枳實味苦溫泄心下痞悶消胃中所傷此藥下胃所傷不能即去須一兩時許食乃消化先補虛而後化所傷則不峻利矣荷葉狀若仰盂於卦為震人感之生足少陽甲膽也飲食入胃營氣上行即甲膽之氣也荷葉空清而象風木此氣所感而胃氣有不上升者乎更以煨飯和藥與白朮協力滋養穀氣而補脾胃其利大矣若用食藥下之傳變諸症不可勝數

枳朮丸 破滯氣消飲食開胃強脾

即枳朮丸加 木香一兩忌火

枳朮丸止主飲食自傷如鬱則氣阻不能下行
則氣鼓因而逆上必賴木香之苦以下氣溫以和
氣所以佐枳朮二味之不及乎肺肝兩臟之有餘
也况芳香之氣又脾所喜經曰寒者通之此方是
已

越鞠丸 總治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不化

香附

梔子

藜蘆汁

蒼朮

炒

神麴

撫芎

各等

右爲末神麴糊爲丸如川椒大空心白湯下如血
鬱加桃仁紅花濕鬱加白芷熱鬱加青黛食鬱加

劑補順生微論

宋四

六

山查痰鬱加南星海石半夏氣鬱加木香

夫人之有鬱氣猶天地之閉塞成冬也不有以開
之則發育之令息矣人身中詎可一日見此象乎
丹溪以香附主氣山梔主熱蒼朮主濕與痰神麴
主食撫芎主血誠諸鬱之總司也經曰木鬱達之
火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之治各異
法詎可執一途而取哉

通少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白
濁真氣虧損肌體瘦弱等症

肉從蓉

遠志

茴香

巴戟

山茱萸

乾山藥

枸杞

熟地黃

石菖蒲

牛膝

杜仲

楮實

五味子

白茯苓

右等分各另爲末和勻用棗肉百枚并煉蜜丸桐
子大每服五七十丸空心溫酒或鹽湯下日三服
脾爲後天根本腎爲先天根本二本固則老可還
少二本傷則少有老態菟蓉地黃枸杞味之厚者
也精不足者補之以味也茴香巴戟杜仲性之溫
者也陽不足者益之以溫也遠志菖蒲幸以潤之

劑補順生微論

宋四

七

也山茱萸五味子酸入東方是腎肝同治也牛膝
杜仲直達少陰山藥茯苓兼通脾土此本腎藥腎
足則少火薰蒸脾胃賴母以健運矣久服則筋骨
強機關利精力克顏色變命曰遠少不亦可乎
大王補心丹 主心血不足神志不寧津液枯竭健
忘怔忡大便不利口舌生瘡等症

人參

白茯苓

玄參

丹參

遠志

桔梗

五味子

當歸身

麥門冬

天門冬

梔子仁

酸棗仁

生地黃四兩

右為末，煉蜜丸，如椒目大，白滾湯下。

心者，神明之官也。憂愁思慮，則傷心。神明受傷，則主不明，而十二官危。故健忘怔忡，心主血，血燥則涸枯，故大便不利。五為心之外候，若火炎上，故生瘡是方，以生地為君者，取其下入足少陰，以滋水主。水盛可以伏火，況地黃為血分之要藥，又能入手少陰也。參、遠志、柏仁，養心神者也。當歸、丹參，玄參，生心血者也。二參助其津液，五味收其耗散，參、柏補其虛氣，以桔梗為使者，欲載諸藥入心，不

補神順生微論

朱明

八

使之速下耳。

班龍丸 治諸虛百損，髓竭精枯，殊有奇效。歌曰：尾閭不禁，滄海竭。九轉靈丹都漫說，惟有班龍頂上珠，能補玉堂閣下穴。

鹿茸 酒炙

鹿角膠 炒成 鹿角霜

陽起石 煅紅 酒淬

肉苁蓉 酒炙 去甲 酸棗仁 炒

柏子仁 炒

黃耆 酒炙 各 當歸 酒炒

黑附子 炮

熟地黃 酒炙 各 煅砂 五錢

右為細末，酒糊丸，如桐子大，空心酒送下。

腎氣虛，則督脈傷而精竭，胎性熱而滲得天地之

陽氣最全，故以鼻向尾，能通督脈，足於精者也。茸、膠、霜三物同用，益以陽氣在頭，取其全耳。陽起、菟絲、附子，取其直入少陰，暖精補子，於破皆安神之品。仙經曰：神足則氣旺，氣旺則精生也。黃耆當歸和上下之氣血，酒糊為丸，通表裏之陰道，且助添藥勢。今諸品無微不達，命曰班龍丸，能配東方屬木為陽，且取其雄矯，此方為健陽而設，故以名之。如真陰下損，元陽上乘者，不宜輕投，反濟其火。

黃柏 酒炙

知母 酒炙

熟地黃 酒炙 各

補神順生微論

朱明

九

虎骨 酒炙

鎖陽

當歸 各一兩

陳皮 去白

白芍藥 酒炒

牛膝 各二兩

龜版 酒炙

右為末，煅羊肉搗為丸，如桐子大，淡鹽湯下。

人之一身，陰氣在下，陰不足則腎虛，腎主骨，故艱于步履。龜屬北方，得天地之陰氣最厚，故用以為君。虎屬西方，得天地之陰氣最強，故用以為臣。獨取鹿骨，從類之義也。此二物者，古人所謂草木之藥性偏難效，氣血之屬，異類有情也。黃柏知母，所以去骨中之熱，地黃歸芍，所以滋下部之陰，陰

虛則陽氣泄越而上故加鎖陽以禁其上行加陳皮以導其下降精不足者補之以味故用羊肉爲丸命曰虎潛者虎陰也潛藏也欲其封閉氣血而退藏于密也

四神丸 治脾腎俱虛子夜作瀉不思食不化食

肉豆蔻 二兩 生用 破故紙 四兩 炒 五味子 三兩

吳茱萸 五錢 湯洗過

右爲末紅棗四十九枚生薑四兩切用水煮棗熟

去滓取棗肉和藥爲丸如桐子大空心鹽湯下

脾主水穀又主上升虛則不能消磨水穀而反行

剛補順生微論

卷四

十

下降腎主二便又主閉藏虛則不能禁固二便而

反爲滲泄夫腎水受時于子弱土不能禁制故子

後每瀉也肉豆蔻之辛溫可固滑而益脾吳茱萸

之辛溫可散邪而補土五味子酸鹹可入腎而收

飲破故紙辛溫可固本而益元土受溫補則燥能

制水水受溫補則力能閉藏子後之瀉從可瘳矣

香連丸 治下痢赤白腹痛不快裏急後重

黃連 二十兩 吳茱萸 二兩 同炒去吳茱萸 木香 四兩 八錢 不見火

右爲細末醋糊爲丸如椒目大米湯下

時至于夏天道南行屬火而熱在人身則心應之

斯時也不能致謹多食生冷則腸胃之間寒熱相搏悒鬱成積不能宣通發而爲痢火性急速故腹痛而後重裏急錢氏以黃連爲君者取其苦寒直折心家之火恐其大寒之性凝而不行故以茱萸之辛溫制之以木香爲佐者蓋以痢之爲病只是火火之有餘只是氣得以通利三焦氣行而火降矣且能監制黃連無喜攻增氣之變夫是二物皆主直行而折經曰有餘者折之是也

左金丸 治肝經火實左脇滿痛

黃連 六兩 炒 吳茱萸 一兩 鹽湯泡

剛補順生微論

卷四

十一

右爲細末水運爲丸如椒目大白滾湯下

吳氏曰肝木居于左肺金處于右左金者謂金令

行于左而平肝木也黃連善瀉心火不使乘金則

肺家清肅之令左行而肝木有制矣愚謂心者肝

之子也實則瀉其子故以黃連爲君然肝喜疎泄

必佐以茱萸之辛使其條達宣通無拂鬱之患辛

者金之味也辛以暢氣則治節收氣化之機而將

軍無謀慮之失矣經曰佐以所利和以所宜左金

丸之謂乎

脾約丸 治脾熱大便秘結

麻仁二兩 另研 杏仁五兩 五錢 皮尖炒 枳實炒

厚朴姜汁 炒 芍藥各八兩 大黃一斤

右為末，蜜為丸，如桐子大，白滾湯下。

成氏曰：約者，約結之約，又約束也。經門，飲入於胃。

一游溢精氣，上輸于脾，脾氣散精，上歸于肺，通調水

道，下輸膀胱，水精四布，五經並行，今胃強脾弱，約

束津液，不得四布，但輸膀胱，小便數而大便硬，故

曰脾約。麻仁甘平而潤，杏仁甘溫而潤，經門脾欲

緩急食其以緩之。本草白潤可去枯，是以麻仁為

君，杏仁為臣，枳實苦寒，厚朴苦溫，破結者必以苦

刪補顧生微論 卷四 十一

故以為佐。芍藥酸寒，大黃苦寒，酸苦湧泄為陰，故

以為使。丹溪曰：既云脾約，血枯火熾，金受邪而津

竭，必竊脾之母氣以自救，金衰則土受木邪，脾失

轉輸，肺失傳化，理宜滋陰降火，金行清化，脾土健

旺，津液既潤，何秘之有。此方惟熱甚而稟實者可

用，熱雖甚而虛者，愈致其燥潤之苦矣。

化蟲丸 治一切蟲，大者即下，小者盡化為水。

鶴鵲各五錢 苦練根各五錢 使君子各五錢

檳榔各一兩 枯白礬二錢 五分

右為末，水為丸，麻子大，上旬空心米飲下。

飲食入胃，非濕與熱，則不能腐化，若嗜嗜肥甘，則

濕熱愈甚，積久生蟲，曆家五月之令，濕熱大行，腐

草為螢腸胃生蟲，亦此義也。蟲以濕熱為巢穴，鶴

鵲等七味，皆有殺蟲之能，且去濕熱，能直搗其巢

穴矣。蟲類多種，治各不同，此方無所不宜。蟲劑之

總司也，但服之有法，無不神驗。須初一至初十，蟲

頭向上，宜先餓半日，而使蟲飢，次早五更用油煎

肉一片嚼之，蟲聞肉香，頭皆向上，隨以藥服之，須

史或葱湯或白水，助藥力下行，則蟲盡下矣。

刪補顧生微論 卷四 十一

礞石滾痰丸 治實熱老痰，非此不化，功效若神。

大黃酒洗 各八兩 黃芩各八兩 青礞石酒洗 各一兩

沉香五錢

右為極細末，水丸，川椒大，量人強弱用之。

痰不自動也，因氣而動，氣不自升也，因火而升，積

之既久，依附腸胃，迴薄曲折，處以為棲泊之窠，曰

謂之老痰，其變現之症，種種怪異，難以測識，莫可

名狀，非尋常藥物可能療也。隱君見及此，故用大

黃為君，以開下行之路，黃芩為臣，以抑上僭之火。

礞石礞悍之性，游行腸胃，踵其迴薄曲折之處，

而滌之。幾于刮腸刮骨之神故以為佐。奔馳于上中下三焦。開飛門。鬼門之竅者。沉香之力也。故以為使。然必服之得法。則效如響應。用水一口送過。咽。即便仰臥。令藥在咽喉間。徐徐而下。半日不可飲水。不可起身。坐行言語。直待藥氣除逐上焦痰滯。然後動作。大抵服罷。喉間稠粘壅塞不利者。乃痰氣泛上。藥力相攻故也。少頃藥力既勝。自然寧貼。

大黃廔蟲丸 治五勞七傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。

刪補願生微論

卷四

十四

大黃 十兩

黃芩 二兩

甘草 三兩

桃仁 十兩

杏仁 十兩

芍藥 各四兩

乾地黄 十兩

乾漆 一兩

蟅蟲 一兩

水蛭 十枚

蟅蟲 一兩

廔蟲 一兩

右為末。蜜丸。如小豆大。酒服五丸。日三服。

勞傷之症。未有無瘀血者也。瘀之日久。則發而為熱。熱潤其液。則乾粘于經絡之間。愈乾愈熱。愈熱愈乾。而新血皆損。人之元養百骸。充華潤澤者。止藉此血。血傷則無以沃其膚。故甲錯也。目得血而能視。營氣不貫于空竅。故黯黑也。仲景聖于醫者。

洞見此症。補之不可。涼之無益。而立此方。經曰。血主濡之。故以地黃為君。經曰。堅者削之。故以大黃為臣。統血者脾也。經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。又曰。酸苦湧泄為陰。故以甘草。桃杏芍藥為佐。經曰。鹹走血。苦勝血。故以乾漆之苦。四蟲之鹹。為使。吳氏曰。濁陰不降。則清陽不升。瘀血不去。則新血不生。今人一遇勞症。便用滋陰。服而不效。坐以待斃。嗚呼。術豈止此邪。

煎方六十三首 治諸病之發。發急則而本之。有正治其本。而欲收效。亦用湯散。大抵散利之劑。宜生補養之劑。宜熱。是在學者。

刪補願生微論

卷四

十五

症變通可耳。

四物湯 治一切血虛。日晡發熱。

當歸 酒炒

熟地黄 各三錢

白芍藥 二錢

川芎 一錢

右水煎服。

丹溪曰。難成而易虧者。陰血也。不足則生熱。經曰。血主濡之。四物皆濡潤之品。故為血分主藥。地黃甘溫。走北方。以沃血之源。當歸辛溫。入心脾。而壯主血攝血之本。芍藥酸寒。入肝家。而飲疎泄之血。海川芎陰中之陽。可上可下。通入足三陰。而行血。

中之氣。某氏曰失血太多者禁勿與之。四物皆陰。陰者天地閉塞之令。非所以生萬物者也。

四君子湯 治一切氣虛。脾胃弱。面色枯白。言語

輕微。四肢無力。脉來細軟。

人參 去蘆

白朮 土炒

茯苓 各二錢
去皮

甘草 一錢

右薑三片。棗肉二枚。水煎服。

吳氏曰。面色枯白。望之而知其氣虛。言語輕微。聞之而知其氣虛。四肢無力。問之而知其氣虛。脉來細軟。切之而知其氣虛。是方以人參補五臟之元

刪補願生微論

卷四

十

氣。白朮補五臟之母氣。茯苓致五臟之清氣。甘草調五臟之乖氣。四藥皆甘溫。甘得中之味。溫得中之氣。猶之不偏不倚之君子也。愚按。君子以陽明勝。展布德澤。以行春和之令。南風解慍。為國家培元氣者也。經曰。氣主煦之。此方有焉。

六君子湯 治氣虛脾弱。食少痰多。

即四君子加

半夏 製熟

陳皮 各二錢

右薑三片。棗肉二枚。水煎服。

半夏燥濕治痰之本。陳皮利氣泄痰之標。標本既得。攻補互行。補而不滯。攻而不峻。故曰六君子經

曰壯者氣行則愈。怯者着而為病。六君子者。既壯其氣矣。氣壯則升降自如。精以奉上。濁以歸下。誰復有物停留以着其焦肺者乎。加香附。薤白。砂仁。各香砂六君子湯。其用稍峻矣。

八珍湯 治氣血俱虛。惡寒發熱。煩躁作渴。大便不

實。飲食不進。小腹脹痛。眩暈昏憤等症。

四物湯

西君子湯

取二湯合用。薑三片。棗肉二枚。水煎服。

氣為衛。屬陽。血為營。屬陰。此人身中之兩儀也。純

用四物。則獨陰不長。純用四君子。則孤陽不生。二

刪補願生微論

卷四

十七

方合用。則氣血有調和之益。而陰陽無偏勝之虞矣。經曰。氣血正平。長有天命。斯方也。其庶幾焉。

十全大補湯 治勞傷困倦。虛症蜂起。發熱作渴。喉

痛。舌裂。心神昏亂。眩暈眼花。寤而不寐。食而不化。

人參 去蘆

茯苓 八分

當歸 一錢

熟地黃 酒炒

白芍藥 八分

川芎 八分

肉桂 五分

黃耆 三錢

水煎服

丹溪曰。實火可瀉。浮連之屬。虛火可補。芤耆之屬。

凡人根本受傷虛火游行世越于外若誤改其熱變成危症多致難救此方以四物補血四君平補氣佐以黃耆克實勝理如以肉桂導火歸原薛立齋曰飲食勞倦五臟虧損一切熱症皆是無根虛火但服此湯固其根本諸症悉退金匱玉函曰虛者十補勿一瀉之此方是也

二陳湯 治肥壯之人濕痰為患喘嗽脹滿

茯苓 三錢 半夏 三錢 陳皮 三錢

甘草 一錢

右薑三片水煎服

制補順生微論

卷四

十八

六君子可治虛痰若肥壯氣實之人未可驟補則姑去參朮以攻其標肥人多濕濕挾熱而生痰火載氣而逆上半夏之辛可以利二便而去濕陳皮之辛可以通三焦而理氣茯苓佐半夏共成燥濕之功甘草佐陳皮同致調和之力成無已曰半夏行水氣而潤腎燥經曰辛以潤之是也行水則土自燥非半夏之性燥也詩見藥性論中或曰有痰而渴宜去半夏代以貝母吳鶴皋曰渴而喜飲水者易之不能飲水雖渴宜半夏也此濕為本熱為標所謂濕極而兼勝已之化非真象也加枳殼砂

仁即名枳砂二陳湯其性較急矣

附子理中湯 治脾胃虛寒飲食不化或手足厥冷腸鳴切痛或痰氣不利口舌生瘡或嘔逆吐瀉等症去附子即名人參理中湯

人參 去蘆 白朮 土炒 乾薑 炮

甘草 炙 附子 製熟各等分

右每服八錢水煎服

人有元陽命曰真火受氣于甲乙聽命于天君者也此火一衰則不能生土而資生之本大虛今以附子迴少火乾薑煖中州而參朮甘草為之補氣

制補順生微論

卷四

十九

氣屬陽氣旺則火足而脾土自能健運經曰氣主煦之又曰其澤所勝平以辛熱即補火之說也天心上腎下肝左肺右而脾獨居中中氣空虛四臟不能相生因而不平得此方以理之則萬物之母安而四臟皆平矣故曰理中湯去參朮即名四逆湯為四肢厥逆者設也

補中益氣湯 治勞倦傷脾中氣不足懶于言語惡食泄瀉或身熱而煩或氣高而喘或頭痛惡寒自汗或氣虛不能攝血或法太無力或微細軟弱或瘡癤等症因脾虛久不能愈或虛人感冒風寒不

勝發表者宜以此代之、

黃耆一錢五分

人參去蘆

北草炙

歸身酒拌

白朮土炒各一錢

陳皮去白五分

升麻

柴胡各三錢

右薑三片、棗二枚、水煎服、

東垣自評曰、勞倦傷脾、心火乘土、而肺金受邪、脾

胃一虛、肺氣先絕、故多用黃耆以益皮毛、而閉腠

理、上喘氣短、人參以補之、心火乘脾、炙草之甘以

瀉火、而補胃中元氣、白朮甘溫、除胃中熱、利腰膈

間血、胃中清氣在下、必升柴以引之、氣亂于胸中、

刪補順生微論

卷四

二十

為清濁相干、用陳皮以理之、脾胃氣虛、為陰火傷

其生發之氣、血中伏火、日漸煎熬、則心亂而煩、加

辛甘微溫之劑、以生陽氣、陽生則陰長、經曰、勞者

溫之、益溫能除大熱、太忌苦寒之藥、瀉胃土、耳、愚

按脾為坤土、以應地氣、地氣升而發、陳之令布、地

氣降而肅殺之令行、勞倦傷脾、土虛下陷、經曰、交

通不表、名木多死、白朮不下、苑桑不榮、此言肅殺

成否之象、人應之、則變症百出、未與絕滅、東垣先

生、深達造化、故立溫中之劑、溫和中者、春氣之應、後

生之道也、且以升麻、提脾之右陷者、從右而升、柴

胡提肝之左陷者、從左而升、地既上升、天必下降、

二氣交通、乃成雨露、此氣行而生氣不竭矣、治勞

傷者、不當如是耶、

升陽散火湯 治四肢困倦、肌膚大熱、

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍藥炒

人參各一錢

柴胡六分

防風五分

甘草四分

右水煎服、忌食寒涼之物、

東垣自評曰、四肢屬脾、脾者土也、就伏地中、多因

血虛而得、又有胃虛過食冷物、鬱遏陽氣于脾土、

刪補順生微論

卷四

二十一

之中者、並宜服此、愚按經曰、火鬱則發之、升柴羌

獨防葛、皆味之薄者、陰中之陽、故足以發無光之

火、而顯揚于上、人參助其上升、而固衛氣、芍藥防

其發散而欲榮氣、甘草以緩之、勿使風藥太過、而

元氣反傷也、東垣此方、非洞曉陰陽、孰能與于斯、

歸脾湯 治思慮傷脾、不能攝血、或健忘、怔忡、驚悸、

盜汗、寤而不寐、或心脾作痛、嗜卧、少食、大便不調、

或肢體重痛、月經不調、赤白帶下等症、

人參去蘆

白朮土炒

茯苓去

龍眼肉去核

酸棗仁炒各二錢

遠志去骨

當歸身各一錢 木香生用 甘草各五分

黃耆各一錢五分

右薑三片水煎服

心藏神而主血。脾藏意而統血。思慮則兩臟受傷。而血不歸經。心血不足。故健忘怔忡。驚悸不寐。脾血不足。故嗜臥少食。體重便病。過甚則氣鬱而心脾作痛。在女則帶下而月經不調。治以金石腸胃傷而真元不復。治以寒涼氣血損而病本日深。茲取參苓耆朮炙草甘溫。可以補脾。龍眼棗仁歸身遠志濡潤。可以養心。佐以木香者。益思慮所傷三

制補順生微論 卷四 三

焦氣阻。藉其宣暢。則氣和而血和。且平肝可以實脾。血之散于外者。悉歸中州。而聽太陰所攝矣。故命之曰歸脾湯。

人參養榮湯 治脾肺氣虛發熱惡寒面黃肌瘦倦怠短氣食少作瀉

白芍藥一錢五分 人參去蘆 陳皮

黃耆蜜炙 桂心 當歸酒炒

白朮土炒 甘草炙 熟地黃蜜汁

茯苓去皮各七分半 五味子炒 遠志去木各五分

右薑三片棗肉二枚水煎服

陽春至而物榮。肅殺行而物穢。脾為坤土。心屬乾金。經曰脾氣散精。上輸於肺。地氣上升也。肺主治節。通調水道。下輸膀胱。天氣下降也。於象為泰。脾肺氣虛。則上下不交。陰陽不調。故面黃肌瘦。亦猶大物之積也。人參五朮溫其脾胃。黃耆炙甘草溫其脾。陳皮芍藥溫其肝。地黃精心溫其腎。當歸遠志溫其心。溫者陽春之氣也。春氣行而一身之中有不欣欣向榮者乎。故曰養榮湯。薛立齋曰氣血虛而變現諸症。莫能名狀。勿論其病。勿論其脈。但用此湯。諸症悉退。可謂有回春之識矣。

制補順生微論 卷四 三

加味逍遙散 治血虛倦怠發熱口乾自汗盜汗或月經不調腹痛重墜水道澀痛等症

當歸酒炒 白芍藥酒炒 白茯苓去皮

白朮土炒 柴胡各一錢 甘草炙

牡丹皮便炒 梔子各五分

右水煎服去丹皮梔子即逍遙散原方

藏血者肝也。一有拂逆。則將軍之官謀慮不決。而血海為之動搖。經曰暴怒傷陰。散為血虛。諸症婦人尤甚。此以白朮茯苓固其脾。恐木旺則土衰。經所謂不治已病治未病之法也。經曰肝苦急。食

甘以緩之。故用甘草。經曰以辛散之。故用當歸。經曰以酸瀉之。故用芍藥。紫胡氣涼散其怒火。山梔味苦抑其下行。丹皮和血通經。所以導血中之氣而無壅塞之虞。絲是而察其平肝補血之法。可謂婉而至矣。

當歸補血湯 治氣血虛熱面赤煩渴脉大而虛。

黃耆 一 當歸 二錢

右水煎空心服之

東垣曰經云脉虛血虛又云血虛發熱此多得于饑飽勞役症類白虎惟脉不長實爲辨耳誤服白

刪補願生微論

卷四

三十四

虎湯者必以思按陰陽對待一勝則一負陰既不足陽必有餘故熱而渴也黃耆乃甘溫補氣之劑此本血虛何反用之爲君耶經曰治病必求於本又曰陽生陰長故血虛補氣治其本也佐以當歸之潤正與陰血相投二物並行則上下表裏無處不到故名補血湯

清心蓮子飲 治熱在氣分夜不安甚口渴便濁或

口舌生瘡咽乾煩躁小便赤淋遇勞即發

黃芩 炒

麥門冬 去心

地骨皮

車前子 炒

甘草 各一錢五分

石蓮肉

白茯苓

黃耆

人參 各一錢

右水煎服

心臟主火火者元氣之賊勢不兩立者也小腸與心竅爲表裏心火發動小便必澀故以門冬石蓮寧其大君使有銷鑠之患參耆之用助氣化以達州都中前之功因決瀉以供感受甘草一味可上可下調和諸藥其底成功若小便既通則心清而諸火自息宜治本不必兼標矣

草薢分清飲 治膏濁頻數漩白如油名曰膏淋

刪補願生微論

卷四

三十五

川草薢

石菖蒲

烏藥

益智仁 各三錢

右水煎服

經曰雨氣之復不應山澤無不蒸騰小便膏濁者濕氣感行蒸滯之象也水性就下故淋瀝不已燥可去濕故用菖蒲烏藥以平濕土之效烏藥益智入腎可納氣歸源腎水得令則自能閉藏而小便有節至於使水道轉入大腸分清泌濁者獨草薢之力也故曰草薢分清飲

茵陳五苓散

治酒積黃疸小便不利清熱去濕

茵陳

猪苓

茯苓

澤瀉

白朮

上炒各一錢

桂三分

右水煎服。去茵陳即五苓散原方。

土虛則受濕。濕生熱。濕熱乘脾。中央之黃色乃見。酒亦濕熱。故並治之。茵陳專理濕熱。發黃者所必用也。佐以猪苓澤瀉。則水液分於膀胱。佐以白朮茯苓。則土旺可以勝濕。桂之為用。能令諸藥直達熱所。蓋向導之兵也。

龍膽瀉肝湯 治肝熱膽溢火實口苦

柴胡

黃芩

五味子

刑補願生微論

卷四

三六

生甘草

山梔

知母

天門冬

麥門冬

黃連

人參

龍膽草

右水煎服

肝為將軍之官。性急而暴。不有以直折之。則火之發也必烈。柴胡輕清上升。能順木性而使之條達。故為君。山梔龍膽味若性寒。直入肝膽以平其亢。甚黃連降心火。實則瀉其子也。金匱可以平木。故加五味門冬。木旺將以賊土。故加人參甘草。腎肝同治。故用知母。古人立方之意。其深奧如此。

滑歸六黃湯 治盜汗發熱火實陰虛

黃耆

當歸

生地黃

熟地黃

黃芩

黃連

黃柏

右水煎服

盜汗者。乘人之睡而出。有如盜也。陰虛而睡。則衛外之陽乘虛陷入陰中。表液失其固衛。故澀澀然汗出。覺則陽氣用事。衛氣復出于表。汗即止矣。當歸地黃。滋陰之藥也。芩連黃柏。降火之藥也。盜汗之餘。腠理不固。故以黃耆補表。愚謂既曰陰虛。則

刑補願生微論

卷四

三七

元氣有降而無升。肅殺之氣方淡而復用肅殺之劑。毋乃犯虛虛之戒乎。惟火實氣強者。不得已而暫用之。不然。寒涼損胃。禍彌深耳。

三子養親湯 治氣喘痰盛

紫蘇子

白芥子

蘿蔔子

右水煎服

丹溪曰。氣有餘便是火。火載痰升。氣高而喘。茲以蘇子降氣。芥子開氣。蘇子利氣。氣下則火清而痰自已。吳鶴皋曰。治痰先理氣。此治標之法。不若二陳有去濕治本之妙也。愚謂治病先攻其

實而喘則氣反為本。痰反為標。是在智者神而明之。不可以一端泥也。然氣稍近于虛。便非所宜矣。

橘皮

竹茹

各一分

人參 去蘆

生薑 根

甘草

各一分

大棗 二枚 去核

右水煎服

久病而虛。肺金失下降之令。心火肆炎上之權。嘔逆所時有也。茲以生薑橘皮之辛溫。導其下降。竹茹生草之甘寒。禁其上升。人參大棗。所以強胃扶脾。而安其轉輸之職。嘔必自止矣。如因於寒者。以

刪補願生微論

卷四

三十八

丁香代竹茹。毋守株而不變也。

丁香柿蒂湯

治久病呃逆。因於寒者。

柿蒂

丁香

各二錢

人參 去蘆 一錢

生薑 五片

右水煎服

嘔為大氣上冲。呃為寒氣阻寒。亦有中氣不續而呃者。案古老人以丁香之辛溫正治。以柿蒂之澁寒從治。人參為佐。使真氣得以展布耳。呃在中焦。穀氣不運。其聲短小。得食乃發。呃在下焦。真氣不足。其聲長大。不食亦然。臨症者。不可以不辯也。

溫膽湯

治膽虛不眠。夢中驚悸。嘔吐痰涎。

竹茹

枳實

熱炒

半夏 製

甘草

陳皮

生薑

右水煎服

聖惠云。云。膽虛不眠。寒也。經曰。寒者溫之。故以生薑陳皮之辛溫為君。枳實半夏之苦溫為臣。甘草所以和中。竹茹所以向導。膽溫則土得其平。嘔吐自止。脾主四肢。又主困倦。故能睡也。如元氣不足。心血有虧者。以歸脾湯主之。如實痰滯脈而不得睡者。以素問半夏湯主之。是在圓機者變通耳。

刪補願生微論

卷四

三十九

內經半夏湯

治痰感夜不得寐。

秫米

一升 即小半 煮 五合

右用千里水八升。揚之萬遍。取清五升。煮沸。入前

藥。煮一升半。每服一杯。日進三服。以知為度。病新

發者。覆杯即臥。汗出則已。久者三服而已。

岐伯曰。衛氣行于陽。陽氣滿。不得入于陰。陰氣虛。故目不得瞑。惡按陽者。動也。關也。陰者。靜也。關也。故行于陽。則動而醒。行于陰。則靜而臥。陽亢亢上。則氣有餘。而脇有痰。經曰。合夜至雞鳴。天之陰。陰中之陰也。氣行于陰。而陰不足。則陽愈狂。而陰乃

松靜反為動。開反為閉。神氣散而不守。故目不得
瞑。精氣甘平。益陰氣而利大腸。半夏辛溫。通痰厥
而泄小便。二便俱通。氣可立降。陽不乘陰。即可立
至。經曰。陽強不能密。陰氣乃絕。陰平陽閉。精神乃
治。此之謂也。

生脉散 治熱傷元氣氣短倦怠口乾出汗。

人參去蘆 五味子作 麥門冬去心各

右水煎服

火氣赫曦則金為所制。而絕寒水生化之源。故氣
短倦怠出汗者。皆手太陰本經症也。人參補氣為

刪補順生微論

卷四

三十

君所謂損其肺者益其氣也。五味子酸飲收肺家
耗散之金。麥門冬甘寒濡肺經燥枯之液。三者皆
扶其不勝。使火邪不能為害也。司天屬火之年。時
令濕。

清暑氣 治濕熱困倦胸滿氣促肢節疼痛或

小便黃數大便溏澀或瘧痢等症。

人參去蘆 白朮土炒 陳皮去白

神曲炒 澤瀉各五 黃耆炙

荷木製 升麻各一 甘草

乾葛各三 五味子九粒

右水煎服

熱傷元氣清濁不分。經曰。濁氣在上。則生脹滿。清
氣在下。則生飧泄。故見症如前。黃耆二朮為元氣
之保障。人參五味為治節之藩籬。升麻乾葛引清
氣上升。神曲澤瀉分濁氣下降。根本充實。清濁不
淆。雖有濕熱之邪。無所容矣。故曰清暑益氣湯。

香薷用礬 人參去蘆 陳皮

黃耆炙 白朮土炒 扁豆

甘草炒 厚朴炒 茯苓

刪補順生微論

卷四

三十

木水各錢

右水煎服

溽暑之時。濕熱交作。濕因火蒸。逆乘于頭。故頭重
而昏。經曰。壯火食氣。脾氣受傷。重之以濕。又其所
惡。中黃失令。則陰陽不能分利。清濁不能泌別。吐
痢之所繇來也。以參耆保肺扶不勝之金。以朮木
扶脾壯資生之本。陳皮厚朴祛逆上之炎蒸。扁豆
甘草和乖亂之神氣。香薷之用。清散暑邪。善除濕
熱。木瓜之加。為中宮制賊邪。不使肝木乘虛來犯。
夫如是則脾胃治而水精四布。五經並行。濕熱皆

消而吐痢盡止矣。

百合固金湯 治肺傷咽痛喘咳痰血。

百合去心一錢 麥門冬去心一錢五分 細甘草生用一錢

芍藥炒一錢 懷生地二錢 懷熟地三錢

黑玄參去蘆八分 桔梗去蘆八分 貝母去心一錢二分

當歸一分

右水煎服

元陰不足則腎先絕水不制火愈燥其陰熱地黃

太補五臟之陰故用為君生地黃滋陰退熱自合

保肺安神歸功補血門冬潤燥玄參壯水之主貝

劑補願生微論

卷四

三

母去肺之痰細甘草生用能清神中之火可代

栢知母桔梗載諸藥于至高以成固金之功趙張

宰此方不欲以苦寒傷生發之氣故以甘寒主之

殊有卓見愚謂陰虛則足太陰必虛而金位無母

始用此方清金之後亟宜顧其母氣方為至治若

專事于肺而不取化源則不惟土氣難強即金氣

亦終不可足也滋陰者其詳審之

清脾飲 治壯盛人瘧疾熱多寒少小便澀脉弦數

青皮炒一錢 厚朴薑汁一錢 白朮土炒一錢

黃芩炒一錢 半夏製一錢 柴胡去蘆一錢

茯苓去皮 草蓰 甘草

右薑三片水煎服。

瘧症之因多是大陰受傷濕生痰痰生熱熱生風

故脉見弦數也吳氏曰清脾非清涼之謂乃攻其

邪而脾部為之一清也愚謂半夏除濕化痰開氣

散表佐以草蓰厚朴則中州之垢肅清然瘧脉自

弦肝風必鼓柴胡青皮可以散厥陰之邪木旺必

乘脾白朮茯苓可以固太陰之主黃芩清其火甘

草緩其急而瘧邪可解矣雖然此為壯實者設也

用之太過反淡沉痼必致綿延難愈甚而變成他

劑補願生微論

卷四

三

症卒難救藥有司命之責者其可不惕然慎耶

紫苑湯 治癆熱久嗽吐血吐痰。

紫苑洗淨一錢 阿膠蛤粉炒一錢 知母炮去毛一錢

貝母去心各一錢 桔梗去蘆一錢 人參去蘆一錢

茯苓去皮一錢 甘草各五分 五味子十二粒

右水煎食後服

癆而久嗽肺虛可知即有熱症皆虛火也海藏以

保肺為君故用紫苑阿膠以清火為臣故用知母

貝母以參苓為佐者扶土以生金以甘桔為使者

載藥以入肺五味子滋腎經不足之水收肺家耗

散之金、火嗽者所必收也、

導氣湯 治寒疝疼痛

木香 三錢 忌火

茴香 二錢

吳茱萸 一錢 湯泡

川練子 四錢

右用長流水煎服

巢氏曰陰氣積于內復為寒氣所加榮衛不調故成疝、疝者控引舉丸而痛也、川練入肝暢氣舒筋則無掣急之苦故以為君、木香破氣善調榮衛故以為臣、茴香接諸藥入小腸且開任脉故以為佐、茱萸之性微上微下、心腹俱通故以為使、薑焦一

刪補願生微論

卷四

三

氣得吳則宣遇寒斯阻故以溫劑宣之、所以勝寒氣而開臆門之路、水用長流取其源遠而通引氣下行耳、故名導氣湯、此乃疝之通劑也、然其病多端、古有厥微寒盤氣附狼之七名、子和分寒水筋血氣孤癩之七種、須熟察其源通變處劑、斯萬舉萬全矣、

香蘇飲 主四時感冒風邪頭疼發熱

紫蘇

香附 三錢 炒各

陳皮 去白一錢二分

甘草 七分

右薑三片葱一莖煎服

巢氏曰南方風氣柔弱因于風寒俗稱感冒乃受

邪膚淺之名也、經曰卑下之地春氣常在故東南之民感風之症居多而六經之症不顯其感也繇

鼻而入惟頭痛發熱而已、昏蘇以芬芳之氣疏肌表之邪、是以蘇為君、附為臣、陳皮甘草和膈裏之

氣而輔正、是以為佐、表裏互治微邪立解、

黃連解毒湯 治陽毒上竅出血

黃連 炒

黃芩 炒

黃柏 炒

山梔 炒各三錢

右水煎服為末為丸即名三黃金花丸

刪補願生微論

卷四

三

巢氏曰治病必求其本、陽毒上竅出血則熱為本、血為標、能去其熱則血不治而自歸經矣、故以黃連為君、佐以芍藥、梔子、四物皆苦、苦者直行而泄其走南方、平其亢甚、若陰虛之火則降多亡陰、及從火化、出血愈甚、不可不知、

秦艽升麻湯 治風寒客胃口眼喎斜惡見風寒四肢拘急脉浮而緊

升麻

乾葛

甘草

芍藥

人參 錢各一

秦艽

白芷

防風

桂枝 錢各三

葱白連鬚二根

右水煎服、

至哉坤元爲五臟之主木勝風淫則倉廩之官承制脾主四肢故虞痺也口爲土之外候眼爲木之外候故俱病也升麻白芷皆陽明本藥故用爲直入之兵人參桂枝固其衛氣芍藥秦艽和其榮血防風卑賤之卒隨今而行慈根發汗之藥無後不達又藉甘草以和之而邪有不散者乎

桂枝湯 仲景曰太陽中風頭痛陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出膏膏惡寒漸漸惡風新

刪補順生微論

卷四

姜

翁發熱鼻鳴乾嘔本方主之

桂枝三兩去皮

芍藥三兩

甘草二兩炙

生薑三兩

大棗十二枚

水七升微火煮取三升服一升覆令微汗不可令如水淋漓病必不除若一服汗出病瘥不必盡劑若不汗更服至二三劑

成氏曰陽脈浮者衛中風也陰脈弱者榮氣弱也風併于衛衛實而榮虛故發熱汗出衛虛則惡風榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以汗出則腠理疎亦惡風也翁翁者若合羽所覆熱在表也

鼻鳴乾嘔者風邪氣逆也與桂枝湯和榮衛而散

風邪桂味辛熱用以爲君者桂猶主也宜道諸藥爲之先聘辛甘發散爲陽之意也芍藥味苦酸寒其草甘平用以爲臣佐者維白風淫所勝平以辛佐以苦以甘緩之以酸收之也生薑辛溫大棗甘溫一物爲使者經曰風淫于內以甘緩之以辛散之也藳陳固能發散此又不待發散之用專行脾胃之津液而和榮衛者也麻黃湯不用藳陳專于發汗則不待行化而津液得通矣愚按衛屬陽陽氣者不能衛外而爲固則有汗成云衛實何邪蓋

刪補順生微論

卷四

姜

邪氣盛則實非正氣也既曰邪實則熱在表矣其惡風又何耶蓋汗能開腠故也既曰熱在表則汗出而腠開亦宜解矣乃不解者又何耶趙嗣真所謂惟臟腑可分表裏皮膚骨髓但分浮淺深沉俱屬于表若以皮膚爲表骨髓爲裏則麻黃湯症骨節疼痛其可謂有表復有裏耶然則不解者骨髓之邪自在正與膏肓惡寒之義相合所謂執在皮膚寒在骨髓也如骨髓無寒則桂枝不宜與矣論曰桂枝下咽陽盛則斃其此之謂乎

麻黃湯 仲景曰太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節

疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

水九升先煮麻黃減二升去沫納諸藥煮取二升半溫服八合覆取微汗

刪補順生微論

卷四

三八

足太陽膀胱之脉起于目内眦上額交巔入絡腦下項循肩膊俠脊抵腰中貫腎入膈循胃下合膈中貫膈內故所過無不疼痛也麻氏曰寒則傷榮太陽經榮血不利也經曰風寒客于人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也寒并于榮榮實而衛虛無汗而惡風也榮強衛弱故氣逆而喘麻黃甘苦為君者以輕劑專主發散也桂枝為臣者表實腠密非桂枝所能散必專麻黃以發汗經曰寒淫于內治以甘熱佐以辛苦是也甘草甘平杏仁甘溫用為佐使者經曰肝苦急急食甘以緩之肝者榮之主也榮勝衛固血脉不利宜山草杏仁甘以緩之且桂枝陽主風傷衛風邪併于衛則衛實而榮弱故佐以芍藥用和榮也麻黃湯主寒傷榮寒邪併于榮則榮實而衛虛經曰氣之所并為血虛血之所并為氣虛者是已治之以杏仁用利

氣也愚按審係真寒太陽無汗非麻黃湯莫可代者前哲謂冬不用麻黃夏不用桂枝蓋以冬令主閉藏不應疎泄夏令本炎熱不可辛溫經所謂必先歲氣毋伐天和之說也又曰麻黃惟冬月寒邪在表腠密無汗者必用是何與前說相反耶戒不用者明時令之常慮輕用也勸必用者發病機之理慮遺用也或拾時從症或拾症從時臨症變通在乎其人倘一槩疑懼惟以輕和之劑代之必有陰受其天折而莫之覺者該通君子其熟察之

天壽龍湯 仲景曰太陽中風脉浮發熱惡寒身

刪補順生微論

卷四

三九

疼痛不汗出而煩躁者大青龍主之

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

生薑

大棗

石膏

水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升溫服一升取微汗一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

成氏曰此中風見寒脉也浮則為風風則傷衛緊則為寒寒則傷榮榮衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風并于衛者為榮弱衛強寒并于榮者為榮強

衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故不汗出而煩躁也青龍者東方甲乙木神也專主生發之令萬物出甲開甲則有兩岐肝有兩葉以應之所以謂之青龍中風脉浮緊為中風見寒脉傷寒脉浮緩為傷寒見風脉是風寒兩傷也桂枝湯解肌以祛風而不能已其寒麻黃湯發汗以散寒而不能去其風故特取大青龍以兩解之麻黃甘溫桂枝辛熱寒則傷榮以甘緩之風則傷衛以辛散之故麻黃為君桂枝為臣也甘草甘平杏仁甘苦甘為助佐麻黃以發表大棗甘溫生薑辛溫辛甘相合佐

刪補顧生微論

卷四

四十

桂枝以解肌石膏辛甘微寒夫風陽邪也寒陰邪也風傷陽寒傷陰陰陽兩傷非輕劑所能獨散也必須輕重之藥同散之是以石膏為使而專達肌表也陶氏曰此湯險峻須風寒俱甚又加煩躁方可與之不如桂枝麻黃各半湯為穩愚按能者至神至雄王行雨者也今用以發風木之邪而行其汗有速效之驗有與禦之雄且經曰陽之汗以天地之雨名之故命曰青龍湯

白虎湯 主傷寒傳入于胃脉大而長神昏日晡更俱熱煩渴

知母六兩
梗米六合

石膏一觔

甘草二兩

水一斗煮米熟湯成溫服一升日三服

傳胃則邪入裏矣仲景言滑瀉以邪亦未解也成氏曰白虎湯解內外之邪白虎西方金神應秋而歸肺熱甚于內者以寒下之熱甚于外者以涼解之中外俱熱內不得泄外不得發非此湯不能解也夏熱秋涼湯名白虎言秋氣至而熱去也知母苦寒經曰熱淫所勝佐以苦其又曰熱淫于內以苦發之故以知母為君石膏甘寒熱則傷氣寒以

刪補顧生微論

卷四

四十一

勝之甘以緩之故以石膏為臣其草梗米味皆甘平脾欲緩急食甘以緩之故以甘草梗米為使太陽中暈得此頓除熱見白虎而盡矣立秋後不可服服則不能食多成虛羸愚按知母之寒不及石膏况知母但主內熱不能解肌况止用六兩恐非君也宜作臣石膏入肺屬金其色又白其性又雄正與白虎之義相合且用一觔恐非臣也宜作君珍珠囊論石膏之性而謂仲景有白虎之名因名責實則豈非此方之君王耶

天承氣湯 傷寒寒邪入裏痞滿燥實四症俱全

枳實炙五枚

厚朴半兩炙去皮

茵陳三合

大黃四兩酒洗

水一斗先煮枳朴取五升去滓納大黃煮取二升

去滓納茵陳微火一二沸分三再服

成氏曰承順也邪入胃者鬱滯精粕秘結壅實氣

不得順也本草云通可去滯泄可去閉氣得以順

故曰承氣王水曰宜下必以苦故以枳實為君經

同燥淫于內治以苦溫泄滯除燥苦溫為輔是以

厚朴為臣經曰熱淫于內治以鹹寒傷寒則熱故

以苦硝為佐經曰燥淫所勝以苦下之故以大黃

刪補願生微論

卷四

聖

為使大滿大實有燥屎乃可投也如非大滿則生

寒症而為結胸痞氣之屬矣愚按調胃承氣不

用枳朴以其不作燥滿恐傷上焦虛無氣氲之氣

也小承氣不用苦硝以其雖實未堅恐傷下焦真

陰之分也此則上中下三焦皆病痞滿燥實四症

俱全故以本方主之仲景曰欲行大承氣先與小

承氣腹中轉失氣者有燥屎也可以大承氣湯攻

之不可轉失氣慎不可攻

天柴胡湯

治陽邪入裏表症未除裏症又急

柴胡八兩 黃芩三兩 枳實四枚

芍藥三兩

生薑五兩切

半夏半升洗

大棗十二枚去核

大黃二兩半酒洗

水一斗二升煮六升去滓再煎服一升日三服

成氏曰大滿大實則有承氣湯如不大堅滿惟邪

熱甚而須攻下者必須輕緩之劑乃大柴胡也傷

寒可下則為熱折熱必以苦故以柴胡為君黃芩

為臣經曰酸苦湧泄為陰泄實折熱必以酸苦故

以芍藥枳實為佐辛者散也散逆氣者必以辛其

者緩也緩正氣者必以其故用半夏薑棗為使也

加大黃功專蕩滌不如恐難攻下應以為使也

刪補願生微論

宋四

聖

愚按表症未除者寒熱往來脇痛口苦尚在也裏

症又急者大便難而燥實也此為兩解之劑

小柴胡湯主傷寒五六日往來寒熱胸脇苦滿脇

痛耳聾默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不

嘔或渴或腹痛或脇下痞或心下悸小便不利或

不渴身有微熱或咳者此邪在少陽經半表半裏

之症也

柴胡八兩

黃芩三兩

人參三兩

甘草炙三兩

半夏半升洗

生薑切二兩

大棗十二枚去核

水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服。

升日進三服。

成氏曰。邪在表。則寒。在裏。則熱。半表半裏。故寒熱往來。在表。則不滿。在裏。則脹滿。止言胸脇。若滿。知在表裏之間。少陽行身之側。胸脇為少陽之部。其脉循脇絡于耳。故胸脇痛。而耳聾。在表。則呻吟。在裏。則煩亂。經曰。陰入之陰。則靜。然者。在表裏之間也。在表。則能食。在裏。則不能食。不欲飲食者。邪在表裏之間。未至于不能食也。在表。則不煩。在裏。則煩。嘔心煩喜嘔者。邪在表。方傳裏也。經曰。熱

刪補顧生微論

卷四

四

淫于內。以苦發之。柴苓之苦。以發傳邪之執。裏不足者。以甘緩之。參草之甘。以緩中和之氣。邪半入裏。則裏氣逆。辛以散之。半夏以除煩。嘔邪在半表。則榮衛爭之。辛甘解之。薑棗以和榮衛。仲景曰。胸煩不嘔。去半夏。人參。加枳實。枳實一枚。渴者。去人參。更加人參一兩。五錢。括蘄根四兩。腹痛者。去芍藥。加芍藥三兩。脇下痞。去大棗。加牡蠣四兩。心悸。小便不利。去苓。加茯苓四兩。不渴。外有微熱。去芍藥。加桂枝三兩。溫覆取微汗。欬者。去參。薑棗。加五味子半升。乾薑二兩。愚按。近世治傷寒。不分表裏陰

陽。樂用此方。去參。投之。取其平穩。不知此為半表半裏之劑。太陽經之表熱。陽明經之標熱。皆不能解也。若夫陽氣虛寒。面赤發熱。脈沉足冷者。服之立至危殆。可不慮哉。即大便不實。脈息小弱者。皆在所禁。信乎用之。不當。皆可殺人。不獨峻劑也。大陷胸湯。傷寒下之早。從心下至少腹。鞭滿而痛。手不可近者。大結胸也。此方主之。

中遂一錢

芒硝一升

大黃六兩

去皮

水六升。先煮大黃。取二升。去滓。納芒硝。煮一二沸。納枳遂。末溫服一升。得快利。止後服。

刪補顧生微論

卷四

四

三陽經表症未解。用承氣以攻裏者。下之早也。下早則裏虛。表邪乘之而入。三焦皆實。故心下至少腹。痛不可近也。成氏曰。諸陽受氣于胸中。邪氣與陽氣相結。不可分解。高者陷之。故曰陷胸。陷胸破結。非苦寒直達者。不能。是以枳遂為君。經曰。鹹味湧泄為陰。又曰。鹹以軟之。是以芒硝為臣。湯液邪冠。將軍之職也。是以大黃為使。傷寒錯惡。結胸為甚。非此。缺劑。不能通利。

小陷胸湯。下早熱結胸中。按之則痛。小結胸也。

半夏湯

黃連一兩

括蘄實一兩

大者一枚

承六升。先煮枳實取三升。去滓。納諸藥。煮取二升。分溫三服。

止在胸中。不及于腹。按之則痛。不按猶未痛也。故曰小結胸。經曰。苦以泄之。辛以散之。黃連泄胸中之熱。括實泄胸中之氣。半夏散胸中之痰。一服未能即和。再服微解。下黃涎便安也。

半夏瀉心湯 主傷寒下利。心滿而不痛者。為痞。

半夏 半升

黃芩

乾薑

人參 去蘆

甘草 炙以上各三兩

大棗 十二枚 去核

水一斗。煮六升。去滓。煎取三升。溫服一升。日三服。

刺繡願生微論

卷四

聖本

加甘草一兩。即甘草瀉心湯。治痞嘔吐痢。加生薑四兩。即生薑瀉心湯。治痞嘔噎氣。

成氏曰。結而不散。壅而不通。為結胸。陷胸湯為直達之劑。寒而不通。否而不分。為痞。瀉心湯為分解之劑。痞與結胸。有上下焉。邪結在胸中。故曰陷胸湯。邪在心下。故曰瀉心湯。黃連黃芩皆苦寒。經曰。苦先入心。以苦泄之。是以黃連為君。黃芩為臣。以降陽而升陰也。半夏辛溫。乾薑辛熱。經曰。辛走氣。辛以散之。故以半夏乾薑為佐。以分陰而行陽也。甘草甘平。參朮甘溫。陰陽不交為痞。上下不通。

為滿欲通上下。交陰陽。必平其中。中者脾胃也。脾不足者。以甘補之。故用參朮。甘為使。上下得通。水升火降。則痞熱自消矣。

真武湯 太陽病發汗過多。心悸。有水頭眩。筋惕身顫。動振振欲擗地者。此方主之。

茯苓 三兩

白朮 二兩

芍藥

生薑 各二兩

附子 一枚 炮

水八升。煮三升。溫服七合。日三服。

經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。汗多而心悸。有水。此心亡津液。腎水反上而陵心。虛邪內動。筋肉

刺繡願生微論

卷四

聖本

失養。故跳動也。成氏曰。真武。北方水神。屬腎。應水。水在心下。邪帶表而屬陽。必應發散。故治以真武。滋茯苓甘平。白朮甘溫。脾惡濕。腹有水氣。則脾不治。脾欲緩。急食甘以緩之。故以茯苓為君。白朮為臣。芍藥酸寒。生薑辛溫。經曰。濕淫所勝。佐以酸辛。故以為佐。附子辛熱。經曰。寒淫所勝。平以辛熱。故以為使。今之汗多。而成顫動之症者。多矣。醫者畏附而不投。病者亦其斃而不悟。於是夭折者多矣。古人惓惓立方之意。其謂之何。

真武湯 主傷寒腹中急痛。

膠飴一升

甘草一兩

桂枝三兩

芍藥六兩

大棗十二枚

生薑五兩

水七升。煮三升。去滓。納膠飴。微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不用建中。以甜故也。

邪氣入裏。與正氣搏。則腹痛。太陽腹不痛。少陽有胸脇痛。而無腹痛。陽明腹滿痛。此為裏實。宜下之。三陰下痢。而腹痛者。裏寒也。宜溫之。陽氣傳太陰。而痛。其症有二。腹滿便閉。按之痛者。實也。宜下之。腸鳴泄利。而痛者。虛也。宜與建中湯。成氏曰。脾應中央。有不調。則榮衛失所。有津液失所。行必以

刪補願生微論

卷四

四

此湯溫建中。藏故建中名焉。膠飴甘溫。甘草甘平。脾欲緩。急食甘以緩之。故以飴為君。甘草為臣。桂枝辛熱。辛散也。潤也。榮衛不足。潤而散之。芍藥酸寒。酸收也。泄也。津液不逮。收而行之。是以桂枝芍藥為佐。生薑辛溫。大棗甘溫。胃者衛之源。脾者榮之本。黃帝鍼經曰。榮出中焦。衛出上焦。是已。衛為陽。益之必以辛。榮為陰。補之必以甘。辛甘相合。脾胃健而榮衛通。是以薑棗為使。

梔子豉湯

主汗吐下後心煩不得眠。心中懊憹。

梔子十四枚

香豉四合

水四升。先取梔子。取二升半。去滓。納豉。更煮取一

升半。分二服。溫進。一服得快。吐者止後服。

成氏曰。經曰。其高者因而越之。其下者引而竭之。中滿者瀉之于內。其有邪者瀉形以為汗。其在皮者汗而發之。治傷寒之妙。雖有變通。終不越此數法也。邪氣自表傳裏。留于胸中。為邪在高分。則可吐之。所吐之症亦自不同。如不經汗下。邪氣蘊鬱于膈。謂之膈實。應以瓜蒂散吐之。若汗吐下後。邪氣乘虛。留于胸中。謂之虛煩。應以梔子豉湯吐之。梔子苦寒。經曰。酸苦湧泄為陰。湧者吐也。是以梔

刪補願生微論

卷四

四

子為君。煩為熱。勝湧熱者必以苦。勝熱者必以寒。香豉苦寒。是以為臣。經曰。氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。過其所以為治。依而行之。所謂良矣。愚按。心中懊憹。若無燥屎。大便更者。吐症也。若有燥屎。不大便者。下症也。毫釐疑似之間。關人生死。奈何不悚然懼耶。

抵當湯 主身黃如狂。屎黑。喜忘。皆畜血症也。

水蛭三十個

蟅蟲三十個

大黃三兩

桃仁三十個

水五升。煮取三升。溫服一升。未利再服。

成氏曰血畜于上非大毒跌劑不能抵當故曰抵
當湯經曰鹹勝血故以水經鹹寒為君苦走血血
結不行必以苦為助故以蟲蟲苦寒為臣肝者血
之源血聚則肝燥肝苦急食甘以緩之散血緩
肝故以桃仁苦甘為佐濕氣在下以苦泄之血亦
濕類也是以大黃苦寒為使

凡味羌活湯 上兩感傷寒及四時不正之氣憎寒
壯熱頭疼身痛口渴人人相似者

羌活 二錢 防風 五分 蒼朮 一錢

細辛 三分 川芎 三分 白芷 一錢

刪補順生微論

卷四

五十

黃芩 一錢 甘草 三分 生地黃 一錢

右生薑三片葱一莖水煎服出汗用熱止汗用溫
兩感為灰症其人壯盛者猶可活百中之一黃芩
生地為裏熱之藥羌活細辛為解表之藥乃和平
表裏之輕劑耳吳崑曰非其時而有其氣長幼之
病多相似藥之辛者得天地之金氣于人則為義
故能匡正而黜邪羌活蒼朮細辛皆辛物也邪在
太陽治以羌活邪在陽明治以白芷邪在少陽治
以黃芩邪在太陰治以蒼朮邪在少陰治以細辛
邪在厥陰治以川芎防風為諸藥之卒徒至地去

血熱其草和諸藥而除氣中之熱易老自序云冬
可治寒夏可治熱春可治溫秋可治燥是諸路之
應兵也但陰虛氣弱之人非所宜與

清燥湯 治元氣不足濕熱乘之遍身痠痛或肺受
火邪腎無所養小便赤少大便不調腰腿痠軟口
乾作渴體重麻木頭目暈眩飲食少思自汗盜汗
肢體倦怠胸滿氣促

黃耆 一錢 五味子 九粒 黃連 炒

神麴 炒 猪苓 柴胡

甘草 二分 蒼朮 炒 白朮 炒

刪補順生微論

卷四

五十一

麥門冬 去心 陳皮 生地黃

澤瀉 白茯苓 去皮 人參 去蘆

當歸 升麻 各三分 黃柏 酒拌

右水煎服

金者水之母也氣者水之源也肺被火傷真氣不
足絕寒水生化之源則水液衰涸金燥轉增而諸
症作矣黃耆甘溫益元氣而實皮毛用以為君人
參茯苓麥冬五味扶其不勝之金地黃當歸黃柏
澤瀉救其衰微之水二朮補金宮之母升麻法春
令之升黃連神麴陳皮甘草猪苓滲中州之濕熱

亦顧母救子之法也濕去熱清燥金獲潤則水出
高源何疾不廖哉

葛花解酲湯 專治酒積上中下分消

白豆蔻

砂仁

葛花 各一錢

木香 一分

青皮 六分

陳皮

白茯苓

猪苓

人參 各三錢

白朮 炒

神麴 炒

澤瀉

乾薑 各四分

水二鍾煎一鍾服

麴蘖之積令人腹痛益中州受傷氣逆而濕鬱也

刪補願生微論

卷四

五三

豆蔻砂仁推逆氣有功且兼辛散之力葛花獨入

陽明令濕熱之毒從肌肉而解故以三味為君解

上焦之醒也茯苓猪苓澤瀉令濕熱之毒從小便

而出故以三味為臣解下焦之醒也參朮木香二

皮乾薑中氣賴以調和濕熱搗其巢穴解中焦之

醒也

人參安胃湯 治脾胃虛熱嘔吐或泄瀉不食

人參 一錢

黃芩 一錢

生甘草 五分

炙甘草 五分

白芍藥 七分

白茯苓 四分

陳皮 三分

黃連 炒 一分

右水煎服

脾胃虛傷補中益氣或四君子異枚故可也此獨

于甘溫劑中加芍藥之酸寒黃連之苦寒蓋因下

虛而內有燥熱故暫用以伐其標也白朮為補胃

正藥何不用乎必之名安胃與補胃不同胃氣純虛

本為要品今雖虛而有燥熱則胃不安也故不用

本者懼其燥耳以三錢之參耆投以二分之炒連

與世俗之肆用苦寒者自有別也

竹葉黃耆湯 治胃虛火盛而作渴

竹葉 一錢

黃耆 一錢

生地黃

刪補願生微論

卷四

五三

麥門冬

當歸

川芎

甘草

黃芩 炒

石膏 煨

芍藥

人參 各一錢

右水煎服

夫胃氣大虛苦寒甘寒皆在禁例此云胃虛者其

人居恒胃虛而又為火邪迫之則水精不能上輸

乃為煩渴是非中暑之餘殃即是傷寒之遺害以

竹葉清心用為主劑石膏甘草入陽明而滌熱

黃芩麥冬直入太陰以清燥火在則血液不凝

地黃芍歸潤澤之品也血主濡之也胃虛則氣逆

不克用人參黃耆甘溫之品者氣主煦之也芍藥
渴東方安胃土之仇讐也心肺俱清肝脾俱治則
水精四布五經並行何煩渴之不痊哉

竹葉石膏湯 治胃實火盛而作渴

竹葉

石膏

桔梗

木通

薄荷

甘草

右水煎服

陽明外實熱解肌陽明內實承氣攻滯此云胃
實非有積留但多陽增耳火實則南方必盛以抑
其瀉之火亢則西方必囚以桔梗救之薄荷清其

刪補顧生微論

卷四

五

上水通清其下石膏甘草直入戊土而清其中二
焦之火皆平則水精上輸于肺水道下輸膀胱燔
蒸若掃而津液自克矣

四七湯 治七情鬱結心腹絞痛或為膨脹

人參

官桂

半夏

甘草

右薑三片水煎服

夫七情過極皆傷其氣怒則氣上喜則氣緩悲則
氣消恐則氣下驚則氣亂思則氣結丹溪以越鞠
氏主之而此獨異者蓋鬱久則濁氣不通為閉塞

成冬之象而清氣日以薄矣故心腹雖痛胸膈雖
膨而不與木香厚朴但用人參以壯主氣之藏自
桂以制謀慮之官久鬱生痰半夏為之祛逐久鬱
不和國老為之調停况桂性辛溫疏氣甚捷譬如
陽春至而閉塞通鬱結者還而為和暢矣湯名四
七者以四味治七情也

犀角地黃湯 治血虛火盛吐衄發行溺血便血

犀角

生地黃

白芍藥

牡丹皮

右水煎去渣入犀角末服之如因忿怒致血者加

刪補顧生微論

卷四

五

山梔柴胡

血陰位也主乎靜定者也陽火擾之則不得安其
靜定之常或從口鼻或從二便妄行而不止法當
急治之察陰氣至純者莫過于犀角得濁陰下降
者莫過于地黃白芍酸收丹皮清降涼血止血之
要品瀉南實北之神方也因于怒者氣必逆上故
加山梔以屈曲下行肝喜疎泄故加柴胡以達其
水鬱本用四味獨名犀角地黃者所重在二味白
芍丹皮不過佐助耳

通黃飲子 治腎氣虛弱語言蹇澀足膝痠廢

熟地黄

已戟去心

山茱萸

肉苁蓉

去甲

附子

炮

五味子

石斛

白茯苓

石菖蒲

遠志

去心

肉桂

麥門冬

右各一錢入薄荷少許薑三片棗一枚煎服

腎之脉出然谷循內踝上踹及股故虛則足痿不能行其直者挾古本故虛則言寒不能言地黃已

戟茱萸菖蒲精不足者補之以味也附子官桂陽

不足者溫之以氣也遠志菖蒲使心氣下交也麥

門五味壯水之上源也茯苓石斛走水穀之府化

劑補順生微論

卷四

五

榮衛而潤宗筋者也不及肝者腎肝同治也諸臟

各得其職則筋骨強而機關利寒濕痿廢失復何

虞

清胃湯 治膏粱之變癰瘡之災唇齒作痛或潰爛

生瘡甚而頭面頸項俱痛

黃連

五分

當歸

生地

各一錢

牡丹皮

一錢

升麻

二錢

石水二鍾煎一鍾服

胃者水穀之海一切飲食之毒陽明先受之口齒

者胃之應也內毒醞釀積熱熏蒸則病顯于外故

口齒瘡潰而疼痛不已諸痛屬實也升麻為陽明

之引經且症在上者尤為相宜也用以為君黃連

之苦本歸丙丁得升麻則引而入胃矣況諸瘡痛

痒皆屬心火故用以為臣歸地益陰殺其亢烈之

威丹皮下行開其一面之路而倉廩之官獲有寧

字矣加犀角連翹甘草無非瀉其南方為瘴濕者

設也

調中益氣湯 治勞傷元氣肢體倦怠脾肺虛弱自

汗盜汗內熱作渴等症

黃耆

一錢

人參

甘草

劑補順生微論

卷四

五

當歸

白朮

各五

白芍藥

柴胡

升麻

各三

陳皮

二分

五味子

十五

水二鍾煎至一鍾去渣溫服

此方但于補中益氣加白芍五味而已補中益氣

純用甘溫但行春升之令此加酸斂兼持秋肅之

體氣虛多汗散而不收如夏氣之蒸薄也金商一

奏而炎散如夫矣蓋有升有降能發能收則天地

交通宛葉生遂此東垣先生別行一路以廣補中

之妙者乎

大承氣湯 治畜血中焦腹中急結下利膿血

桃仁五箇 桂心舊誤 芒硝

甘草各二錢 大黃四錢

水二碗煎一碗去渣內芒硝待沸溫服

腹中急結緩以桃仁之其中焦畜血散以官桂之辛蓋甘以緩之辛以散之也熱甚血凝或乾閉或下膿血非硝黃不足以徹其藩籬入甘草者欲其委曲搜剔不欲其一往而盡耳按犀角地黃湯治上焦之血抵當湯治下焦之血此治中焦之血宜用桂心舊本誤作桂枝成氏隨文順釋不足據也刪補順生微論

今改正之

卷四

五

升麻葛根湯 治脾臟發欬欬而右脇痛痛引肩背甚則不可以動及無汗惡寒陽明發痲欲出未出以此發之

升麻 白芍藥 甘草各二錢

葛根三錢

右水二鍾煎一鍾服

右脇者脾胃之鄉也屬手陽明之脉也痲繇胃熱胃主肌肉用升麻葛根正入陽明而逐其邪熱佐之以芍藥和其營也俾無伏匿之

邪也其治發痲止宜于將出者若已出而用之重虛其表反增痲爛矣

升麻六物湯 治赤痲口瘡赤爛

升麻 梔子各一錢 大青

杏仁 黃芩各一錢 蔥白三莖

水二鍾煎一鍾溫服

痲者肌肉之症應在陽明或失汗或失下或下早或下遲或陽虛誤溫則熱甚傷血裏實表虛皆為痲症口亦陽明之應熱上蒸迫故瘡赤而爛也以升麻為向導之兵以青梔為解紛之客杏仁佐升麻補順生微論

卷四

五

麻黃湯 治邪氣外宣火威下抑中州之禍吾知免夫

天黃黃連瀉心湯 治心下痞按之濡關上脈浮

大黃五錢 黃連五分

右取沸湯泡須臾去渣溫服

仲景曰心下痞明明在胃脘矣用大黃黃連瀉胃中濕熱非瀉心也病發于陰而下之則痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于胃脘胃之上脘正當心下故名瀉心實則瀉胃也詳見大黃條下不用煎煮但取湯漬者瀉虛熱者且氣薄也

四逆湯 治陰症脉沉身痛太陰自利不渴

附子 三錢

甘草

乾薑 各一錢五分

水鍾半煎八分服

脾為太陰而主四肢四肢厥冷繇于真火無光無氣以布也寒傷營衛則身痛幽門氣衰則不禁有水無火故不渴非附子斬關之將將有噬臍之悔矣得乾薑則達中州貫至高而陽氣可回耳偏于燥熱恐有喜攻之害甘草以緩之赫曦轉為青帝矣

○散方十二首

散者散也主于散去病邪較先劑則功速較煎劑則功緩補劑亦有

別補順生微論

卷四

六十

散者則又以前為義往往為脾胃之方也

瓜蒂散 主胸中多痰氣上衝咽喉不得息

瓜蒂 炒黃

赤小豆

各等分

右為細末取一錢用豉一合湯七合煮作稀糜去滓取汁和散頓服之不吐少少加得吐乃止諸亡血虛家不可與服

華陀曰四日在胸可吐之通而奪之之法也千金

方曰氣浮上部胸中滿者吐之經曰濕氣在上以苦吐之瓜蒂苦寒是以為君經曰酸苦湧泄為陰赤小豆味酸是以為臣香豉苦寒苦以湧泄寒以

勝熱是以為使吐中之駛劑重亡津液之藥也

稀涎散

主中風暴仆痰涎壅盛此藥取吐

牙皂

四條去皮弦炙 白礬

精一兩

共為末每進三字水下

經曰邪風之至疾如風雨又曰暴氣象雷又曰陽氣者閉塞又曰狗蒙招尤曰冥耳聾皆言陽氣之乘人以明症之急且重也巢氏曰清陽在上濁陰在下天冠地履無暴仆也若濁邪逆湧清陽失位故暴仆而多痰耳經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本故不與疎風補虛而先吐其痰

別補順生微論

卷四

七

涎白礬酸苦經曰酸苦湧泄故以為君皂角辛鹹經曰辛以散之鹹以軟之故以為佐此固奪門之兵也咽喉疏通能進湯液便止若攻盡其痰則無液以養筋令人孳急偏枯此大戒也

平胃散

治脾濕痰飲痞隔或嵐氣霧露不服水土

蒼朮

陳皮

去白

厚朴

薑汁炒

甘草

炙三兩

共為末白滾湯點服

濕土太過謂之敦阜腎挾肝邪侮所不勝土不能制留于中焦故痞隔也嵐霧之毒水土之症陽明

虛者受之。若水甘燥，甘則入脾，燥則勝濕，故以君厚朴苦溫，溫能益脾，苦可下氣，故以為臣佐。以陳皮之辛，正下行之令，和以炙甘草之甘，為向導之兵，濕氣分消，故早以平，所以有平胃之名也。

參苓白朮散 治脾胃虛弱不進飲食或瀉或嘔

人參 去蘆 茯苓 去皮 白朮 土炒

甘草 炙 山藥 炒 扁豆 去殼炒

砂仁 炒去衣 桔梗 炒去蘆 薏苡仁 炒

蓮肉 各二兩 各去衣及心

右共為末，薑棗湯調服。

刪補順生微論 卷四 六

脾胃屬土，土為萬物之址，故東垣曰：脾胃虛則百病生。然則調理中州，其首務也。脾悅甘，故用人參、甘草、芍仁、脾喜燥，故用白朮、茯苓、脾喜香，故用砂仁、心、生脾，故用蓮子、治心、土惡水，故用山藥、治腎、枯梗入肺，能升能降，所以通天氣于地道，而無否塞之憂也。

玉屏風散 主氣虛表弱，自汗，易感風寒。

黃耆 炙 防風 各一兩 白朮 土炒

共為末，每服三錢，白湯下。

衛氣虛薄，則玄府不閉，陽不能固，自汗乃出。黃耆

其溫專克肉分，是以為君。防風入肺，貫徹皮毛，故東垣曰：黃耆得防風而功愈大，是以為臣。白朮其溫入脾，脾主肌肉，故以為佐。以其善補衛外，足為吾身之倚庇，故玉屏風之名立焉。

六一散 主中暑身熱煩渴，小便不利。

滑石 六兩 白礬 甘草 一兩

右為末，每用五錢，新汲水調服。

身熱煩渴，陽明症也。小便不利，太陽症也。滑石味

甘淡，其入中央，淡則五臟無歸，專入太陽，利便，滑

則利竅，不獨小便也。故以為君。然石性大寒，能傷

刪補順生微論 卷四 七

中州，太滑能滲真氣，經曰：以其緩之，故用甘草為佐。經曰：治溫以清涼而行之，故用新汲水調。夫天一生水，地六成之，此太陽寒水之數也。經曰：寒勝熱，此方專主丙丁，故有取于六一之數焉。

二妙散 主濕熱為患，腰膝疼痛，不能行動。

黃柏 乳酒 蒼朮 土炒

右二味，等分為末，空心酒下，一錢。

溫性有乾下之美，故其病在下。以下，濕則生熱，溫熱相搏，其痛乃作。黃柏味苦，性寒，且能下行，故以為君。蒼朮性燥，能勝濕，且能辛散，故以為佐。

黃柏可去熱中之濕。營木可去濕中之熱。兩者相縮。各有妙用。故曰二妙。

十灰散 治嘔血吐血。咯血。嗽血。此方止之。

大蓴

小蓴

柏葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

梔子

丹皮

棕櫚皮各等分

右燒灰存性。研細。碗蓋地上一夕。出火毒。用時先

將藕汁或蘿蔔汁。磨京墨半碗。調服五錢。

血屬陰。反從火化。故其色赤。為陽所動。則血菀于

劑補順生微論

卷四

六四

上使人薄厥。黑屬壬癸。見黑則止者。太見水而伏

也。故用灰與墨汁。苦澁之味。聚而閉者。若能勝火

澁。可固脫。更得童便引之下行。尤善。初伏之妙。勝

于蘿蔔藕汁也。

霍香正氣散 治外感風寒。內傷飲食。頭痛寒熱。或

霍亂洩泄。或作瘧疾。

桔梗

大腹皮

厚朴製

升麻

茯苓各一錢

甘草分五

藿香一錢五分

紫蘇一錢

右薑三片。棗一枚。煎熱服。

正氣旺。則皮毛充固。外無感冒之虞。脾胃健行。內

無停食之患。正氣稍有不足。外感內傷。交作以并。

桔紫蘇。辛甘發散。其外邪。厚朴大腹。苦辛宣通。其

內滯。更以藿香為君。主內可和中。外可解表。統領

諸劑成功。正氣賴以復矣。故名藿香正氣。

不換金正氣散 治脾氣虛弱。寒邪相搏。痰停胸膈。

寒熱為症。

厚朴薑製

藿香

蒼朮薑製

陳皮各一錢

半夏分五

右薑三片。棗一枚。水煎熱服。

劑補順生微論

卷四

六五

正氣。指中氣也。中氣不和。水濕不行。則痰生為患。

蒼朴陳耳。平胃散也。所以鋤胃土之壅。阜而使之

平也。佐以藿香。一身之滯氣皆宣。助以半夏。滿腹

之痰涎盡化。俾正氣得以轉輸。邪氣無繇乘襲。可

貴孰甚焉。雖有黃金。吾不與易矣。故名。

霍亂散 治陰盛。隔陽身熱。脉浮煩燥。欲水

附子一隻

用冷灰埋之。取出細研。入真蠟茶一錢。同研。分二

服。每服水一鍾。煎六分。入蜜一匙。冷服。

陰寒太盛。隔陽于外。此即內真寒而外假熱也。無

根之虛陽在外故脈浮而大按之如無非表邪也煩躁者陰寒發躁水極似火之象欲水者欲生井中爲外有虛熱故也此寒極反見勝已之化雖如冬月嚴寒水泉水堅堅爲陽象反于極寒乃見也若誤以爲熱輕與寒涼須臾之頃便入幽泉矣可不謹諸方名霹靂者卽所謂一聲雷破臘萬象盡回春之義也

紫雪散 治脚氣及暑中三陽所患必熱煩躁發癰等症

升麻六錢 黃金十兩 寒水石

刪補順生微論 卷四 六六

石膏各四兩 犀角 羚羊角各一

玄參六錢 沉香 木香

丁香各五 甘草八錢

水五碗黃金至三碗去金入諸藥再煎至一鍾去渣投朴硝三兩二錢微火煎柳條勿停手攪候欲凝入盆中更下硃砂麝香各三錢急攪令勻候冷凝成雪每服一錢細細嚥之煩躁發癰症在陽明大青升麻用而不效其毒深矣草木無功進求金石黃金中夾陰已之氣合西方從革之行且能鎮定可肅妄炎二石有冰霜之象二角有凜冽之

厚天參補其北米砂瀉其南制以四香無增氣之虞君以朴硝有陰冬之象羣陰並集賴升麻以導入陽明雖有苛毒行且冰消矣方名紫雪者取其色喻其功也

膏方六首之藥不厭煩而少便取其便干頻又

地黃膏 主滋陰降火養血清肝

生地黃酒洗 當歸身酒洗 白芍藥錢一兩五

地骨皮炒 牡丹皮二錢 知母鹽炒

地骨皮炒 人參去蘆 甘草各五

刪補順生微論 卷四 六七

水二斗煎一斗去渣熬煉成膏

夫陰虛者未有不火動苦寒直泄之藥惟病端初起元氣未虛勢方蘊隆脈鼓而數者暫取治標稍久涉虛便不可服王太僕曰治熱未已而中寒更起且足太陰傷而絕肺金孕育之原矣茲以地黃爲君知母爲臣壯天一之水以制丙丁不與之直爭也當歸芍藥以沃厥陰腎肝同治之法也水衰則火旺是以二皮爲鈐制火盛則金衰是以二冬爲外障人參蓮子補金位之母甘草生用所以奉令承使奔走贊成者也若火勢既平而中宮虛弱

者亟進參朮膏以壯倉廩之官

參朮膏 治虛勞之人脾胃虧損或脹或瀉

人參 去蘆 白朮 八兩 炒各 意苡仁 四兩 炒

蓮肉 三兩 去心 黃耆 二兩 炙 茯苓 二兩 去皮

神麴 一兩 澤瀉 炒 甘草 三錢 各

水二斗熬一斗去滓再熬成膏

經曰清氣在下則生殄泄濁氣在上則生脹脹此皆土虛并金亦薄遂失其升降之常耳經曰脾欲緩急食甘以緩之以苦泄之白朮苦甘是以爲君東垣曰脾胃虛則氣不足人參甘溫補氣是以爲

刪補願生微論 卷四 六元

臣氣不足者肉分不克故佐以黃耆土虛則不能生金故佐以苡仁虛則補其母故佐以蓮子土惡濕虛則水寡于畏故佐以茯苓澤瀉土虛則不養散精輪肺故佐以神麴通五方之氣于太陰和諸藥之性而無忤者甘草爲使之方也

人參固本膏 治腎虛肺熱喘嗽煩渴

人參 一兩 天門冬 麥門冬 生地黃 熟地黃 各四

右以二冬二地熬成膏以人參細末和勻時時挑少許置口中嚥化

天一生水故腎爲萬物之元人身之本自伐其元則本不固而勞熱作矣熱則火刑金而喘嗽生焉取二地以補腎爲君精不足者補之以味也取二冬以保肺爲臣虛則補其母也火刑金而肺氣衰非人參莫可救援東垣所謂無陽則陰無以生也倘泥肺熱傷肺之說則孤陰不長不幾于坐而待斃耶

瓊玉膏 治虛勞乾咳

生地黃 四兩 白茯苓 十三兩 白蜜 二兩

人參 六兩

刪補願生微論 卷四 六元

右以地黃汁同蜜熬沸攪勻用絹濾過將參苓爲細末和勻前汁入磁瓶用綿紙十數層加箬封扎瓶口入砂鍋內以長流水煮沒瓶頸用桑柴火煮三晝夜取出換油紙扎口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日白湯點服

乾咳者有聲無痰火來乘金金極而鳴也此本元之病非悠游漸漬難責成功若誤用苦寒祇傷脾胃土金又無母故丹溪以地黃爲君冷水感則火自息也損其肺者益其氣故用人參以鼓生發之元虛則補其母故用茯苓以培萬物之本白蜜爲百

五味子膏

北五味子

一觔水浸一宿去核入砂鍋煎之去渣入蜜三觔共熬成膏須微火爲妙

北方之令主閉藏神氣虛怯則不能收固五味子

味酸酸者束而收斂能固耗散之精有金水相生之妙况酸味正入厥陰厥陰偏喜疎泄乃圍魏救趙之法也一物單行功專力銳更無監制故爲效

七十

神速不可多服久服必有偏勝之患。

龜鹿二仙膠

大補精髓益氣養神。

鹿角十血取者

龜版五自敗者

枸杞子 耳州者三十兩

人參清河者大
者十五兩

右用鉛罈如法熬膠。初服酒化一錢五分。漸加至

三錢空心下。

人有三奇。精氣神。生生之本也。精傷無以生氣。氣傷無以生神。故曰。天一生水。水爲萬物之元精。不足者。補之以味。故鹿角爲君。龜板爲臣。鹿得天地之陽氣最全。善通督脉。足于精者。故能多淫而壽。

伏息而壽一物氣血之屬又得造化之玄微異類

有情竹破竹補之法也人參爲陽補氣中之怯枸

杞爲陰清神中之火故以爲佐是方也一陰一陽

無偏攻之憂入氣入血有和平之美繇是精生而

氣旺。氣旺而神昌。庶幾享龜鹿之年矣。故曰二仙。

白木膏

補胃健脾和中進食

白朮

十觔取淨切片用山黃土蒸之。曬乾。再以
刮去皮。淨切片用山黃土蒸之。曬乾。再
米粉蒸之。
曬乾聽用。

右用水百碗桑柴火煎取三十碗加白蜜二觔熬

七十一

成膏每服一酒杯淡薑湯點服。

太陰主生化之元其性喜燥其味喜甘其氣喜溫

白朮備此三者故爲中宮要藥配以白蜜和其燥

也。且其味重。則歸脾速。陶氏頌云。綠葉抽條。紫花

標色百邪外禦六府內克木榮火謝盡採擷之難

啓旦移申窮淋瀝之劑味重金漿芳躑玉液夫豈

無故而得此隆譽哉

醫案論第

醫之難非處常之難處變之難也毫釐疑似之間

若千里之隔。苟無確然之見。而拘于常。其不大人之
年者鮮矣。余儒者也。鉛槧是業。而又與醫。寧免掛
漏之譏。然沉心綜考之餘。永就倍謹。愚而自用。矢不
敢為。繆辱知信。往往取驗。其瘡處常之症。不敢贅錄。
摘一二治之變者。謹述如左。知我者其惟此案乎。罪
我者其惟此案乎。

吏部少宰蔣恬菴。習禮部時。患手足痠痺。日中視一
成兩。服補血藥不應。改服脾藥。痰藥。精神困倦。余
診得寸口脉大。兩尺獨清。此心腎不交。水泛為痰。
之故也。乃取地黃丸料。作煎劑。倍用澤瀉茯苓。入

補顧生微論

卷四

七十三

青鹽少許。凡六劑而岐視遂收。乃兼進參耆安神
之劑。一月而康復如常。

中田孫待御瀟湘夫人。久病不止。口乾發熱。飲食不
進。猶服香連等藥。完穀不化。尚謂邪熱不殺穀。欲
進茶連數日。不食。熱甚危迫。余診之。脉大而數。按
之極微。詢之。小便仍利。腹痛而喜手按。此火衰不
能生土。內真寒而外假熱也。小便利則不熱可知。
腹喜按則虛寒立辨。進閉于理中湯。得冷與服
一劑而痛止。連進一十餘劑。兼服八味丸而愈。

徽州太學方魯儒精神疲倦。腰膝異痛。不可忍。醫者

皆曰腎主腰膝。乃用桂附之劑。綿延兩月。愈。而
肢痠軟。腰膝寒冷。遂悉服熱藥。了無疑懼。比余視
之。脉伏于下。極重按之。脈指有力。因思陽盛格陰。
乃火熱過。反兼勝已之化。欲用苦寒之藥。駭而
弗從。又半月而寒愈甚。復求治。余曰。寒勢日增。
乃熱毒愈甚也。小便當赤。必畏沸湯。詢之果然。方
能信。余以黃柏三錢。龍膽草二錢。苓連梔子各
一錢五分。加生薑七片為之。向導。乘熱頓飲。移時
便覺腰間暢快。三劑而痛若失矣。用人參固本此
日服二兩。一月而痊安。

補顧生微論

卷四

七十三

孟太宗師胃脘痛甚。狀若感冒。因而廢食。用木香豆
蔻陳皮枳殼理氣之劑。痛勢不減。心脾兩部緩而
且濡。此內傷不足之候也。法當峻補。而原醫者曰。
痛無補法。通則不痛矣。寧敢用此反劑耶。余曰。此
固正劑也。若再進攻伐之藥。請勿復敢見矣。乃進
參耆各三錢。歸朮陳皮各二錢。酸棗仁一錢。服之。
是夕能食。痛勢頓減。調補數日而痊。

同邑郡守張三星。脾胃不和。久患泄瀉。用分利燥濕
之劑。不效。診其脉。右手寸關滑甚。與仁陳痰痰之
藥。再服而瀉止。未幾感冒。發熱惡寒。困倦之甚。診

得六部大而無力。人迎與氣口亦各相當。遂與補中益氣湯連服一月而安。

同邑社友俞敬敷。飲食不均。遂行勞倦。發熱煩悶。症類傷寒。乃禁食不與。比余視之。言語輕微。手背不熱。六脉數而軟。此真氣不足。非有外邪也。力勉其進粥。乃與甘溫大補之劑。格服數日。熱退而安。

同邑吳君明忠。傷寒至六日。譫語狂妄。不大便。眾皆欲用大承氣湯下之。余見其小便清。因思仲景曰。傷寒不大便六七日。頭痛有熱。小便清。知不在裏。仍在表也。欲用桂枝湯。羣然譏議。以爲此陽盛之

刪補顧生微論

卷四

七十四

症。桂枝到口必嘔矣。余曰。汗多亡陽。故發譫語。雖不大便。腹無所苦。和其榮衛。必自愈耳。遂遠衆用之。及夜而笑語皆止。明日大便亦通。故知病變多端。不可膠執。向使狐疑而用下藥。禍不旋踵。

給諫晏懷泉如夫人。時當盛夏。心腹大痛。自汗甚多。清火行氣之藥。遍服弗效。診其左寸。瀉右寸濡。此氣弱不行。血因以阻耳。乃進參耆葛桂桃仁歸尾玄胡索之劑。二劑而痊。調理年餘。再姪生子。感暑而用葛桂。拾時從症也。

江右大學李明奇。素雄壯。忽患左脇痛。手不可近。用

左在左。瀉肝陽。至月餘。痛處漸大。右脇亦痛。不能

行動。神氣如癡。惚惚若有所失。面色黃。兩關脉促。此畜血已深。非快劑不下也。用桃仁承氣湯。一服

不動。再加乾漆生大黃五錢。下血塊十餘枚。痛未全減。又下數枚。如雞子大者。痛遂止。神乃爽。然惟見困倦。先與獨參湯。再用八珍湯。調理三月而康。

南都許輪所孫女十八歲。患痰嗽。夏月診之。太陰搏指。少陰如爛綿。其爲水衰而火乘金。了然可見。余曰。金以火爲仇。今不浮濤而反洪大。賊脉見矣。腎水又不能救。秋金之令可憂。至八月初五日診之。

刪補顧生微論

卷四

七十五

忽見肺之洪者。變而爲細。腎之軟者。變而爲大。余曰。歲在戊午。少陰司天。洪當兩尺不應。今尺當不應。而反大寸。當浮太而反細。余曰。尺寸反者。死。况肺部如絲懸。懸欲絕。經曰。肺脉懸絕。十二日死。計其期。當必于十六日。然而安穀者過期。不安穀者不及期。以飲食不減。故當踰期。况十六十七二日皆金助其旺氣。安得遽絕。十八日交寒露節。又屬火日。經曰。手太陰氣絕。丙日篤。丁日死。言火日也。寅時乃氣血注肺之時。不能注則絕。必必于十八日寅時矣。輪所聽之。潛然淚下。自謂能救。猶不肯。

信果至十八日未曉而終。

閩中太學張仲輝喜食瓜果縱飲無度忽患大瀉先
用分利不應再用燥濕反加沈困余見其六脉皆
浮因思經曰春傷于風夏生飧泄非汗不解以麻
黃三錢人參白朮各二錢甘草升麻各一錢與之
有醫者笑曰書生好奇妄用險峻傷寒且不輕用
麻黃此何病也而以殺之耶仲輝惑之既而因其
嘆曰吾已將灰姑服此藥以倖萬一遂前服之覆
取大汗泄瀉頓止以四君子調治而痊遺書謝曰
頃以放縱蒙此奇病藥劑難授無益反害風世有

刑補順生微論

卷四

十六

緣得兄手援而庸夫謹阻幾至敗亡天未絕窮於
沈困之中結肝腸之信一七纔投病邪立解麻黃
人參人視之如鴆毒兄用之如美丸竟救餘生以
有今日淪肌沁骨之感永劫難忘敢忘報耶。

海寧刑部王政許同生令愛痢疾腹痛脉微而軟余
曰此氣虛不能運化其窘迫後重乃下陷耳用升
陽散火湯一劑繼用補中益氣湯數劑而愈。

同邑業師吳玄水如夫人吐血發熱上氣欬嗽其脉
大而虛心部尤甚此氣虛不能攝血忌用降火之

藥遂用歸脾湯加乾薑數服血止熱退而安。

五家嫂發熱煩渴胸腹痛甚肢節皆疼服理氣降火
和血之藥不效余診其脈緊而非數乃中有痼冷
也遂用八味丸料加人參服之數劑而霍然。

江西學憲黃貞父患腸風下血久用四物湯參連櫻
花之屬屢發不止面色頗黃診其脉惟脾部浮而
緩此土虛而風濕交乘也遂用蒼朮三錢茯苓人
參黃耆升麻柴胡防風各一錢進四劑而血止改
服十全大補湯調養而愈。

同邑社友宋敬夫患心腹大痛遂不敢食服行氣消
食溫中諸藥不效診其左寸滑而急視其氣不能
刑補順生微論

卷四

十七

以息偶得一效痛楚難支余曰此為心疝無疑非
有食也亟進米粥以小茴香吳茱萸玄胡索木通
川練耳草煎成加食鹽少許一劑而痛止數劑而
安。

嘉善孝廉葉行可腹脹而瀉腸風下血用涼血行氣
之劑反滾不快用黃柏知母胃氣愈傷飲食減少
余曰此土氣虛甚因而下陷不能攝血也以異劫
散加升麻乾薑數十劑而痊。

浙江太學俞望之鬱熱嘔吐余授以方曰四劑可止
用竹茹白檀各三錢陳皮茯苓各二錢甘草一錢

煎成加薑汁五匙和勻熱服望之曰昨得一方與此相類服而不效何也余曰熱甚而嘔口有冷氣此火梗似水之象須涼藥熱飲方得素問之旨前所服必不甚熱耳第熱飲之必當速愈已而果驗同邑張少椿女以喪子悲傷忽當雷雨交作大恐若無所避且日或泣或笑或自語或罵詈如中鬼祟診其心脉浮滑餘皆沉細此氣血兩虧憂恐傷心心傷則熱熱積生風也以滾痰丸用桔梗玄胡索陳皮杏仁煎湯送下出痰積甚多而愈

兵尊高懸關老公祖患兩足酸軟神氣不足向服安

劑補願生微論

卷

七

神壯骨之藥不效改服滋腎牛膝苡仁二妙散之屬又不效純用血藥脾胃不實召余診之脉皆沖和按之亦不甚虛惟脾部重取之濡而無力此土虛下陷不能制水則濕氣墜于下焦故膝脛為患耳進補中益氣倍用升柴數日即愈夫脾虛下陷之症若誤用牛膝等下行之劑則愈陷此前藥之所以無功也

邑宰裴儀仲太夫人年已八衰戊寅新髮儀仲遠任閩邑愛思不已偶因暑浴遂患發熱頭痛醫者以為傷寒棄其食而肆行解散越三日氣高而喘汗

出如洗昏冒發厥業已治兩事始問治于余余診其脉大而無力乃為之辨曰外感發熱手背為甚內傷發熱手心為甚外感頭痛常痛不休內傷頭痛時作時止今頭痛無定而手背不熱是與虛也與外邪無涉即進食補中猶懼或失之反禁食攻表安得不敗乎遂用人參黃耆各五錢白朮半夏各二錢橘紅一錢甘草六分原醫者為之咤曰喘為氣逆此藥到咽即不可救舉家驚疑不決余百口陳辨甫授一劑喘汗減半更信用參朮二劑症減七八惟飲食不進耳余曰火衰不能生土但于

劑補願生微論

卷四

七

原方加附子一錢五分乾薑一錢十劑而食進調理三月計用參二斤而安

新安吳修予令姪煩躁發熱肌體骨立目不得眠已三年矣大江以南迎醫幾遍非清熱養陰即化痰安神藥劑及千求一刻安臥不能也時寓嘉定盧店中迎余視之肝脉獨沉而搏此怒久久伏木鬱宜達也用柴胡四錢白芍藥二錢丹皮山梔各二錢五分枳實五分桂枝四分日哺進劑未及黃昏而肝脉熱寐達旦未寢伊兄某伯大為憂惶余曰卧則兔歸于肝三歲不歸疲勞已極譬如久熱

得涼樂而忘返。無足懼者。至于方輿喜不自禁。從床褥叩首曰。積患沉痾。自揣必斃。三年之病。一朝而起之人。非土木感極涕零。索余方。惟道隨散。加人參而已。一月之後。頓復康和。

楚中中翰秦五梅奉

旨祭墓董玄宰。昏倦發熱。頭痛惡風。郡侯方公祖命余診之。余曰。中氣大虛。元氣下陷。陽氣不克。而頭痛。形氣衰少。而內熱。用調中益氣加葛根一劑。而愈。再煎而起。更製脾腎兩丸。俾服踰月。而健旺倍常矣。

荆補順生微論

卷四

翰林掌院楊方壺夫人。怒後飮食停滯。作痛。每用枳朮枳朮。七日無功。商治于余。遂以六君子湯加玄明粉投之。宿垢頓下。滯痛雖除。昏倦不能進食。稍得食。便泄瀉困乏。難狀。日用人參一兩。熟附三錢。黃耆白朮肉果各二錢。甘草六分。半夏一錢。間以六君子補中湯調理。參必一兩。附必三錢。百日之內。未嘗少間。越五月。服人參至八觔。薑附至二觔。方復居處之常。

太學姚三省。膈噎嘔吐。或重清火。或與疎通。或與化痰。或與散鬱。居肆載而愈。甚。余曰。氣口無力。兩尺

遲難。脾腎交虛之診也。脾虛則升降失職。而痰起中焦。腎虛則真火衰微。食難運化。與白朮五錢。炒令焦色。半夏二錢。炮薑二錢。沉香一錢。一劑而嘔吐減半。再劑而食進。凡二十日。而善啗如湯沃雪。余亦不意其速効至此。

相國楊文老。歷吾郡督兌時。與余有生平。垂顧就診。極言痰氣作楚。喘急而不能食。遍體作痛。服清氣化痰。無異服水。何也。余曰。豈止無益。翻受害矣。肥人氣。居于未。中氣必虛。脾弱不能勝濕。氣虛不能健運。是以多痰而喘。盡用四君子。加望夏。佐以薑

荆補順生微論

卷四

十一

泚。可數劑已也。遂倍服之。計下車至起行。凡七日。而痰喘果平。

文學金伯含。三年吐血。計二冬。二母四物之類。不啻五百劑。形容憔悴。面色痿黃。咳嗽喘急。每歲必吐血數次。漸至一月而吐五六次。苦不可支。悉簡所服方案。專求商治。余細診之。沉而不浮。尺小于寸。右弱于左。色天而血黯。不覺喟然嘆曰。此陽氣本虛。寒涼復傷之。肅殺之氣。色脉並告矣。夫復何疑。遂用生脉散。加肉桂一錢。熟附一錢。甘草五分。一劑而安然。再劑而嗽減。伯含曰。溫劑若不相宜。則

火速于桴鼓兩投而勢減鬱症可知而今而後甫有生機矣連進十劑血果不來喘嗽頓止更以八味此理中此交進半截而瘳

學師楊龍友如夫人發熱頭疼昏倦煩悶六日之後忽見紅點衆皆以爲發瘵用升麻犀角之類五日以來轉增煩悶紅點不退迺余視之脈浮而大皆有頭粒此太陰之瘵非陽明之瘵也瘵爲熱毒蘊于肌肉法當清火瘵爲風邪客于皮毛法當宣揚一表一裏奚啻天淵乃用防風二錢荆芥一錢前胡桔梗獨活甘草治之三劑而點多三劑而瘵透刪補顧生微論 卷四 八十五

調理半月而安夫瘵爲陽邪太忌苦寒過其宣發誤作瘵治適與相反其不斃者幸而免耳

武林俞王士年甫三旬怒後發渴飲水過多且日肢體俱腫腹脹異常乞診于余余曰年方壯而病發于驟脈方實而藥不厭攻若不急于疎通積久必成大患以胃苓散加牛膝車前三進而不爲少動是病深藥淺也更以升車神祐丸再進而小便泉湧肢體漸收更與胃苓湯加白木椒仁十五日而瘳

薛吳子之九子之甥也出閣時患腹痛食少面黃

體瘦幼科多以退熱消積治之女科多以通經行血治之大方以爲虛而議補俱不效比余視之脈大而尺獨數肌膚甲錯爲小腸有瘕膿已成而潰矣亟與蔡根一兩皂刺二錢銀花三錢甘草節一錢陳皮二錢再劑而膿血大潰更以六乙膏同參者治之一月始安

剛補願生微論四卷

浙江巡撫
採進本

明李中梓撰中梓字士材華亭人是編初稿定於
萬厯戊午已刊板行世崇禎壬午又因舊本自訂
之勒爲此編凡二十四篇曰三奇曰醫宗曰先天
曰後天曰辨妄曰審象曰宣藥曰運氣曰臟腑曰
別證曰四要曰化源曰知機曰明治曰風土曰虛
癆曰邪祟曰傷寒曰廣嗣曰婦科曰藥性曰醫方
曰醫藥曰感應門類類爲冗雜三奇論中兼及道
書修煉如去三尸行呵吸等法皆非醫家本術也

鐫補雷公炮製藥性解六卷


〔明〕李中梓輯

中國中醫研究院圖書館藏明天啓二年刻本

附《四庫全書總目·雷公炮製

藥性解六卷》提要

藥性解序



余讀仲景之叙醫輒為之掩卷
蓋其感生死之茫忽薦君父之
危殆賤名利之浮榮冀年壽以
沒世傷哉其言焉得不原本藥
性加意候診者乎三皇御宇太
皞首畫八卦開萬世道術之祖
而神農編嘗百味黃帝著為素
開跡其鼎足揚化醫之用居多
今考本經所載草木鳥獸等類

則乾木果震萑葦坤子母牛兌
羊艮狗之說酸醎有五味之別
青黃有五色之分則坎水離火
震木兌金坤土之說定浮沉明
燥濕則本天本地親上親下之
說立君臣分佐使則君一民二
之說有畏有喜有惡有反則吉
凶利害之說有補有瀉有正治
右治則變通趨時之說無非
大易之源流八卦之分布聖人

所以順風氣而防天札者端不
越此自太史公著扁倉論以為
美好者不祥之器而儒者又好
自張大置賢於九流之中欲如
皇子之論當心東里之辯六氣
文摯止疾於齊王枚乘霍然於
太子豈可得哉余以少孤不及
搽藥以進慈父間為母氏嘗之
退而考諸方書多所不合斯用
痛心乃於讀書之暇發本經仙

經暨十四家本草四子等書靡
不悉究然後辨陰陽之所屬五
行之所宜著藥性解二卷敢謂
拯危濟殆於是焉賴特以志予
之悲為人子事親之一助爾且
夫甘旨以養之溫清以奉之而
卒罹夫不可療之灾欲代則不
能欲遍訪而證諸人則不及此
人子終天之恨仲景氏傷之余
所不辭而為之縷析者也若夫

素問一書軒岐之精蘊在焉亦
欲訂其同異而折衷之期於剖
微而止敬以異日公之同好

雲間李中梓撰



藥性賦注解炮炙合序



著神農本草三卷計藥三

百六十五種漢魏唐宋以

來日增月益或五百九十

藥性賦全序

五或四百四十一或三百一

十九受病既多用藥亦廣

地分南北人異剛柔固不

可一律齊也且窮鄉下邑

書不能脩醫亦庸，于是

李東垣先生有藥性賦焉

不必朱書墨書圖画形像

而括以韻語分寒熱溫平

藥性賦全序

四類藥止三百二十味以

為君臣佐使迄今奉行于

世而注釋則未遑也

本朝萬曆末雲間李中梓

士材玄禪之暇研精此道
出其以蘊為注二卷可謂
有功於東垣而炮炙則未
遑也余詭雷公所論僭為
條附於各藥之下爰煮脩
子種之俱惠俾後學易於
簡閱討論豈不兼以功於
二李者歟嗟乎醫為人命

大開而讀書不多見理未
徹安能於三指之下霍然
起死回生哉先儒謂予親
者予所以不知醫多儒可
不留心乎若夫三百二十四
校之神農本草三百四十年
百外見其多程見其少然
調劑之宜依方用之罔不

霍然也者多乎哉仁人君子諒能辨之矣多雷公者乃劉宗時人名數能藥對之雷公也藥對雷公乃軒轅時人子翁附扁鵲同時古之神醫墨宗雷公姓偶相同亦見雷氏世有明醫也茲因太末翁氏清刻乞

序再論及之

天啓壬戌仲夏既望吳郡八十二翁錢允治撰



一藥性之刻無虛究揀然有性味者無經絡之歸有定製者無選錄之法有善之有無大小者無使反畏惡之品有此刻未備或刻悉之及此刻所載或刻又缺前校極構迄無全書今先味次性次有毒無毒次入某經絡次主用次辨真偽美惡次製法次佐使次畏惡因而援諸家之說參管窺之見解具一二凡藥之性靡不精詳悉備使學者一覽無餘矣

藥性解九例

一舊本諸刻往往言藥之能不言其所以能如性熱者有此效而寒者亦有此效味辛甘者有此效而酸苦者亦有此效遂使庸醫不察或兼而用之或反而用之漫無主張悞世不淺今推五行所屬之理為之解註且明言有某症者不宜用之或不宜多用久用雖令初學處劑亦無妄投之失矣

一舊本向著功而方書不傳其用者不敢混錄以滋好奇之弊或方書屢稱其驗而舊本未錄

其功者再三考校增補彙又不散開略以括遺則之嗟

一藥有切要之品世所恒用者錄之有險僻之品不恒用者茲下贅入
藥品有不必修製者自無可議其或宜於煅煉者或利於蒸晒炮燂者備括雷公炮製之法以附於後詳載無遺庶一展卷而悉其概云

凡例

藥性解

珍珠放玉付中藥易研為末
雄黃同醋煮可離物事
珍珠同藥洗白不損傷
蛤蚧肉放鹽水炙燥不燥即爛
水銀同藥煮製即成可研為末

藥性解所引書傳

黃帝素問

神農本草經

蜀本草

吳氏本草

食療本草

四聲本草

刪繁本草

食性本草

唐本草餘

藥對

本草性事類

日華子本草

證類本草

陳藏器本草

藥性論

南海藥譜

太上玄變經

三洞要錄

八帝聖化經

脩真秘旨

廣五行記

神仙芝草經

神仙服餌法

太清草木記

博物志

廣異記

稽神錄

陳承別說

本草衍義

丹溪藥性

東垣藥性

仲景全書

原病式

開寶新詳定本草

雷公炮炙論

開寶重定本草

鐫補雷公炮製藥性解總目

卷一

金石部

果部

穀部

卷二

草部上

卷三

草部中

卷四

草部下

卷五

木部

卷六

菜部

人部

禽獸部

蟲魚部

鐫補雷公炮製藥性解總目 終

第補雷公炮製藥性解卷之一目錄

金石部 三十三種

金銀箔 黃丹 胡粉 銅青

鐵漿 鐵銹附 水銀 輕粉 銀硃

密陀僧 丹砂 鍾乳 礬石

禹餘糧 硝石 七種 滑石 石膏

青鹽 食鹽 雄黃 紫石英

赤石脂 寒水石 花藥石 陽起石

蓬砂 膽礬 青礬石 無名異

藥性解 卷之一目錄

玉屑 自然銅 石驚 磁石

硫黃

果部 十八種

陳皮 枝葉肉 青皮 枳殼 枳實

杏仁 肉附 大棗 桃仁 花毛虫 烏梅

藕 皮節蓮子蓮鬚 批把菜 實附 榴皮 附花

山查 水梨 柿 柿乾附 芡實

胡桃 龍眼 橄欖 核中仁附

穀部 十一種

麥芽 神麴 酒 醋

飴糖 胡麻子 白扁豆 豆花豆葉附

赤小豆 芝麻 豆豉 綠豆

第補雷公炮製藥性解卷之一目錄

藥性解 卷之一目錄

鑄補雷公炮製藥性解卷之一

雲間 李中梓 編輯

姑蘇 錢允治 訂正

金石部

金銀箔

金銀箔味辛性平有毒入心肺二經主安心神定驚悸鎮顛狂除邪熱

按金銀之入肺部固其類也其性沉重能制火臟之輕揚故亦入心經過服必中其毒以鷓鴣肉解之

黃丹

黃丹味辛性微寒有毒不載經絡主吐逆顛狂止瀉生肌

按黃丹乃熬鉛所作鉛本水中之金最能制火吐狂等症何者非火而有不瘳者乎

胡粉

胡粉味辛性寒無毒不載經絡主一切癰腫諸毒及

腐爛肉殺三蟲破癥結

按胡粉一名粉錫實亦化鉛所作能破結殺蟲者其亦鎮降之功歟

銅青

銅青味苦溫性平有微毒不載經絡主欬金瘡淘眼暗止血殺蟲能去腐肉

按銅青即銅綠本醋沃銅上而得其精華醋能收斂故欬瘡止血其去腐肉者亦醋之功眼乃肝竅眼之不明用之病也得金之精以制木而目之暗者從此明矣

鐵漿 鐵鏽

鐵漿味甘溫性平無毒入心肺二經主頭癰狂亂解諸毒入腹蛇犬咬傷鎮心神明眼目堪洗漆瘡隨手而愈○鐵鏽油調之可敷惡瘡瘡疥蒜磨傳蜘蛛咬傷

按鐵漿即浸鐵色青可染阜者質本金也宜歸肺部性木沉也宜鎮心家明目治漆皆由伐木之功○鐵鏽可敷瘡毒亦以發在外者有散之義歟

水銀

水銀味辛性寒有毒。不載經絡。主疹癰癩瘍白禿皮膚蟲。墮胎絕孕。殺五金毒。銘化還復為丹。服之神仙不死。畏磁石。

按水銀療癰疹等症。良由其毒也。又殺五金毒者。蓋以其性除采。能消五金為泥耳。入耳能食腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。性滑重。極易入肉。最宜謹之。能下死胎。可灌屍骸。內傳極言其煉服之功。然後世食之者。往往喪生。可為妄信者戒。

雷公云凡草中取者并朱漆中者俱不可用。經別者勿用。若在砂中產出者其水銀色微紅。收得後用葫蘆盛之。免致遺失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時。其毒自退。若脩十兩。止用前二味汁各七錢。和合煮足為度。

輕粉

輕粉味辛性寒有毒。不載經絡。主通大腸。轉胞。諸瘡。蟲癬。小兒疳積。輕明可愛。燒火上走者真。

按輕粉即水銀所昇者。本草言其無毒。快也。外科需為要藥。不宜輕用服食。今見瘰癧方中多用之。必能損人腸胃。不可不戒。其值頗貴。市中多燒炭

水石及石膏為粉以亂真。須細辯之。

銀硃

銀硃味苦辛性溫有毒。止入敷藥殺蟲。餘無他用。按銀硃亦水銀燒就。中其毒者。令人發脹至死。可弗慎耶。

蜜陀僧

蜜陀僧味鹹辛性平有毒。不載經絡。主皮膚斑點。五痔金瘡。嗽嘔吐痰。禁癰癩。鎮心驚。體重如金色者佳。水飛用。

按蜜陀僧一名沒多僧。質極重。過服傷人臟。

雷公云凡使搗令細。于堯場中安置了。用重紙袋令滿着。火煮一服時足去。柳末紙袋取蜜陀僧用。

丹砂

丹砂味甘生者微寒。無毒。煉者大熱。有毒。入心經。主鎮心安神。益氣明目。通血脈。除煩滿。止消渴。療百病。殺精祟鬼邪。祛疥癬蟲瘡。久服成仙。畏鹹水。大如雞卵。形似芙蓉。破之若雲母。光明照徹者佳。

按丹砂之色屬丙丁火。心臟之所山歸也。質性沉

雷公云

凡便宜須細認取諸說內有百等不可
一論之有妙疏砂如李詩大或重一鑑

塊者面而如鏡若遇陰沆天雨卽鏡面上有紅漿
 沖山有楠相俗如梅子許大夜有光生照見一室
 有白庭砂如菩提子許大上面有白星現有神座
 砂不經丹龍服之而自延年其大有白星砂燈木
 砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹木砂
 砂金星砂斧面砂神木砂不可一一述也○
 凡修事硃砂先于淨室內焚香香木然後取砂
 以香木於拭乾卽神搗之後向於中更研之伏時
 竟取一差搗子若丁砂于內用目擊之其色如
 方州各判之者砂上下以東流水洗去三次時
 令水盡開火時候約去今又入青芝草山蟹草
 生兩蓋之下十片火煨一夜入青芝草山蟹草
 研似粉外裝服則入蒸蜜丸如神服之則人空腹
 服之九粒要入蓮中用則取其汁其汁然炭火
 五兩味砂用耳草二兩紫片入葵一錠
 五方草自然汁一錠同東流水煮過

鍾乳味甘性溫有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元氣益陽事安五臟通百節利九竅下乳汁亦能通聲先潤輕氣色如煉硝石者佳久研忌飲須用水飛以參茸土人肉不見爲度蛇床爲使惡牡丹玄石牡蠣畏紫石英藜蘆忌羊血

按鍾乳性溫而狀有下行之義宜入腎經肺即其母也故并入之諸家本草述其功者其衆惟丹溪以爲慄悍之劑不宜輕用不煉而服使人病淋

雷公云凡使白用重硫并星大者為山公石不
是色黑又經大火鑿過并久在地止收者

藥性解 卷六
皆經藥物制者，並不得用。須要鮮明，薄而有光，潤者以爲第箇。爲上者，長五六寸者，凡脩事法，以五香水煮過一伏時，然後漚出，又別用甘草、紫背以松白茅煮一伏時，凡鍾乳入兩，用沉香零香，用甘草等三味，各二兩，以水完煮過一度，用第三度方之。然後入杵臼如粉，篩過，却入鉢中，令有力少壯者，兩三人不住研三日，夜勿歇，然後用水飛打，以絹籠之，于日中晒令乾，又入鉢中研二萬過，後以麤合收貯用之。

機石

礬石。味酸性寒。無毒。入肺肝二經。主寒熱洩痢。白沃陰蝕。諸惡瘡癰。清喉痺。除目痛。祛固熱。禁泄瀉。收脫肛。同皂莢可吐風痰。和蜜蠟能消癰腫。光明如水晶。

色者佳。甘草爲使。惡牡蠣。畏麻黃。

按礬石。西方之色。宜入肺家。東方之味。宜歸肝部。肺肝得令。而寒熱諸症。可無虞矣。然亦收斂之劑。非宜驟用。

雷公云。凡使礬石。以瓦甃盛于火中。取令內外通赤。蜂窠上。用錐錫起蓋。旋安石。蜂窠于赤。窠中。燒後。于屋下。隔一坑。深五寸。以紙糊。坑中。一宿。取出。并紙。燒事。十兩。用石。蜂窠。十兩。燒。度。又云。凡使礬石。要光明。如水晶。酸。鹹。味。全者。研如粉。于火。時。盛之。令乾。置研。丁白。袋。于坑內。用五。方。草。葉。蓋。大。葉。二。枚。自然。升。餅。口。更。以。泥。泥。上。下。用。火。通。令。藥。汁。乾。用。蓋。了。并。餅。口。更。以。泥。泥。上。下。用。火。一。百。斤。炭。從。已。至。末。去。火。取。白。礬。餅。出。放。冷。敲。碎。取。白。礬。若。細。火。一。般。色。如。銀。自。然。伏。火。味。淡。不。失。搗。細。研。如。輕。粉。方。用。之。

禹餘糧

禹餘糧。味甘。性寒。無毒。不載經絡。主咳逆寒熱。煩滿。崩中。血閉。癥瘕。骨節疼痛。四肢不仁。大熱痔瘻。壯丹。杜仲爲使。畏貝母。菖蒲。銕器。

按禹餘糧。因禹行山中。乏食。採此充糧。故以名之。則其無毒可知矣。太乙餘糧。本是一種。今諸家往往分別。惟陳藏器所言者近是。

硝石

硝石。味苦辛。性大寒。有毒。入心脾二經。主六腑積聚。燥結。雷血閉藏。天行疫痢。傷寒發狂。停痰作底。腸風痔漏。推陳致新。解諸石藥毒。種種實熱。悉可爲除。能墮胎孕。大黃爲使。惡苦參。苦菜。女苑。畏麥句薑。

按硝石爲太陰之積。宜入心家。瀉火。而脾卽其子也。故并入之。丹溪云。本經言其無毒。悞也。能化七十二種石。無毒而然乎。分爲七種。氣味相同。俱善消化。毆逐。但朴硝力緊。苦硝。英硝。馬牙硝。力緩。硝石。風化硝。玄明粉。緩而又緩也。以之治病。病退卽已。不經補其缺。服補益。豈理也。耶。經云。熱搖于內。治以鹹寒。佐以苦寒。古方因之。故都用大黃佐芒硝耳。

雷公云。凡使礬石。用錐錫起蓋。旋安石。蜂窠于赤。窠中。燒後。于屋下。隔一坑。深五寸。以紙糊。坑中。一宿。取出。并紙。燒事。十兩。用石。蜂窠。十兩。燒。度。又云。凡使礬石。要光明。如水晶。酸。鹹。味。全者。研如粉。于火。時。盛之。令乾。置研。丁白。袋。于坑內。用五。方。草。葉。蓋。大。葉。二。枚。自然。升。餅。口。更。以。泥。泥。上。下。用。火。通。令。藥。汁。乾。用。蓋。了。并。餅。口。更。以。泥。泥。上。下。用。火。一。百。斤。炭。從。已。至。末。去。火。取。白。礬。餅。出。放。冷。敲。碎。取。白。礬。若。細。火。一。般。色。如。銀。自。然。伏。火。味。淡。不。失。搗。細。研。如。輕。粉。方。用。之。

滑石

滑石。味甘。淡。性寒。無毒。入胃膀胱二經。主利水道。實

大腸化食毒。有積滯。遂凝血。解燥渴。導乳汁。補脾胃。降妄火。白膩而無黃砂者佳。甘草石葦爲使。惡曾青。按滑石甘宜於中州。淡宜於利水。胃與膀胱之所由入也。利益雖多。終是走泄之劑。無甘草以和之。弗宜獨用也。

雷公云凡沒有多服，方採用。有白滑石、綠滑石、黃滑石、赤滑石、青滑石、黑滑石、白膩文、黑滑石、青白膩文、用妙也。滑石以全顆磨則畫石上有青及黑，若碎之，散入冷滑石中，已畫石上作白膩文，并多里細研，色似木白者，是也。畫石有膩文者，重一月，當差以方調研如粉，以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮，取滑石却煎束流水淘過千日中晒乾方用。

石膏

石膏味辛甘性寒無毒入肺胃二經主出汗解肌緩
脾益氣生津止渴清胃消痰最理頭疼與方解石相
似須瑩淨如水晶者真雞子爲便惡莽草馬目毒公
巴豆畏鐵

按石膏辛走肺其走胃所以主發散仲景名爲白虎蓋有兩義一則以其入肺一則以其性雄苟胃弱不食及血虛發熱者誤用之爲害不淺。

雷公云凡使勿用方解石此石須白不透明其性燥若石膏出剡州茗山縣義情山其色瑩
 漸如木情性良善也凡使之先于石曰中搗虛粉
 以密物羅過生甘草飛過了水汀令乾重研細用
 良之

主門

青鹽味鹹性寒無毒入腎經主明目止痛益氣堅筋骨助水臟除心腹痛破積聚療疥瘡一名戎鹽一名胡鹽

按青鹽味鹹。腎所宜也。故獨入之。水臟既補。則明
目堅骨等功。何足異耶。

藥性解
食鹽

食鹽味鹹性溫無毒。入腎肺肝三經。土鬼蟲邪疰毒氣。洗下部墮瘡。吐中焦痰癖。熨疝氣。及內腎氣。止霍亂。及心腹卒痛。殺蟲去風。明目固齒。白如霜雪者佳。炒研用。

按食鹽之鹹本歸腎臟肺即其母肝即其子也故
并入之本草云多食傷筋損肺水腫及咳嗽血虛
者忌之何也蓋以鹹走腎過多則腎不能勝而受
傷於是益食母氣而肺氣亦損肺損則金還剋木

夫肝主筋而藏血肺主咳嗽而生水數症之來寧能免耶

雄黃

雄黃味甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇虺蠱毒山嵐瘴氣惡瘡死肌疥癬蟲鼠百節中風鼻中惡肉中惡腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷孕婦轉女成男解蒸蘆毒大塊透明中無砂石者佳研細水飛用

按雄黃或以為黃金之苗今有金窟處無雄黃則斯言未足深信夫孕婦佩之能轉女胎為男言若不經然里中試之者往往獲驗則有奪造化之功非稟太陽之精惡能臻此殺蠱辟邪宜其效矣中其毒者以防已解之

雷公云雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之其臭似度便無臭氣勿誤用也又有火賦黃亦似雄黃其內重黃一重石不堪用又有黑雄黃亦似雄黃其如雄黃上冠也凡使藥要似雄黃者色為上雄黃

雄黃先以甘草紫背天葵地胆岩花四件並細製三伏時漉出搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫銀石是雄黃中又

紫石英

紫石英味甘辛性溫無毒入心經主咳逆邪氣寧心定驚補不足塗腫毒又主婦人子尸風寒十年無孕長石為使畏畏扁青附子惡黃連蛇甲麥句薑

按紫石英為鎮重之劑又有紫赤色心經之所由入也心主血婦人得之則血受溫補而胎可結矣

赤石脂

赤石脂味甘性平無毒入心經主養心氣明日益精療腹痛下痢癰疽瘡毒女子崩漏產難下胞衣惡大黃及松脂畏芫花

按石脂色赤宜入心經腹痛諸症皆火為之殃崩漏諸症皆血為之禍心主血屬火得石脂以療之而更何庸慮哉

寒水石

寒水石味辛甘性大寒無毒入五臟諸經主內外大熱時行熱渴腹中積聚解已豆毒凡使須薑汁煮之汁盡為度細研用畏地榆

按寒水石即凝水石性寒故於五臟靡所不

入過服令人腸胃受寒不能飲食陶隱居云夏月能為水者佳如此則舉世不能得矣似乎失言

雷公云使大用生薑自然汁煮汁盡為度細研成粉然後下之每修十兩用薑汁一盞

花榮石味性經絡諸書不載主金瘡止血產婦血暈火燬用

按花榮之功專主血症能化瘀血為黃水服之令人人大虛不宜輕用若多用服後當以補劑培之

陽起石

陽起石味鹹性溫無毒入腎經主腎絕陰痿崩中漏下癥瘕結氣有雲頭兩脚及臂鷲毛者真桑螵蛸為便畏兔絲惡澤瀉官桂蛇蛻雷丸忌羊血

按陽起石鹹溫之品宜歸木臟崩漏癥瘕結皆腎虛所致故咸療之難得其真勿宜誤用

蓬砂

蓬砂味苦辛性溫無毒入肺經主消痰止咳理喉痹破癥結光明瑩徹者佳

按蓬砂色白味辛宜專肺部痰嗽等症皆肺火也

宜咸治之

膽礬

膽礬味酸苦辛性寒有毒不載經絡主消熱殺蟲止驚癇吐風痰鮮明者佳

按膽礬之功大抵與白礬相類惟能止驚為小差耳

青礬石

青礬石味辛甘性平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌宿痰消磨食積研絕細用

按礬石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之官也故都入之大損元氣不可漫用

無名異

無名異味耳性平無毒不載經絡主金瘡折傷內損止痛生肌長肉消癰疽腫毒

按海南人云石無名異絕難得土無名異不甚貴重豈本經說者為石今所有者為土乎用時以醋摩塗患處

玉屑

玉屑味甘。性平。無毒。入肺經。主除煩止渴。養神明目。
寧心定驚。滅癰瘰。滋毛髮。助聲喉。美顏色。搗如米。苦
酒浸之。消如泥。惡鹿角。畏款冬花。

按玉屑。色白。性潤。宜入肺部。肺得其養。則煩渴諸
症。何自而生。又主滅癰。云者。亦以肺主皮毛。功
效之所必及也。

自然銅

自然銅。味辛。性平。無毒。不載經絡。主破積聚。療折傷
續筋骨。散血排膿。止痛定驚。亦主產後血邪。凡使須
搥碎。以甘草水煮過。又用醋浸一宿。以泥盒裹之。火
煨。研細用。

按自然銅。實銅坑中所產之石也。其色青黃如銅。
不從礱煉。故名之。丹溪曰。自然銅。世以爲接骨要
藥。不知接骨在補氣補血。補胃補腎。谷工惟冀速
效。以罔利而用之。亦未檢其燥散之禍耳。

雷公云。石隨鈴。即自然銅也。凡使勿用方金牙。其
色似乾銀泥。味微甘。如搥得先搥碎。同甘草
湯煮一伏時。濾出。令乾。入口中搥了。重篩過。以醋
浸一宿。至明用。六一泥。泥。堯台中。約盛得二升已。
來。按文武火中。養三日。夜。乾。便用。蓋蓋了。泥。用。

火煨兩伏時。去土。快蓋。研如
粉。用者。條事五兩。以醋兩錢。

石鷲

石鷲。性涼。無毒。味與經絡。諸書不載。主五淋。小便不
利。腸風痔瘡。婦人產難。兩手各握一枚。立驗。研細。水
飛用。

按圖經云。石鷲出零陵郡。今祁陽縣沙灘亦有之。
形似蚌而小。其實石也。觀其主治。都是行下之功。
食療贊其補益。似未然耳。

磁石

磁石。味辛。鹹。性寒。無毒。入腎經。主周身濕痺。肢節中
痛。目昏耳聾。補勞傷。除煩燥。消腫毒。令人有子。能吸
重鐵者佳。入火煨紅。醋淬七次。研絕細用。柴胡爲使。
惡牡丹。莽草。黃石脂。

按磁石入腎。何也。蓋以性能引鐵。取其引肺金之
氣入腎。使子母相生耳。水得金而清。則相火不攻。
自去。故主治如右。然久服多服。必有大患。勿喜其
功而忽其害也。

雷公云。凡使勿誤用去玄中石。并中麻石。此石之
二。負相似。磁石只是吸鐵。不得中麻石。

硫黃

甘草湯解之

雷公云

果部

陳皮

林

大

州之勝劑也。乃大全以為多川獨川有損脾胃師心之過耳。

青皮

青皮味苦酸。性溫無毒。入肝脾二經。主破滯氣。愈低而愈效。削堅積。愈下而愈良。引諸藥至厥陰之分。下飲食入太陰之倉。消溫瘴熱。其結母。止左脇鬱怒作疼。去肉微炒用。

按青皮即櫛之小者。酸能瀉木。宜走肝經。溫能消導。宜歸脾部。其性峻削。多服傷脾。虛脫禁用。

藥性解

卷一

七

枳殼

枳殼味辛苦。酸性微寒。無毒。入肺肝胃大腸四經。主下胃中至高之氣。消心中痞塞之痰。泄腹中滯塞之氣。推胃中隔宿之食。削腹內連年之積。疏皮毛胃膈之病。散風氣痒麻。通大腸閉結。止霍亂。療腸風。攻痔疾。消水腫。除風痛。去瓢核。麩炒用。陳久者良。

按枳殼辛歸於肺。酸歸於肝。大腸者肺之腑也。胃者上焦之腑也。故均入之。刮下枳殼其效更速。

雷公云。凡使勿用枳實。緣性效不同。若使枳殼。取

枳實

者為上。用時先去麩。麩炒過。得焦黑。取出。出今用布拭上焦黑。後單搗如粉。用之。

枳實味苦酸。性微寒。無毒。入心脾二經。主消胃中之痞滿。逐心下之停水。化日久之稠痰。削年深之堅積。除腹脹。消宿食。定喘咳。下氣逆。麩炒用。

按枳實即枳殼之小者。苦宜於心。脾者心之子也。故並入之。其性猛烈。有冲牆倒壁之功。氣弱者忌之。考青皮陳皮同一種。枳殼枳實同一種。但採有遲。十分微而名也。四者主治咸以導滯為功。然嫩者性酷。治下。老者性緩。治高之別耳。

藥性解

卷一

七

杏仁

杏仁味甘苦。性溫。有小毒。入肺大腸二經。主胸中氣逆。而喘嗽。大腸氣秘而難便。及喉痺。瘡癰。痰結。煩悶。金瘡。破傷。風熱。諸瘡。中風。諸症。蛇傷。大咬。陰戶。痛癢。並堪搗傅。沸湯炮去皮尖。炒用。得火良。惡黃芩。黃耆。烏根。畏葶藶。草。解錫毒。及中狗肉毒。惟杏仁者能殺人。杏仁不可多食。能損筋骨。眼目。

按杏仁入肺者。經所謂肺苦氣上逆。急食苦以瀉。

之是也。大腸則供肺為傳送者也。宜竝入之。考左慈秘訣稱杏仁為草金丹。久服成仙。方書又云。服杏仁者。往往至二三年。或瀉或臍中出物。皆不可治。兩說相背。然杏仁主散痰。從膜理中發散而去。且有小毒。則方書之說最為近理。秘訣所言。意者功在法製。亦未可知。然終屬虛渺。勿宜盡信。

雷公云。凡使須以沸湯浸少時。去皮膜及尖。擊作中下東流水煮。從已至未。其杏仁色褐黃。則去尖。然用每修一斤。用白火石一斤。為豆三合。水旋添。勿令開。免反。

桃仁

桃仁。味苦甘。性平。無毒。入肝大腸二經。主閉血血閉。癥瘕鬼邪。血燥便結。殺三蟲。止心痛。沸湯炮。去皮尖。炒用。花上殺鬼。疰悅顏色。利二便。下諸蟲。勿用千葉者。令人鼻衄。毛主血。瘕積聚崩帶諸疾。桃蟲主殺精鬼邪惡。不祥。葉主惡氣客忤。陰戶生蟲。痛痒及瘡中蟲。桃實多食令人發熱。

按桃仁行血。宜入肝經。性潤。宜入大腸。典術云。桃為五木之精。故花仁千葉。俱能壓邪殺鬼。

雷公云。凡使須炮去皮。淨用白木烏頭二味。和桃仁同於瓦鍋中煮。一服時。後渡出。用手摩作兩片。其心黃如金色。任用之。花勿使干。葉能使人鼻衄不止。目黃。凡用煉令淨。以絹袋盛於磨下。懸令乾。去塵。凡用。鬼觸。勿使乾。桃于其鬼觸。蟻只是千葉。桃花結子。在樹上不落者。乾然于十一月內採得。可為神妙。凡修。噴以酒拌蒸。從已至未。焙乾。以銅刀切片。焙取肉用。

大棗

大棗。味甘。性平。無毒。入心脾二經。主和百藥。益五臟。潤心肺。養脾胃。補精氣。生津液。通九竅。強筋骨。祛邪氣。悅顏色。去核用。殺烏頭赤忌生葷。

按棗之入脾者。經所謂五味入口。甘先歸脾是也。心則生脾者也。宜竝入之多服。能壅脾作脹。凡中滿及齒痛風疾者。咸非所宜。

烏梅

烏梅。味酸性溫。無毒。入肺腎二經。主生津液。解煩熱。止吐逆。除瘧瘕。止久痢。消酒毒。又主皮膚黑點。麻痺。小仁。去核用。

按烏梅入肺者。經所謂肺欲收。急食酸以收之是也。腎則其所生者也。宜竝入之多食。最能損齒。風寒初起。瘧痢未久者。不可驟以此收斂也。

藕味甘。性平。無毒。入脾經。主散瘀血。止吐衄。解熱毒。

藕味甘。性平。無毒。入脾經。主散瘀血。止吐衄。解熱毒。消食止渴。除煩解酒。和蜜食之。能肥腹臟。不生諸蟲。煮熟食之。能實下焦。大開胃脘。其節尤佳。其皮散血。不凝。蓮子主清心醒脾。補中養神。進飲食。止瀉痢。禁泄精。除腰痛。久服耳目聰明。宜去心。蒸熟用。蓮鬚主益腎澀精。荷葉主雷頭風。破血止渴。葉蒂主安胎。逐瘀血。帶好血。止血痢。

按藥味甘溫宜歸脾臟脾實聚血故治血症多服
藥性解

蓮子令人氣滯多服蓮鬚令人秘結荷葉形如仰盂其象爲震震爲雷屬木化風故治雷頭風枳木丸用之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中改能中守又能行血者性溫之功也

枇杷葉。味苦。性平。無毒。入肺經。主除嘔和胃。解渴止

嗽下氣清痰。刷去黃毛。蜜炙用。枇杷主潤五臟。止吐
解渴。

按枇杷葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射人

肺中發咳不已枇杷不可多食亦能發熱生痰

雷公云凡使採得後極濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩者足堪用使館布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之以酥盡爲度

石榴皮味酸溫性溫無毒入大腸腎二經主精流下

痢筋骨風痛脚膝難行日流冷淚腸風下血殺牙蟲
染鬚髮其子止渴其花百葉者主心熱療吐血爲末
吹鼻中止衄血及金瘡血

按腸滑則患血痢。腎滑則患遺泄。樞者，留也。故入

藥性解

茲二經然痼積未盡者不可先以此潤之多服能

戀腦成癡其子不宜過食能損肺壞齒其花色赤
馬大宜入心家而主血。

雷公云：凡使皮、葉、根，勿令犯鐵。若使石礱，穀不計
量，汁浸，使根、葉、皮用漿水浸一宿，至明漉出其水，如
常法浸之。宿方可用之。

山查味甘酸性平無毒入脾經主健脾消食散結

行滯血痺瘡癰瘰癧

按山查之其宜歸脾臟消食積而不傷於刻行金

血而不傷於湯。利川之療兒枕疼。小兒尤爲要藥。

梨

梨味甘性寒。無毒。入心肺二經。主心經客熱。肺臟煩熱。止嗽消痰。清喉降火。解渴除煩。消風潤燥。

按梨之入心經。所謂以甘瀉之是也。火清而金不受燥。故亦入肺經。性冷而利。多食損脾。丹溪曰。梨者利也。流利下行之謂也。乳婦及金瘡忌用。

柿

藥性解

卷一

五

柿味甘溫。性寒無毒。入心肺大腸三經。主潤心肺。通耳鼻。消痰嗽。清火熱。除渴解酒。祛腸內宿血。止口中吐血。忌同蟹食。柿乾潤喉降火。補虛殺蟲。厚腸止痢。柿蒂主呃逆。

按柿之色赤。宜歸心臟。性潤。宜歸肺家。大腸則供肺爲傳送者也。故亦入之。性冷傷脾。不宜多用。若同蟹食。令人腹痛。大瀉柿乾及蒂。總屬寒涼。都能清火。

芡實

芡實味甘。性平。無毒。入心腎脾胃四經。主安五臟。補脾胃。益精氣。止遺泄。煖腰膝。去濕痺。明耳目。治健忘。按芡實之甘。宜歸脾胃。土得其宜。則水不受剋。火亦無益食之虞。故又入心腎二經。多食壅氣。最難消化。嬰兒食之不長。老人服之延年。

胡桃

胡桃味甘。性平。無毒。入肺肝腎三經。主通血脈。潤肌膚。補下元。同松脂可敷瘰癧。同熱酒能理撲傷。去衣川過食。動風生痰。

藥性解

卷一

五

按胡桃入肺。故主肌膚。入肝。故主血脈。其性屬火。能補相火。故亦入腎經。火能剋金。多食則傷肺。故能動風生痰。瀉痢及感冒風寒者忌用。

龍眼

龍眼味甘。性溫。無毒。入心脾二經。主補血氣。養肌肉。益虛羸。美顏色。除健忘。治怔忡。增智慧。明耳目。久服延年。

按龍眼甘溫之品。脾家所悅。心者脾之母也。脾無傾子之憂。則心血可保。故入茲二經。然其能作脹。

凡中滿氣隔之症。均宜遠之。

橄欖

橄欖味甘澀。性溫無毒。入脾胃二經。主開胃下氣。消食化酒。除渴止瀉。解諸魚毒。核中仁可塗口唇燥裂。按橄欖甘溫之性。宜職脾胃。然性熱。能致上雍。亦不可多食。

穀部

麥芽

藥性解

卷一

三

麥芽味甘鹹。性溫無毒。入脾胃二經。主溫中下氣。開胃健脾。催生下胎。化宿食。除脹滿。止吐逆。破癥結。消痰痞。炒去芒。再炒焦黃。研用。蜜爲之使。

按麥芽甘而且溫。宜職中州。夫麥性泥滯。不過水浸生芽。氣雖少清。性猶未化。功效何若是殊哉。全在多炒。使其性枯耳。不然。是即食矣。豈復能消耶。并溪云。大麥有火能生熱病。其芽能行上焦滯血。除腹內寒鳴。然多用久服。令人消腎。

神麴

神麴味甘。性溫無毒。入脾胃二經。主調中。止瀉開胃。消食。破癥結。逐積痰。除脹滿。又主胎上搶心。血流不止。亦能下鬼胎。

按神麴甘溫爲脾胃所喜。故兩入之。本小麥麴造。成。須得六神氣者。良不爾。與麴餅何異。其法於六月六日。用麴五觔。象白虎。蒼耳草自然汁一碗。象勾陳。野麥自然汁一碗。象騰蛇。青蒿自然汁一碗。象青龍。杏仁去皮尖五兩。及北方河水。象玄武。赤小豆煮熟去皮四兩。象朱雀。一如造麴法。懸風處經年用。

藥性解

卷一

三

酒

雷公云

凡使。搗作末。後搗地坑深二尺。用物裏內坑中。至一宿。明出。焙乾用。

酒味甘辛。性大熱。有毒。入十二經。主散邪氣。辟穢惡。御霧露。解瘴癘。溫脾胃。破癥結。助藥力。厚腸胃。駐顏色。通行血脉。榮養肌膚。忌諸甜物。及乳同食。按酒之爲用。無微不遠。故諸經皆入之。主療雖宏。能發濕中之熱。過飲則相火昌炎。肺金受燥。輒致痰嗽。脾因火而困倦。胃因火而嘔吐。心因火而昏。

狂。肝因火而善怒。胆因火而忘。勝軌因火而精。枯甚者勞嗽吐衄。哮喘。蠱脹。癰癤。疽。流。禍。不小。倘非其眼。死亡。立至。可不謹乎。

醋

醋。味酸。性溫。無毒。入肝經。主胃脘氣疼。癥瘕積聚。產後血暈。去瘀生新。同胡粉止鼻中血。同雄黃治蜂蝎蛇傷。漬黃柏可治口瘡。磨南星可敷癰癤。調飛麝堪塗癰腫。和石灰能除腋氣及蛤肉。

按經曰。東方之木。其味酸。醋之所以專入肝也能

藥性解

卷一

五

傷筋損齒。不宜多食。

飴糖

飴糖。味甘。微溫。無毒。入肺脾二經。主和脾潤肺。補虛止渴。消痰理嗽。連中飲汗。

按肺喜潤。脾喜甘。宜飴糖之入二經也。建中湯用之。取其甘緩。丹溪以為能生胃火。此損齒之因。非上制水。乃濕土生火也。中滿嘔吐。及濕熱之症。皆不宜服。

胡麻子

胡麻子。味甘。性平。無毒。入脾肺二經。主傷中。虛羸。補五內。益氣力。潤肌膚。填腦髓。堅筋骨。療金瘡。止痛。陰痒。生瘡。及傷寒溫瘧。大吐後。虛熱。羸困。利大小腸。催生落胞。久服。耳目聰明。辟穀延年。水淘去浮者。酒蒸晒乾。去麤皮。甯薄皮。

按胡麻性潤而味甘。脾肺之所由歸也。仙經需為要藥。取其補虛殊勝。脾家有火。大腸燥結者。始為相宜。不然。恐有泄痢之患。

藥性解

卷一

三

雷公云。麻子有兩件。入藥者。兩頭尖紫者。又先以水淘淨者。去之泥者。洗出令乾。以酒拌蒸。從巳至亥。出攤晒乾。子曰。中春令。麤皮一重。梓小豆相對同炒。小豆熟。即出去。小豆用之。上有薄皮。大在殼也。

白菰豆

白菰豆。味甘。性微溫。無毒。入脾經。主補脾。益氣和中。止渴。醋製。能療霍亂轉筋。解酒毒。及河鮑毒。一切草木毒。藥主蛇蟲咬傷。化主赤白帶下。

按菰豆性味皆與脾家相得。宜獨入之。然此劑最為泥膩。惟入健脾藥中。則能補脾。若單食。多食。極

能壅氣傷脾本草稱其下氣恐非

赤小豆

赤小豆味甘酸。性平無毒。入心經。主消熱毒。排癰腫。解煩熱。補血脈。止洩瀉。下水氣。利小便。除大便。血解小麥毒。

按赤小豆南方心火之色也。故獨入之經曰。諸瘡痛癢。皆屬心火。又曰。心主血。故主療如右。小腸者。即受盛而與心應者也。故亦能利之。衍義曰。久服令人黑瘦。枯燥。亦以利小便之故耳。

藥性

卷一

芝麻

芝麻味甘。性生寒。熟溫。無毒。入胃大小腸三經。主行風氣。通血脈。滑腸胃。潤肌膚。生鬚。可傳小兒頭瘡。麻油主治相同。能殺蟲。治疥癬。解百毒。

按芝麻味甘。宜歸胃腑。性滑利。宜入大小腸。總是潤澤之劑。故能通血脈。血脈通。則風氣自行。肌膚自潤矣。乳母食之。令兒無熱病。不宜久食。令人滑精消瘦。發渴困。有牙疼及脾胃疾者。尤所當戒。

豆豉

豆豉味苦。性寒。無毒。入肺經。主傷寒頭痛。寒熱惡毒。瘴氣煩躁。滿悶。虛勞喘吸。

按豉之入肺。所謂肺苦氣上逆。急食苦以泄之之意也。傷寒瘴氣。肺先受之。喘吸煩悶。亦肺氣有餘耳。何弗治耶。

藟豆

藟豆味甘。性寒。無毒。入心胃二經。主除熱毒。厚腸胃。散風癰。消腫。下氣。補臟養神。留皮用。

按藟豆寒則入心。而瀉火。甘則入胃。而和中。禹錫

錫補雷公炮製藥性解卷之二目錄

草部上 四十二種

人參	黃耆	甘草	當歸
川芎	山藥	白朮	蒼朮
芍藥 <small>赤白</small>	生地	熟地	知母
貝母	黃芩	黃連	大黃
桔梗	花粉 <small>仁與子附</small>	半夏	紫蘇 <small>附</small>
白芷	防風	獨活	羌活
柴胡	前胡	香附	麻黃

藥性解

卷之二

一

葛根	麥門冬	天門冬	五味子
升麻	藁本	細辛	連翹
澤瀉	玄胡索	地榆	防己
常山	草龍膽		

錫補雷公炮製藥性解卷之二目錄

錫補雷公炮製藥性解卷之二

雲間 李中梓 編輯

姑蘇 錢允治 訂正

草部上

人參

人參味甘性微溫無毒入肺經補氣活血止渴生津。肺寒可服肺熱傷肺去蘆用。茯苓爲使惡鹵鹹反藜蘆。

藥性解

卷之二

一

按參之用臟腑均補。何功之宏也。蓋人生以氣爲樞。而肺主氣。經所謂相傳之官。治節出焉。參能補氣。故宜入肺。肺得其補。則治節咸宜。氣行而血因以活矣。古方用以解散。亦血行風自滅之意也。至於津液藏於膀胱。實上連於肺。故有生津液之功。肺寒者氣虛血滯。故曰可服。肺熱者火炎氣逆。血脈激行。參主上升。且能濟血。故肺受傷也。性本疏通。人多泥其作飽。不知少服則壅。多則反宣通矣。

雷公云：凡使要肥大地如雞腿。并似人形者。採得於乾去四肢。燒灰。順并黑者。割入藥中。反中。

黃耆

解

卷二

雷公云凡使勿用水煮草，真相似，只是生時葉短，并根橫，先須去頭土，破皮了，蒸半日出，後用手擘，令細於塊砧上剉用。

○熊氏曰：黃芪動三焦之火。

甘草

甘草味甘性平無毒入心脾二經生則分身稍而瀉
火炙則健脾胃而和中解百毒和諸藥甘能緩急食
稱國老白芷乾漆苦參爲使惡遠志反甘遂海藻大
戟芫花忌豬肉菘菜

按味甘入脾爲九土之精安和七十二種金石。

千二百種草木。有調攝之功。故名國老。然性緩不

可多用。恐其能作脹。一恐藥餌無功。惟虛人多熱。及諸瘡毒者。宜倍用。中滿及初痢者。忌之。所謂脾病人。毋多食甘也。

雷公云人使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸倒劈破作六七片使篋器中盛用酒浸蒸候已至午出曝乾細剉使一斤用酥七兩塗上以酥盡爲度先炮令內外赤黃用良。

附錄

當歸味甘辛性溫無毒入心肝脾三經頭止血而上
行身養血而中守積破血而下流全活血而不走氣

血昏亂服之而定各歸所當歸故名酒浸用惡藺茹

藥性解

卷二

11

畏葸蒲海藻牡蒙

按歸血藥也。心主血。肝藏血。脾裹血。故均入焉。用分爲四。亦經上經下之道也。雷公云。一齊用。不如不使服。亦無效。未可盡信。性泥滯。風邪初旺。及氣鬱者。宜少用之。

雷公云：此藥去塵并頭大硬處一分已來酒浸，當好要破血，鮮使尾，若要止痛止血，即用頭手實處若養血，即用中身，若全用，不加不伏，則養無効，單使妙也。

川芎

川芎味辛甘性溫無毒入肝經上行頭角引清陽之

氣而止痛下行血海養新生之血以調經六服令人
果亡白芷為使吳黃連小者名吳黃連主開鬱

按白入肝經能補血矣何云果亡以其氣升陽其
味辛散善提清氣於上部有功然宜中病即已若
久用則氣逆且耗故有此患凡氣升痰喘火劇中
滿等症不宜用之

山藥

山藥味甘性溫無毒入脾肺腎三經補陰虛消腫硬
健脾氣長肌肉強筋骨療乾咳止遺泄定驚悸除瀉

藥性詳

八卷二

四

痢乳製用紫芝為使喜門冬惡甘遂

按丹溪曰山藥屬土而有金與水宜入脾肺腎而
補虛經曰虛之所在邪必湊之腫硬之謂也得補
則邪自去脾自健於是土盛生金金盛生水功效
相仍矣然單食多食亦能滯氣

白朮

白朮味甘性溫無毒入脾經除濕利水道進食強
脾胃佐黃芩以安胎君枳實而消痞止泄瀉定嘔吐
有汗則止無汗則發土炒用防風地榆為使忌桃李

崔肉青魚松菜

按白朮甘而除濕所以為脾家要藥胎動痞滿吐
瀉皆脾病也用助脾諸疾自去有汗因脾虛故
能止之無汗因土不能生金金受火剋皮毛焦熱
既得其補脾又藉其甘溫而汗可發矣傷寒門有
動氣者不宜用之

蒼朮

蒼朮味甘辛性溫無毒入脾胃二經上平胃健脾寬
中散結發汗祛濕歷山嵐氣散溫瘧淋浸一宿換泔
藥性解

八卷二

五

浸炒用使忌同白朮

按蒼朮辛甘祛濕脾胃最喜故宜入之大約與白
朮同功乃藥性謂其寬中發汗功過於白固矣又
謂其補中除濕力不及白於理未然夫除濕之道
莫過於發汗安有汗大發而濕未除者耶濕去而
脾受其益矣若以為發汗故不能補中則古何以
稱之為山精煉服可長生也亦以其結陰陽之精
氣耳俗醫泥其燥而不常用不知脾為臟主所喜
惟燥未有脾氣健而諸臟猶受其損者獨火炎土

燥脾虛作悶者忌之恐益其火也

白芍藥

白芍藥味酸苦性微寒有小毒入肝經主怒氣傷肝胃腹中積聚腰膝間瘀血腹痛下痢日疾崩漏調經安胎赤者專止破血利小便除熱明眼目雷九烏藥沒藥爲使惡石解苦破石畏硝石雷甲小齒反藜蘆

按白芍酸走肝故能瀉木中之火因怒受傷之症得之皆愈積聚腹痛雖脾之病然往往亢而承制

上極似木之象也經曰治病必求於本今治之以

藥性解

卷十

六

肝正其本也日疾與婦人諸症皆血之病得之以伐肝邪則血自生而病自已故四物湯用之亦以婦人多氣也今竟稱其補血之效而忘其用可邪新產後宜酌用之恐酸寒伐生生之氣也血虛者煨用痛痢者炒用

雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上粗皮之乾用

生地黃

生地黃味甘苦性寒無毒入心肝脾肺四經涼心火

之煩熱瀉脾土之濕熱止肺金之閉熱除肝木之血熱忌見鐵器常歸爲使得麥門冬酒良惡貝母畏蕉黃萊菔及子

按生地黃總是涼血之劑故入四經以清諸熱老人津枯便結婦人崩漏及產後血攻心者尤爲要藥實脾藥中用二三分使脾家水不受邪血虛寒者忌之

熟地黃

熟地黃味甘苦性溫無毒入心肝腎三經活血氣封填骨髓滋腎水補益真陰傷寒後腰股最痛新產後

藥性解

卷十

七

臍腹難禁利耳目烏鬚髮治五勞七傷能安魂定魄使忌畏惡俱同生地性尤泥滯薑酒浸用

按熟地黃爲補血上劑而心與肝藏血主血者也故能入焉其色黑其性沉陰重濁經曰濁中濁者堅強骨髓腎主骨故入之精血既足則腰股臍腹之症自愈耳目鬚髮必受其益而勞傷驚悸並可痊矣

雷公云採得生地黃去白皮洗淨上柳木甌蒸之

鐵令入腎消并白髮、男損榮、女損衛也。

知母

知母味苦性寒無毒入腎經瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之陽勝滋化源之陰生勿犯鐵器犯之損腎烙去毛鹽酒炒用。

按知母入腎為生木之劑木盛則火熄所謂壯水之主以制陽光也口渴乾嗽眼花目眩便赤腰痛。痔勞煩躁不眠此皆陽盛陰衰之症服之皆愈若肺家寒嗽及腎氣虛脫無火者禁用。

藥性解

雷公云凡使先於槐砧上細剉燒乾木臼中杵搗勿令犯鐵器○行經上頸酒炒用。

貝母

貝母味辛苦性微寒無毒入心肺二經清心潤肺止嗽消痰主胃腹氣逆傷寒煩熱淋瀝痰癰喉痺金瘡人面瘡癰瘰諸惡瘡去心切用厚朴白薇為使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭。

按貝母辛走肺苦走心善能散鬱瀉火故治胃腹云等疾。

雷公云凡使先於柳木火中炮令黃擘破去內口鼻上有米許大者心一小顆後行糯米於

藥性解卷二
黃芩味甘平性寒無毒入肺大腸膀胱膽四經主崩淋熱疽痛痢惡瘡解毒收口去翳明目調經安胎中枯面黃者瀉肺火消痰利氣除風溫當熱於肌表細實而堅者瀉大腸火去陰退陽滋化源除熱於膀胱山茱萸龍骨為使惡蔥實畏丹砂牡丹藜蘆砂參卅

黃芩

黃芩味甘平性寒無毒入肺大腸膀胱膽四經主崩淋熱疽痛痢惡瘡解毒收口去翳明目調經安胎中枯面黃者瀉肺火消痰利氣除風溫當熱於肌表細實而堅者瀉大腸火去陰退陽滋化源除熱於膀胱山茱萸龍骨為使惡蔥實畏丹砂牡丹藜蘆砂參卅

藥性解

卷二

九

按芩枯飄者有上升之象故入肺堅實者有下行之理故入大腸諸經性甚寒苟無實火不宜用之

黃連

黃連味苦性寒無毒入心經主心火炎目疾暴發瘡瘍紅腫腸紅下痢痞滿泄瀉小兒疳熱消中口瘡驚悸煩躁天行熱疾黃芩龍骨連翹滑石為使惡菊花芫花玄參白蘚白殭蚕畏款冬花解巴豆烏頭毒忌猪肉冷水

按黃連味苦瀉心治心火諸病不可缺瀉痢雖屬

脾經正由火不能生上。況心與小腸相為表裏。心火瀉則小便亦利而腸胃自厚矣。因寒得瀉者忌之。又久病氣虛。心火不盛者。用之則心氣愈虛。虛火反熾。

火反熾

雷公云：凡使細切。內絨如布。旋填。緊重。剉蒸。從已至未。曬乾。又浸。水。蒸。從未至。如此。蒸七度。曬乾。如烏膏。樣。於日。曬乾。用之。為妙。

大黃

大黃味苦性大寒。無毒。入脾胃大腸心肝五經。性沉而不浮。用走而不守。奪土鬱而無壅滯。定禍亂而致太平。名曰將軍。又主癰腫及目疾。痢疾暴發。血閉火閉。推陳致新。黃芩為使。無所畏。錦紋者佳。

按大黃之入脾胃大腸。人所解也。其入心與肝也。人多不究。昔仲景百勞丸。廣黃丸。都用大黃。以埋勞傷吐衄。意最深微。蓋以濁陰不降。則清陽不升者。天地之道也。瘀血不去。則新血不生。者。人身之道也。蒸熱日久。關血停於經絡。必得大黃以豁之。則肝脾通暢。陳推而新致矣。今之治勞多用滋陰。數服不效。坐而待斃。嗟乎。術豈止此耶。至癰腫目

疾及痢疾。咸熱悶所致。故並治之。傷寒脉弱及風寒未解者。禁用。

寒未解者禁用

雷公云：凡使細切。內絨如布。旋填。緊重。剉蒸。從已至未。曬乾。又浸。水。蒸。從未至。如此。蒸七度。曬乾。如烏膏。樣。於日。曬乾。用之。為妙。

桔梗

桔梗味辛。性微溫。有小毒。入肺經。主肺熱氣奔。痰嗽鼻塞。清喉利膈。能載諸藥入肺。節皮為使。畏白芨。龍眼龍膽草。

按桔梗味辛。故專療為功。下部藥中勿用。恐其上載而不能下達也。

雷公云

凡使勿用木梗。真似桔梗。咬之。只是腥澀。不堪用。凡使去頭尖。硬二三分。已來。并兩時。附枝子。於梗上。細剉。用百合水。浸一伏時。漉出。緩火熬令乾。用每條。事四兩。用生百合五分。為作膏。浸水中。

天花粉

天花粉味苦。性寒。無毒。入肺心脾胃小腸五經。主肺火盛而喉痺。脾胃火盛而口齒腫痛。清心利小便。消痰除咳嗽。排膿消腫。生肌長肉。止渴退煩。熱補虛通。月經拘攣。為使。惡乾薑。畏牛膝。乾漆。反烏頭。

按天花粉色白入肺。味苦入心。脾胃者心之子。肺之母也。小腸與心相為表裏。故均入焉。木功清熱。故主療煩多。其理易達。惟曰補虛通經。此其不可泥也。夫苦寒之劑。豈能大補。以其能清火。則陰得其養。非真補也。月水不通。亦以熱閉。熱退則血盛。經通。非真能通也。此治本窮源之說耳。倘因寒致疾者。可悞使哉。子名瓜蒌。主胃痺。仁主潤肺下氣。止痰嗽。療乳癰。乳閉。並宜妙用。

半夏

半夏味辛平。性生寒。熱溫有毒。入肺脾胃三經。下氣止嘔吐。開鬱散表邪。除濕化痰。涎大和脾胃。須湯洗十遍。薑蒜甘草製用。射干柴胡為使。惡皂莢。畏雄黃。生薑乾薑秦皮龜甲反。烏頭忌。羊肉羊血飴糖海藻。按半夏味辛入肺。性燥入脾胃。中其毒者。口噤發吐。煩渴及血症勿用。惟氣症發渴者不禁。

雷公云。凡使勿誤用白粉。幾于真似半夏。只片咬了白芥子末二兩。頭醋六兩。一味。攪令濕。將半夏投中洗三遍。用之。半夏上有神涎。若洗不淨。令人氣逆。肝氣志滿。

紫蘇

紫蘇味甘辛。性溫。無毒。入肺脾二經。葉能發汗。散表溫胃和中。除頭痛。肢節痛。雙面紫者佳。不敢用。麻黃者。以此代之。梗能順氣安胎。子能開鬱下氣。定喘消痰。

按辛走肺。甘走脾。辛散之。劑下氣最捷。氣虛者少用之。

白芷

白芷味辛。性溫。無毒。入肺脾胃三經。去頭面皮膚之風。除肌肉燥癢之痺。止陽明頭痛之邪。為肺部引經之劑。主排膿托瘡。生肌長肉。通經利竅。止漏除崩。明目散風。驅寒燥濕。當歸為使。惡旋覆花。

按白芷味辛。為肺所喜。而溫燥為脾胃所喜。宜其入矣。然香燥而發散。主治雖多。能傷氣血。不宜多用久用。

雷公云。凡使勿誤用馬齒。不入藥中。採得後。風雨上。皮細剝。用黃粉。在細剝。以竹刀切二味。分兩。度蒸一伏時。後出。於日曬乾。去黃。隨用之。防風。

防風味辛甘性溫無毒入肺經為肺金。療諸風開結氣理目痛。惡乾薑藜蘆白薇羌活附子毒。

按防風辛走肺為升陽之劑。故通療諸風氣之結者。肺之疾也。目之痛者。風之患也。宜並主之。東垣云。平賤之卒。聽令而行。隨所引而至。乃風藥中潤劑也。能瀉上焦元氣。虛者不得藥用。今人類犯此弊。

獨活

獨活味苦甘辛性微溫無毒入肺腎二經。主新舊諸

風濕痺。

卷二

十四

風濕痺。頭項難伸。腰背痠疼。四肢攣痠。黃色而作塊者。為獨活。

按獨活氣濁屬陰。善行血分。欬而能舒。沉而能升。緩而善搜。可助表虛。故入太陰脾。少陰腎。以理伏風。

羌活

羌活味苦甘平性微溫無毒入小腸膀胱二經。散八表風邪。利周身節痛。排口陽腐肉之痘。除新舊風濕之症。紫色而節密者。為羌活。

按羌活氣清屬陽。善行氣分。舒而不欬。升而能沉。雄而善散。可發表邪。故入手太陽小腸。足太陽膀胱。以理遊風。其功用與獨活雖若不同。實互相表裏。用者審之。

雷公云。

採得後。細剉。拌酒。羊脂。蒸二日。後膠乾。去酒。羊脂。用羌活。煩人心。

柴胡

柴胡味苦性微寒無毒入肝膽心胞絡三焦胃大腸六經。主傷寒心中煩熱。痰實。腸胃中結氣積聚。寒熱邪氣。兩脇下痛。疏通肝木。推陳致新。半夏為使。惡皂莢。畏女苑。藜蘆。犯火無功。

卷二

卷二

十五

按柴胡氣味升陽。能提下元清氣上行。以瀉三焦火。補中益氣。湯用之。亦以其能提肝氣之陷者。由左而升也。凡胃腹腸胃之病。因熱所致者。得柴胡引清去濁。而病謝矣。故入肝膽等經。衍義曰。本經並無一字言及治勞。今治勞多用之。誤人不小。勞有一種真臟虛損。復受邪熱。邪因虛而致勞者。宜用。後世得此數言。凡遇勞症。槩不敢用。此所謂侏儒觀場。隨眾喧嘩矣。惟勞症不犯實熱者。用之。亦

能殺入誠所當慎。咳嗽氣急痰喘逆者禁用。以其上并也。傷寒初起忌之。恐引邪入少陽經也。

雷公云

凡使薑黃。乾皮赤黃。髭鬚出在平州。平州。鶴於此。羽處是。柴胡香直上雲間。若有遺往。聞者皆氣爽。凡採得後。去其根。并頭。用銀刀割上赤薄皮。少許。却以粗布拭淨。細剉用之。勿令犯火。立便無效也。

註云

柴胡乃少陽經藥也。久服令人肝膽平。

前胡

前胡。味苦甘辛。性微溫。無毒。入肺肝脾膀胱四經。主傷寒痰嗽。痞滿。心腹結氣。解熱開胃。推陳致新。亦止

藥性解

卷五

七

夜啼兒。佐使畏惡同柴胡。

按前胡辛可暢肺以解風寒。甘可悅脾以理胃腹。苦能泄厥陰之火。溫能散太陽之邪。

雷公云

凡使勿用野葛根。緣真似前胡。只是味粗酸。誤用令人胃反不受食。若前胡味甘氣香。凡修事先用刀刮去蒼黑皮。并髭鬚。細剉用甜竹瀝浸令潤。於日中曬乾用之。

香附

香附。味辛甘。性溫。無毒。入肺肝脾胃四經。疏氣開鬱。消風除痒。便醋製用。

按香附味其辛。故主發散疏通。以入肺肝脾胃。類

稱女科聖藥者。蓋以婦人。心性偏執。多氣多鬱。血

因氣鬱。則不能生耳。不知惟氣實而血不大虛者。

宜之。不然。損其氣。燥其血。愈致其疾。惜乎未有發

明。而世俗多受女科聖藥一句之累矣。性燥。故便

製以潤之。性散。故醋製以歛之。

麻黃

麻黃。味苦甘。性溫。無毒。入肺心大腸膀胱四經。主散

在表寒邪。通九竅。開毛孔。破癥結。除積聚。去根節者。

大能發汗。根節能歛汗。厚朴爲使。惡辛。黃石。黃。陳久

藥性解

卷二

七

者良。

按麻黃專主發散。宜入肺部。出汗開氣。宜入心與

大腸膀胱。此曉悍之劑也。可治冬月春間傷寒。癰

疫。夏秋不可輕用。惟在表真有寒邪者可用。或無

寒邪。或寒邪在裏。或裏虛之人。或陰虛發熱。或傷

風有汗。或傷食等症。雖發熱惡寒。其不頭疼身疼

而拘急。六脉不浮緊者。皆不可用。雖可汗之症。不

宜多服。蓋汗乃心之液。若不可汗而汗。與可汗而

過汗。則心血爲之動矣。或至亡陽。或至衄血不止。

而成大患。丹溪以麻黃人參同用。亦攻補法也。醫者宜知。

雷公云。凡使去節并沫。若不洗。服之令人悶。用炙三四次。洗淨。切片。掠去上沫。盡。漉出。蒸乾。用。

葛根

葛根味甘。性平。無毒。入胃大腸二經。發傷寒之表邪。止胃虛之消渴。解中酒之奇毒。治往來之溫瘧。解野葛巴豆丹石百藥毒。

按葛根療熱解表。故入手足陽明。若太陽初病。未入陽明而頭痛者。不可便服。以發之。恐引賊入家也。又表虛多汗者禁用。

麥門冬

麥門冬味甘。性平微寒。無毒。入肺心二經。退肺中隱伏之火。生肺中不足之金。止消渴。除得具養補虛勞。熱不能侵。去心用地黃車前為使。惡款冬苦瓠畏苦參青蘘忌鮑魚肥大者佳。

按麥門冬陽中微陰。夫陽乃肺藥。微陰則去肺中伏火。伏火去則肺金安而能生水。水盛則能清心。

而安神矣。故能治血妄行。調經和脉。

天門冬

天門冬味甘。性寒。無毒。入肺腎二經。保肺氣。不被熱擾。定喘促。陟得康寧。止消渴。利小便。強骨髓。悅顏色。殺三蟲。去伏尸。去心用地黃貝母垣水為使。畏青忌鯉魚。

按天門冬氣薄主升。故入肺。味厚為陰。故入腎。虛熱者宜之。虛寒者禁用。

雷公云。採得了。去上皮。一重。便勞破去心。用柳木。蒸出。曝去地二尺。已來。作小架。上鋪。

五味子

五味子。味皮肉甘酸。核中苦辛。且都有鹹味。五味俱備。故名。性溫。無毒。入肺腎二經。滋腎中不足之水。收肺氣耗散之金。除煩熱。生津止渴。補虛勞。益氣強陰。養容為使。惡萎蕤。勝烏頭非產者良。

按五味屬水。而有木火土金。故雖入肺腎。而五臟咸補。乃主津之要藥。收斂之妙劑。然多食反致虛熱。蓋以收補之驟也。如火嗽。帆川寒涼。恐致相激。

須用此酸斂以降之。亦宜少用。肺火鬱及寒邪初起者禁用。小兒尤甚。以酸能平痰引嗽也。

雷公云凡小兒皮嫩泡者有白膜鹽類一重其味酸鹹若辛其味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已至中却以漿水浸一宿焙乾用之

升麻

升麻味甘苦性微寒無毒。入大腸脾胃肺四經。引蕙白散手陽明之風邪。引石膏止足陽明之齒痛。引諸藥遊行四經。升陽氣於至陰之下。故名升麻。又主解百毒殺精物辟瘟疫除蠱毒止瀉痢白芷為使。形輕而堅實青綠色者佳。

藥性解

子

按升麻提氣解肌。故入此四經。然奉令之使。不能益人。若下元不足者。用此升之。則下虛而元氣益。虧矣。藥性乃曰元氣不足者。用此於陰中升陽。恐非。惟陽氣有餘而下陷者宜之。若初病太陽症。便服升麻以發陽明汗。是引賊入門。亦非所宜也。

雷公云採得後用刀刮上蘆皮一重了用黃精自煎汁浸一宿漉出曝乾細剉蒸了曝乾用之

藁本

藁本味苦辛性微溫無毒。入小腸膀胱二經。主寒氣客於巨陽之經。苦頭痛流於顙頂之上。又主婦人疝瘕陰中寒腫腹痛中急疼惡聞茹畏青箱子。

按藁本上行治風。故理太陽頭痛下行治濕。故治婦人諸症。風濕俱治。功用雖匹。尤長於風耳。

細辛

細辛味辛性溫無毒。入心肝膽脾四經。止少陰合病之首痛。散三陽數變之風邪。主肢節拘攣風寒濕痺。濕中氣散死肌破結氣消痰嗽止目淚療牙疼治口臭利水道除喉痺通血閉獨活會青藁根為使惡根毒山茱萸黃耆畏硝石滑石反藜蘆忌生菜狸肉華陰者良。

藥性解

卷二

按細辛辛溫。宜入心肝等經。以療在裏之風邪。其氣升陽。故上部多功。然諸症犯寒者可用。若因火熱屬陽症者忌之。單服未不可過半錢多則氣塞不通者死。

雷公云凡使一一採以藥服之害人須去頭上四爪水浸一宿至明漉出曝乾用

連翹

防已

防已味辛苦。性平溫。無毒。入十二經。尤善腰以下至足濕熱腫痛。瘡中風手脚攣急。口眼喎斜。疥癬蟲瘡。止嗽消痰。利大小便。去留熱。垣衣為使。惡細辛。草薢。殺雄黃毒。

按防已為陽中之陰。於經絡無所不入。又主降。故下部多功。象之於人。則險而健者也。用之當則可展其能。一不當而反階之禍。惟十二經真有濕熱壅塞。及膀胱積熱。下注脚氣。此誠要藥。無可代者。

藥性解

卷十

雷

然其味拂人。妄服之令人減食。其不可用有四。若飲食勞倦。元氣既虧。而以防已泄大便。則重亡其血。一也。發渴引飲。熱在肺經氣分。而防已乃下焦血藥。二也。外傷風寒。邪傳肺部。以致小便黃赤不通。此上焦氣分。禁忌血藥。三也。久病之後。津液不行。此上焦虛渴。宜補以甘溫。若用苦寒之劑。則速其危。四也。分木漢二種。即根苗為名。漢主水氣。木主風氣。為少異耳。

雷公云

凡使勿使水條。以其木防已黃。腥皮。上有一丁。足子不堪用。夫使防已。要心花大黃。

色者。然細到車前草。根相對同。蒸半日。取出。晒車前草。去之。細到用。

常山

常山味苦辛。性微寒。有毒。入肝經。最開結痰。專理瘴疾。毒令人吐惡。生慈。松葉及醋。苗名蜀漆。雞骨者良。按并溪云。常山屬金。宜伐肝邪。然其性酷。下咽令人大吐。傷脾損胃。惟精壯與痰實者宜之。老人小兒。及虛弱久病勿用。

雷公云

凡使春使莖葉。夏秋冬用時。用酒浸一宿。至明漉出。日乾。熬搗。妙用。勿令老人久病服之。

藥性解

卷二

雷

草龍膽

草龍膽味苦澀。性寒無毒。入肝膽腎膀胱四經。退肝經之邪熱。除下焦之濕腫。明目定驚。治痘止痢。能殺疳蟲。小豆。貫眾為使。惡防葵。地黃。

按圖經。龍膽秋令開。花冬間結實。屬金與水。金能制木。木入腎家。膽與膀胱。乃肝腎同部之腑也。故均入焉。大目得肝血而能視。肝得腎水而後生。今益腎清肝。目之受明。所自來矣。驚疳痘痢。皆肝膽症也。何弗治耶。

官公云：此藥性熱，欲用時，用銀刀切去，焙上，用
煎，勿空服，之。
令人胃不禁。

鎬補雷公炮製藥性解卷之一

鎬補雷公炮製藥性解卷之三目錄

草部中 五十四種

玄參 丹參 苦參 紅花

三稜 蓬莪茂 天麻赤箭 南星

秦艽 遠志附小草 破故紙 葫蘆巴

何首烏二種 骨碎補 威靈仙 牛膝二種

黃精 蒲黃 續斷 益母草

肉蓯蓉 鎖陽 車前子 紫苑

百部 百合 款冬花 馬兜鈴

青黛 甘菊 薏苡仁 牡丹皮

兔絲子 茴香附小茴 砂仁 白豆蔻

肉豆蔻 草豆蔻 草果 菖蒲

黑附子 天雄 烏頭 烏喙

側子 射干 旋復花 大戟

商陸 葶藶甜苦二種 牽牛黑白二種 草薢

木通 通草

鎬補雷公炮製藥性解卷之三目錄終

雲間 李中梓 編輯

姑蘇 錢允治 訂正

草部中

玄參

玄參味苦鹹性微寒無毒入心肺腎三經主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣除心煩明眼目理頭風療咽喉消癭瘤散癰腫解熱毒惡黃者乾薑大棗

藥性解

卷三

山茱萸反藜蘆勿犯銅器餌之噎喉損目

按玄參氣輕清而苦故能入心肺以清上焦之火體重濁而鹹故能入腎部以滋少陰之水所以積聚等症靡不療之

雷公云凡採得須用蒲草重重隔入甕蒸兩伏時後出晒乾使用時勿令犯銅餌之後噎人喉損目也

丹參

丹參味苦性微寒無毒入心經養神定志破結除癥消癰散腫排膿止痛生肌長肉治風邪得熱眼赤狂

悶骨節疼痛四肢不遂破宿血補新血安生胎落死胎理婦人經脉不調血崩帶下

按丹參色赤屬火味苦而寒故入手少陰經以療諸般血症

苦參

苦參味苦性寒無毒入胃大腸肝腎四經主結氣積聚伏熱黃疸腸風燥渴溺有餘瀝逐水消癰明目止淚去濕殺蟲療大風及一切風熱細疹以糯米泔浸一宿去浮面腥氣晒用玄參爲使惡貝母漏蘆兔絲子反藜蘆

藥性解

卷三

按苦參屬木有火性下降本入少陰已又入手足陽明及足厥陰經者以其善主濕也蓋濕勝則生熱熱勝則生風而結氣等症從茲有矣今以苦參燥濕治其本也東南卑濕尤爲要藥丹溪曰能峻補陰氣或得之而腰重者以其氣降而不升非傷腎也

雷公云凡使不計多少先須用糯米泔浸一宿過即蒸從已至中出曝乾細用之

紅花

紅花味辛性溫無毒入心肝二經逐腹中惡血而補血虛除產後敗血而止血暈療跌撲損傷瘡毒腫脹老人血少便結女子經閉不行催生下胎衣及死胎酒噴用其苗生搗敷腫毒其子吞數粒主天行痘瘡不出

按紅花下行血海宜入足厥陰而逐血潔古云苦溫爲陰中之陽故又入手少陰而補血然長於行血欲其補血須少用或佐補劑

藥性解

卷三

三

三稜

三稜味苦性平無毒入肺脾二經主行氣行血多年癥癖如石能消爲水麩裏煨醋炒用

按三稜爲血中氣藥脾聚血肺主氣宜竝入焉蓋血隨氣行氣聚則血不流故生癥癖之患非三稜不治然有斬關之勢虛人忌之

蓬莪茂

蓬莪茂味苦辛性溫無毒入肺脾二經開胃消食破積聚行闕血療心疼痛除腹痛利月經王奔他定霍亂

下小兒食積

按蓬莪茂與三稜相似故經絡亦同但氣中血藥爲小異耳性亦猛厲但能開氣不能益氣虛人禁之乃大全謂氣短不能續者亦宜用之過矣即大小七香丸集香丸都用以理氣豈用以補氣乎欲其先入血則醋炒欲其先入氣則火炮二稜亦然雷公云凡使於沙盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用之

天麻

天麻味辛性平無毒入肝膀胱二經療大人風熱眩暈治小兒驚悸風癇祛諸風麻痺不仁主癰瘰語言不遂利腰膝強筋力活血脈通九竅利周身療癰腫濕紙裏煨用無畏忌苗名赤箭主用略同

按天麻去風故入厥陰去濕故入膀胱真有風濕功效若神癰腫之症濕生熱也宜亦治之赤箭用苗有自表入裏之功天麻用根有自內達外之理不宜同劑反致無功

雷公云凡使勿用銜風草綠與天麻相似只是葉莖不同其銜風草根莖斑葉皆白有青點使銜風草根切勿使天麻二件同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用茯苓子一錢緩火熬焦

熱後便先安置天麻十兩於甌中，其用火熬過，蒸
蘇子蓋內，外便用三、五紙蓋，并繫從已至未時，又
出蘇子，再入熬炒，存在天麻甌內，用炒蘇子
於中依前蓋二隔，一伏時取出，如此七遍，瓶盛出，
後用布拭上氣汗，用刀劈斷之，細切單
搗，然用銜風草修事法，亦同天麻一服。

南星

南星味苦辛，性平，有毒，入脾肺二經。主中風牙關緊
閉，痰盛麻痺，下氣破堅積，消癰腫，利智，臨散血墮胎。
搗敷疥癬瘡，并蛇蟲咬傷，沸水泡，七次以牛膽汁
收其末，入膽久懸風處，更佳。畏附子，乾薑生薑。

按肺受風邪，脾多痰飲，南星專主風痰，故竝入二
藥性解

卷三

五

經味辛，主散，所以消癰墮胎，及療疥癬等疾。大抵
與半夏同功，但半夏辛而能守，南星辛而不守，其
燥急之性甚於半夏，故古方以牛膽苦寒之性制
其燥烈，且膽又有益肝鎮驚之功，小兒尤為要藥。
丹溪曰：南星欲其下行，以黃柏引之。

秦艽

秦艽味苦辛，性微溫，無毒，入胃大小腸三經。主骨蒸
腸風瀉血，活筋血，利大小便，除風熱，療黃疸，解酒毒。
去頭風，舊蒲為使，羅紋者佳。

按秦艽苦則涌泄為陰，故入大小腸以療諸濕，苦
則發散為陽，故入陽明經以療諸風。骨蒸之症，亦
濕勝風淫所致，宜竝理之。

雷公云：凡使秦艽，并芫須於野文處認取，左文列為
上黃肉，白黃肉，然後用酒洗，元湯
按一宿至明，出日乾用之。

遠志

遠志味苦辛，性溫，無毒，入心腎二經。補不足，除邪氣，益
智慧，明耳目，寧怔忡，定驚悸，利九竅，治健忘，壯陽道。
益氣長肌肉，助筋骨，及婦人血禁失音，小兒驚風。

藥性解

卷三

六

秦艽皮膚熱，面目黃，久服悅顏色，延年。甘草湯泡，去
心用，得茯苓、冬葵子、龍骨、良薑、珍珠、菖蒲、黃連、齊蛤
、忌猪肉、生蔥、冷水、殺天雄、附子、毒藥、名小草，主夢泄。
按遠志苦入心，經溫能滋腎，而不足等症，咸本二
經故都治之。

雷公云：遠志凡使，先須搗去心，若不去心，服之令
乾用之。
人問：去心了，用熱甘草湯浸一宿，濾出，曬

破故紙

破故紙味苦辛，性大溫，無毒，入腎經。主五勞七傷，陽

威靈仙

威靈仙味苦性溫無毒入十二經主諸風宣通五臟去腹內冷滯心胃痰水人積癥癖勝脫惡水腰膝冷寒兩足腫滿又療折傷忌麪及茶茗牛肉牛乳採時不開流水聲鐵脚者佳

按威靈仙可升可降為陰中之陽故於經絡無所不入丹溪云屬木故於肝臟多功治痛風之要藥也其性好走多服疏人五臟真氣然風注疼痛非此不除中病即已不宜多用

牛膝

牛膝味苦酸性平無毒入腎經補血氣利腰膝填骨髓除腦痛祛寒濕破血結通月經墮胎孕理膀胱氣化遲難陰中作痛欲死夫蘆酒浸一宿用惡龜甲鹽火陸英畏白前白蘆皮忌牛肉

按丹溪云牛膝引諸藥下行宜入足少陰經以理諸疾婦人得之應歸血海故行血有功脾虛氣陷及腿膝濕腫者不宜用之有二種土牛膝所稟薄故短而細上破血氣川牛膝所稟厚故肥而長主

補柏髓竹木刺入肉塗之可出

雷公云凡使去頭并身上下用黃精白然汁發一箇洗出刺到骨乾用

黃精

黃精味甘性平無毒入脾肺二經補中益氣除風濕安五臟耐顏色久服延年

按黃精甘宜入脾潤宜入肺久服方得其益黃勝於銀花勝於實但難辨耳與釣吻相似然釣吻有毛釣吻二物是別認處誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以後洗淨後蒸從已至于刀薄切曬乾用

蒲黃味甘性平無毒入肝經生用則性滑主行血通經墮胎消閉排膿利小便祛心腹膀胱熱炒用則性澀主止血除崩漏帶下一切吐血衄血痢血尿血腸風下血止精洩定兒疳痛忌見鐵器宜隔紙焙黃蒸之再焙用

蒲黃

按蒲黃主血而肝藏血故刺入焉有經用之亦以多功於血耳

雷公云凡使勿用松黃其味異及吐人凡欲使黃須用三時發黃令色黃蒸半日却焙令乾用之妙

續斷

續斷味苦辛性溫無毒入肝腎二經主傷寒不足折傷金瘡諸癰腫胎漏尿血益氣力續筋骨散諸血煖子宮療腰脚縮小便止夢泄利關節瀉血和血生肌止痛酒浸一宿焙乾用也黃為使惡雷丸

按腎主骨藏精肝主筋而藏血續斷補精血而助筋骨入此二經矣胎產之症尤為要藥

雷公云凡使勿用草薊根真似續斷若誤服之令人筋脈痿痺得後橫切到之又去向裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

益母草

益母草味辛甘性微溫無毒入諸陰經主行血養血安胎利產消浮腫惡毒疔瘡治頭風血虛目疾癰疹發瘡堪作浴湯子名充蔚益精明目除水氣療血逆大熱頭痛心煩下腹中死胎理產後血脹

按益母本功治血故入諸陰之經行血而不傷新血養血而不滯閼血所以為胎產聖藥又能消瘡

腫者取其行血而且辛甘發散也

肉蓯蓉

肉蓯蓉味甘酸鹹性微溫無毒入命門經與陽道益精髓補勞傷強筋骨主男子精泄尿血滑有遺瀝女子瘕瘕崩帶宮寒不孕酒浸一宿去浮甲劈破中心去白膜蒸半日酥炙用潤而肥大者佳

按從容性溫為濁中之濁故入命門而補火惟尺脉弱者宜之相火旺者忌用多服令人大便滑

雷公云凡使先須清酒浸一宿至明以棟上土沙上淨甲盡劈破中心去白膜一重如竹

藥性解凡使此偏隔人心前氣不散令人上氣不吐凡使先用酒浸并刷淨却蒸定干至西出又用酥炙

鎖陽

鎖陽味甘鹹性溫無毒入腎經補陰虛固精髓潤大便燥結宜酥炙用

按鎖陽鹹溫宜入少陰本經不載丹溪續補以其固精故有鎖陽之名主川與從容相似老人枯閉最為要藥大便不實者忌之

車前子

車前子味甘性寒無毒入肝膀胱小腸三經主淋瀝
癰閉陰莖腫痛濕痛泄瀉赤白帶濁血閉產難炒細
研用常山為使根葉主金瘡功用同子

按車前子利水宜入手足太陽行血宜入厥陰然
逐水之劑多損於目本草云明目者以其清肝熱
如釜底抽薪非因泄水之功也

紫菀

紫菀味苦辛性溫無毒入心肺二經主咳逆氣痰
喘吐衄補虛勞安五臟水洗淨蜜炙用款冬為使惡

天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿紫色潤軟者佳

按紫菀苦能入心而泄上炎之火辛能入肺而散
結滯之氣行氣養血專治血痰為血癆要藥

雷公云凡使先去髮有白練色者號曰羊鬚草白
然不同採得後去頭土了用東流水淘洗
令淨用蜜浸一宿至明於火上
焙乾用凡修一兩用蜜二分

百部

百部味甘苦性微寒有小毒入肺經主肺熱咳逆傳
屍骨蒸殺疳疔寸白諸蟲及鼠竹刀劈開去心酒浸
用

按百部專療咳嗽宜入肺經有小毒殺蟲
雷公云凡採得後用竹刀劈去心皮花作段
於簾下懸冷風吹待上乾後用酒浸一
宿漉出焙乾細剉用蔥一顆自有八十三
條者焙乾號曰地仙苗若修事餌之壽長

百合

百合味甘性平無毒入心肺大小腸四經主鬼魅邪
氣熱咳吐血潤肺寧心定驚益志攻發背消癰腫除
服清利二便

按百合性潤故入心肺諸經雖能補益亦傷肝氣
不宜多服

款冬花

款冬花味甘辛性溫無毒入心肺二經主中風喉痺
肺痿肺癰潤心肺止咳嗽除痰喘定驚悸洗肝明目
本仁為使得紫菀良惡皂莢硝石玄參畏貝母辛夷
麻黃黃耆黃芩黃連青箱

按款冬辛甘發散為陽故入心肺以理痰嗽等症
畏惡甚多川者慎之

雷公云凡採得須去向外裏花藤殺節向裏實如
碎纔煎兩件
非者棄了用

馬兜鈴

馬兜鈴。味苦。性寒。無毒。入肺經。主清肺。除咳嗽痰喘。治血痔瘻瘡。根名青木香。下氣甚速。

按馬兜鈴專主手太陰經矣。何以治痔瘻之症也。良以肺與大腸相為表裏。肺遺熱於大腸。故有此症。入清其表。而裏病自愈矣。

雷公云。凡患痔瘻。後去藥。用生油。盛於瓶內。令油氣子勿令去。草藥不盡用之。并少。

青黛

藥性解

卷三

十三

青黛。味苦甘。性寒。無毒。入肝脾二經。除鬱火。解熱毒。止下痢。殺諸蟲。治小兒疳蟲消瘦。驚癇和氣。唇焦口渴。上膈稠痰。療傷寒赤斑。面黃鼻赤。

按青黛色青。屬木。味甘。屬土。宜入厥陰太陰。以理諸熱之症。

甘菊

甘菊。味甘微苦。性平。無毒。入肺脾肝腎四經。能補陰氣。明目聰耳。清頭風。及胃中煩熱。肌膚濕痺。枸杞根桑白皮。蒼白朮。為使。

按丹溪曰。菊花屬金。而有土與水。大能補陰。宜入肺脾等經。蓋煩熱諸症。皆由水不足而火炎得此補陰。則水盛而火自息矣。須用味甘者佳。若苦者為苦。慈大傷胃氣。慎之。

慈苢仁

慈苢仁。味甘微寒。無毒。入肺肝脾胃大腸五經。利腸胃。消水腫。祛風濕。療腳氣。治肺痿健脾胃。

按慈苢仁總理濕熱。故入上下五經。蓋受熱使人筋急。受濕使人筋緩。若受寒使人筋急者。

藥性解

卷三

十六

忌之。勢力和緩。須多用見効。

雷公云。凡使勿用慈米。類大無味。其慈米時人呼為慈。慈是也。若慈苢仁。類小色青。味甘。咬者。人商大用。一兩。以糯米一兩同熬。令糯米熟。去米取使。若更以鹽湯煮之。之過。別是一般。修得。

牡丹皮

牡丹皮。味辛苦。性微溫。無毒。入肝經。治一切冷熱氣血凝滯。吐衄血。瘀積血。跌撲傷血。產後惡血。通月經。除風痺。催產難。畏兔絲子。忌蒜。

按丹皮主用。無非辛溫之功。禹錫等言。其治冷當矣。本草曰。性寒。不亦誤耶。夫肝為血舍。丹皮乃血

劑固宜入之本功專主行血不傷血而東垣以此治無汗骨蒸六味丸及補心丹皆用之蓋以血患火燥則枯患氣鬱則新者不生此劑苦能瀉陰火辛能疏結氣故為血分要藥

雷公云凡採得後日乾用銅刀劈破去骨丁細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日曬用

鬼絲子

鬼絲子味甘辛性平無毒入腎經主男子腎虛精寒腰膝冷痛莖中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精久服

藥性解

卷三

十七

強陰堅骨駐顏明目輕身今人多士酒浸五宿蒸熟杵作餅曬乾研用山藥松脂為使惡葷菌。

按雷公云鬼絲子稟受中和凝正陽氣故宜入補少陰溫而不燥不助相火至和至美之劑宜常用之。

雷公云凡使勿用天碧草子其樣與相似只升天藥中和之正陽氣受結偏補人腎氣助入筋脈一莖從樹枝成又從仲春土陽氣其氣大小六七筵二兩今採得去粗薄殼了用酒浸二日滴出用黃精自然汁浸一宿至明後用火煎至乾入口中熱燒鐵杵一去三千餘度檢用苦酒并黃精自然汁與鬼絲子相對用之

茴香

茴香味辛甘性溫無毒入心脾膀胱三經主一切臭氣腎臟虛寒癰疽腫痛及蛇咬傷調中止嘔下氣寬胃又有一種小茴氣味稍薄然治膀胱冷痛疝氣尤奇。

按茴香氣厚為陽中之陽故入少陰太陰太陽以理虛寒諸症雖辛溫快脾亦能耗氣今內相都入煎燂油膩之物與火無異久則致疾深宜戒之。

砂仁

藥性解

卷三

十八

砂仁味辛性溫無毒入脾胃肺大小腸膀胱腎七經主虛寒瀉痢宿食不消腹痛心疼咳嗽脹滿奔弛霍亂轉筋祛冷逐痰安胎止吐下氣化酒食炒去衣研用。

按砂仁為行散之劑故入脾胃諸經性溫而不傷於熱行氣而不傷於剋太陰經要劑也宜常用之。

白豆蔻

白豆蔻味辛性溫無毒入肺脾胃三經主消寒痰下滯氣退目中翳止嘔吐開胃進食除冷瀉痢及腹痛

心疼妙去衣研用白而圓滿者佳

按白豆蔻辛宜入肺溫為脾胃所喜故竝入之大抵辛散之劑不能補益藥性稱其補上焦元氣恐無是理但不甚刻削耳世俗不察而信之誤人不少治寒氣神效肺胃中有火及虛者忌之

肉豆蔻

肉豆蔻味苦辛溫性溫無毒入脾胃二經療心腹脹痛卒成霍亂脾胃寒弱宿食不消虛冷瀉痢小兒傷乳吐瀉尤為要藥糯米粉裹煨忌見鐵器

藥性解

卷三

十六

按肉蔻即肉果辛溫之性宜入脾胃有未去之積者不可先以此澁之

雷公云凡使須以糯米作粉使無湯搜索豆蔻於其中布子散煨灰中炮待米剛子熟黃熟然後出去米用勿令犯銅

草豆蔻

草豆蔻味辛性熱無毒入脾胃二經主風寒客邪在胃其餘與白者同功而性尤燥急不及白蔻有清高之氣

按草蔻辛溫發散故入脾胃而主風寒多食大損

脾胃衍義謂其虛弱不食者宜此恐生胃火者忌

雷公云凡使須去微并向東子後取皮用朱英同炒上級炒得朱英微黃黑即去朱英取子用之

草菓

草菓味辛性溫無毒入脾胃二經主瘧疾胃腹結滯嘔吐胃經風邪

按草菓辛溫發散與草蔻同功故經絡亦同多食亦損脾胃虛弱及胃火者亦忌之

藥性解

卷三

十七

菖蒲

菖蒲味辛性溫無毒入心肺膀胱三經上風寒濕痺欬逆上氣鬼疰邪氣通九竅明耳目堅齒牙清聲亮益心智除健忘止霍亂開煩悶溫心腹殺諸蟲療瘡疥癬勿犯鐵器去根毛用秦皮秦朮為使惡地脂麻黃忌羊肉羊血怡糖生石上一寸九節者佳

按菖蒲通神明宜入心經祛風濕宜入肺與膀胱功驗雖宏然主散而不主收勿宜久用

雷公云凡使勿用泥泔洗其根二節相似如竹根形黑氣微味腥不潔用之食採石上生

之藥發散而藥更節制長引有九節者是與也
按後用細刀刮上黃黑硬節皮一重了用嫩
枝條細并蒸出膠

黑附子

黑附子味辛甘性大熱有大毒通行諸經主六腑沉
寒三陽厥逆癱瘓積聚寒濕拘攣霍亂轉筋足膝無力
力墮胎甚速擇每隻重二兩者去皮臍以薑汁鹽水
煮數沸又用黃連甘草煎合煮一時於午地上掘
坑埋一宿取出晒乾用地膽爲使惡蜈蚣畏人
參其草黃者防風黑黑

藥性解

卷三

十一

按附子爲陽中之陽其性浮而不沉其用走而不
息故於經絡靡所不入宜致墮胎祛癥積等症者
辛其大熱能補命門衰敗之火以生脾土故仲景
四逆湯用以回腎氣理中湯用以補脾入味丸用
以補腎膠譬如躁悍之將善用之奏功甚捷不善
用之爲害匪輕丹溪以爲仲景取其行地黃之滯
而不能有補則古方用黑附一味可以回陽不補
而能之乎丹溪之言於理未當雖然彼或鑒誤用
之弊有激而發耳如洪制之毒性盡去且令下行

若酒冷陽脫但微炮之。

天雄

天雄性味經絡功用與附子同主療頭面風寒來疼
痛遺志爲使惡腐婢

按天雄卽附子之長而尖其頂不正者其氣親上
故滌古云主上焦陽虛。

烏頭

烏頭性味經絡功用亦同附子主中風惡風洗洗出
汗莽草爲使惡藜蘆反半夏瓜蒌貝母白蘇白芨。

藥性解

卷三

三

按烏頭卽春間採附子之嫩小者一云原生苗腦

烏喙

烏喙主男子腎濕陰痒癰腫便反性味功用同前。

按烏喙卽烏頭之有兩岐者如烏之口故名。

側子

側子主發散四肢爲風癰藥。

按側子卽附子傍出小顆其氣輕揚故主發散。

雷公云側子只是附子傍出小顆似子如藥性者
是宜主用治風癰神妙也木龍子只是諸

藥附雄側子中現者謂曰木龍
子不入藥用若服之令人喪目

射干

射干味苦性微溫有毒入肺肝脾三經主咳逆上氣咽喉諸症開胃進食鎮肝明目消癰毒逐開血通月經行積痰使結核自消又肝經濕氣因疲勞而發便毒者取三寸與生薑同煎服利兩三行效

按射干溫能下氣行血宜入肺肝苦能消痰宜入脾經久服令人虛

雷公云

凡使先以米泔浸一宿漉出然後用鹽白菜煮從干至玄漉出曬乾用之

旋覆花

藥性解

卷三

十三

旋覆花味鹹甘性溫有小毒入肺肝大腸膀胱四經主結氣風氣脇下滿膈上痰如膠漆利大腸逐水濕按旋覆花專理風氣水濕而肝主風肺主氣膀胱大腸主水濕故均入之丹溪曰走散之藥病人涉虛者不宜多服

雷公云

凡採得後去裏殼殼與用帶子花並蒸從干至玄晒乾用

大戟

大戟味苦甘性大寒有毒入十二經主水脹蠱毒癰結腹滿急痛發汗利大小腸通月經墮胎孕小豆乳

便惡山藥畏首蒲反甘草芫花海藻

按大戟陰中微陽逐十二經水能損真氣量虛實用之

雷公云

凡使勿用附生者若服今洩氣不禁仰臥到海羊糞拌蒸從已至中土羊糞晒乾用之

商陸

商陸味酸辛性寒有毒入脾膀胱小腸三經主水脹蠱毒癰瘰癧惡瘡墮胎孕

按商陸專主逐水與大戟相似夫水之為病由於勝肺小腸不利而脾家之所深惡者也故咸入之有赤白二種白者可服赤者有神堪用此腫誤服殺人

藥性解

卷三

市

雷公云凡使勿用赤葛綠相似其赤葛花莖有青採之用作補可下酒也每條長約一尺許去粗皮丁薄切以東流水浸兩宿然後洗出架曬蒸以豆葉一重了與商陸一重如斯蒸從午至亥出

去豆葉暴乾了細剉用苦無豆葉只用豆代之

葶藶

葶藶味辛苦性寒有小毒入肺心脾膀胱四經主水腫結氣膀胱閉熱定肺氣之喘促痰飲之痰厥

糯米焙黃去米用。榆皮爲使。惡蠶蠶燈草石龍芮。

按葶藶辛走肺。苦走心。膀胱者。肺所縮也。脾土者。心所生也。故皆入之。大傷肺氣。滲泄下元。用之不當。殺人其捷。稍涉虛者忌之。有甜苦二種。苦者太猛。劣甜者性少緩。

雷公云。凡使勿用赤蘘子。與相。似葶藶。只是味微煨。上微微焙。待米熟去米。單搗用。

牽牛子

牽牛子。味苦辛。性寒。有毒。人大小腸二經。主下氣。通

二便。

祛瘴滯氣急。退水腫。消風毒。治腰脚痛。墮胎孕。

酒蒸去皮用。

按牽牛子專主水氣。故入大小腸經。丹溪曰。屬火

者。是有兩種。黑者兼水。白者兼金。病形與症俱實。

者用之。然驅逐致虛。不脹滿。不大便秘者勿用。仲

景治七種濕症。及小便不利。俱不用之。何也。蓋受

濕之根在下焦。是血分中氣病。皆因上焦虛弱。不

能氣化所致。若復用辛辣之劑。以瀉太陰之金。危

亡立至矣。可不謹乎。

雷公云。葶藶。實冬收之。凡用晒乾。却入水中淘淨。若去之。取沉者晒乾。拌酒蒸從巳至未。晒乾。臨用春去黑皮用。

葶藶

葶藶。味苦甘。性平。無毒。入脾腎膀胱三經。主風寒濕痺。腰背痛。中風不遂。遍身頑癩。膀胱宿水。陰痿失溺。利水道。益精明目。薏苡爲使。畏葵根。大黃。柴胡。牡蠣。忌牛肉。

按葶藶之入三經。何也。蓋腎受土剋。則水臟既衰。

肝挾相火而凌土濕。脾主肌肉。濕鬱肌腠。則生熱

生風。以致榮衛不和。關節不利。而葶藶長於去水。

用之以滲脾濕。則土安其位。水不受侮矣。然久用

令人小便多。小便既多。則腎氣安得復實。今多泥

其入腎。用爲補劑。亦未深原其理耳。

木通

木通。味辛甘。性平。無毒。入小腸經。主五淋。小便閉。經

凝。乳閉。難產。積聚。驚悸。心煩。健忘。耳聾。聲啞。鼻塞。癰

瘡。脾疸。喜睡。天行瘟疫。

按木通利便。專瀉小腸。宜療五淋等症。其驚悸等

症雖屬心經而心與小腸相為表裏故並治之
但喜睡此脾之病皆濕所釀也利小腸而濕不祛
乎瘟疫之來感大地不正之氣今受盛之官行而
邪不能容亦宜療矣

通草

通草味淡性寒無毒入肺大小腸三經與木通同功
特瀉肺明目退熱行經下乳通結力尤勝之

按通草色白宜其瀉肺味淡故入小腸性主通行

故又入大腸即本草續註所謂通脫木今女工用

以作花

卷三

三七

錫補雷公炮製藥性解卷之四目錄

草部下 五十四種

燈心 石斛 石葦 白蒺藜

青箱子 木賊草 茅根 仙茅

鬱金 薑黃 牛蒡子 紫草

白頭翁 白前 白薇 白附

蚤休 白蘚皮 蘆薈 胡黃連

澤蘭 狗脊 青蒿 草撥

王不留行 淫羊藿 巴戟 蘭葉

水萍 決明草 草麻子 馬鞭草

蘆根 蛇床子 金銀花 山豆根

艾葉 薄荷 稀莖 蒲公英

夏枯草 藿香 荆芥 香薷

佛耳草 蒼耳 茵陳 使君子

高良薑 石蓮子 合歡皮 豈草根

劉寄奴 覆盆子

錫補雷公炮製藥性解卷之四目錄

鑄補雷公炮製藥性解卷之四

雲間 李中梓 編輯

姑蘇 錢允治 訂正

草部下

燈心

燈心味淡。性寒無毒。入心小腸二經。主胸腹邪氣清。心定驚除。熱利水。燒灰付金瘡。止血。療小兒夜啼。吹喉中。治急喉痺甚捷。

藥性解

卷四

石斛

石斛味甘。性平無毒。入胃腎二經。補虛羸。緩水臟。填精髓。強筋骨。平胃氣。逐皮膚邪熱。療脚膝冷痺。久服厚腸胃。定志除驚。去根酒浸一宿。曝乾。酥炙用。陸英爲使。惡寒水。石巴豆。畏蠶蠶雷九。

按石斛入腎。則專主下部矣。而又入胃者。蓋以其味甘耳。助腎而不傷于熱。平胃而不傷于燥。故也。

石葦

雷公云

凡使先去頭上丁。用酒浸一宿。漉出。曬乾。却川酥蒸。從己至酉。却徐徐焙乾。然後用。

石葦味苦甘。性平無毒。入肺膀胱二經。主勞熱邪氣。五淋癃閉。膀胱熱滿。癰疽發背。除煩下氣。補虛益精。拭去毛。羊脂炒焦黃用。絡石杏仁爲使。得苜蓿良。按石葦清熱利水。本入膀胱而肺則下連者也。宜兼入之。既能清熱利水。則無陽亢陰傷之患。

白蒺藜子

白蒺藜子味苦辛。性溫無毒。入肺肝腎三經。主惡血。癰癥結喉。痺產難乳。閉小兒頭瘡。皮膚風癢。頭痛。咳嗽。肺痿。除煩下氣。明眼。且去燥熱。療腫毒。止遺精。其葉可作浴湯。治風。并去刺。酒蒸炒用。烏頭爲使。有一種沙苑蒺藜。主補腎添精。強陰。種子。

按蒺藜行血。宜入肝經。下氣宜入肺經。惡血等症。皆二經病也。故俱主之。其所以入腎者。因肺爲之母。肝爲之子。未有子母俱利。而腎不受其益者。故能止遺泄。

雷公云。凡使採得後。半揀擇了。蒸從午至酉。出。曬乾。春令皮上刺盡。用酒拌再蒸一二時。

青箱子

青箱子。味苦。性微寒。無毒。入心肝二經。主邪氣皮膚風熱。淫癬。殺三蟲。疥。惡瘡。痔。下血。下部。醫。瘰。癧。肝。膽。堅。骨。筋。益。腦。髓。明。目。一。名。草。蒿。

按青箱子。苦者。肉丁之味也。青者。甲乙之色也。故入心肝二經。本經並不言治眼。而藥性論及日華子皆言之。亦以苦寒之性。能清肝膽熱毒上衝耳。
雷公云。凡使勿誤用。思其子。并鼠細子。兩件頗相。似。只是味不同。其思其子。味更酸。而之有疑。

木賊

木賊。味甘。微苦。性平。無毒。入肝經。主目疾。退翳膜。消積塊。益肝臟。得麝香。牛角。應治。休息。痢。久不瘥。得禹餘糧。當歸。等。藥。煎。服。中。赤。白。得。槐。葉。桑。耳。治。腸。風。下血。得。槐。子。枳。實。地。榆。治。腸。澼。及。痔。血。去。節。水。潤。焙。用。
按木賊之名。以其能伐木也。肝為木。故宜入焉。夫目得血而能視。藉之以伐肝邪。則血生而愈目矣。

茅根

茅根。味甘。性寒。無毒。入胃小腸二經。逐瘀血。通血閉。止吐衄。下五淋。利小便。理勞傷。補虛羸。除腸胃客熱。

治婦人崩漏

按茅根利水。本入小腸。而胃則其傳受。故亦入之。

仙茅

仙茅。味辛。性溫。有毒。入肝腎二經。主心腹冷氣。不能食。腰足攣痺。不能行。丈夫血損勞傷。老人失溺。無子。強陽道。補精血。明眼目。堅骨髓。洗淨。去皮。銅刀切如豆大。生稀布袋盛。于烏豆水中浸一宿。酒拌蒸半日。曬乾用。勿犯鐵器。忌牛肉牛乳。

按仙茅性溫。本入腎經。而肝者。腎所生也。故兼入之。傳云。十斤乳石。不及一斤仙茅。蓋表其功耳。中其毒者。令人舌脹。急煎大黃。朴硝湯飲之。復以未

按舌間即解。素有火症者勿用。

雷公云。凡採得後。用清水洗。今流刮去皮。于槐砧上切。豆許大。却用生稀布袋盛。一宿蒸用。

鬱金

鬱金。味辛。苦。性溫。無毒。入心肝二經。主下氣。破血。開鬱。療尿血。淋血。金瘡。楚產。蟬肚者佳。

按鬱金本草言其性寒。自藥性論始言其治冷氣。今觀其主療。都是辛散之川。性寒而能之乎。夫肺

主氣。心主血。鬱金能行氣血。故兩入之。丹溪云。屬火而有土與水。古人用以治鬱遏不散者。故名。

薑黃

薑黃。味辛苦。性溫。無毒。經絡主治。與鬱金同功。更烈。按薑黃。本草亦曰性寒。而陳藏器及日華子咸稱其熱。辨之悉矣。能傷元氣。用者審之。

牛蒡子

牛蒡子。味辛。性溫。無毒。入十二經。主風溼癰疹。盈肌咽喉風熱。不利。諸腫瘡瘍之毒。腰膝凝滯之氣。潤肺藥性解。

止咳。散氣消痰。酒拌蒸。待有白霜出。拭去。焙乾。搗用。一名惡實。一名鼠黏子。

按主治秘訣。及東垣皆云牛蒡子辛溫。故能入十二經而通散也。潔古云。吞一枚。可出癰疽頭。亦表其辛散之功耳。本草言其性平。誤矣。

紫草

紫草。味苦。性寒。無毒。入心小腸二經。主心腹邪氣。脹滿作痛。癰腫諸毒。除五疸。利九竅。通水道。小兒血熱痘瘡。尤爲要劑。取嫩草。去髭用。

按紫草主血熱。本入心經。而小腸者。受盛而與心應者也。故并入之。邪氣諸症。咸本于熱。今清其心而自愈矣。

雷公云。凡使須用。鹽水蒸之。待水乾。取去頭并兩利。用。每事紫草一斤。用鹽二兩。鹽化用。

白頭翁

白頭翁。味苦。性溫。有小毒。入心腎二經。主溫瘧發狂。癰疽積聚。癰瘰癧。金瘡鼻衄。齒痛腹痛。骨痛。赤毒痢下。男子除疝。偏腫。小兒頭禿。瘰癧。脈實爲使。得酒良。

藥性解

本

按白頭翁。味苦。本入心經。經曰腎欲堅。急入苦以堅之。故又入腎。溫瘧等症。無非水衰火旺。故治之。

白前

白前。味甘辛。性微溫。無毒。入肺經。主下氣除嗽。氣塞喘上衝。不得睡臥。氣逆衝喉。呼吸欲絕。腹中時時作水雞聲。甘草水浸一宿。去頭鬚子。焙乾用。忌羊肉。

按白前。色白。味辛。故入肺經。專主一切氣症。

白薇

白薇。味苦鹹。性大寒。無毒。入心腎二經。主暴中風。身

然腹滿忽忽不知人狂或鬼邪寒熱酸疼溫瘧洗洗
發作下水氣利陰氣定驚益精以糯米泔浸一宿去
芰細剉蒸引惡黃耆大黃大戟乾薑大棗乾漆山萸
按白薇味苦入心鹹入腎故主治如右

白附子

白附子味甘辛性溫無毒入肺脾二經主中風失音
一切冷風氣頭面百病斑點風瘡疥癬心痛血痺陰
囊溼癢入藥炮用新羅出者佳

按白附色白味辛故宜入肺以治風痰甘而且溫
藥性解

故宜入脾以治皮膚陽中之陽能上升故治面病

蚤休

蚤休味苦微寒有毒入心經主驚癇癩疾瘰癧陰蝕
癰腫毒瘡小兒胎風手足抽掣下三蟲去蛇毒一名
紫河車一名重樓金線

按蚤休味苦故入心經以治驚癇等疾而能解毒

白鮮皮

白鮮皮味苦鹹性寒無毒入肺小腸二經上頭風黃
疸咳逆淋瀝濕痺死肌一切疥癩惡風疥癬楊梅諸

瘡熱毒天行時疾頭痛眼疼女子陰痛小兒驚癇和
血脈通九竅利小腸惡蟬蛸枯梗茯苓車前

按白鮮皮入肺經故能去風入小腸故能去溼夫
風溼既除則血氣自活而熱亦從此逝矣

蘆薈

蘆薈味苦性寒無毒入心肝二經消風熱除煩悶明
眼目治驚癇殺三蟲療五疳及疥癬痔瘡諸瘡解已
豆毒

按蘆薈之苦本入心經而肝則其母也故亦入之
藥性解

在小兒驚癇諸熱尤為重藥

雷公云凡使勿用細藥其家願乾了上有竹斑
光膩微微甘便和寒藥搗此藥先搗成粉

胡黃連

胡黃連味苦性寒無毒入肝膽胃三經主傷寒咳嗽
溫瘧發熱骨蒸勞熱三消五痔補肝膽明眼目止瀉
痢益顏色治小兒驚癇霍亂大人五心煩熱婦人胎
蒸虛驚惡菊菊花玄參白鮮皮忌猪肉解巴豆毒折之
出塵如煙者與

按胡黃連苦寒能瀉三經之火小兒多熱症最宜

澤蘭

澤蘭味苦。性微溫無毒。入小腸經。通肝脾之血。產前後百病皆治。通九竅。利關節。又主頭風目痛。鼻紅吐血。治癰排膿。防已為之使。

按澤蘭能通利小腸。則肝脾無壅閼之患。故能通關節。以理血脈也。行血而無推蕩之患。養血而無膩滯之虞。所以為產科聖藥。凡癰瘡皆因血熱。故亦治之。

雷公云。要別識雄雞其形不同。大澤蘭形葉皆圓。能生血益氣。與榮合小澤蘭通別同用。

狗脊

狗脊味苦甘。性微溫。無毒。入腎膀胱三經。主腎氣虛弱。風寒溼痺。腰膝軟弱。骨節作疼。老人失溺不節。女子傷中淋露。酒蒸用。草解為使。惡敗醬。

按狗脊入腎。故主骨病。入膀胱。故主溼病。

青蒿

青蒿味苦。性寒無毒。入心經。主骨蒸勞熱。虛煩盜汗。明目殺蟲。童便浸七宿。晒乾用。

按青蒿苦入心。故瀉丙丁以理諸疾。

葦撥

葦撥味辛。性大溫無毒。入肺脾胃膀胱四經。主溫中下氣。消食開痰。治陰疽。止霍亂。除瀉痢。日久療心腹冷痛。醋浸一宿。刮去皮。栗子令淨方用。

王不留行

王不留行味苦甘。性平無毒。入心肝二經。主金瘡止血。癰疽毒瘡。心煩鼻衄。難產。出竹木刺入肉。治風毒通血脈。酒蒸焙用。

藥性

卷四

按王不留行專療血症。而心主血。肝藏血者也。故均人之癰疽等症。血不和也。經曰。營氣不從。逆于肉理。乃生癰腫。此主和血。固宜治之。又治風毒者。所謂治風先治血。血行風自滅也。

淫羊霍

淫羊霍味辛。性溫無毒。入腎經。主絕陽不起。絕陰不育。范中作痛。小便不利。益氣力。堅筋骨。丈夫久服。令人無子。每斤去花細剉。拌羊脂四兩。炒脂盡為度。山藥紫芝為使得酒良。一名仙靈脾。

按仙靈脾入腎而主絕陽等症其為補也明甚乃
繼之曰久服無子母乃惑乎不知此劑專助相火
令人淫慾不休慾太甚則精氣耗經曰因而強力
腎氣乃傷高骨乃壞且命門之火乘水之衰拔土
來尅生之不保其能嗣耶

雷公云凡使先須時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉
枝盡後細剉用羊脂和對拌炒過然後用

巴戟天

巴戟天味辛甘性微溫無毒入肺腎二經主助腎添
精除一切風及邪氣酒浸用覆盆為使惡雷丸丹參
按巴戟之溫本專補腎而肺乃腎之母也且其味
辛故兼入之以療風凡命門火旺以致泄精者忌
之

雷公云凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出
酒浸一時又漉出用菊花同煮令焦黃用

蘭葉

蘭葉味甘性寒無毒入肺經止渴生津益氣散鬱

按丹溪云蘭葉果金水之精故入肺臟昔東垣方
中嘗用之經曰消諸痺治之以蘭是也余屢驗之

水萍

水萍味辛酸性寒無毒入肺小腸二經消水腫利小
便逐風寒堪浴遍身瘡癢發汗甚于麻黃

按水萍入肺故主祛風入小腸故主祛溼此是水
中大萍非溝渠所生者高供本採萍歌云不在山
不在岨採我之時七月半選其嫩風與緩風此小
微風都不算豆淋酒下兩三九鐵帳頭兒都出汗
以此觀之其功甚于麻黃可知矣

決明子

決明子味鹹苦甘性平無毒入肝經主青盲赤白翳
膜時有淚出除肝熱療頭風研末塗腫毒貼臍止鼻
紅著實為使惡大麻子

按決明專入厥陰以除風熱故為眼科要藥昇紅
腫毒咸血熱也宜其療矣

草麻子

草麻子味甘辛有小毒入脾大腸二經主水脹腹滿
臟腑燥熱無名腫毒敷之可消口眼喎斜敷之可正
歪足心下胞胎如神塗癰疽收生腸其捷忌見鐵器
服過者一生忌食豆誤犯之腹脹猛良

牡丹溪云。草麻子屬陰。故入太陰陽明。以驅水。以催產難固矣。而無名腫毒熱也。口眼喎斜。風也。何併治之。豈其辛甘發散之功耶。

果主脚氣風腫不仁。搗蒸傳之。
雷公云。凡使勿用黑天赤利子。綠在他處上生足。生有黑點。凡使先須和皮。用鹽湯煮半日。去皮取肉研調用。

馬鞭草

馬鞭草味甘苦性寒。有小毒。入肝脾二經。主活血通經。治金瘡諸瘡。癰疽取汁和酒服。

蘆根

按肝藏血者也。脾裹血者也。馬鞭草主血分。故入是二經。

蘆根

蘆根味甘性寒無毒。入肺胃二經。主消渴客熱。止小便利。治五噎膈。煩氣煩悶。吐逆。以蘆根五兩。水三盞。煮一盞服。其效。

按蘆根主氣逆嘔噦。故入太陰陽明。消渴之症。亦以氣化不及。州都故也。今蘆根以理太陰。而津液之生必矣。

蛇床子

蛇床子味苦辛甘性平。有小毒。入肺腎二經。主風寒溼痺。諸惡瘡癰。婦人陰中腫痛。男子陰痿溼痺。久服駐顏輕身。令人有子。酒浸一宿。地黃汁拌蒸焙乾用。

惡牡丹皮巴豆貝母。

金銀花

按蛇床理風濕宜入太陰補虛痿宜入少陰。
金銀花味甘性平。微寒。無毒。入肺經。主熱毒血痢。消癰散腫。補虛。瘡風。久服延年。

山豆根

按金銀花解肌膚之毒。故入肺經。為外科要藥。陶隱居云。常服益壽。人多忽之。更求難得者。且能具遠賤近庸人之情乎。

山豆根

山豆根味甘性寒無毒。入心肺二經。主解諸藥毒。止咽喉痛。退熱消癰。

按山豆根性寒專瀉心火。心火去則金無所損。全得其保而無傷之虞。吾知免矣。

艾葉

艾葉味苦性微溫無毒入肝脾二經主灸自病溫中
理氣開鬱調經安胎種子止崩漏除久痢辟鬼邪定
霍亂生搗汁理吐衄血

按艾之溫能令肝脾疏暢而無壅遏之患夫人之
一身惟絃氣血兩端今土木既調則榮衛和而病
自此却矣至十溫中等效又寒其偏長其煎服者
宜新鮮火者宜陳久生用則寒熱用則熱

薄荷

薄荷味辛性微寒無毒入肺經主中風失音下脹氣

藥性解

卷四

十五

去頭風通利關節破血止痛清風消腫引諸藥入榮
衛能發毒汗清利六陽之會首祛除諸熱之風邪

按薄荷有走表之功宜職太陰之部中風諸患固
其專也而血痢之症病在凝滯今得辛以暢氣而
結疝爲之自釋矣

稀莖

稀莖味苦性溫有小毒入肝腎二經主氣祛風溼
強筋骨長眉髮烏鬚髮助胃氣九月九日採
者佳

按稀莖功驗如右宜職厥陰少陰二經

其性溫當矣本草謂其性寒與上用相違不亦誤
乎久服大能補益故張詠述御表云金稜銀線素
根紫葳誰知至賤之中乃伏殊常之品臣服百劑
耳目聰明漸服滿千鬚髮再黑羅守一陰馬風
不語十服即痊曾知嚴七十口眼喎斜服頓愈
若張益州者可謂識其用矣宜去根連莖葉細剉
搗爛取汁熬煉成膏以甘草熟地煎膏煉蜜三味
收之出火毒酒調服功妙不可具述所謂有小毒
者以生用令人吐也今既經製度則毒去而功全
矣

蒲公英

蒲公英味苦甘性寒無毒入脾胃二經化熱毒消惡
瘡結核解食毒散滯氣細剉同忍冬藤取汁入酒以
治乳癰服罷欲睡是其功也睡覺病已安矣

按丹溪云蒲公英花黃屬土宜入太陰陽明經有
一種花葉莖相類而高大者非也其具者短小堪
地質甚脆斷之有白汁其味甘如慈管者是也

四時常花。花罷飛絮。絮中有子。落處即生。則其與天地中和之性可見矣。故治諸毒。又名黃花地丁。以治疔毒得名也。

夏枯草

夏枯草味苦辛。性寒。無毒。入肝經。主瘰癧。癭瘤。淫痺。脚腫。肝虛。目痛。淚。羞明。散血。破癥。生肌。解毒。上瓜為使。

按夏枯草二四月開花。是時正厥陰風木主令。其為肝經之劑。明矣。丹溪曰。夏至即枯者。蓋稟純陽之氣。得陰氣則枯也。

藿香

藿香味甘辛。性微溫。無毒。入肺脾胃三經。開胃。口進飲食。止霍亂。除吐逆。

按藿香辛溫入肺經。以調氣。甘溫入脾胃。以和中。治節適宜。中州得令。則臟腑咸安。病將奚來。

荆芥

荆芥味辛苦。性微溫。無毒。入肺肝二經。主結氣。閉血。酒傷。食滯。能發汗。去皮毛。諸風。涼血。熱。癢。痛。痒。諸瘡。

其穗治產血。如神。陳久者良。

按荆芥行血。療風。則太陰厥陰之入。固其宜也。今人但遇風症。輒用荆防。此流氣散之相沿耳。不知風在皮。裏膜外者。荆芥主之。非若防風之入骨肉。也有汗者勿用。

香薷

香薷味辛。性微溫。無毒。入肺胃二經。主下氣。除煩。熱。霍亂。止嘔。吐。瘵。腹痛。散水腫。調中。溫胃。最解暑氣。按香薷性溫。其除熱解暑之功。何若是其著也。不知炎威酷暑。則藏府伏陰。胸腹有凝結之憂。而皮膚多蒸熱之氣。得香薷之辛。以散之。溫以行之。而傷暑之症。從茲遠矣。熱服令人泄瀉。久服耗人真氣。江右硬梗石生者良。土香薷苗軟。但能解暑。其他無效。

佛耳草

佛耳草味酸。性熱。有小毒。入肺經。主肺中有寒。及痰嗽。鬼嗽。欬。冬。花。為之使。

按佛耳草入太陰。大升肺氣。宜少用之。過令損目。

以性熱有小毒也。

蒼耳子

蒼耳子味甘性溫有小毒入肺經主風寒淫痺頭風腦漏疥癰困重疥癬瘰癧血崩大風癰癧善能發汗炒令香杵去刺用反猪肉解狗毒。

按蒼耳甘溫故能走表肺主皮毛所以入之肺主風邪故治療如右。

茵陳蒿

茵陳蒿味苦性微寒無毒入膀胱經主傷寒大熱黃疸便赤治眼目行滯氣能發汗去風溼去根用犯火無功。

按茵陳專理溲便本為膀胱之劑又何以治疸蓋疸之為病脾受傷也而脾之所惡溼乘土也得茵陳以利水則溼去土安而疸自愈矣疸分陰寒陽熱三種陽疸熱多有濕有燥同梔子大黃治溼疸同梔子橘皮治燥疸陰疸寒多只有一症同附子治之。

使君子

使君子味甘性溫無毒入脾胃二經治小兒五疳利小便止白濁除瀉痢殺諸蟲連殼用。

按使君子甘溫宜主脾胃然多食令人發一傷胃故也。

高良薑

高良薑味辛性大溫無毒入脾胃二經主胃中冷逆霍亂腹痛除寒氣去冷痺止吐瀉療翻胃消宿食解酒毒。

按良薑辛溫脾胃所快真有寒症者服之甚驗若

有入病者誤投愈劇。

石蓮子

石蓮子味苦性寒無毒入心胃膀胱三經主噤口痢及溼熱滲入膀胱為白濁淋瀝等症清心解煩開胃進食去殼用。

按石蓮苦寒宜瀉少陰之火心火既清則胃與膀胱不能獨熱矣故皆入之此別是一種非蓮子比也。

合歡皮

合歡皮味甘一性平無毒入心經王安五臟利心志殺諸蟲消癰腫續筋骨令人歡樂無怒輕身明目花主小兒撮口煎湯洗拭跌打傷疼熱酒調下

按合歡味甘何以獨入心家經所謂以甘瀉之之說也心得所勝而癰瘡諸患為之自釋矣其葉細細相竝至夜則合又名夜合花似絨拂可愛俗又謂之烏絨

護草根

護草根味甘性寒無毒入脾肺二經主沙淋水氣酒

藥性解

卷四

十一

痘身黃小便赤澀身體煩熱大熱衄血安五臟利心志令人喜悅忘憂輕身明目採其嫩苗功亦相倣花名宜男最利胸膈始婦佩之轉女為男

按萱草之甘宜歸脾部而肺則其所生者故亦入之稽康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂圖經亦具言之當非虛語

劉寄奴草

劉寄奴草味甘性溫無毒入心脾二經主下氣除癥破血通經療霍亂水瀉止金瘡出血湯火所傷亦堪

楊傳酒蒸曝川

按寄奴之苦宜歸心藏而溫煖之性又與脾部相宜故兩入之蓋心實主血脾實裏血所以專療血症唐本云多服令人利亦以其宜泄耳

雷公云

採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上淨皮令淨拌酒蒸從巳至申出晒乾用

覆盆子

覆盆子味甘酸性溫無毒入肝腎二經主腎傷精滑陰痿不起小便頻數補虛續絕益氣溫中安和五臟補肝明目黑髮潤肌亦療中風發熱成驚女子食之多孕久服延年去黃葉及帶水淘淨酒蒸曝乾用

藥性解

卷四

三

按覆盆之酸宜歸肝部而腎則其母也且溫補之性適與相宜故咸入之衍義云小便多者服之帶覆其溺器故名

雷公云

凡使用東流水淘去黃葉并皮帶子用酒蒸一宿以東流水淘兩遍又晒之方用

錫補雷公炮製藥性解卷之五目錄

木部 五十七種

茯苓赤白二種

琥珀
松香

附葉節
栢子仁

桂
四分
腫爲
槐實
皮校

木香

山梔
吳茱萸

山茱萸 蔓荊子

杜仲
烏藥

厚朴
黃柏
桑白皮 枝樵寄生附

枸杞子 二種
地骨皮
酸棗仁
益智

檳榔 大腹皮 丁香 冰片

猪苓
蘇木
沉香
乳香

沒藥
木瓜
竹葉
苦竹
竹瀝
竹茹

天竺黃 金櫻子 訶梨勒隨風子附 郁李仁

蕪荑
 五加皮
 楮實附 樹汁
 秦皮

栲白皮椿白皮附 密蒙花 辛夷 蕤仁

女貞實
五倍子
牙皂
巴豆

金鈴子 紫葳 雷丸 鉤藤

血竭
茶茗
阿魏
乾漆

楓香 蜀椒 目錄

焦補雷公炮製藥性解卷之五

雲間	李中梓	編輯
吳郡	錢允治	訂正

木部

白茯苓

白茯苓味淡微甘性平無毒入肺脾小腸三經主補脾氣利小便止煩渴定驚悸久服延年去皮心研細入水中攪之浮者是其筋也宜去之誤服損目赤者

卷五

專主利水抱根而生者名茨神主補心安神除驚悸
治健忘馬蘭爲使惡白藟畏牡蠣地榆雄黃素尤惡
甲忌醋及酸物

按茯苓色白是西方肺金之象也味淡是太陽滲利之品也紫甘是中央脾土之味也故均入之夫脾最惡濕而小便利則濕自除所以補脾既能滲泄燥脾似不能生津已潔古何為辨其止渴良由色白屬金屬能培肺部肺金得補則自能生水且經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出焉誠

以其上連於肺得肺氣以化之。津液從之出耳。藥性所謂白者入壬癸亦此意也。而渴有不止者乎。至於驚悸者。心經之症也。而心與小腸相為表裏。既瀉小腸。而心火亦為之清矣。故能定之。丹溪曰。陰虛未為相宜。蓋虞其滲泄爾。然味尚止。甘主緩。亦無大害。若猪苓一於淡泄而大傷陰分也。藥性云。小便多而能止。大便結而能通。與本功相反。未可輕信。赤者屬丙丁。專人膀胱瀉火。故利水之外。無他長。伏神抱根。有依而附之之義。驚悸者。魂不能附。健忘者。神不能守。宜其治矣。唐誌云。伏神。松脂所作。勝茯苓。衍義曰。氣盛者泄於外。不抱本根。結為茯苓。有津氣而不甚盛。不離其本。結為伏神。考茲兩書。各相違悖。然仙經服食。多需茯苓。而伏神不與焉。兩說之是非。於是乎辨。

琥珀

琥珀味甘。性平。無毒。入心脾小腸三經。主辟百邪。安五臟。定魂魄。止心痛。消閉血。利水道。通五淋。破癥結。去目翳。傳金瘡。

按琥珀乃松脂入地。千載化成。得土既久。宜入肥家。松之有脂。猶人之有血與水也。且成珀者。有下注之義。又宜入心與小腸內經。曰主不明則十二官危。使道閉塞而不通。服琥珀則神室得令。五臟安。魂魄定。邪何所附。痛何自生。邪於是使道通而。闕血諸症。靡弗去矣。夫目得血而能視。心寧則營和。而腎何足虞。金瘡者。惟患其血逆於膝耳。能止之和之。未有不瘳者也。丹溪曰。古方用以燥脾土。有功。脾能運化。則肺氣下降。故小便可通。若血少不利者。反致其燥急之苦。別說云。茯苓生成於陰者也。琥珀生於陽而成於陰者也。故皆主安心利水而治榮。

雷公云

凡用紅松脂。石珀。水珀。花珀。物象珀。翳珀。珀多無紅色。如淺黃。多食皮。鐵石珀。如石。重色黃。不堪用。花珀。文似新馬尾。松心文。一路赤。一路黃。物象珀。其內自有物。命動。此使有神妙。翳珀。其琥珀。其長。故號曰翳珀。琥珀如血色。熱於布。任試。吸得者。其真也。古人藥中。用水調。調。相。于。未。安。于。火。黃。從。已。至。申。別。有。異。光。便。鑑。如。粉。更。細。用。

松香

發散之義且氣味俱輕宜入太陰而主表丹溪曰
仲景救表用桂枝非表有虛而用以補也衛有風
寒故病自汗以此發其邪則衛和而表密汗自止
耳衍義乃謂仲景治表虛誤也本草言桂發汗正
合素問辛甘發散之義後人用桂止汗失經旨矣
大抵桂為陽中之陽壯年火旺者忌服惟命門火
衰不能生土元穀不化及產後虛弱者宜之細考
桂有數神論之者無慮數十家或言種異或言地
殊各不相侔咸無所據詢之交廣商人所販惟陳
藏器所謂雖分數等同是一物此說最當別說亦
稱之矣今採其意以詳別如右

藥性解

卷上

六

雷公云

凡使其薄者要紫色厚者去上麤皮取心
中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩

取有味厚皮生用如未用錫用重密細并紙裹
勿令犯風其州上只有桂草元無桂心用桂草者
丹陽木皮遂成桂心
凡使節單搗用之

槐實

其味苦酸鹹性寒無毒入心肝大腸三經主五內
邪熱腸風五痔湯火傷瘡男子囊墜腫痛陰瘡濕痒
婦人陰中痛痒崩中漏下明目補腦殺蟲去風黑髮

延年酒服能催生墮胎枝專主洗濕熱諸瘡治九種
心疾皮主中風拘攣齒痛疳疔消癰解毒止痛長肉
膠主肝臟風筋脉抽掣及急風口噤四肢不收或毒
風周身如蟲行破傷危急花與質同功又主心痛及
疔腫熱毒赤白下痢小兒驚癇是天為使

按槐實之苦能泄心火酸寒之性能伐肝邪經曰
酸苦涌泄為陰其功主降故又入大腸以理下焦
諸症且催產難天蟲之生也因於濕風之生也因
於熱濕熱既去又奚庸虞花枝皮葉主治大同小
異尤為痔瘡要藥

藥性解

卷五

七

木香

木香味苦辛性微溫無毒入心肺肝脾胃膀胱六經
主心腹一切氣痛痼癥塊九種心痛止瀉痢除霍亂
健脾胃消食積定嘔逆下痰壅辟邪氣驅疫殺瘧蟲
精物宜生磨用火炒令人脹形如枯骨苦口治牙者
良

按木香辛入肺苦入心溫宜脾胃肝者心之母也
膀胱者肺所連也故均入焉蓋心乃一身之主氣

血之所聽命者也有主則能塞氣肺氣調則金能制木而肝火自伏矣凡人有怒則肝氣拂逆而反忤其元氣心有縱肝之情而不能制則肝氣於是乎盛或為拂逆或為攻衝得木香則心氣暢而正氣亦暢肝氣何拂逆之有哉實心之行大肝也非肝之自行也東垣以黃連制之恐其氣行過於通暢不無走泄之患耳

雷公云凡使其木香是腐變根條左盤於懷得二日方硬如朽骨硬則其有腐頭口蓋木香神也

山梔

山梔味苦性寒無毒入心肺大小腸胃膀胱六經主五內邪熱亡血津枯面紅目赤癰腫瘡瘍五種黃病開鬱瀉火療心中懊憹顛倒而不眠治臍下血滯小便而不利皮走肌膚之熱仁去心胸之熱解羊躑躅

父瘡蟲毒

按山梔味苦歸心輕飄象肺大腸則供肺為傳送者也小腸則受盛與心應者也胃亦上焦之腑也膀胱亦肺部之絡也故咸入之以理邪熱諸症緊

古曰輕清上行丹溪又曰屈曲下行兩家之說似相左矣不知惟其上行最能清肺肺氣清而化則小便從此氣化而出經曰膀胱津液藏氣化則能出者是也虛火炎者炒黑用煩鬱嘔逆者薑汁炒用此外並宜生服

雷公云凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須生用反以仁以仁其草水浸一宿取出如乾者以金末用

吳茱萸

吳茱萸味苦辛性熱有小毒入肝脾胃大腸腎五經主下氣消痰寒氣噎氣心腹刺痛霍亂轉筋脚氣攻心止咳逆逐風邪消宿食除血痺鹽湯炮去毒用參

實為使惡丹參硝石白堊畏紫石英按吳茱萸辛熱之劑宜入五經以理寒症多食大損元氣腸虛者忌之

雷公云凡使先去葉核并雜物子用大盆一口使中用條子一兩用鹽二兩研竹末投中淘水四升中分作一百度洗則有大効若用醋洗即先沸醋乾勿用十兩使醋一盞為度

山茱萸

山茱萸味甘酸微溫。無毒入肝腎二經。主通邪氣逐風痺。破癥結。通九竅。除鼻寒。療耳聾。殺三蟲。安五臟。壯元陽。固精。利小便。去核用。莖實爲使。惡桔梗。防風。防。

按山茱萸大補精血。故入少陰厥陰。六味丸用之。取其補腎而不傷于熱耳。若今是而別求熱劑。以爲淫慾助。猶葉賢良而搜伐作也。愚乎哉。

雷公云。凡使勿用雀兒。熟實。山茱萸。其是。按入。去核。一。用。取肉。皮用。只。有。去。四。兩。已。未。續。火。按。之。方。用。壯。元。氣。秘。精。其。核。能。滑。精。

蔓荊子

蔓荊子。味苦甘辛。性微寒。無毒。入肝經。主散風寒。療頭風。除日痛。去翳膜。堅齒牙。利九竅。殺白蟲。酒浸一宿。蒸用。惡石膏。烏頭。

按經曰。東方青色入通於肝。開竅於目。又曰。風生木。木生酸。酸生肝。荊實入肝。故專主散風以療目疾。主治秘訣云。其味苦甘。爲陽中之陰。能涼諸經之血熱。

杜仲

杜仲味辛甘。性溫。無毒。入腎經。主陰下濕痺。小便餘瀝。強志壯筋骨。滋腎止腰疼。去脂皮。酥蜜炙。去絲。用惡蛇蛻。玄參。

按杜仲降而屬陽。宜職腎家之症。然清血燥者不宜多用。

雷公云。凡使。先。須。剉。去。金。皮。用。酥。蜜。炙。一。兩。炙。酥。一。兩。以。盡。爲。度。炙。乾。了。和。用。用。於。事。一。斤。相。與。一。處。用。也。

烏藥

烏藥。味苦辛。性溫。無毒。入肺脾二經。主一切氣症。及

中惡心腹脹滿。毒鬼疰。天行疫瘴。咳逆。脹滿。霍亂吐瀉。癰瘡。疥癩。

按烏藥辛宜於肺。溫宜於脾。故主中惡等症。癰瘡疥癩。成於血逆。始於氣逆。烏藥長於理氣。故許療之。然辛溫發散。不宜久用。恐損真元。

厚朴

厚朴。味苦辛。性溫。無毒。入脾胃二經。去實滿而治腹脹。除濕結。和胃氣。止嘔。清痰。溫中消食。乾姜爲使。惡澤瀉。寒水石。硝石。忌食豆。

按厚朴辛則能發溫則能行脾胃之所喜也故入之以理諸症丹溪曰厚朴屬上而有火平胃散用之以佐蒼朮正謂瀉上焦之濕平胃土不使人過以致於和而已若以爲溫補而泛用之非也溫重濁而微降最能耗氣春夏秋宜用冬間忌之氣虛之人及孕婦亦不可服

雷公云此藥要用紫色味辛爲好或九散便去
薑汁八兩炙一升爲度

黃柏

黃柏味苦性寒無毒入腎膀胱二經主瀉下焦隱伏之火安上焦虛熾之蟲除臍下痛補腎水衰止血痢治瘰癧明眼目利小便除濕熱藤女子熱崩鹽酒多炒免致寒入於腎惡乾漆肉厚鮮黃者佳

按黃柏沉而屈陰故主腎與膀胱諸症其性苦寒能泄亢甚之陽以堅腎部則水主既盛陽光自退而陰血無火燥之患矣立有滋補之功哉若腎室無火兩尺微弱或左尺獨旺者均不宜用

桑白皮

桑白皮味辛性寒無毒入脾肺二經主傷中羸瘦腹中脹絕肺氣有餘虛勞客熱瘀血停滯吐血熱渴止嗽消痰開胃進食利二便消水腫能殺寸白可縫金瘡皮中白汁塗唇燥及小兒口瘡刀切片文火蜜炙勿令延落桂心麻子爲使忌見銅鐵桑枝療手足拘攣陰管作痛眼腫作量氣逆咳嗽肺毒風寒樞關關利血脉安神魂里發明耳目桑寄生主除腰痛去風濕健筋骨充肌膚愈金瘡益血脉長髮髮堅齒牙安胎氣下乳汁止崩漏折其莖深黃色者真

桑白皮

卷五

按桑皮辛則走西方而瀉肺金甘則歸中央而利脾土然肺氣虛脾氣弱者不宜用之恐潤利之品能走真元耳枝本四發有發散之義慎爲桑英有裨益之功而寄生獨產於海外蓋以地煖不蠶桑木無採持之苦得氣最厚生意濃密葉上自然生出何曾有所爲節間可容樹子也此說本之丹溪最爲近理圖經諸書胥失之也難得其真誤服殺人用者謹之

雷公云凡使在樹上自然生獨枝樹是也家醫
用鋼刀和根枝葉細剉除乾用勿令見
火功忌

枸杞子

枸杞子味苦甘性微寒無毒入肝腎二經主五內邪
熱煩躁消渴周痺風濕下胸脇氣除頭痛明眼目補
勞傷堅筋骨益精髓壯心氣強陰益智去皮膚骨節
間風散瘡腫熱毒久服延年惡乳酪解麪毒

按枸杞子味苦可以堅腎性寒可以清肝五內等
症孰不本于二經宜其治矣陶隱居云去家千里

藥性解

勿食枸杞此言其補精強腎也然惟甘州者有其
功至於土產者味苦但能利大小腸清心除熱而
已

雷公云凡使根抽得後使東流水浸以物刷上土
然後焙乾用其根若似物命狀者
止春食後下食子秋冬食根升丁也

地骨皮

地骨皮味苦性寒無毒入肺腎二經療在表無定之
邪退傳疑有汗之骨蒸除熱清肺止咳解渴涼血
涼骨利二便去骨用

按地骨皮即枸杞根也故均之入腎又入肺者蓋
以其質為皮則其用在表肺主皮毛所以人之本
功外與枸杞相同

酸棗仁

酸棗仁味酸性平無毒入心脾肝膽四經主筋骨酸
寒夜臥不寧虛汗煩渴安和五臟大補心脾炒熟去
皮尖研用生者治嗜臥不休惡防已

按棗仁味酸本入肝經而心則其所生者也脾則
其所制者也膽又其相依之腑也宜並入之聖惠

藥性解

方云膽虛不眠寒也炒熟為末竹葉湯調服蓋以
肝膽相為表裏血虛則肝虛肝虛則膽亦虛得熟
棗仁之酸溫以旺肝氣則木來剋土脾主四肢又
主困倦所以令人多睡又濟眾方云膽實多睡熟
也生研為末煎茶湯調服亦以棗仁秋成者也生
則得全金氣而能制肝木肝木有制則脾不受侮
而運行不睡矣

雷公云酸棗仁凡使根抽得後晒乾取棗仁拌
酸棗仁蒸半日丁去火支子任用

益智

性溫無毒入脾胃腎三經主遺精虛滑小便除滯益氣安神和中止嘔去皮鹽炒用。

按益智辛溫善逐脾胃之寒邪而土得所勝則腎水無凌剋之虞矣。遺精諸症。吾知免矣。

檳榔

檳榔味辛止澁性溫無毒入胃大腸二經。土消殺逐水宜。何臟腑。堅行滯。除痰癖殺三蟲。卻伏尸。療寸白。攻脚氣。解諸蟲。降藥性如鐵石。治厚重如奔馬。見火無功。

藥性解

卷五

土

按檳榔甘溫之品。宜於胃家。沉陰之性。宜於大腸。考諸功驗。取其下墜。非取其破氣。廣閩多服之者。蓋以地煖濕蒸。居民感之。氣亦上盛。故服此以降之耳。火長者快銳速效。

雷公云。此使在生。穩正。堅實。不虛者。碎破。肉有綠。微事。即。身形。矮。毗者。是。身形。尖。紫。大。處。身。力。大。欲。使。先。以。刀。刮。去。底。細。切。勿。經。火。

大腹皮

大腹皮味苦辛性微溫無毒入肺脾二經主令熱氣攻心腹。疏通關格。除脹滿。去壅滯。消浮腫。酒洗去沙。

以大豆汁洗用。

按大腹皮宜瀉肺溫宜使脾然宜泄太過氣虛者勿用。樹上多棲烏鳥。汗染毒最。能為害。故必多洗。方堪用耳。

丁香

丁香味甘辛性溫無毒入肺脾胃腎四經主口氣腹痛霍亂反胃鬼疰蟲毒及腎氣奔弛氣壯陽暖腰膝療冷氣殺酒毒消痰癖除冷勞有大如山茱萸者名母丁香氣味猶佳。

藥性解

卷五

土

按丁香辛溫走肺部甘溫走脾胃腎者土所制而金所生也宜成人之果犯寒疴投之輒應倘因火症召禍匪輕陳藏器云拔去白鬚薑汁調塗孔中重生即黑。

雷公云

此使有蟬雄。小。蟬。大。似。蠶。桑。核。方。中。多。使。雖。力。大。高。煎。中。用。堆。若。用。須。去。丁。蓋。乳。子。發。人。甘。也。

冰片

冰片味辛苦性溫無毒入肺肝二經主心腹邪氣積聚喉閉乳蛾舌腫痔瘡通九竅消風氣。明耳目。設者。

去毒又主小兒驚癇大人痰迷

按冰片之辛本入肺家而肝則受剋者也故藥人焉主治諸症俱是氣閉生熱而冰片則辛散之極開氣如反掌故多用之然亦從治之法也世俗因其主用遂疑其性寒輒與麝香同用以爲桂附之助獨不計人身陽易於動陰易於虧丹溪之訓詎可忽諸

猪苓

猪苓味淡性平無毒入膀胱經主利便除濕消腫通淋去黑皮用

按猪苓味淡五臟無歸專入膀胱利水今之療瀉者槩用之謂其去脾家之濕也不知一於滲泄逐水太過水盡則傷腎昏目不可不知

雷公云

凡採得用剉刀刮上蘆皮一重薄切下東

蘇木

蘇木味甘鹹性平無毒入肝經主破產後惡血癆瘡死血一切跌撲損傷調月水去瘀血和新血并腹止

痛消腫散腫皮上霍亂嘔逆赤白痢下酒蒸陰乾用

按蘇木專主血分宜入肝經然破血之功多而和血之功少勿得多用以傷陰分

雷公云凡去上蘆皮并節了若有中心文端如對細了重搗碎細條梅枝蒸前已至中陰乾用

沉香

沉香味辛苦性溫無毒入腎命門二經主祛惡氣定霍亂補五臟益精氣壯元陽除冷氣破癥瘕皮膚癢痒骨節不仁忌見火生磨用

按沉香屬陽而性沉多功於下部命腎之所由入也然香劑多燥未免傷血必下焦虛寒者宜之若

水藏裏微相火盛炎者誤用則水益枯而火益烈

禍無極矣今多以爲平和之劑無損於人輒用以

化氣其不禍人者幾希

雷公云

凡香凡使須要下括者如嘴角硬重沉下

候衆藥出即人拌和用之

乳香

乳香味辛苦性溫無毒入十二經主祛風下氣補腎

益精止霍亂催產難定心腹急痰療癰瘡風痒諸
惡瘡風水腫毒中風醒睡亦入敷膏止痛生肌若上
微炒出油燭草同研用

按孔香辛香發散於十二經絡無所不入生南
波斯國赤松脂也重滴成味殺木末落者名珠香
圓小光潤及速滴下如乳銀相地而者名樹香大
塊枯乾者用者不可不審

沒藥

沒藥味苦辛性平無毒入十二經主破癥結宿血止

藥性解

以卷五

痛癰金瘡杖瘡痔瘡諸惡腫毒跌打損傷目中翳障
歷節諸風骨節疼痛制香同乳香

按沒藥與乳香同功大抵血滯則氣壅於氣壅於
則經絡滿急故痛且腫得沒藥以宣通氣血宜其
治矣

木瓜

木瓜味酸性寒無毒入肺脾肝三經主脚氣水腫心
腹冷熱痛及奔弛去濕氣調榮衛助氣和脾胃止
吐瀉忌犯鐵器石槌用

按木瓜入三經何也經所謂以酸補肝以酸瀉脾脾則

受制於木而學育夫金者也何弗入焉東垣云氣脫則能收氣

澤則能和脾胃肝脾之要藥也香葉飲用之取其專和

脾胃培植肝氣除夏間之濕以生至微之金耳

雷公云

凡使勿誤用和國子葉子代子其色紫外似瓜其氣
味助殺氣而子頭尖一面方是瓜皮薄微赤者甘酸不滋調藥
小國味滋微鹹傷人氣葉子類小似木瓜叶絕不滋潤此似木

竹葉

竹葉味甘辛性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有

二除新舊風邪之煩熱止喘促氣勝之上也

小味絕淡子如大孫頭又苦澀不潤者今人目為竹葉而
痛凡使大瓜勿令犯鐵用銅刀刮去硬皮并子薄切於日中曬乾此

書中乳汁拌煎從已至未其色如青煎於日中曬乾此

竹葉

竹葉味甘淡性平無毒入心肺胃三經主新舊風邪之煩熱

喘促氣勝之上也傷寒解虛煩治消渴癰瘡癰止嘔吐除

咳逆有一種苦竹葉主舌瘡目痛去青刮取為竹茹主胃熱

嘔呃除煩解渴療吐衄中噎膈氣滿筋及五痔火燒竹

瀝主除虛發熱中風牙痛除自汗解消渴止驚悸清煩

躁痰在手足四肢非此不達痰在脾裏膜外有此可破又

主小兒天吊驚癇婦人懷妊悶暈胎前不穩子產後不

渴虛勞補氣止渴久食益人

按竹葉生於中半以上故主治多在土焦肺胃皆屬肺
之居也宜入之味苦者專潤南方竹茹者兼除
土飲黃連用小殊竹蘆者竹之液也猶人身之血也極能補
陰陰之不足由於火燥竹蘆長於清火則血得其養本經
已載其功母溪又詳其效而世俗不能常用者蓋泥證類之
大寒耳不知竹茹性平者也今人自創食竹茹至老不撤曾
無中其寒涼之害者證則假大而何寒之有證
類所謂大寒者蓋其功非論其氣也幸有明
明者導之以理斯藥無遺用矣

天竹黃

天竹黃味甘性平無毒入心經主清心明目除驚
解煩酸和逆痰及小兒驚癇天竹黃能治症
按竹黃之寒專潤少陰之火大者而邪諸症
宜辨不虛矣天竹黃即竹節內黃粉然後
有偽者誤辨其片如竹茹者真

金櫻子

金櫻子味酸澁性溫無毒入脾肺腎三經主脾洩下
痢血崩帶下澁精氣止遺泄除咳嗽止小便勤益氣
潤顏色久服延年先去刺剉開去子復刷去毛用
按丹溪曰金櫻子屬土而有金與水脾肺腎之人
固其宜也又曰經絡墜道以通暢為和平昧者取
其澁性煎膏食之自不作靖咎將誰執此恐過服
者傷脾而發也須九十月間半熟時採之太生今
人利太熟功力薄

藥性解

卷五

三

訶梨勒

訶梨勒味苦酸澁性溫無毒入肺肝脾腎大腸五經
主令氣心腹脹滿久瀉痢霍亂喘急腸風瀉血崩中
帶下奔弛腎氣開胃消食生津止渴治嗽開音酒浸
蒸熟用木熟時風飄墜者謂之隨風子肺因火傷鬱
遏脹滿痰嗽咽嗑不利者含三四枚殊勝
按訶梨勒酸以瀉肝收肺苦以堅腎瀉脾澁以厚
大腸五經之入所由來也終是酸澁之劑久瀉痢
者宜之若積初發而用之與丹溪痢無止法之意

雷公云凡使勿用毗梨勒諸梨勒謂細胡麻路勒

郁李仁味酸性平無毒入大腸經主四肢浮腫腸中
藥性論

結氣關格不通膀胱急痛潤腸破血利水下氣消食
寬中忌麪及牛馬肉

法鄒李仁屬陰性主降故獨入大腸然宜泄太過能瀉五臟真氣虛人不宜多用

無災

蕪荑味辛性溫無毒入肺脾二經主五內邪氣腸風痔瘻疥癬風熱皮膚骨節間風濕除冷氣化宿食消積殺諸蟲去水麪炒黃用。

按蘆薈辛宜於肺。溫宜於脾。故兩入之。風寒濕痺。

五加皮

五加皮味辛苦性溫無毒入肺腎經主心腹腰膝
痛抽氣骨節拘攣多年因血在皮膚陰瘡囊濕小兒
脚軟女子陰痒陰蝕積勞百痺筋骨益志氣添精髓
久服延年遠志爲使畏地皮玄參

按五加皮辛能瀉肺苦能堅腎宜竝入之心腹等

素性解

卷五

生

何非兩經之症而有不治者耶昔張子聲揚建
如王叔牙丁世彥等皆服五加皮酒不絕房室得
壽百歲有子十人延年之說此其徵矣

雷公今江蘇皮島本
其三在九
陰人使國

栳寶

格實味甘性平無毒入腎經主補虛勞壯陰痿助陽
痿退水腫堅筋骨益氣力充肌膚悅顏色明目耳鳴
赤長生酒液一宿蒸用澆汁塗之及芎藭餅皮主風

有以爲本大邦亦作於此

胃虛熱不受風下首刀其後日

雷公云凡使之去盡皮拭上赤肉毛了即以此藥乾用者治眼目出翳即一翳去皮用向裏實者

凝仁

凝仁味甘性溫無毒入心肝脾三經主心腹結氣結瘀鼻中衄血眼胞上下風腫爛弦左右皆熱障勞肉清火止淚益水生光破核取仁去皮尖研用

按心肝脾皆血之臟而凝仁入之夫目之有疾理之故也今得其計以養血溫以和血而腫脹諸患從茲息矣

雷公云凡使先用熱水浸其皮去其肉片研碎後出上諸藥取仁研成膏任加減入藥中使凡使中四兩用單精兩水通甘草七兩

女貞實

女貞實味甘性平無毒入心脾二經主安五臟養精神補陰分益中氣黑髮強筋力去風濕除百病久服延年立冬採取布袋浸蒸去皮酒浸一宿晒乾用

按女貞實苦走心甘走脾性用平和經冬不凋誠補陰之上劑也仙家亦常服食今平日常用之者

亦未既其功耳

五倍子

五倍子味苦酸性平無毒入大腸經主高宜瘡風癬疥瘡腸風五痔及小兒面鼻口耳疥瘡明日生津止渴潤精除口中治口瘡善收頑疾解諸毒而自藥前即五倍造成主肺脹喘咳化能飲而降之

按五倍酸苦之性專瀉大腸其收斂其捷渴痢初起者未宜入劑

牙早

藥性論

卷五

九

牙早味辛鹹性溫有小毒入肝胃二經主風痺死肌頭風目淚中風邪氣勞蟲積物通關竅理癰疽消脹諸化穀食除咳嗽瘰癧骨蒸去疥癬指鼻噴嚏立至數腫疼痛即除和生礬可此風痰并蜂毒名為導筋水浸一宿去皮弦酥炙復去核及黃用柏實爲使惡麥門冬畏空青人參苦參早角刺主風鼻鼻榮崩倒箭髮自落又主癰疽其未潰者能發竅其已潰者能引排膿藥直達膿處成功諸惡瘡癰疽咸不可缺

按肝爲風木之臟胃爲水穀之腑牙早辛溫有行

之功宜竝入之多。用能耗氣損血其利乃質幹之銳者故於瘡癰無所不達。若瘡腐風九蒸曝為妙。

巴豆

巴豆味辛性生溫。熱寒有大毒。入脾胃大腸三經。主削堅積蕩臟腑之沉寒。通閉塞利水穀之道路。排膿消腫破血通經殺鬼毒蠱毒及腹臟諸蟲去皮心膜。油水煮五度用芫花為使。惡黃連草畏大黃黃連藜蘆牽牛蘆薈蠶鼓冷水殺斑毛蛇池毒。

按巴豆專主宣通則脾胃大腸宜其入已。妙令紫黑可以通腸亦可止瀉。蓋通因通用之意也。仲景東垣及諸名家每每用之。今世俗畏其辛熱之毒蕩滌之患。輒云劫劑廢閣不用。不知巴豆為斬關奪門之將。其性猛烈投之不當。為害非輕。用之得宜。奏功甚捷。譬如張飛亦一虎將也。顧人用之何如耳。可槩棄哉。倘氣虛羸弱脾氣久傷者。誠所大忌。

雷公云。凡使巴之與豆及別子須在仔細認勿誤。用穀人巴類小緊實色黃豆即類有子後。

色黑者則子小。以漿液兩頭尖巴與豆即用剛子。勿使凡修事巴豆。為碎似油并酒等可交巴豆。丁研碎後用每節事一兩以酒與麻油各七合盡為度。

金鈴子

金鈴子味苦性寒。有小毒。入心小腸二經。主溫疾傷寒。理大熱。顛狂利小便。通水道殺三蟲愈瘡瘍。善除心痛。宜作浴湯。晒乾酒蒸。去皮核用。川蜀者佳。

按金鈴子苦寒宜入心家。而小腸即其腑也。故竝入之。瘡瘍諸症。何非心火所致。得金鈴以瀉之。洵可愈矣。

紫葳

紫葳

紫葳味甘酸性微寒。無毒。入脾胃二經。主婦人產後血奔不定。血膈遊風。崩中帶下。癰瘕血閉。安胎通淋。又主熱風及身痒。風癰。二便不通。酒釀熱毒。畏鹵鹹。一名凌霄花。

按紫葳甘歸脾。酸走肝。家二經。乃藏血裏血者也。故專調血症。風痒之生。亦榮氣不和耳。宜竝理之。丹溪曰。治中血痛之要藥也。且補陰甚捷。蓋有守而獨行者。

雷丸

雷丸味苦鹹性寒。有小毒。入肺脾胃三經。主胃中熱。煩癩狂走。惡風汗出。解蟲毒。殺諸蟲。逐皮裏膜外之水。又作摩膏。除小兒百病。利丈夫。不利女子。久服陰痿。火炮用。荔實厚朴。芫花為使。遷延根。扁黃。赤者殺人。

按雷丸若能燥脾。而胃則其肺也。肺則其子也。故均人之蟲。以濕熱為巢穴。而蟲可殺矣。本經既云。利丈夫。別錄又云。久服陰痿。於事相反。陶

隱居

卷五

三

隱居以此致疑。不知利者。疎利之謂耳。非利益也。

百公云。凡使川甘草水浸一宿。銅刀刮上黑皮。破作四五片。又用甘草湯浸一宿。後蒸從前法已至末。蒸可乾用之。

鈎藤

鈎藤味甘苦。性微寒。無毒。入十二經。主小兒寒熱。諸種驚癇。胎風客忤。熱壅夜啼。舒筋活絡。色黃而嫩。鈎多者佳。

按鈎藤。兼主氣血。故於經絡。靡所不入。惟療小兒。不入餘方。

阿魏

阿魏味苦。微鹹。性平。有小毒。入諸陰經。主五臟邪氣。腹卒痛。際帶下。破積血。療疥癬惡瘡。及金瘡。生肌。痛得蜜陀僧良。有假者是海母血。頗相似。然味大。鹹。有腥氣為辨耳。敲斷有光彩。磨指甲紅透者佳。另研用。若與別藥同搗。化作飛塵。

按血竭。專主血分。故人諸陰之經。日華子云。諸瘡久不合者。且敷此藥。然不可多使。却能引膿。

茶茗

藥性解

卷五

三

茶茗味苦。性微寒。無毒。入心肝脾肺腎五經。土下氣。醒睡。除痰消食。利便生津。破熱氣。清頭目。善祛油膩。解煎炙毒。

按茶茗。清利之品。故五臟咸入。然過食傷脾。令人面黃消瘦。其醒睡者。亦以伐脾故耳。

阿魏

阿魏味辛。性微熱。無毒。入胃經。主破癥積下惡氣。治霍亂止腹疼。辟瘟禁瘡。辟鬼祛邪。能消蠱毒。可滅傳屍。

按阿魏辛熱之性與胃腑相宜故獨入迴光波斯國阿蘭木內之脂也唐本註云體性極臭而能止臭亦奇物也今市家多煎蒜白假充不可不辨真者置熱銅器中一日夜其沾阿魏處白如銀

雷公云凡使多有訛誤其有第一驗將半鍊銅永無赤色第二驗將一鐵器於五方草自然汁中浸一夜至明如鮮血色第三驗將一鉢按在樹上樹立乾便是真凡使先於下鉢中研如粉了於熱酒器上蒸過任入藥中用之

乾漆

乾漆味辛性溫有毒入胃大小腸三經主年深堅結之沉積日久秘結之開血殺三蟲絕傳屍損咳嗽止崩漏紫九種心疾療風寒濕痺炒令烟盡用半夏爲使畏雞子油脂鐵漿黃蘗汁蟹

按乾漆專主行化胃與二腸宜其入已然攻堅消積之劑終損元神不宜過用中其毒者以所畏之物解之

楓香

楓香味辛苦性平無毒入脾肺二經主辟惡氣消瘡毒止齒痛消風氣除下痢止霍亂吐瀉一名

白鳳一名芸香

按楓香辛宜走肺苦宜燥脾治節得宜倉廩得令則惡氣等症何患其不瘳

蜀椒

蜀椒味辛性熱有毒入肺脾二經主冷氣欬逆心腹邪氣風寒濕痺癥瘕積聚霍亂轉筋留飲宿食開腸理通血脉堅齒髮調關節堪辟瘟疫可洗漆瘡微炒出汗一日及黃殼用

按蜀椒辛宜肺部熱利肺家故並入之症屬寒凝藥性解

誠爲要劑然過於行散多服令人之氣且發熱疾閉口者能殺人不可不慎

雷公云一名南椒凡使須去日及開日者不用其製法微炒出汗投器中春之取紅皮去黃殼密收器中任用也

續雷公炮製藥性詳卷之五終

錫補雷公炮製藥性解卷之六目錄

菜部 十種

生薑

乾薑

萊服子

白芥子

韭根子

蒜

胡荽子

葱白

冬葵子

白冬瓜

人部 十種

乳汁

金汁

屎蛆

人溺

秋石

月水

髮三種

紫河車

天靈蓋

死人枕

禽獸部 十八種

黑嘴白鴨

鴨頭

烏骨雞

雄雀

伏翼

龍骨

虎骨

犀角

羚羊角

牛黃

麝香

阿膠

鹿耳

鹿茸

熊膽

臘脂

狗肉

羊肉

牛肉

牛乳

猪心

猪肚

猪胆

猪脂

蟲魚部 二十六種

蜂

杜蠅

魚珠

石決明

龜甲

龜甲

龜板

白花蛇

蝦蟇

蝮蛇

蜈蚣

五靈脂

蜈蚣

蝮蛇

白蟻

蟻

蟻

刺蝟皮

土鼯

蛇

蛇

蛇

穿山甲

鯽魚

鯽魚

鯽魚

鯽魚

烏賊骨

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

錫補雷公炮製藥性解卷之六目錄終

雲間 李中梓 編輯

姑蘇 錢允治 訂正

菜部

生薑

生薑味辛性溫無毒入肺心脾胃四經主通神明去穢惡散風寒止嘔吐除泄瀉散鬱結暢脾胃療痰嗽製半夏和百藥要熱去皮要冷留皮惡黃芩

藥性解

卷六

按生薑辛入肺肺得所勝則氣通宣暢主宰精靈故能通神明神明通則一身之氣皆為我使而亦勝矣一身之氣勝則中焦之元氣定而脾胃出納之令行邪氣不能容矣故能去穢惡經云秋不食薑者蓋以燥金主令天道斂收薑則味辛善散肺氣入肖天地以生未有干天地之和而猶受其益者謬所謂夜不食薑亦以夜氣斂而薑性散耳如療病則不可泥也宜常用而不宜多用

乾薑

乾薑味辛性大熱有毒入肺大腸脾胃腎五經生者味辛能行血逐寒邪而發表熱者味苦能止血除胃冷而守中沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕者用黑附為引

按乾薑之辛本職肺家以其性熱故又入脾胃大腸至於少陰之入黑附為引耳夫血遇熱則走生者行之固其宜也而吐衄下血崩漏淋產症熱者反能止之何也蓋物極則反血去多而陰不復則陽無所附得此以助陽之生而陰復矣且見火則味苦色黑守而不走血安得不止耶然必病久氣虛亡陽而多盜汗及手足冷者宜用否則病火熾速爾投之是抱薪救火危亡立至矣可不謹乎丹溪曰乾薑散肺氣同五味能止嗽治血虛發熱該與補陰藥同用入肺中利肺氣入腎中燥下濕入氣分引血藥入血也東垣云多用能耗元氣壯火食氣故也乾薑辛熱皆言補肺海藏獨言泄肺何也泄之一字非泄肺之正氣是泄肺中寒濕之邪蓋以辛熱之劑燥之故曰泄肺也生者能墮胎

藥性解

卷六

萊菔

萊菔味辛甘。性溫無毒。入肺脾二經。主下氣消食除痰止嗽解渴化癖。搗汁磨墨。堪止吐血。熱者補脾。其下氣猶捷。有推牆倒壁之功。水研可吐風痰。醋研可敷惡毒。俗名蘿蔔。解麪毒。

按萊菔辛宜肺部。其走脾家。故兩人之生。若下氣多食耗血。以辛多於甘也。熱者補脾。多食滯氣。以甘多於辛也。其子力倍虛者戒之。

白芥子

藥性解

卷六

三

白芥子味辛性溫無毒。入肺胃二經。主下氣止翻胃消癰癖。辟鬼邪。殺疔氣。除皮膚膜外痰涎。醋研可敷射工。其莖葉堪御冷氣。

按白芥子辛宜於肺溫宜於胃。故復入之氣虛及肺胃中有火者咸禁之。

韭

韭味辛性溫無毒。入肺脾腎三經。上下氣和中補腎益陽。利腰膝。和臟腑。除胃腹痰癖。痼冷。止白濁遺精。其根搗汁下膈中。閉血。殊效。其子較根葉猶勝。忌糖。

饅牛肉

按丹溪云。韭屬金而有土。與水宜。入肺脾腎。以主三經之虛。然不宜多食。令人神昏目暗。

蒜

蒜味辛性大溫。有小毒。入脾胃二經。主溫中消食。止霍亂轉筋。除吐瀉及中脘冷痛。瘟疫痔瘡。蠱毒疔腫。邪痺毒氣。

按蒜味辛溫。故入脾胃。以理諸症。丹溪云。性熱快膈。人皆喜食。多用則傷脾損肺。壞肝。昏目。生痰發嗽。面無顏色。化肉之功不足多也。有志願生者宜知自警。

藥性解

卷六

四

知自警。

胡荽

胡荽味辛性溫微毒。入肺脾二經。主通小腹氣。除四肢熱。止頭痛。消穀食。散痧疹。齊痘瘡。其子煎油可敷疥瘡。忌斜高同食。令人汗死。

按胡荽味辛。肺所樂也。性溫脾所快也。故皆入之。肺主皮毛。脾主肌肉。所以理痧痘等症。多食損精神。發痼疾。令人健忘。脚氣。狐臭。皆食之愈甚。

葱白

葱白味辛性溫無毒入肺胃肝三經善發汗通骨節逐肝邪明眼目去喉痺愈金瘡安胎氣止鼻衄治霍亂轉筋理傷寒頭痛殺魚肉毒通大小腸散面目浮腫止心腹急疼脚氣奔脫氣連鬚前可除蛇傷蚯蚓傷和鹽醬即解畏蜜菰菜常山同食殺人

按皮毛腠理肺所司也風淫木旺肝所患也邪傳入裏胃所疾也葱白功專發散又主通中三經之入有由來矣多食則伐氣昏神虛者戒之

藥性解

卷六

冬葵子

冬葵子味甘性寒無毒入小腸膀胱二經主滑胎產利小便療熱淋逆生者得之即順胎死者得之即下能通乳汁堪潰癰疽

按冬葵子性最滑利能宣積壅宜入手足太陽以爲催生神劑然不可預服恐胞未轉而先催空涸其水反艱其產耳癰疽者營氣不從逆於肉理乳閉者亦凝滯之所致也得冬葵以導之而不瘳者鮮矣

白冬瓜

白冬瓜味甘性微寒無毒入脾胃大小腸四經主胃前煩悶作渴膝下水脹成淋通大小便大解熱毒可貼癰疽又解丹石毒及魚毒

按冬瓜味甘宜入脾胃性走而急宜入大小腸煩渴諸症皆熱也其性寒故能解之丹溪曰久病與陰虛者忌服未被霜而食之令人成反胃病

人部

藥性解

卷六

乳汁

乳汁味甘性平無毒入心肝脾三經主健四肢營五臟實腠理悅皮膚安神魂利關節明眼目久服延年按乳汁水血也心主血肝藏血脾聚血宜並入之夫婦人之血降爲月水升爲乳汁房術云女子一身屬陰惟月水屬陽故名水中金情神農本經不載而諸家本草遂以爲血屬於陰其性大冷不知月水乳汁本同一物月水之熱人咸知也今升而爲乳質較輕清中和補益實爲過之而反以爲太

冷耶。若果大冷。則必能傷脾。小兒食之。當泄利不止矣。有是理哉。特不宜與食混進。誠能令人瀉耳。

金汁

金汁。味甘。苦性大寒。無毒。入心經。主天行狂熱。陰虛燥熱。解一切毒。療一切瘡。埋上年久者佳。

按素問曰。濁陰出下竅。宜其足以制陽光。而心則火之主也。故獨入之。造法於冬月。取竹籬置缸上。覆皮鋪蒲。加草紙數層。尿澆於上。汁淋在缸。新甕盛貯。蓋之。鹽泥封固。埋地年深。自如清泉。聞藥性解。卷六。七。無穢氣。又法。臘月取淡竹。刮去青皮。浸廁中。取汁亦佳。

屎蛆

屎蛆。味甘。鹹。性平。無毒。入脾經。主小兒疳積。脹滿。須水中漂淨。貯於桶中。割蝦蟆飼肥。烈日曝蒸。蓋密。即死。文火烘燥。用。

按蛆。本濁陰下降。流動不拘之物。有行下之理。故專入脾經。以療兒疳最效。

人溺

人溺。味鹹。性寒。無毒。入心肺二經。主勞熱吐衄。痰喘咳嗽。撲傷。因血產後。敗血生津止渴。能通二便。童男者。猶勝。若在器中。名人中白。凡上文火煨之。存性。酒醋煎服。同功。療口瘡。痰結。須露天經年者佳。按人溺降火最速。丹溪曰。氣有餘。便是火。肺主氣。心屬火。宜均入之。降火而不傷於寒涼。且補益之功甚大。而本草不言。惜哉。褚澄云。以童便治血症。百不一死。庶得其用矣。

秋石

藥性解。卷六。八。

秋石。味鹹。性微寒。無毒。入肺腎二經。主滋腎水。返本還元。養丹田。歸根復命。安和五臟。潤澤三焦。消咳逆。潤燥。退骨蒸。勞熱。能除鼓脹。亦軟堅。積明目。清心。延齡。本專入腎。而肺即其母也。故并入之。須用陰乾。外者兼而服之。得坎離既濟之義。東坡有煉法。可用。

月水

月水。性味經絡。諸書不載。主男子虛羸。中傷。幾死。解。

藥簡毒首經者猶屬純陽能回生再造

按月水之補實令人有起死之功。今罕有能用之者惜哉。

髮

髮味苦性微溫無毒入心經主咳嗽五淋二便不通。燒灰吹鼻立止衄血。亦主小兒驚癇胎髮及童男女剃下者猶佳。多產婦人髮燒灰酒服極善。保生。

按髮為血之餘而心則主血者也。故獨入之。丹溪稱其補陰甚捷。良有故耳。

藥性解

雷公云：凡使之是男子二十已未無疾。患顏貌紅白於心剪下者是。凡於九散膏中先用。若水浸宿漉出入瓶中以火之令通亦放冷。河川之。

紫河車

紫河車味甘性大溫無毒入心脾腎三經。上諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱體弱氣短吐衄來紅男子精衰婦人無孕的是仙丹。取肥壯者洗淨細去紫筋切碎人童便二碗入鉛餅重湯煮爛一晝夜方開作成膏用世俗有理地日久化作清泉者此名河車水主天行時疫熱狂小兒丹痧熱毒。

按紫河車味甘宜其歸脾父之精也。宜歸腎臟母之血也。宜入心家。夫其精血所結本有男女先立胚胎。渾然大虛實乾坤之象。營絡未之根基。九九數足兒則載而來之。故名河車。又曰紫者以紅黑色相雜也。合坎離之色得妙合之精。雖成後天之形實稟先天之氣。補益之功更無足與倚者。第其性溫。若有火症者必得便制。斯無他患耳。

天靈蓋

天靈蓋味鹹性平無毒所入經絡諸書不載。主傳屍。

藥性解

鬼疰并療犬傷取得后。用糖灰火焙一夜待腥穢氣出盡却用童便於磁鍋內煮一伏時埋於地下可深一尺亦一伏時聽用陽人使陰陰人使陽。

按天靈蓋即頂蓋骨也。神農本草經不載。後世醫家始用之。此本同類之物。見則常憐而悲之。乃取而食之。殊非仁人之用心。世稱孫思邈有大功於世。以殺命治命。尚有陰責。况於是乎。若不得已而用之。當取年深清汚者良。以其絕屍氣也。

死人枕

死人枕味鹹性平無毒所入經絡諸書不載主傳屍鬼
症邪氣石蛇取之煎湯用用畢送還原處

按死人枕即腦後骨也夫鬼邪聚人非藥石可攻用死
人枕者所謂引之以類也石蛇者久枕也也醫家既
辨此蟲轉堅其刺不能療所以需鬼物驅之用畢即
送還原處者一則使邪症之氣有所依歸一則勿以
療人而傷鬼也古有神醫徐嗣伯劉大用者用之輒
驗

藥性解

卷六

十一

禽獸部

黑嘴白鴨

黑嘴白鴨味甘性微寒無毒入肝腎二經主大補虛勞
最消毒熱利小便除水腫消脹滿和臟腑退瘡腫定
驚癇瘰癧者亦堪用白口者能殺人忌過熱向

按肝之也屬白腎之也屬黑中黑嘴白鴨宜其入此二經
肝腎受補誠為勞症仙方得宜便奏服功不可言
盡

烏骨毛雞

烏骨毛雞味甘性微溫有小毒入五臟諸經主虛羸
折傷惡疽及心腹惡氣亦能安胎過食生火動風
按丹溪曰雞屬土而有金與木火則所稟者惟少
水耳今得其毛骨之黑是五行具備故於五臟靡
弗入也於卦為巽巽為木故能生火又為風故能
動風日華子以為除風濕癱痺於理未合

雄雀

雄雀味甘鹹性熱無毒入命門經主並氣壯陽其腦
與性解

卷六

十二

主耳聾及凍瘡頭血主點雀盲雙名白丁香主潰癰
癰點目內努肉血膜除癥瘕伏梁爛瘰癧積塊
按雀之鹹熱宜入命門而補火然相火又熾真水
必衰勿宜過服以傷腎臟姪娠猶忌食之腦血反
白丁香之功咸性熱所致耳

雀卵

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱
多精有子腦主耳聾頭血主雀盲雄雀尿齒痛通用
藥療日通決癰癰女子帶下溺不利除癰癥五月取

之良注云兩頭尖者是雄麻屎

雷公云在蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經
其者九陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩頭
一宿者通用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸
水服之任用

伏翼

伏翼味鹹性微熱有毒不載經絡上逐五淋利水道
去翳明目令人喜樂媚好忘憂久服延年尿名夜明
砂破腹中血氣及寒熱積聚除驚悸血卑黑眼形重
一觔色白如雪者佳

藥性解

卷六

十三

按伏翼原名蝙蝠以其晝伏夜飛因稱伏翼能伏
氣冬月不食故多壽人服之宜其有延年之功矣

雷公云凡使要重一片者方抹之每修事生拭去
酒浸一宿取出取黃精自然汁塗之炙令乾方用
勿修事者一前一箇用黃精自然汁五兩為度

龍骨

龍骨味甘性平無毒入腎經主丈夫精滑遺泄婦人
崩中帶下止腸風下血療瀉痢不止得五色具者佳
其齒主驚癇狂疾俱畏乾漆蜀椒理石石膏
按經曰腎主骨宜龍骨獨入之觀其沾舌大抵澀

之用居多故主精滑等症經曰澀可去脫是之謂
耶

虎骨

虎骨味辛性微熱無毒入腎經主邪氣羸症筋骨毒
風癱急酥炙用畏乾漆蜀椒磁石

按虎骨入腎亦以腎主骨故也其治骨間毒風者
何也易曰風從虎夫風木也虎金也木受金制焉
得不從

雷公云虎睛凡使須知採人間其眼有雌有雄有
老有嫩有殺得者唯在中毒自死者勿使
却傷人之意失用虎睛先於草羊血中浸一宿瀝
出微乾火上焙乾搗成粉候衆藥出取合用之也

藥性解

卷六

十四

犀角

犀角味苦酸鹹性寒無毒入心肝二經主百毒蟲症
犀角亦能傷寒瘟疫煩躁頭狂痘疹血熱癰疽腫毒
清心管目目定驚孕婦忌服須紋細色烏光明滑
潤者佳取其茸尖功力具備松脂為使惡雷丸忌鹽
按犀角苦寒本入心家瀉火久入肝臟者蓋以火
不妄炎則金能制木也丹溪曰屬陽性走比諸角
猶甚痘瘡後用以散餘毒俗以為常若非有餘毒

雷公云凡使勿用奴犀臂病水犀者在于犀下角犀
潤者上凡修治之時錯其屑入口中待令細再入
日中淘萬遍方入藥中用之婦人有妊勿令消服
氣凡修事切
大忌盛也

羚羊角

羚羊角味苦鹹性寒無毒入肝經主傷寒熱在肌膚溫風注毒伏在骨間邪氣不祥驚癇狂越心神不寧小兒卒熱驚搐產婦敗血冲心清心解毒明目益氣燒灰又主食噎不通其角多節掛痕深入者爲真

藥性解

卷六

11

五

按丹溪曰：羚羊屬木，宜入厥陰，木得其平，而風火諸症無能乘矣。

雷公云：西伯內有天神，羊角其神，羊角長有二十
年之力也。凡修事之時，勿令單，令不復有驗，須要
不折元對，以絕縛之將，銀錯于錯之旋，旋取用，勿
令犯風，錯未盡處，須三重，重未盡，力微也。錯得工
卽單，搗搗盡，背風頭，重篩道，然後入藥中用之。若
更研萬匝了，用之。
更妙，免刮人腸也。

牛黃

牛黃。味苦。性平。有小毒。入心經。主大人癲狂發瘧。中風痰壅。不語。小兒驚癇。天吊。客忤。口噤。除邪逐鬼。定

安魂能墮胎。孕婦體輕微。香磨甲色透。置舌上。先
後甘清涼透心者。爲真人參。爲使惡龍骨。地黃龍
蚶蠟常山。畏牛膝乾漆。

按牛黃味苦宜歸心部癲狂等症何不屬心而有
不療者耶

雷公云凡使有四件第一是生神與膽死者次任
黃走心其黃在中心黃是病死者後識
黃需水復便如碎蕤梨子許如豆大
玩片如如小官自光恐俱人試有人別未之可
有神妙之事用此先搗細研如脾却絹裏又用
黃嫩牛皮紫安于井而止去水三四尺已來一宿

卷六

五

明方用之、麝香

麝香味辛。性溫。無毒。入十二經。主惡氣鬼邪。蛇虺蟲
毒。瘰癧。瘡中惡心。腹暴痛。脹滿。目中翳膜。淚眇。風
濕。癰疽。痛。通關竅。殺蟲。催生墮胎。忌大蒜。

按麝香爲諸香之最其氣透人骨髓故於經絡無所不入然辛香之劑必能耗損真元用之不當反

引邪入黨莫可救藥誠宜謹之

雷公云凡使多有偽者不如不用其香有二等一者名遺香是射干臍開滿其麝自於石上

鹿茸味甘鹹性溫無毒入腎經主益氣滋陰強志補腎理虛虛弱齒牙止腰膝酸疼破流血作瘡療虛勞如婦女子崩漏胎動丈夫溺血洩精小兒驚癇散石中有一朽木者佳連頂骨用長成鹿角主逐鬼邪並神藥性解

鹿茸

鹿茸味甘鹹性溫無毒入腎經主益氣滋陰強志補腎理虛虛弱齒牙止腰膝酸疼破流血作瘡療虛勞如婦女子崩漏胎動丈夫溺血洩精小兒驚癇散石中有一朽木者佳連頂骨用長成鹿角主逐鬼邪並神藥性解

按鹿茸鹹溫之品含腎奚歸功效雖宏須脉沉細相火衰弱者始為相宜若有火熱者用之何異抱薪救火其角亦然麋者更甚大麋冬至解角則屬陽鹿夏至解角則屬陰其性熱所以其功捷大凡含血之物肉易長角難長惟二茸不兩月長大至一二十觔其堅如石生長神奇莫過於此且諸獸

之角終身不易惟此種一年一易蓋其性熱生生不已舊者未去新者隨之氣化穠密孰能與京諸賢盛述其功良有以也

雷公云

凡使鹿茸以天火炙乾然後解鹿茸作上浸火炙之令內外黃脆于用鹿皮裹之於鹿茸一宿其藥燥也至明則以慢火焙之令其力揭其末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為沙又用法用酒洗鹿茸鹿角之膠如鹿角其角要黃色者重人好者其鹿茸食之鹿茸其角要黃色者鹿茸上法乾寧記云其鹿茸與鹿茸生此異耳其鹿茸中有一朽木者佳連頂骨用長成鹿角主逐鬼邪並神藥性解

阿膠

阿膠味甘鹹性微溫無毒入肺肝腎三經主風淫木旺肢節痠疼火盛金衰喘嗽痰血補勞傷療崩帶滋腎安胎並氣止痢明澈如水質脆易斷者真山藥為使畏大黃蛤粉炒成珠用

按阿膠。用黑驢皮造成。黑屬水。專入腎。能剋火。蓋以制熱。則生風之義。故宜入肝。且火得制。則金亦無侵。故又宜入肺。夫東阿井。係濟水所生。性急下趨。清而且重用之。煎煮攪濁澄清。所以能清上炎之火。及上逆之痰也。

熊膽

熊膽。味苦性寒。無毒。入膽經。主時氣熱盛。變為黃疸。小兒風痰。瘰癧。穿驚。癰疽。殺蟲。散毒。可敷惡瘡及痔。入水分塵。如練不散者。真。惡防已地黃。

藥性詳

按熊膽入膽。從其類也。清火定驚之功。較勝諸膽。

雷公云。凡收得後。煉就器中。安每一斤。熊膽入。生

臘胸臍

臘胸臍。味鹹。性大熱。無毒。入脾命門二經。主助腎添精。補中益氣。鬼氣尸疰。夢與鬼交。宿血癥結。心腹疼痛。置睡犬傍。驚狂跳走入水。不冰者真。酒浸一宿。紙裹於文火上炙脆。細剉搗用。

按臘胸臍。鹹熱之品。本入命門。補火脾家所快者。熱也。故亦入之助陽之功。獨甲群劑。今出登萊州。

即海狗腎也。其狀頭似豕。尾似魚。止生兩足。價值殊貴。類多為者。須細辨之。

雷公云。凡使。先須細認其偽。者多。主海中有獸。影在藥中。修合。恐有誤。其物白。殊有一對。其有兩重。薄皮。果。此氣。肉。核。皮。上。自有肉。黃。毛。三。並。共。一。穴。年年。新。溫。常。如。新。燕。將。於。墜。著。大。礪。足。置。於。大。頭。其。犬。驀。驚。如。狂。即。是。真。也。若。須。用。酒。浸。一。日。後。以。紙。裹。微。火。上。炙。令。香。細。剉。單。搗。用。也。

狗肉

狗肉。味鹹。酸性熱。無毒。入命門經。主壯元陽。補絕傷。安五臟。益氣力。其陰莖最助房事。及治婦人帶漏十

藥性詳

二疾。血主補陰。辟邪。療癰狂。忌蒜。

按狗亦鹹熱之品。命門之所由歸也。助火最速。有熱症者。所宜深戒。炙而食之。令人發渴。不止。九月食之。傷神。孕婦食之。生子缺唇。且無聲。丹溪曰。人之虛。皆陰虛也。陰虛則陽必亢。用狗為補。寧不熾其火。以其病。即世人信其補虛。以為指陽虛也。不知凡虛。屬陰。若果陽虛。死亡。立至。舍偏復生。無能措手。豈此之能補乎。雖然。丹溪生平。主意。只是滋陰。故有此論。而溫補之功。諸家其道。當非虛語。

惟命門脉弱素無火症者始為相宜不然則未獲其功先嘗其禍矣。

羊肉

羊肉味甘性大熱無毒入脾肺二經主虛勞寒冷腦風大風補脾益氣安心定驚。

按羊肉之甘宜其歸脾于甘為兌實屬西方之金故亦入肺臟十劑云補可以去弱人參羊肉之類是也夫人參補氣在中羊肉補形在表凡補虛者當分用之不得槩視也六月食之傷神孕婦及水腫骨蒸癰疾一切火症咸宜忌之。

黃牛肉

黃牛肉味甘性平無毒入脾經主安中益氣健脾養胃強骨壯筋其乳補虛弱養心肺潤皮膚解熱毒止消渴滑大腸脂治頭風膽主風痰角腮主赤白帶及行血。

按色黃味甘屬土于土為坤故專入脾家用之倒余誠有再造之功然此為稼穡之資不輕屠殺其自死及有病老邁者不惟無補反能損人市中多

犯此弊食者慎之

猪肉

猪肉味甘性溫無毒入脾經主補脾益氣然多食能助風痰四蹄主捷傷下乳及諸癰腫腸主肉痔腎主腰疼脂能扶胃肺能止咳心能定驚舌能健脾油可敷瘡脂治頭眩腦鳴骨能潤肺利血脈解風熱。

按猪肉之甘自宜入脾遍身之用各以類從丹溪謂其熱能生痰痰多則氣不升降故外感者食之而愈劇患瘧者食之而復成善願生者節食為貴

蟲魚部

蜂蜜

蜂蜜味甘性平無毒入脾肺二經主益氣補中潤燥解毒祛邪定驚養脾氣除心煩通便閉解虛熱療心疾悅顏色和百藥除眾病畏生惡惡花每餉煉至十二兩半用蠟主痢下諸瘡。

按蜂蜜甘宜歸脾潤宜歸肺其用最多良有百花之精日取人溺以釀之故也七月勿食生蜜令人

暴下霍亂

雷公云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分

壯

壯蠟味鹹性微寒無毒入腎經主遺泄帶下喉痺咳嗽榮衛虛熱去來不定心脇下老痰痞積宿血溫瘧瘡腫結核貝母為使喜甘草牛膝遠志蛇床惡麻黃吳茱萸黃辛火火般微紅杵絕細用

按壯蠟本是鹹水結成故專入腎部軟堅收斂之劑也

藥性解

雷公云有石壯石無蠟五海壯蠟石壯蠟者頭邊壯蠟蠟收得是火大不盡服令人無氣壯蠟火蠟日炮并麻堅試之隨上起要認真壯蠟頭已堅用之妙凡修下生用二十兩醫兩養一伏時後入火中燒令過赤然後入鉢中研如粉也

真珠

真珠味無考性寒無毒入心經主手足皮膚逆腫心潤顏止渴降痰點目去膜塞耳除聾催生下死胎又主小兒驚熱風癩須未經錯眼者研細篩過再研二萬下方用

按真珠為水精所孕專能制火且其性鎮重心經之所出入也研之不細傷人臟腑功未獲奏害已隨之

雷公云凡取淨新者以絹袋盛之然後用地榆五

之約重四五斤已米先置於平底鍋中以物四向搖令穩然後著直珠於上丁方丁到子三件葉龍湯湖之令平後於口中搗令細以絹羅重重篩過却更研二萬下丁用凡便

石決明

石決明味鹹性平無毒入肝經主風熱青盲內障骨

藥性解

蒸勞熟久服益精九孔七孔者良以麩裝煨磨去其外黑處并粗皮搗碎於乳鉢中再研絕細永忌山桃按石決明本水族也宜足以生木而制陽光故獨入肝家為眼科要藥命曰決明者丹溪所謂以能而名也

雷公云凡取淨者以絹袋盛之然後用地榆五斤已米先置於平底鍋中以物四向搖令穩然後著直珠於上丁方丁到子三件葉龍湯湖之令平後於口中搗令細以絹羅重重篩過却更研二萬下丁用凡便

龜甲

龜甲味鹹甘性平有毒入心肝脾三經主陰虛不足
骨蒸勞熱癰疽瘰癧五痔陰蝕四肢重弱血癰痺風
疾產前後痢疾驚悸氣心腹痛傷寒勞復肌體寒熱
欲死小兒顛門不合及頭瘡女子赤白漏下及陰瘡
逐瘀血續筋骨催生並智自敗者更佳酥炙用龜尿
主耳聾久嗽斷瘧但畏狗膽惡沙參蜚蠊

按龜甲京士癸之氣而生其補陰也甚捷心主血
肝藏血脾聚血故並入之骨蒸等症靡非陰

藥性

不

六

虛所致用此土之不亦宜哉欲取其尿者取龜置
磁器中以鏡照之既見鏡中影則淫發而失尿另
有一種火蛇龜中心折者不惟服食生搗其肉皆
付蛇毒最良敗龜版及自死之龜形肉慘爛甲內
性氣其全故其功力較倍今本經以下師鑽灼者
為凡愚耳灼者不過燒炙焦黑而已與生者何
殊又何取哉特加敗字詳譯以示人耶

龜甲

龜甲味鹹性平無毒入肺脾二經主骨蒸勞嗽積聚

殺癰瘰肉除蝕痔瘰癧瘰癧血催生墮胎婦人五色
漏下九斤者佳童便浸一宿濾起酥炙用其肉並肺
補金大涼血熱奇形異狀者有人毒快食者以黃者
吳藍煎湯解之俱惡理石紫石

按丹溪云龜甲屬金與上肺脾之所以入也須生
取之去脫者不堪用肉性大冷過食傷脾癰疽勿
食恐益其疾孕婦勿食恐短子項同雞食成癰同
雞子食能殺人同莧菜食生血龍同芥子食發惡
疾不可不慎

藥性

不

三六

雷公云凡使要綠色九肋多裙重七兩者為佳
六一泥同煮三日乾了乾於大火以物焙於中與
方炙乾然入藥用又治勞瘵去熱藥中用保前泥
用童子小便煮盡夜盡小便一斗二升為度後法
之取東流水二兩半盆盛開於盆上一宿至明任
用方有萬倍也

新州烏蛇

新州烏蛇味甘性平有小毒入肺脾二經主諸風皮
膚不仁散癰瘰身癰瘰癧熱毒風淫疥癩脫落塞耳
治聾須辨真者佳去頭及皮鱗帶子剉碎酒浸一宿

厚炙埋地一宿炙乾用。

按烏蛇之用專主去風以理皮肉之症肺主皮毛脾主肌肉故兩入之色黑如漆背有三稜渾如劍脊尾細尖長性善不傷生命多在蘆叢中嗅其花氣亦來南風而吸雖至枯死兩目不陷儼如生者頭有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對稱之重三分至一兩者為上粗大者轉重力彌減也

白花蛇

白花蛇味甘鹹性溫有大毒入肺肝二經主肺風鼻塞去癰瘡浮風四肢不仁骨節疼痛口眼喎斜半身不遂癰癩風白癰風髮眉脫落鼻柱塌壞鶴膝風難距風筋骨拘攣凡使須火燒一大磚令通紅醋沃之使熱氣薰蒸將蛇頭尾各一尺去淨置磚上以盆覆一宿如此三過去骨取肉用亦以眼不陷者為真

按白花蛇專主皮膚之風肺主皮毛肝為風木故都入之然服之者服一晝夜方醒善蛰人中足者輒自斷之補養已痊未接代步不然令人死其毒可知然諸藥不效者獨能引達成功以其性實

直領藥方至於風處所謂大毒之病必用大毒之藥以攻之是也諸蛇鼻向下惟此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名愚謂凡用之更須日換酒浸過五宿去酒不用盡去皮骨埋於土坑一宿取出再炙其毒咸去矣

白公云

凡使即云治風元何治風綠蛇生窠即今切蛇須認取雄雌及川上有新出烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛一路可長半分已來頭尾使之入藥彼出後多留其進重二兩三分者下居別處也此蛇不食生命只吸蘆花氣并南風并上樹枝上棲採不能傷害人也又有重十斤至中蛇腹下有白腸帶子一條可長一寸已來即其酒浸之宿至明漉出向柳木灰中焙之令乾了以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上一層一英可深一尺已來安蛇於中一宿至明再將上皮丁乾濕酒煮過用之良

蛇藥

蛇藥味甘性寒有毒入脾經主除邪氣破堅血解結熱癰兒疳貼癰腫療大傷凡使去皮及腸并爪陰乾塗牛酥炙用脂酥主蛇牙惡瘡疔腫癰癰痔瘻助陽其助塗玉則刻之如蠟

按蜈蚣其之故也形狀與蟾蜍相似本經未
嘗分言自陳藏器極口分殊以爲蜈蚣背有黑點
身小能跳接百強在陂澤間舉動極急蟾蜍身大
嘴黑無點多癰瘡不能跳不解作聲行動遲緩腹
下有丹書八字者然竟其功用無甚差別想有牝
牡之分而無種類之異也

雷公云蜈蚣有蟻其形各別其蜈蚣有黃蜈蚣有
班點脚短即不鳴則黑虎身小黑嘴脚小班點黃
班色前脚大後腿有小尾子一條黃蜈蚣身黃色
然其出蜈蚣即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蜈蚣黃
班頭有肉角凡使蜈蚣先去皮并腸及爪下陰乾然
後使蜈蚣今乾每條事一箇用牛酥一分炙盡爲
陰乾清於日曬出焙乾用之

蠍

蠍味甘辛性平有毒入肝經主小兒風癰手足抽掣
大人中風口眼喎斜風痰耳聾風毒瘰癧出青州緊
小者良去鹽土炙黃用

按蠍之主療莫非風症肝爲巽風宜獨入之喜螫
人甚者令人死雄者螫人痛在一處取井泥傳之
稍溫則易雌者螫人痛索諸處用瓦屋溝下泥傳

之或不值天雨可吸新水調用如螫手足竟以冷
水浸之微暖即易若餘處不可用水浸者則以冷
水浸布貼之小暖則易觀其喜寒若此則爲大熱
之劑無疑今諸書不載其性惟日華子稱其平故
姑錄之此即方書所稱蜘蛛者是也

五靈脂

五靈脂味甘性溫無毒入心肝二經主心腹冷氣疼
痛腸風產後血暈小兒疳癰去目翳辟疫氣解蛇毒
酒研飛煉令去砂石爲佳生者行血炒者止血

按五靈脂

專主血症心主血肝藏血故兩入之行
氣血最捷勿宜過用以傷臟腑

蜈蚣

蜈蚣味甘辛性溫有毒不載經絡主小兒口噤鬼疳
毒諸蛇毒殺精物溫瘧去三蟲心腹寒熱結聚去瘀
血墮胎去頭足慢火炙黃用畏蛤蚧蜈蚣大蒜雞屎

按蜈蚣最似自足蟲第自足蟲足較細密死而不
僵頭上有白肉面及尖嘴其毒更甚勿宜輕用

雷公云凡使蜈蚣用下足蟲其似足是頭上有白肉
面并嘴夫若誤用梃者腥臭氣入頂受死

夫使蠟木末不然而用蠟木末于上器中炒木末焦後去木末用竹刀刮去足甲丁用

蝟牛

蝟牛。味鹹性寒。有小毒。不載經絡。主賊風口眼喎斜。風筋脉拘攣。收大腸脫肛痔瘡消渴。兒疳。火炒過用。

按蝟牛之名。以頭有角似牛也。夏日往往升高。涎書即枯死。必用火炒者。誠欲去其寒毒耳。是即蝟也。圖經考之甚核。本草分爲兩種。恐非。又有一蝟。其眼赤熱。瘡醪酒湯點痔瘡。類分數種。功用相同。茲不多贅。

白蠟蠟

白蠟蠟。味鹹辛。性微溫。有小毒。入心肝脾肺四經。主風濕口噤失音。疥毒。風痰結滯。皮膚風動如蟲行。小兒驚癇夜啼。女子崩中赤白。止除瘳。去三蟲。滅黑疥。米泔水浸去涎炒。去絲用。惡茯苓。草薢。桑螵蛸。桔梗。雖蠟蠟性熱。主固精強陽。交接不倦。

按丹溪云。白蠟蠟屬火而有土與金水。心肝脾肺之所出入也。凡使須頭番者。方倍蠟蠟亦然。

凡使須先須以糯米泔浸一日。待蠟蠟涎出。以布淨拭蠟蠟上黃白毛。并黑口甲了。單搗篩如粉用也。

蟬蛻

蟬蛻。味鹹甘。性寒。無毒。不載經絡。主催生。下胎。衣通乳汁。止夜啼。定驚癇。逐邪熱。殺疳蟲。亦能止渴。

按蟬有五種。陳藏器辨之甚悉。今以形極大聲極高。一鳴而無所停斷者。入藥最良。西川有一種蟬。花乃。蟬在殼中不出而化爲花。自頂中生出。功用畧同。故不另載。

刺蝟皮

刺蝟皮。味苦甘。性平。有小毒。不載經絡。主五痔腸風。瀉血。蠶胃鼻。腹癰疽積陰。腫痛。酒煮殺用。畏桔梗。門冬。

按蝟亦有數種。惟蒼白色。脚似猪蹄者佳。此外並不宜用。其骨以忌入口。令人消瘦。

土蠶蟲

土蠶蟲。味鹹性寒。有毒。入心肝脾三經。主留乳。心腹寒熱。洗洗祛。墜積。殺蟲。乳過經。一名廢蟲。畏

屋遊皂角呂蒲

按土龍專主血症心上血肝藏血脾藏血故三入之今跌打損傷者往往主此或不效則加而用之殊不知有瘀血作瘀者誤為要藥倘無瘀血而其傷在筋骨臟腑之間法當和補愚者不察久服弗已其流禍可勝數耶

蠅螂

蠅螂味鹹酸性寒有毒不載經絡主小兒驚風痰癇大人癲狂狂症件破血墮胎通腸治脹又主力惡諸瘡

羊角

按莊子云蠅螂之置在於轉丸宜其有破血通腸之功矣然其性為火亦賴之以洩其性其性猛驟故能傷脾勿得藥用

斑蝥

斑蝥味辛鹹性寒有大毒不載經絡主癰疽疔瘡毒鼠癰疥癬惡瘡如蝕死肌破石瘰癧積利水道墮胎凡使去足翅并糯米炒米黃為度馬刀為使畏巴

豈丹參赤青蔥會青豆花

按斑蝥入腹有開山鑿嶺之勢最稱猛烈故輒食腹痛不可忍余見里中一壯年患瘡服斑蝥數劑初則人肉不止痛悶欲絕繼則便來紅三日而死自非有藥不效之病可漫使哉

穿山甲

穿山甲味甘鹹性微寒有毒不載經絡主五邪驚悸婦人鬼魅悲傷山嵐瘴癘惡瘡疥癬蠟癩痔漏亦能去風痰黃用

鱗甲

按穿山甲形似鯉魚有四足能陸能水出岸間開鱗甲如死今蟻入中閉而入水開甲蟻浮水而於是入之故土蟻瘻其性喜穿山是以名之故其用亦主潰癰疽通血脈及治吹乳疼痛

鯽魚

鯽魚味甘性溫無毒入脾胃二經主溫胃健脾進飲食補虛羸癯腸癰水穀不調腸風血痢燒灰可傳諸瘡其子調中益肝氣惡猪肉雉肉沙糖

按

品且是土所化其入脾胃宜矣

集錄云諸魚屬火。惟鯽魚屬土。而有補火之功。然多食亦能動火。

鯽魚

鯽魚味甘。性平。無毒。入脾肺肝三經。主咳逆氣喘。上氣水腫。脚滿黃疸。煩渴安胎。妊娠身腫。冷氣瘕癖。氣塊橫膈。伏梁。膽熱眼去翳。滴耳除聾。塗小兒熱腫。血塗小兒丹毒及瘡。脂主小兒癩疾驚忤。鱗燒灰酒服。破產婦滯血。腸主小兒肌瘡。癢癰取蟲。骨主陰蝕。赤白帶下。齒主齋閉。石淋。皮主癰瘡惡瘡。忌猪川。天來。藥性鮮。卷六。三。

按鯽魚之甘。本入脾家。土能生金。金能制木。故亦入肺肝二經。衍義曰。鯽魚至陰之物也。故其鱗三十六陰極。則陽復。所以有魚熱中之說。王叔和曰。熱即生風。故食之多發風熱。諸家並不論及。惟日華子云。鯽魚涼。恐無是理。萬一風症。更使食魚。則是貽禍無窮矣。烟薰者損目。天行病後食之。再發必死。

烏賊骨

烏賊骨味鹹。性微溫。有小毒。入腎經。主崩漏赤白帶。經閉陰蝕。腫痛除目翳。止淚。理金瘡。止血。治驚氣。入腹腹痛。環臍陰。莖寒腫。瘡多膿。汁寒熱瘕瘕。久服令人有子。惡白蝨。白芨附子。

按烏賊之鹹。宜歸水臟。治病有殊效。今用之者鮮。大亦未達其功歟。

雷公云。凡使勿用。沙魚骨。像真相似。只是上文。小者并煮。一伏時。了。取出。與屋下。搗一地。穴。可盛。有前件。烏賊骨。各少。先燒坑子。去炭灰。子。盛藥。用之。其效倍多。

鰻鱺魚

鰻鱺魚味甘。性平。有微毒。不載經絡。主虛勞不足。陽事衰微。傳屍鬼疰。蠱毒諸蟲。婦人陰瘡。蟲痒。帶下。皮膚惡瘡。疳蠱痔瘻。腰背間風寒濕痺。諸般草石藥毒。脚氣癰瘍。風白痢風。肉燒室內。可辟蚊蟲。骨置廂中。能除衣蠹。

按鰻鱺雖有小毒。而功甚溥。或言是蛟蜃之類。未可盡信。今據稽神錄所載。主療傳屍。甚奇。信亦非常物也。五色金者。其功最勝。然罕能得耳。

鯪魚

鯪魚味甘性大溫無毒入脾經主產後淋瀝血氣不調腹中冷氣腸鳴滯脣濕痺又主補脾益氣血堪塗癰

按鯪魚甘溫之品脾所快也宜專入之生於泥窟其性善蟄遇夏方出則為陰類可知大有補血之功惜本經及諸家未能悉載耳多食令人霍亂時行病食之多復

注云凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無腥者頭中無腥者皆養人魚汁不可合鷄鵒肉食之鯪魚不可合鯢鱖食之鯢鱖不可合白犬血食之鯢魚不可合鯢魚食之鯢魚亦爾青魚鯢不可合生胡荽及生薑并食之鯢魚及腹中諸藥及黃之反白皆不可食生鯢鯢不可合鯢肉食之亦損人

蟹

蟹味鹹性寒有毒不載經絡主散血破結並氣並筋除膏熱煩悶搗塗漆瘡爪專主破血墮胎惡柿主按蟹者解也故其用主散不主欬過食令人傷脾吐瀉風疾食之再發孕婦食之損生狀異者能殺人候中其毒用豉蒜冬瓜黑豆煎汁並可解之

六卷終

雷公炮製藥性解六卷 通行本

舊本題明李中梓撰凡金石部三十三種果部十八種穀部十一種草部九十六種木部五十七種人部十種禽獸部十八種蟲魚部二十六種每味之下各有論案其稱雷公云者蓋采炮炙論之文別附於末攷宋雷斅炮炙論三卷自元以來久無專行之本惟李時珍本草綱目載之差詳是篇所采猶未全備不得冒雷公之名又江南通志載中梓所著書有傷寒括要內經知要本草通原醫宗必讀願生微論凡五種獨無是書卷端太醫院訂正姑蘇文喜堂鐫補字亦坊刻炫俗之陋習殆庸妄書賈隨意哀集因中梓有醫名故託之耳

新刊魯府祕方四卷

〔明〕劉應泰輯

北京圖書館藏明鈔本

附《四庫全書總目·魯府祕方

四卷》提要

魯府祕方

蓋聞醫書之作肇於神農而宋儒亦曰暇時將藥方看知得養生之理自昔仁人志在濟世不有奇方秘傳胡以延生而恤患哉余自守藩以來軫念民疾嘗施砭劑以惠人矣第藥之所及猶有限也乃因國事之暇博求醫書索諸秘論間或採之江湖以及親所經驗之方拔其最良者因病分類輯為四卷粹語真訣折衷明備刻既成題曰魯府祕方頒之國中俾世之抱疾莫伸者開卷洞然知有對疾之證對證之藥依方修製効應如響要之以代病為功而躋烝民於仁壽則神聖相傳



之澤藉是呂流布無疆矣昔
名醫有不著方書者人問之
則曰醫者意也不可以言傳
彼蓋以心得自秘非裕後之
謀也余推所得者嘉與天下
後世共之則仁民愛物之心
其少慊乎惟願同志者神悟
理會因此識彼即百家所傳
亦無遺珠之憾矣庶其有補
於世云

省
萬曆甲午歲仲春之吉
皇明八代孫魯王三畏堂書於
存心殿

新刊魯府秘方卷之一

福集

魯府良醫正臣劉應泰編輯

醫官臣段 焯校正

醫生臣陳特務

臣王 聖同校

禁方括曰

魯藩仁主 心同天地 忠孝賢明 精金美玉

時值饑饉 疊施賑濟 積善累德 陰功普被

施藥傳方 弗忍私秘 特命良醫 選奇拔萃

剛繁就簡 分門析類 不用切脉 問病投疾

藥性平和 奏効奇異 屢施屢驗 救投輒愈

好生君子 依方修製 救急濟貧 扶危蘇急

刊布天下 咸霑恩惠 國泰民安 功垂萬世

中風

神仙奪命丹 治中風痰厥氣厥牙關緊不省人事

南薄荷葉一兩 天南星湯泡透切片 薑蠶錢 南菴活錢

荆芥穗錢 川椒去目 遠細辛錢 牙皂剉去皮

石腦油二兩 硃砂一兩

右各製如法將牙皂以上八味共合一處用好酸漿水四碗入磁盆內浸藥春秋五日夏三日冬七日臨熱時濾去滓存淨汁入銀鍋或銅鍋內用桑柴火熬以槐柳枝頻攪熬數十沸方入石腦油細砂再熬成膏形如琥珀色乘熱攤於連四紙上待乾收貯臨用時剪方寸一塊以溫漿水溶化蓋內用二箒筒吹入二鼻孔中良久吐痰涎即省若吹之太重或藥水太熱致鼻出血勿懼即飲淡鹽湯一二口便止

紫金錠 專治男子婦人諸般風症左癱右瘓口眼歪斜半身不遂及破傷風量虛實輕者半錠重者一錠無灰黃酒研下汗出即愈避風孕婦不可服其効不可盡述

鮮玄參 去蘆四 鮮地榆 去蘆四 鮮天麻 去蘆四 鮮草烏 去蘆四
 全蝎 洗去鹽足 麻黃 去根四 白麩 十斤 麝香 真正淨
 每半五月初一日採取鮮藥至初五日先玄參等四味用水洗淨切片碾壓取自然汁入磁缸內每日攪晒至九月甲子庚申日入全蝎同碾為細

末入麝香拌勻候麻黃四十斤碾細末取其半其渣入鍋內熬水二三炷香濾去渣加入麻黃末及白麩打糊搗成莖用竹葉包裹隨症研服

千金不換刀圭散 治男婦小兒諸般風症左癱右瘓半身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言蹇澀行步艱難遍身瘡癬上攻頭目耳內蟬鳴痰涎不利皮膚癢痒偏正頭風無問新舊及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刀所傷出血不止敷貼立効疔漏膿血痛楚難禁服之頓愈

川烏 黃火炮 草烏 黃火炮 蒼朮 米泔浸 白茯苓 去皮
 兩頭尖 天 甘草 天 薑黃 隔紙炒 白芍 酒浸三日
 石斛 酒洗 川芎 白芷 細辛 當歸 防風 去蘆 麻黃 荆芥 金蝎 去尾 何首烏 去蘆
 天麻 藥本 石為細末每服三分或五分漸加至六七分臨臥酒調下不飲者茶亦可服後忌多飲酒并一切熱物飲食一時恐動藥力

牛黃紫金丹 治中風暗風痰厥氣厥不省人事

朱砂^{二錢} 阿芙蓉^{一錢} 沉香^{一錢} 牛黃^{一分} 廣木香^{一分}
冰片^{三分} 麝香^{二分}

右共為細末入乳為丸四十數陰乾細嚼用梨汁送下每服一丸如無梨汁薄荷湯送下或研碎灌之即醒

治風肉消丸 治男婦左癱右瘓口眼歪斜半身不遂

遂語言蹇澀手足麻木行步艱難偏身疼痛神效

川芎^兩 乾山藥 白芷 甘松 防風^{各錢} 桑寄生^{各錢} 烏蛇^{各錢}

當歸 芍藥^{酒炒} 天麻 甘草 細辛 白膠香

牛膝^{去蘆} 兩頭尖^{燈入} 參 木香^{各二錢}

右為細末酒糊為丸如櫻桃大每服一丸細嚼無灰黃酒送下

華山五子丹 治左癱右瘓偏身疼痛三十六種風

二十四般氣胎前產後腹脹咳嗽氣急傷風痔漏

手足頑麻偏身瘡痒癩五般痢疾共血氣風血

脾血山崩積聚赤白帶下一切疾病俱服之此藥

生精補髓安五臟定魂魄補下元治虛損壯精神

補血氣和容顏其功如神

當歸 川芎 生地黄 熟地黄 川烏^炮 白木

蒼朮^{酒浸三日} 益智仁 五靈脂 桔梗 甘松

人參 白茯苓 白豆蔻^{各二錢} 天麻 陳皮 廣黃

滑石 川椒 甘草 白芷^{各一兩} 木香 丁香

沉香 乳香 沒藥 牛黃^{各二錢}

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼茶酒米湯任下

祛風散

治中風口眼喎斜半身不遂

白附子 薑蠶 全蝎^{各等分}

右為細末每服一錢五分熱酒調下

牛黃散 治中風痰厥不省人事小兒急慢驚風

牛黃^{一分} 辰砂^{半分} 白牽牛^{頭末二分}

右共研為末作一服小兒減半痰厥溫香油下急

慢驚風黃酒入蜜少許下

壽星散 治痰厥不省人事

臘月牛膽南星^{各錢} 枯礬^{二錢} 朱砂^{一錢}

右共為末每服一錢茶酒薑水皆可送下

治中風不語及打傷敗血攻心

膽礬為細末弱人三分壯人五分黃酒調服血從

大便下或口吐一二口即已

治左癱右瘓半身不遂

用好麻四兩燒灰存性 朱砂二錢

右共為一處研末分作四服黃酒送下

治口眼歪斜神方

當歸 白芍 川芎 白朮 茯苓 陳皮

半夏 枳殼 白芷 桔梗 薑桑 天麻

防風 荊芥 細辛 黃芩 烏藥 甘草

生薑煎服

通關散 治中風痰厥昏迷不省人事欲絕者先用

皂角細辛等分為末每用少許吹入鼻中有嚏可

治隨用吐法

皂角末各 半夏 白礬各三分

右為末薑汁調服探吐後服對症藥

紅白散 治中風痰厥不省人事

用辰砂白礬各等分三伏內裝入猪胆內透風處

陰干每用一塊涼水研下

傷寒

傷寒金口訣

這傷寒世罕稀多少庸醫莫能知仲景石函節庵泄

千金不易傷寒秘方不同法史異四時傷寒各有

例惟有冬月正傷寒不與春夏秋同治發表實表

兩妙方用在三冬無別治真傷寒真中風表實表

虛各自中表虛自汗脈浮緩疎邪實表有奇功表

實無汗脈浮緊升陽發表汗自鬆背惡寒背發熱

頭痛脊強一般說俱屬太陽膀胱經有汗無汗須

分別有汗表虛無汗實脈浮緩紫胸中別春夏秋

另有方通用羌活沖和湯春溫夏熱秋治濕隨時

加減細斟量病症與冬皆相似淺深表裏脈中詳

脈有浮脈有沉半浮半沉表裏停有力無力求虛

實或溫或下細推尋更有汗吐下三法當施當設

莫留停兩感症日雙傳一日太陽少陰連腎與膀

胱脈沉大口乾頭痛是真原二日陽明與太陰沉

長之脈脾胃熱目又痛鼻又乾腹滿自利不能乾

三日少陽厥陰病肝脾脈息見沉弦耳聾脇痛囊

踈縮。古人不治。命由天。陶節庵泄瀉方。不問陰陽。兩感傷。通用冲和靈寶飲。一服兩解。雪洗湯。更明表裏多少病。治分先後。細推詳。表病多。裏病微。麻黃葛根湯。最奇。表緩裏急。宜攻裏。調胃承氣急通之。寒中陰絀。口不乾。身疼發熱。自下利。脉沉。息又無力。回陽救急湯。最的。都言兩感無治法。誰知先後有消息。結胸症候。分輕重。雙解六一二方。免陽明症不得眠。鼻乾目痛。是根源。柴葛解肌湯。一劑。猶如渴急過井。采耳聾。脇痛。半表裏。柴胡雙解立甦。症。腹又痛。咽又乾。桂枝大黃湯。可斷。太陽發黃。頭有汗。茵陳將軍湯。獨美。無熱自利。是臟寒。加味理中湯。最端。特行病症。身大熱。六神通解。須當啜。小火不利。導赤飲。下焦畜血。憑斯訣。一切下症。並結胸。六一順氣。分明說。身有熱。頭無痛。面赤。飲水不下。咽庸醫誤認。為熱症。豈知心火泛上矣。自是戴陽。多不曉。後元湯。服得安然。身如珠。眠似火。發狂狂叫。快認我。病在三焦。無人識。三黃石羔湯。最可發。斑之症。先飲嘔。耳聾。冷足。無他。休發汗。愈斑。

爛消斑。青然。飲莫慢。勞力感寒。症又異。調榮養衛。金不換。內傷氣血。外感寒莫與傷寒一例。看身出汗。熱又渴。如神。白虎湯。最確。食積症。類傷寒。發熱不惡寒。嘔逆。身不痛。頭痛。休疑。談只消。加味調中飲。氣口緊盛。休變。延小水利。大便黑。桃仁承氣對。子說。熱邪傳裏。畜血症。血熱自利。病安。帖吐血。血。血另有方。生地。芩連湯。最切。陰隔陽。難通。詳陰。極發熱。面戴陽。欲赴井。中脉無力。急救。回陽。返本湯。水不下。咽。乘血症。加減。犀角地黃湯。真中寒。真厥。症。回陽救急湯。連進。陽急發。斑。脉洪。數。三黃。巨勝湯。之症。再造飲。治無陽。症。重復發。汗。汗。不定。如狂。症。原無熱。精采不與人相攝。熱結。膀胱。休悞。下桂苓。飲子。真奇。絕心。下硬。痛利。清水。熱結。利症。醫莫測。又識語。又作。渴身熱。黃龍湯。莫錯。口噤。頭搖。名。瘧症。如聖。飲內。抽。添。訣。瘧後。昏。沉。百合。病。紫。胡。百。合。湯。休。越。亡。陽。症。過。汗。多。頭。痛。振。振。病。不。和。筋。惕。因。體。虛。太。甚。溫。壯。益。元。湯。最。和。男。女。勞。復。陰。陽。易。道。遙。湯。治。脉。沉。疴。脚。氣。症。類。傷。寒。禁。用。補。劑。與。湯。

九暑中身熱寒中冷浮風濕熱脉之端便閉嘔逆
難伸屈加味續命湯保全撮空症仔細認休認風
症誤人命猶衣摸床為症檢入手摸背不識人只
因汗熱相傷肺升陽散火勿如神睡覺中忽言語
夢寐昏神不主湯猶與之雖吞嚥形如中酒多
不舉心火剋金越經瀉心導赤湯急取身熱渴
不頭痛神思昏亂語言小水不利大便黑燥投
涼藥黃泉病傳心肺夾血症當歸活血湯最玄
夾痰症類傷寒寒熱昏迷頭又眩涎出口中為症

驗七情內損傷之根神出舍空亂語言加味導痰
湯可增大頭痛是天行項腫惡寒熱並煎一劑芥
連消毒飲痰飲喉痺盡安痊此是先賢千古秘不
是知音莫浪傳

升陽發表湯 治冬月正陽寒到發熱惡寒功著重脈浮緊無汗足
是太陽陽明症若如身發熱身似火者宜用此方

麻黃 杏仁 桂枝 甘草 川芎 白芷

羌活 防風 升麻

薑蔥豆豉水煎熱服出汗汗出藥止勿多服

疎邪實表湯 治冬月正陽寒到發熱惡風寒重項脊強重脈浮緩有
汗者太陽表症也

桂枝 芍藥 甘草 防風 川芎 羌活 白朮

薑一片棗二枚水煎服 汗不止加黃芪

喘加紫胡 胸中飽悶加枳殼桔梗

羌活冲和湯 治春夏秋非時感冒寒濕發熱惡寒無汗脊強脉
浮緊此是太陽陽明受邪是表症

蒼朮 羌活 防風 川芎 白芷 細辛 黃芩

生地黃 甘草

薑蔥煎熱服出汗 胸中飽悶加枳殼桔梗 夏

月加石羔知母 有汗出蒼朮加白朮再不止去

細辛加黃芪如再不止以紫胡加桂枝芍藥一錢

名神術湯 不作汗加蘇葉

紫葛解肌湯 治陽明身熱惡寒不眠微惡寒頭痛眼痛喉痛牙痛
肌屬陽明症其正陽明別無治法

紫胡 黃芩 葛根 芍藥 羌活 石羔末

白芷 桔梗 甘草

生薑棗煎服本經無汗惡寒去黃芩加麻黃

紫胡雙解散 治少陽傷寒身熱頭痛寒熱嘔吐而苦脉弦數屬少陽
本經受邪和解此經有三禁不可汗下利小便也

紫胡 黃芩 半夏 人參 甘草 茯苓

芍藥

生薑棗煎服 嘔者加陳皮竹茹薑汁 痰多加

水薑貝母 口渴加知母石膏 心中飽悶加枳

殼桔梗 心下痞滿加枳實黃連內熱甚錯語心

煩不得眠合黃連解毒湯 小便不利大便泄瀉

合四苓散挾熱而利加炒連白芍藥

杜枝大黃湯 治太陽經腹滿痛咽乾而渴手足溫脈沉實此為太陽

桂枝 大黃 芍藥 甘草 枳實 厚朴

生薑煎臨睡服加檳榔磨水二匙入溫服

茵陳將軍湯 治太陽腹滿身黃小便短赤或不利煩渴脈沉有力

者不治

茵陳 大黃 梔子 黃連 枳實 甘草梢

滑石末二錢

滾水煎熱服以利為度 但頭汗出身無汗小便

不利渴飲水漿身必發黃宜此藥調下五苓散

六一順氣湯 治傷寒熱和傳裏大便秘實口燥咽乾怕熱語狂妄

或代大小承氣調胃承氣三承氣大抵胡大陷胸等湯之神藥也

枳胡 黃芩 芍藥 枳實 厚朴 大黃

芒硝 甘草

滾水煎臨服入鐵秀水三匙調服

如神白虎湯 治身熱渴而有汗不解或雖汗過渴不解者服米飲

石膏 知母 甘草 糯米 人參 麥門冬

五味 山梔 天花粉

薑一片煎臨服入烏梅汁一匙服 心煩加竹茹

濕溫症熱不退而大便溏者依古方加蒼朮

三黃石膏湯 治陽毒發斑黃身如金米眼珠如火狂叫欲走六脈洪數

發其汗病熱不退又復下之大使逆刺小便不利亦有錯治溫症而或此

黃連 黃芩 黃柏 山梔 麻黃 石膏

豆豉 生薑細茶煎服

三黃巨勝湯 治陽毒狂妄亂言登高而歌棄衣而走面赤脈大有力

石膏 黃芩 黃連 黃柏 甘草 大黃

芒硝 山梔 薑棗煎熱服

中和靈寶飲 治兩感傷寒頭痛身熱惡寒舌乾口燥以陽先受病者

先下利身發病者入當以四陽救急湯

羌活 防風 川芎 生地黃 細辛 黃芩

枳胡 知母 乾葛 石膏

薑棗煎臨服加薄荷十片煎一沸熱服中病即止

冬月去黃芩石膏加麻黃

犀角 生地黃 當歸 黃連 苦參 木香

但湯逆本湯或脈弱者不可服涼藥若誤認為熱症而用涼藥元不可

附子製 乾薑 人參 肉桂 麥門冬 五味
茯苓 甘草 童便

薑棗煎臨服入蜜二匙頓服之 無脈者加猪胆
汁一匙 面赤者加葱七莖嘔者則入薑汁炒
半夏

溫經益元湯治汗下後頭眩振振欲倒地及肉瞤筋惕或大便
後衛虛亡陽汗不止脈來無力

附子 人參 白朮 甘草 芍藥 當歸

黃芪 生地 乾薑 肉桂

薑棗糯米炒水煎溫服

如神飲治傷寒重感寒濕則成剛赤二症頭面赤項強直手足攣
口噤背張與瘕瘕同法

羌活 防風 柴胡 枳殼 甘草 川芎

人參 白朮 白芷 芍藥

薑一片煎臨服入薑汁竹瀝各二匙溫服 有汗

去枳殼加桂枝 無汗去白朮加麻黃 口噤咬

牙加大黃 手足攣手攣加當歸

六神通解散治三月前後感寒疫頭疼大熱惡寒體痛而渴脈浮
紫有汗無汗年力壯盛之人用羌和芍湯忌緩散用此

麻黃 甘草 黃芩 滑石 蒼朮 細辛

生薑葱白豆豉煎熱溫出汗 頭痛甚加川芎

渴甚加天花粉 身痛甚加羌活 無頭疼惡寒
反怕熱者大渴識語大便實此熱邪傳裏也去麻
黃蒼朮加大黃煎胡枳實

加味調中飲治傷寒夾食停寒亦有頭痛身熱不惡寒為異
耳口脈紫盛是也

陳皮 枳實 青皮 厚朴 乾薑 白朮

砂仁 蒼朮 草果 甘草

生薑炒蘿蔔子一撮煎溫服

桂苓飲子治傷寒初得症無熱狂言煩燥不安精米不與人相當不可
認為發狂而用下無元者多矣不知此因邪熱結胸也如狂症

桂枝 猪苓 知母 澤瀉 黃柏 甘草梢

滑石 生薑三片燈心二十四莖煎溫服

逍遙湯治傷寒後發大熱冷沉語失神小腹絞痛頭不舉足不舉移
眼中生花百病難散熱氣消胃男子則陰腫入小腹攻利婦人則
寒急腰膝重引腹內痛此男女勞復陰陽易也

知母 人參 竹青 茯苓 甘草 生地黃

黃連 滑石 微鼠糞兩頭尖者十四枚

薑棗煎臨服入燒視襠末調服陰頭痛即愈矣

黃龍湯治傷寒下利純清水心下硬痛而渴識語怕熱者

大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草 人參

當歸 年老氣血虛者去硝

蜚一片水煎溫服 大便實識語加大黃利之

熊膽奪命散 治傷寒熱秘發與不逆親疎端賴至善和交

熊膽一分研末凉水調服立效

點眼聖仙方 治傷寒并大頭瘟腫項癰瘰癧疹等症

人尿 猫屎

狗屎 各一兩用黍糠二升炒黃色入前三味製過各淨用六錢

山茨菰 土錢

白犀角 剉七錢 羚羊角 剉五錢 火硝 七錢

黃連 六錢

血竭

沒藥 各五錢

右共為細末將小桌剖開去核每一箇入藥末二分合上用針將索刺遍服為金紙包裹入陽城罐內封固打火線香一炷取出冷定去藥上皮每藥包連藥料一錢研細入好片腦三分共研細如

痛

傷寒點眼男女左右大眼皆汗出即愈如傷寒十二

日無汗者用藥吹入男左女右鼻孔汗出即愈如

陰症瘟疫頭項俱腫者俱如上點汗出即愈驢馬

中結點眼亦瘥

一半分散 治傷寒頭項痛發熱惡寒無汗

雄黃南星半夏

川烏草烏硃砂

更加一味白天麻

薑蔥酒調送下

傷寒無汗被蓋之

萬兩黃金無價

右俱生用為末每服半分出汗如神

千金散 治痲同前

苦實去皮用香油焙黃色為末每服三分先喫菜

豆湯一二鍾次將藥用菜豆湯調服再喫菜豆湯

一二鍾汗即出神效

預防傷寒 韓與實傳

六月六日三伏時採黃蒿陰乾冬至日搗為末待

正月初一日早晨蜜水調渾家大小各喫一口一

年不犯傷寒

傷寒日久不出汗者用梨一箇生薑一塊同搗取汁再金便

瘟疫

神初清震湯 專治天行瘟疫頭面腫盛咽喉不利

舌乾口渴燥增寒壯熱時氣流傳親戚不相訪問染

之多不救若依此方服之無不應驗

羌活 荊芥

牛蒡子

防風 葛根

紫胡

赤芍

獨活

白芷

前胡

川芎

升麻

甘草

薄荷

薑蔥煎出汗

內府仙方 治腫項大頭病

薑萎二兩

薑黃

蟬退各二錢半

右為細末合一處薑汁打麪糊為丸每丸重一錢
小兒半丸蜜水調服

一 遍瘟丹

廣陵零香

小陵零香童加蒼朮

茅香 藿香各六

香附子

三素子

川芎

藁本各四

細辛

白芷

甘松

防風

遠志各三

檀香

沉香

降真香

樟腦

乳香

辰砂

焰硝

安息香

鬼箭草各二

大皂角各四

右為細末水和丸任意大小黃丹為衣

二聖救苦丸 治傷寒瘟疫不論傳經過經俱可服

大黃

四兩切片

牙皂二兩

右為細末水打稀糊為丸如萊豆大每服三五十
丸萊豆煎湯待冷送下即汗而愈 衆人病一般
者此瘟疫也即服此藥汗出立已

中暑

天水丸 治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃脘
積熱治一切熱病

白滑石各一兩

大粉草微炒

右為細末生蜜搗為丸如彈子大井水化服一丸
九似丸 治伏暑暈生諸症頭疼壯熱似傷寒寒

熱往來似瘧疾翻胃嘔吐似膈氣大便下血似腸
風小便不利似淋瀝飲食無消渴四肢困倦似虛

勞服脂黃赤似酒瘟遍身黃腫似食黃

船上硫黃

白礬

玄精石

滑石

石膏

盆硝

甘草各

寒食麴二兩

右為細末滴水丸如彈子大每服一丸用熱水一

呷許浸透其藥然後以薑汁蜜各少許先嚼芝蔴

一捻嚥下不拘時服

梅蘇丸

治上焦熱潤肺生津

烏梅

不拘多少溫水洗

白沙糖半斤

右為細末入南薄荷頭末半斤再搗成膏丸如彈
子大每用一丸口中噙化行路備之解渴妙

千里水壺蘆

白沙糖

白楊梅去核南薄荷

烏梅去核各

百藥煎

天門冬酒浸

麥門冬酒浸

白檀香各一兩

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每用一九噲化

內傷

參朮膏

治飲食失節損傷脾胃勞役過度耗傷元氣肌肉消削飲食不進

陳參

去蘆

白朮

去蘆

右剉片入砂鍋內水六碗煮至二碗濾出汁再入水熬如此四次共得汁八碗濾淨去滓將汁再熬至二碗入蜜二兩再熬成膏磁罐盛入土埋三晝夜出火毒每服二三匙白米湯下不拘時任意服

調和大補羹

大米

小米

糯米

薏苡仁

蓮肉

艾實

山藥

白茯苓

白糖

右炒熟黃色為末每日空心白滾湯和羹食之

傷寒

消滯丸

消酒消食消水消氣消痞消脹消腫消積

消痛

黑牽牛

炒

南香附米

炒

五靈脂

各一兩

右為細末醋糊為丸如菜豆大每服二三十丸食

後淡薑湯送下

消導平胃散

治飲食所傷胸膈痞悶肚腹疼痛

蒼朮

製

陳皮

厚朴

炒

神麴

麥芽

枳實

炒

香附米

甘草

薑棗水煎溫服

傷肉食如山查

腰痛加莪朮

惡心加砂仁

有痰加半夏

傷酒加薑炒黃連

健脾丸

枳實

炒

白朮

炒

陳皮

神麴

木香

半夏

製

黃連

炒

黃芩

炒

厚朴

製

當歸

香附子

大麥芽

炒

白芍藥

酒

白茯苓

去皮

川芎

五錢

右為細末用荷葉煮糯米糊為丸如桐子大每服四五十丸食後白米湯下

痰火

神異痰火膏子

生地黃

四

熟地黃

核桃肉

紅棗肉

蓮肉

柿霜

山藥

製

甘枸杞

胡黃連

人參

知母

貝母

銀柴胡

柯子肉

牡丹皮

地骨皮

山藥

黃芪

黃芩	黃柏	陳皮	白沙參	杏仁	桔梗
黃菊花	五味子	白芍	梔子	香附	松花
天門冬	麥門冬	厚朴	枳殼	當歸	白朮
桑白皮	天花粉	瓜蒌仁	白茯苓	乳香	沒藥
玄胡索	玄明粉	鹿角膠	棗殼	栢子仁	以上四十味各四兩
梨汁	藕汁	二斤	五加皮	六兩	

右用甜水一大鍋將生熟地黃煮熬稠水十碗收起又用水一大鍋再煮熬待稠濃收十餘碗汁將二黃用冷水磨細絹袋濾渣將煎調藥下鍋用水一大桶煮一次收水十碗如此將藥煮熬五次取水五十碗將煎煮二黃汁投入諸藥汁和勻仍再將水用細絹袋濾淨止用淨藥水下鍋調以文武火熬成膏于下蜂窠五斤再熬一二沸時下松花玄明粉白礬乳香柿霜梨藕已成膏子熟美用磁罐盛之勿令泄氣每日早用三錢以滾水和食不拘時食之前後永無痼疾仍將諸藥渣為末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸不拘時滾水送下

法製陳皮 一清氣化痰甚妙

廣陳皮一斤 青鹽 五味子 甘草 薑 山茱萸 烏梅 去核各二兩 將陳皮在溫水浸一宿取出將肉白刮去晒乾將青鹽等五味置砂鍋底陳皮在上水可滿陳皮用文武火燒乾止用陳皮任意嚼下治痰火

廣陳皮四兩 甘草二兩 二味鹽水炒黑色為末加玄明粉二兩神麴糊為丸菜豆大每服五十九食後茶釣痰仙方

礪砂 白礬 半生 磁膏 上細礪打 青蒙石 煎生薑汁下青研極細 內各一錢

水帝 共研極細末每用二厘薄荷濃湯調入內即秋露白 治痰火

經霜絲瓜自根至蔓留尺五長斷餘藤不用將斷蔓就地脉接水二日用餅罐扎嚴埋地不要漏土每一科盛者可取二碗水小者亦得水一碗共埋地下臨用痰火盛者二兩輕者一兩以麥米白糖化對甜為則緩化糖連水重湯頓取下露一夜一氣飲之急則煮化放冷飲下即消痰利膈如米糖無以白砂糖亦好

灰薑膏 治上焦痰火如神

青嫩灰薑洗淨切片搗爛用布絞取汁二碗入砂鍋內慢火熬至一碗加真竹瀝一小盞白蜜一碗再熬數沸磁罐收貯每用一小盞傾茶甌中白滾湯不拘時服

咳嗽

治咳嗽方

消油二兩

蜜三兩

生薑自然汁二兩

柯子皮 白礬各五錢

慢火熬黑如漆空心服二匙最効

治咳嗽如神

槐花

杏仁去皮另研各四兩

人參五錢為末

右為末煉蜜九龍眼大每一丸臨睡嚥化下

治寒熱久嗽方

川芎

官桂

薄荷

細茶各等分

右為末用茶罐一箇盛火在內以藥末些須散入內烟起即用書本覆上口烟從罐嘴出患人用口吸烟嚥之米湯隨即壓下神効

治咳嗽

桑白皮二兩 枯白礬五錢

治嗽

右為末麴糊為丸如梧子大每服五十丸食後下

杏仁去皮 胡桃肉去皮各等分

右二味研為膏入蜂蜜少許每服一匙臨臥下

治肺熱喘嗽久不愈者

石膏火煨紅為末每服二錢食遠用蜂蜜水調下

治喘嗽

蘿蔔子二兩蒸熟皂角燒存性為末每服二錢蜜水調下

治喘嗽

杏仁去皮 童便浸一日一換半月取出焙乾研如泥

每服一搗頂大薄荷蜜水一匙水一鍾煎半鍾食後服

治痰嗽 用黃熟灰薑一箇取出子若干數還去皮

杏仁于內燒存性醋糊為丸如梧子大每服二十

丸臨臥時白蘿蔔湯下

治久嗽 川椒一百粒去目為末杏仁一百粒去皮

尖小紅棗五十枚去核共搗如泥丸如小棗大每

服一二枚臨臥時細嚥下

治吐膿血咳嗽

半夏二兩先用白礬滾水浸十日再生薑汁浸五日陰乾為末甘草二兩熬汁為丸如櫻桃大早晚噙化一丸神効

治痰嗽神効方

生礬 枯礬各五錢 槐子兩二 辰砂三錢

右為末醋糊丸如梧子大每服三十丸薑湯下日三

治咳嗽吐膿乃肺傷也

知母 貝母 白芨 枯礬各等分

右研細每服三錢生薑三片嚼服三五服後已

喘喘

治喘嗽

半夏 麻黃 石膏 杏仁去皮 細茶 甘草

川芎少許 粟殼少許 淡豆豉 剉生薑三片水煎服

治喘喘

千葉雌 雄黃 牛黃 片腦各一分

右為末麝糊丸如菜豆大每服一丸臨卧溫茶下

瘡疾

塞鼻丹 治瘡疾

草烏一箇 巴豆二箇 胡椒七箇 棗二箇

右三味為末棗肉為丸如梧桐子大每用一丸綿花塞男左女右塞鼻孔中於未發之先

治瘡疾方

木鱉子七箇炮過去皮 全蝎七箇去頭 橫柳結實者

廣木香 砂仁 草果火炮 知母去皮毛

貝母去心各一錢五分 為末每服一錢五分燒酒送下

龍虎丹 治瘡 端午午時製

龍骨 虎骨 等分為末水丸如彈子大朱砂為

衣臨發日預握男左女右手心內即止

截瘡丹 治諸瘡 端午日以獨蒜不拘多少搗爛

入好黃丹研勻乾濕得所搗作丸如龍服大晒乾

收貯但瘡發發一二次後臨發日雞鳴以一九水煎服

治瘡疾仙方 不拘年月新久

紫胡 黃芩 烏梅 草果 桂皮 橫柳

子薑 知母各一錢 陳皮 半夏各一錢 寒多子薑二錢

熱多知母二錢 酒水煎空心服

痢疾

治痢不拘赤白

白蘿蔔搗取汁與蜂蜜停對服三四匙即愈

治血痢 用苦參炒為末每服半錢米湯調下

治白痢

肉苳菰麴包煨過入乳香一粒為末每服二三分米湯調下

治禁口痢不思飲食

蓮肉不拘多少為細末每服二錢蜜水調下

又方 糯米半升入生薑汁浸炒為末每服三錢白湯調下

椿根散 治痢疾如神

椿根白皮高 松花麴 地榆 荷葉柿 各四錢長

右和勻為末若白痢白糖調服紅痢黑糖調服立止

妙應散 治遠近痢疾

用男左女右舊草鞋一隻取中心一寸許燒存性

為末用黃酒調服或井花水亦可立止

治下痢禁口不飲食

黃雞一隻製如食法以炭火炙之鹽醋椒末搭之

炙令香熟食患人在側聞香即食其因

治久痢 酸石榴皮一箇劈破火燒黑灰為末每服

二錢不拘時米湯調下作九服亦可

治赤白痢疾久不止者神効

烏梅六七箇燒存性為末空心黃酒調一服見神

藥

久痢神丹

鵝片 各二錢 牛黃 冰片 麝香 各三錢 木香

硃砂 各三錢 乳香 雄黃 各一錢 沉香 各二錢

右為細末燒酒為丸如菜豆大硃砂為衣每服一

九空心服 白痢井水下 紅痢黃連水下 赤白痢井水下

泄瀉

治大人小兒脾虛泄瀉方

丁香 木香 陳皮 甘草 白朮 各三錢 澤瀉

茯苓 藿香 厚朴 冬瓜仁 各一錢 白芍 酒炒各三錢

右為末煉蜜為丸如雞頭子大每服一二丸米湯

或淡薑湯下

萬補丸 治脾胃不和澹泄一切脾氣不足治男子

遺精婦人赤白帶下尤妙

蒼朮八兩 厚朴七兩 陳皮各五兩 甘草 小茴香

右為末听用將猪肚一箇連肉為末半斤將猪肚

擦洗極淨入蓮肉末於中線扎住用猪腰二箇同

煮用童便黃連瀉為度取出搗如泥和前藥再

搗極勻為丸如梧子大每服七八十丸薑湯送下

白亦可

金丹散 治水瀉

箱穀子不拘多少炒去刺黃色為末每服三錢

霍亂

順逆丹 治霍亂上吐下瀉傷食腹脹

白朮^{去油} 白茯苓^{去皮} 陳皮 厚朴^{去皮} 澤瀉^{各一}

諸苓^{各一} 蒼朮^{各一} 神曲^{各一} 赤芍^{各一} 砂仁^{各一}

木香^{二錢} 甘草^{五錢}

右為末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸滾水化下

秘方 治霍亂吐瀉

乾薑 胡椒 胡黃連^{各二} 菜豆粉^{五分}

右為末每三分沸湯點服

治霍亂吐瀉時筋筋粗大如桃李學縮痛不可忍

林菊葉煎湯飲之即効

青筋

白虎丸 治青筋初覺頭疼惡心或心腹腰背遍

身疼痛增寒壯熱不思飲食此瘀血上攻即進

一服當時血散若遇三五日青筋已老服亦効

及婦人崩漏帶下久患赤白痢疾或打撲內損血

不能散

古礦灰^{不拘多少} 燒上為末水飛曬乾

右為末水糊為丸如梧子大每服三五十丸溫

燒酒送下青筋重加減此散

翻胃

噎食方

皂莢 黃糖^{各一} 硼砂^{各一} 硃砂^{各一}

俱拌在煎二味內裝入老酒瓶內封固令乾先文

後武火煨^{半日}取出研就三錢作三服先一服將

藥末放舌上即見酒送下第二服以酒調作一

硬塊後舌上亦用酒送下第三服亦用酒調服

連三服一日服盡五愈

治五噎如神

雄黃 五靈脂各五錢

右為末黑狗膽乾如梧桐子大每服七丸龍缸水送下

又方 螺蛳二升煮甘浸一宿去螺取水澄取泥焙

乾為末酒下忌日飲食不喫如神病重加一服

治翻胃

胡桃肉 舊銅錢 蜂蜜各五錢

右搗三千下丸如彈子大噙舌下不可嚼待消

自化下即愈若隨食隨吐者加珍珠末二分

又方 乾糖六兩 生薑四兩 甘草二兩 為末同搗作

餅焙乾為末每服二錢用鹽湯調下

槐葉升 治噎食轉食瘕疾

真阿膠 五靈脂各五錢

古為細末用黃狗膽汁為丸如菴豆大每服五

七丸小兒三丸白滾湯送下有痰薑湯下忌生

冷葱蒜魚翅其中滿中窄有脈伏暴肥氣癰瘕

十常八九之切

治翻胃 用棗一枚去桃暴全班苗一箇濕紙已慢

火煨熟將班苗葉之用棗細嚼空心米湯送下

又方 用甘蔗七升汁生薑一升汁二味和勻分作二

服切

又方 用黑驢尿一鍾服之即愈有虫吐出

又方 五月五日山東去處尋野人肝即人大便是也

用真阿膠等分為細末空心用生薑薄片煎藥

食之其効如神

治翻胃轉食

用乾柿餅三箇連蒂搗為細末酒調服如神

欬逆

七粒散 治欬逆

柿蒂七箇焙乾為末黃酒調下立止外用旌

黃二錢酒一盞煎至七分急令患者飲其熱

氣即止或有唾黃乳香等分酒煎服之亦可

噎氣

南極丸 治胃中有火有痰有鬱作噎氣

南星 湯洗透切片 半夏 同上 吹石膏 香附末 薑汁 炒

梔子各等分 為細末水打神麴糊為丸梧子大
每服五七十丸臨卧薑湯送下

瓜酸

芩連丸 治鬱積吞酸吐酸

芩朮各等分 陳皮 白茯苓去皮 半夏湯泡洗切片

黃連夏月倍用 胡萊蔓冬月倍用

右為細末蒸餅水打稀糊為丸如萊豆大每服三十丸食後薑湯下

醋雜

三聖丸 治錯雜

白朮四兩 紅陳皮二兩 黃連五錢

右為末神麴糊為丸如萊豆大每服五十丸津液

下或薑湯半口亦可

七氣

交感丹 治一切公秘神情名利失志抑鬱煩悶

七情所傷不思飲食面黃形羸胸膈痞悶疼

痛等症

南香附米一斤長流水浸三日

白茯苓去皮木為淨

右攪勻煉蜜為丸如彈子大每清晨細嚼一丸
白滾湯下陳皮湯亦可

神仙一塊氣 治諸氣食積及噎膈痞滿胸脇

刺痛癥瘕氣並皆治之

青皮 陳皮 三稜 莪朮 香附重便炒各

神麴 麥芽 白丑剉木 檳榔 蘿蔔子

蘇合 黃連各等分 枳實各等分 皂角 百草霜各二錢

右為末麴糊丸萊豆大每三十丸視痰之上下為
食之先後熱酒薑湯任下

痞滿

枳朮丸 治心下堅如盤

枳實三錢 白朮三錢 水一鍾煎至七分溫服

治氣結聚心下不散

用桃樹上不落乾桃子三兩為末每服二錢空心

溫酒調下

香砂枳朮丸 治脾胃虛弱飲食減少胸膈痞悶宜服

枳實二錢 白朮二錢 砂仁 香附子各五錢 為末湯浸蒸

餅為丸如桐子大每服三十丸食遠白湯下

勞疾

治勞嗽吐膿血

款冬花一錢 藕節六分

右共剉為一罐內鋪灰火上放熟炭四五塊將藥全
放大上用布圍罐口病人以口鼻受烟氣入腹每
日清晨一次不過三次愈

治勞疾眠陽方

紫頭一兩 麻黃根二兩 皮硝以水煮一炷香取出

麻黃根切碎晒乾紫頭用麪包煨熟焦去麪將此

為細末以皮硝水打麪糊為丸如菜豆大每服三

十五丸無根水送下自然安眠任意食肉飲酒不
可用燒酒宜十全大補湯調治

治陰虛火動發熱咳嗽痰喘

人乳一盞 童便一盞 竹瀝半盞 薑汁二匙

右四味合一處入磁碗內重湯煮熱空心二服午間

一服晚上一服

治傳屍勞瘵及傳染瘵門者

月經螺魚白水煮食之用骨燒烟薰病人斷根

治勞瘵好食諸物而有勞瘵者

猪肝心肺一付去胆用白芷草麻子仁一兩石膏

一錢乳香沒藥各三分葱白三根用酒研爛灌入

肺灌內用河水五十斤桑柴五十斤文武火煮乾

水為度限三日喫完如肝喫不盡作丸用之神効

八珍膏 治勞瘵

用梨汁蘿蔔汁藕汁各一碗栢枝搗爛用童便

熬濃汁一碗糖稀一碗乳汁一碗共熬成膏再入

知母黃柏各為末入膏攪勻每服二茶匙白

水送下其疾自愈

清肺飲 治男子陰虛火動發熱咳嗽吐血盜汗痰

喘心慌

當歸 白芍 生地 麥門冬 生知母 貝母

紫苑 前胡 黃連 五味子 地骨皮 人參

甘草 各等分 水煎入童便一鍾同服

滋榮健脾丸 治陰分不足四肢倦怠脾氣不能

布化或五心煩熱盜汗將成勞瘵或大病後羸

瘦一切不足之症

白朮二兩

白芍炒

白茯苓各五兩

當歸酒洗

橘紅各四兩

川芎三兩

甘草蜜炙

生地酒洗

麥芽炒

枳實炒

山查肉蒸

黃連各二兩半

右為末酒糊丸如梧子大每服七八十丸白水下

失血

清大涼血湯 治吐血一服立已

當歸尾酒洗

赤芍藥酒洗

生地黃酒洗

百合

貝母去心

梔子仁炒黑

麥門冬各一錢

川芎

熟地黃

桃仁去皮尖

阿膠蛤粉炒

牡丹皮

蒲黃炒黑各七分

如薑皮一片水煎服

治吐血成斗命在頃刻

管仲為本

血餘灰五分

側柏葉湯汁一

放一大碗內重湯煮一炷香取出待溫入童便

小鍾黃酒少許頻頻溫服立止

將軍丸 治吐血不止一服如神

大黃酒拌九蒸九晒為末水丸每服四五十九白滾

水下下血用條茶湯下

衄血

鼻衄不止

駝糞焙乾為末血餘燒灰等分每少許吹鼻立止

止血方 吐咯衄血下血皆止

鮮藕汁工

白蘿蔔汁上

刺脚茅汁即茅草

韭汁中

生薑汁下

右合一處碗底頓熱不拘時服立効

治鼻衄神法

勿令患人知以井花水忽然搗嗅其面即止

衄血神方

人乳

童便

好酒

三味重湯煮清飲之立止

鼻衄血方

天項後髮際兩筋間穴中三壯立止蓋自此入腦注

鼻中

眩暈

將軍丸戰丸 治頭目眩暈多是痰火

大黃不拘多少酒拌九次蒸九次以黑為度晒乾

為末水丸每五十丸臨卧白水送下

治酒虛頭暈

小茅川兩 羌活 藜蘆 蔓荊子 香白芷各五錢

右為細末每服五錢八牛腦髓內好黃酒煮熱連酒臨服之

麻木

止麻消痰飲 治口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或

嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心並遍身麻木

黃連 半夏 瓜蒌 黃芩 茯苓 桔梗

枳殼 陳皮 天麻 細辛 甘草 南星

血虛如歸氣虛如參亦有十指麻木胃中有濕

痰元血加二木以佐熱附子行經中死血者四物加薤仁紅花並汁忌生冷魚腥發風發熱之物

癲狂

獨參丸 治狂邪舉發無時被頭大叫欲殺人不

避水火

苦參不拘多少為末煉蜜為丸如梧桐子大每

服二三十丸薄荷湯送下一方治氣心風即是

痰迷心竅發狂亂作以花蕊石煨黃酒淬一

次為末每服一錢黃酒送下

養血清心湯 治癲狂喜笑不常

人參 白朮 茯苓 石菖蒲 遠志 以甘草水煮去骨

酸棗仁 炒香各一錢 當歸 錢川芎 生羊 各一錢

甘草 五分 水煎服

治喜笑不休神方

先用食鹽二兩成塊燒令紅放冷研細以河水一

大碗同煎三五沸待溫分三次服之須臾以針探

喉中吐去熱痰數升以黃連解毒湯加半夏竹瀝

薑汁服不數劑而愈殊効

五癇

清明丸 治風癇 久服其涎隨小便出

白礬 細茶 各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九茶

清送下

治諸癇神志不寧時發狂燥多言好怒面容不澤

生地黃 錢 橘紅 貝母 茯苓 黃連 遠志

酸棗仁 枳實 甘草 石菖蒲 瓜蒌仁

天花粉

右生薑煎服

健忘

定志丸

治心氣不足恍惚多忘怔忡驚悸

遠志甘草水

石菖蒲各二兩

白茯苓去水

人參一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服二十丸臨卧米湯送下

邪祟

秦承祖灸鬼法 治一切驚狂癲忘踰牆上屋罵

言不避親疎等証

以病者兩手大姆指用細麻繩扎縛定以大艾炷置於其中兩箇甲及兩指角由四處着火一處不着即無効灸七壯神驗

怔忡驚悸

安神丸

治血虛心煩懊惱驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂水漂

黃連酒洗

生地黃一錢

當歸二錢

甘草炙

右四味為末蒸餅打稀糊丸如黍粒大朱砂為衣

每服三五十丸津嚥下

參歸腰子 治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈

人參

當歸身各五錢

猪腰子一隻

先以腰子用水二碗煮至一碗半將腰子細切入二味藥同煎至八分喫腰子以藥汁送下有契下盡猪腰子同上二味藥渣焙乾為細末山藥糊為丸梧子大每三五十丸米湯下

寧神定志丸

當歸 白芍

茯苓

麥門冬

陳皮

貝母

朱砂

川芎

遠志

肉桂

生地黃

酸棗仁

黃連

人參

甘草

右為末煉蜜為丸如黍豆大每五七十丸食遠棗湯下

新刊魯府

方卷之一

福集單

魯府秘方目錄

壽集

鼓脹

水腫

積聚

五疳

補益

痼冷

頭痛

鬚髮

鼻病

口舌

面病

牙瘡

眼目

咽喉

癭瘤

結核

肺癰

心痛

腹痛

腰痛

脇痛

痛風

腳氣

癩痢

消渴

濁症

遺精

淋症

小便閉

大便閉

大小便閉

痔漏

腸癖

脫肛

諸虫

目錄畢

新刊魯府秘方卷之二 壽集

魯府良醫正臣劉應泰編輯

醫官臣段 燦校正

醫生臣陳時務

臣王 璽同校

鼓脹

金蟾散 治氣鼓

大蝦蟇一箇以砂仁推入其口使吞入腹以滿為度用泥罐封固炭火煨至透紅烟盡取出候冷去

泥研末為一服或酒或陳皮湯送下候撒屁多乃

見其効

秘方 治脹滿水腫

癩蝦蟇一二枚裝在猪肚內用好酒煮一伏時去

蝦蟇將猪肚與酒服盡大便屁如雷或水下水腫

自消極効 加宿砂夢須尤妙

金棗兒 治腫脹仙方

紅芽大戟一斤紅棗三斤火煮一晝夜去大戟用

棗晒乾食之

秘方 治腫脹

白商陸根似人形者搗取汁一分 生薑汁二點黃酒一盞和服空

心三日服一次元氣厚者服五次薄者三次止忌

鹽醬凡八年五十以裏者可服以外者不可用

加減補中益氣湯補元氣健脾胃養心益肝火清濕熱消鼓脹

黃芪二錢 人參四錢 白朮三錢 當歸一錢 白芍二錢

陳皮七分 柴胡五分 升麻三分 黃芩酒炒五分 黃連五分

木香三分 砂仁四分 茯苓五分 甘草五分

右剉一劑生薑三片棗一枚水二鍾煎至一鍾溫

服

人參四錢服三劑後每一劑止用三錢又服五劑

後止用二錢黃芪服至三十劑後渾身不痒去之

恐生濕而助脹也

升麻服至二十劑後去之恐升提太過並增痰嗽

右方逐日看病加減不同大畧如此服至三十劑

後又易後方

益氣補脾養心平肝清火消脹之劑

人參二錢 白朮去蘆土三錢 白茯苓去皮一錢 當歸酒洗一錢

頭伏日采下瓦松熬水不時洗之

治腸風下血

烏梅連核四兩燒存性 黃連四兩

右為末醋糊丸桐子大每服七十九茶清送下藥

盡愈

又方

猪腸頭五寸長煮爛用黃連為末和搗細如泥可

丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯送下

治腸風痔漏

用戴膽汁點痔又用新汲水早晚洗之常洗最

効

治痔下血

槐花 荆芥 各等分

右為末每服一錢空心茶清送下

治翻花痔 馬齒菜一斤燒存性細研猪脂

調搽

痔漏

五倍子大者一箇取乳 當歸 防風牙分為末裝實

白芍藥酒洗 麥門冬去心 五味子十箇 柴胡酒炒 黃連酒炒

黃芩酒洗 香附子炒 陳皮七分 厚朴薑炒 枳實炒

砂仁五分 蘿蔔子炒 甘草二分

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎不拘時服此藥

調參朮膏同服與後地黃丸瑞蓮丸太和丸相開

服之以愈為度愈後去枳實蘿蔔子柴胡黃芩厚朴倍加參朮以收萬全之切

參朮膏 補元氣健脾胃為主

揀參四兩 白朮去蘆油淨八兩

右剉片入水十碗熬至二碗濾汁將渣再熬如此

四次共得汁八碗將汁濾淨入沙鍋慢火熬至二

碗入蜜再熬成膏磁罐盛入水內拔去火毒每用

三四匙米湯下

六味地黃丸 養心滋腎補肺健脾清熱除濕

大懷生地黃用酒拌炒鍋內蒸熟取出再用砂仁一兩茯苓二兩

從不用竹刀切碎 山茱萸酒蒸去核四兩 白茯苓去皮 乾山藥四兩

牡丹皮去骨澤瀉二兩

右忌鐵器為細末用前參朮膏為丸如梧桐子大每

服三錢空心米湯下此方止用半料後又製入鹿角膠四兩為丸乳

瑞蓮丸 補元氣健脾胃進飲食止泄瀉

人參二兩 白朮去蘆 白茯苓去皮 山藥炒 蓮肉炒

芡實去殼 陳皮一兩 白芍藥酒洗 甘草五分

右為細末用豬肚洗令淨水煮爛杵千餘下入

藥再搗和為丸如梧桐子大每服三錢米湯送下

太和丸 補元氣健脾胃養心血平肝火清濕熱化

痰涎開胸膈消鼓脹化積滯進飲食順氣寬中解

鬱結

人參二兩 白朮去蘆 白茯苓去皮 半夏湯泡切片姜汁炒 枳實炒

陳皮二錢 黃連薑炒 當歸酒洗 川芎二錢 白芍藥酒洗

香附子炒 神麴炒 麥芽炒 山楂二錢 木香二錢

厚朴薑炒 蘿蔔子炒 宿砂炒 甘草二錢

右為細末荷葉手掌大煎湯煮倉穀米飯為丸如

梧桐子大每服三錢米湯送下

白雪糕

乾山藥二兩 人參二兩 茯苓二兩 蓮肉二兩 芡實二兩 神麴炒

麥芽炒 大米半升 糯米半升 白沙糖二斤

右為末蒸糕當飯食之

水腫

丹房奇術不服藥自去水蠱脹腫病

真水銀粉或巴豆四兩去毒生硫黃或

右三味一處搗研成餅用新綿一斤鋪臍上次以藥當臍掩之外用帛裹住待人行三五里自然瀉下水來行之三五度去藥以溫粥補之入患者隔日取水此藥不可棄一餅可救二三箇人忌一切腥冷酸硬之物

又方 治症同前

用精猪肉一二兩加甘遂細末一分到一處用濕

紙包裹火煨香熟細嚼好酒送下便出一切惡物即愈重者不過二服

扶脾消腫湯

人參 白朮去毒茯苓 猪苓 澤瀉 木通

滑石 木香 麥門冬去心 黃芩 大腹皮 桑白皮

茯苓皮 陳皮 生薑皮 燈草 甘草 水煎服

金匱腎氣丸 治脾腎虛腰疼脚腫小便不利或肚

腹脹痛四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其効如

神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症者非此藥不能救

白茯苓三兩牛膝去毒肉桂 澤瀉 山茱萸酒洗

車前子 山藥 牡丹皮各一兩大附子製五錢熟地黃四兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服七十八十九臨

卧米湯送下

秘方 粟米菜豆各一抄猪肝一葉切碎三味煮作

粥食之至重者不過五次其腫自消切忌氣惱生

冷之物

積聚

三稜煎丸 治飲食過度痞滿疼痛食不消化而成

癖又治婦人血積血塊乾血氣經閉小兒癖疾

義木 三稜各二兩二味大黃去皮八兩

右為末先以黃銀器內好醋漬令平慢火熬微

乾入二味為丸如菜豆大每服十九至二十九食

後溫白湯送下虛實加減大人如梧桐子大每四

十九

神化丹 消癖疾破血氣下鬼胎通經脉及諸癖積

血氣塊

硃砂 乾膝炒 血竭各三錢 紅娘子二十箇去翅足 斑貓二十箇去翅足

乳香一錢五分

右為末棗肉為丸豌豆大每一丸服至三五丸臨

卧漿湯或薑湯或紅花蘇木湯下

勝金丸 治一切瘡塊積氣發熱

大黃 皮硝 甘草各一兩

右三味共為細末每服三錢蜜一茶匙滾水調下

空心加減服之大便下膿血効矣

五疸

地黃散 治遍身黃腫

地龍二兩 黃瓜二兩

共為細末每服二錢用黃酒或茶清調下

露珠飲 治五疸黃病神効

露珠即土豆形如薑搗爛取汁半碗服之

酒煮茵陳湯 治酒疸遍身眼目發黃如金色者

好茵陳一兩好黃酒一鍾半煎至八分食後溫服

不過五六劑全矣

治五疸黃腫

綠礬不拘多少炒至白色

右為細末棗肉為丸如櫻桃大每服五丸早辰

午間晚上各一服用冷黃酒送下忌醋生冷發物

百發百中或有虫即吐出

治黃疸專屬濕熱金匱相似

茵陳三錢 白朮五錢 赤苓一錢 猪苓 澤瀉各一錢 蒼朮

山梔 滑石各二錢 桂 甘草一分 燈草 水煎服

治黃病方

黑礬二兩 雄黃三錢 五靈脂五錢

右三味為末用紅棗煮熱去皮核揉和為丸如梧

桐子大白麴為衣每服二十九薑湯送下乾物壓

之

補益

神仙接命秘訣

一陰一陽道之體也二弦之系道之用也二家之系

交感於神室之中而成丹也萬卷丹經俱言三家

相會盡矣三五合一之妙藥世學仙者皆不知下

紅鉛要十四歲清男女子 人乳要壯健婦人初生男 乳香二厘半要
朱砂二厘半要 火石用新小馬齒入童便於內今滿放淨去處陰地上
生出秋石掃下用少許

右各為細末合一處研勻用物生男乳汁加童便少許揉和為丸如梧桐子大用雞蛋取頂去清黃令入丸在內厚紙封頂放眾雞蛋內雞抱二十一日取出每遇病輕者一丸病重者二丸乳汁送下無病人服之延年須要居一靜室清心絕慾勿太醉太飽太喜太怒太勞靜養每早卯時伏氣後用

一丸晚上伏氣後用一丸俱用乳汁送下服至四十日為止身體康健耳目聰明髮白返黑落更生延年益壽其功不可盡述

呼吸靜功妙訣

人生以氣為本以息為元以心為根以腎為蒂天地相去八萬四千里人心腎相去八寸四分此腎是內腎臍下一寸三分是也中有一脉以通元息之沉浮息總百脉一呼則百脉皆開一吸則百脉皆闔天地化工流行亦不出呼吸二字人呼吸常在

於心腎之間則血氣自順元氣自固七情不熾百病不治自消矣

每于午卯酉時靜室中厚褥鋪於榻上盤脚大坐瞑目視臍以綿塞耳心絕念慮以意隨呼吸一性一來上下於心腎之間勿坐勿徐任其自然坐一炷香後覺得口鼻之氣不龐漸漸和柔又一炷香後覺得口鼻之氣似無出入然後緩緩伸脚開目去耳塞下榻行數步又偃仰榻上少睡片時起來服淡粥半盞不可作勞惱怒以損靜功每日能專心

依法行之兩月之後自見功效

夫萬病之原摠歸於虛虛者人不自慎而戕之也蓋飲食失節損傷脾胃勞役過度耗散元氣思慮無窮損傷心血房慾過度耗傷腎水此四者人常犯之雖智者慎之亦難免無一傷也然傷之者則內傷勞瘵諸虛百病生焉良工未遇峻劑復攻則輕病變重重病變危可勝嘆哉預為調攝者晚服保合太和丸以培元氣脾胃之虧可以壯氣而增力可以代勞而任事可以助困而不倦可以當寒而

耐鐵早服坎离既濟丸以補心血腎水之損由是
 添精而養神由是升水而降火由是却病而除根
 由是延年而益壽然此二藥專補人自戕之虛可
 免終身之患乃王道平和之劑能收萬全之功衛
 生君子稟賦薄弱或斷喪太早不能節慎者不可
 一日無此藥也可不信服而預防哉

保合太和丸

白朮去蘆當歸酒洗各四兩茯苓去皮白芍酒洗各二兩人參去蘆山藥

陳皮帶白蓮肉半夏枳實麸炒神麴炒麥芽炒

山查去子香附去皮黃連去心龍眼取肉各二兩白朮去蘆三錢

甘草炙五錢

右為細末荷葉煎湯下大米煮粥稀為丸如梧桐
 子大每服六七十丸食後臨卧米湯送下

坎离既濟丸

熟地黃酒蒸生地黃酒洗天門冬去心麥門冬去心

山藥酒蒸山藥酒洗甘枸杞酒洗肉蓯蓉酒洗

黃柏去皮酒炒知母酒炒當歸酒洗白芍藥酒洗

白茯苓去皮牡丹皮去皮澤瀉酒洗五味子

揀參遠志甘草水泡

右忌鐵器為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一
 百丸空心鹽湯黃酒任下忌三白丸人年過四十
 以後氣血漸衰可加斑龍膠四兩酒化開丸服効
 製斑龍膠法

此膠能生精養血益智寧神順暢三焦培填五臟
 補心腎美顏色却病延年乃虛損中之聖藥也

鹿角連腦蓋骨者佳自解者不用去蓋至壬淨五
 十兩截作三寸段新汲泉水浸洗去垢吹去角

內血腥穢水盡同人參五兩天門冬去心皮五兩
 麥門冬去心五兩甘枸杞子去蒂八兩川牛膝去

蘆五兩五品藥以角入淨壇內注水至壇肩用若
 殼油帛封固罈口大鍋內注水大甑蒸之文武火

蜜煮三晝夜足時常加入沸湯於鍋內以補乾耗
 取出濾去渣將汁復入砂鍋內熬成膠聽用和藥

末其角去外麋皮淨者為末名鹿角霜也亦有可
 用處

調攝預防

萬病根源總屬虛

酒色財氣致災危

忌醫諱疾難治

寡慾清心重易醫

履霜不謹堅冰至

霸藥休投良劑宜

堪嗟真病非容易

調攝還從未病時

全鹿丸

治諸虛百病精血不足元氣虛弱久無子

嗣并四肢無力精神久爽常服能還精填髓補益

元陽滋生血脉壯健脾胃安五臟和六腑添智慧

駐容顏久服其効不能盡述修合沐浴至心勿輕

視之

黃芪

人參

白朮

白茯苓

當歸

生地

熟地

天冬

麥冬

補骨脂

陳皮

甘草

續斷

杜仲

牛膝

五味子

山藥

芡實

瑣陽

楮實

秋石

枸杞子

巴戟

胡蘆巴

兔絲子

酒浸

覆盆子

肉蓯蓉

酒浸

川椒

小茴香

青鹽

沉香

以上各半斤

右藥精製如法各為細末聽用牡鹿一隻宰殺退
去毛肚雜碎洗淨以桑柴火煮熟橫切片焙乾為
末骨用酥油塗炙為細末隨同雜碎入煮鹿湯內

熬成膏和肉骨末一處拌勻石扣內搗為丸如膏

不勻煉蜜添之丸如梧子大每服六七十丸空心

炒鹽酒送下

神仙不老丹

用牛乳一瓶乾山藥末四兩無灰好黃酒一大鍾

童子小便一大鍾去頭尾共和一處入鍾重湯煮

以浮沫出為度取出每用一小鍾溫服每日三次

痢冷

治陰症攪腸沙

胡椒

黃丹

枯礬

細麴

二錢

右研細或好酒或醪醋調勻作膏放手心合在外

腎上即時汗出愈或攤厚紙上或布絹上貼臍大

能起痿

治陰症冷疾

用雞血入好熱黃酒飲下即愈

回陽丹

治陰症手足厥冷心腹疼痛

白炭

胡椒

右為細末黃酒為丸如麥粒大每服九丸用熱黃

酒送下効

治攪腸沙

用胡椒二十四粒藜豆二十四粒同搗碎熱酒調服極効

治傷寒陰症方

艾一撮 乾薑 甘松 細辛 胡椒 各等分

右為細末每用三錢好醋調勻入男左女右手心男朝馬口女朝陰門汗出為効

火精散 治陰症心腹冷痛不可忍者

硫黃_{四分} 胡椒_{一分}

右為末每服三分燒酒調服

治夾陰傷寒

用刀刮鍋蓋木皮炒胡為細末滾熱酒調一盃服又灸兩中指尖又灸兩脚大拇指尖汗出為妙

治男婦陰症

用葱去粗皮捆住如酒鍾粗上下分三指長切去

胡葉放肚臍上用熱熨斗熨葱氣透則熱而愈

寒症方

乳香 當歸_{各一兩} 胡椒_{一兩} 為末雞血研熱黃酒下

頭痛

治偏正頭風

羌活 白芷 細辛 川芎 蔓荊子 薄荷

防風 甘草

右八味各等分為細末每服一二茶匙白湯調下

香茗散 治因氣惱冲動頭痛神効

香附子_錢 川芎_錢 細茶_{二撮}

右剉一劑水煎溫服

三靈散 治八般頭風

草烏 細辛_{等分} 黃丹_{少許}

右為極細末吹鼻內効

獨烏膏 治風寒頭痛服藥不効

川烏_兩 為末醋調如膏塗於頂腦角太陽風府處

須臾痛止

太陽膏 治頭痛頭風

川烏 天南星 白芷_{等分}

右為細末用葱白連鬚同藥搗爛貼太陽穴上紙

蓋之

二黃散 治偏正頭疼頸風眼痛破傷風立驗

黃丹三錢 雄黃三錢 乳香 沒藥各二錢 煅硝一兩

右為細末令患人齧溫水吹藥於鼻內立効

烏鬚髮

烏鬚固本丸 生精補髓益血補虛烏鬚黑髮返老

還童延年益壽

何首烏八兩 米泔水浸三宿竹刀刮去粗皮切片黑豆五升同煮烏
漆水泡一晝熟去黑豆

黃精四兩 用黑豆二升同煮 生地黃 酒浸 熟地黃 酒浸

天門冬去心 麥門冬去心 人參 浙木去蘖

白茯苓去皮 甘枸杞 五加皮 巨勝子

柏子仁 松子仁 核桃仁各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七八十丸加
至百丸空心溫酒下鹽湯亦可忌葱蒜蘿蔔豆腐

燒酒等物并房事

烏鬚

何首烏一斤 打碎炮包 白茯苓去皮 當歸半斤

蒼朮米泔浸去 熟地黃 生地黃黃酒洗 麥門冬泡去心

天門冬泡去心 早蓮花去根 金墨晚土烟 沒藥

乳香各五錢

右為細末黃酒麵糊為丸如菉豆大每服五十丸
青鹽湯送下服二十日見効黑至三月再服十日
見効朝暮各一服

烏鬚方

五倍子一兩 硃砂各八分 紅銅末 白礬

沒石子各一錢

右各研極細末先將鬚髮用肥皂洗淨以布拭乾
將藥入於白茶盞內又用濃茶食鹽湯調前藥

放於鍋內煮三四沸看其不稠不稀取起趁熱以
眉掠挑藥塗白處以油紙包裹一二時解去油
紙候乾洗淨鬚髮即黑

製五倍子法

用五倍子不拘多少搗碎如黃豆大用糖篩篩去細
者入無油淨鍋內不住手炒以黑色為度不要黃
色不要焦枯了用青布一方水濕趁五倍熱包裹
在內於地上板蓋踏成餅候冷取出聽用

製銅末法

用紅銅末將好醋銅末于鍋內炒乾如此七次方好
入醋者末多寡酌量

牢牙烏鬚 養生不用煉丹砂每日清晨只擦牙若
還用之三五日轉教鬚鬢黑如鴉

早蓮草 青鹽 槐角子 猪牙皂 生地黃

右俱切碎搗和一處紙包鹽泥裹燒存性研為細
末早晨擦牙吐出洗鬚上久則其黑如漆

益牙散 補腎去脾濕熱固齒止疼明目烏鬚髮大
有神効

熟地黃 地骨皮 川芎 青鹽炒 香附子

破故紙 細辛 防風 白茯苓 五加皮

石膏 川椒 猪牙皂角 各二錢

右為細末每早蘸藥擦牙用百沸湯嗽口嚥下其
効不可盡述

神仙延齡丹 專治男婦癱瘓五勞七傷顏色枯乾
身體羸瘦婦人久不成胎男子精神減少行步艱
難筋骨疼痛能使衰返壯折骨復堅素髮返黑去
癰退耳聰目明能除百病益壽延年其効不可盡

述

早蓮 取汁曬乾 破故紙 炒香為末 五加皮 酒浸一晝一夜

赤茯苓 去皮乳 生地黃 取汁一晝一夜 紅棗 去皮炙

生薑 取汁一晝一夜 杜仲 去皮炙 核桃仁 去皮各 川芎

枸杞 去蒂酒浸 沒石子 蜂蜜 煉老熟 細辛 二兩

右除桃仁紅棗蜜外其餘各為細末將前三味藥

煮熟為丸如桐子大每服三五丸或酒或鹽湯

下服二十日外退白生黑日久延年神効

烏鬚大補丹

何首烏 一斤銅刀切碎黑豆三升水泡入甑內與烏層燻黑

當歸 熟地 牛膝 故紙 草薢 茯苓 各二

瑣陽 覆盆子 桑椹子 栢子仁 酸棗仁

沒石子 川椒 小茴香 茯苓 各一 巴戟

百藥煎 槐角子 各五錢 青鹽 甘草 各三

右二十一味各製為末石扣內不犯鉄器蜂蜜

一碗頭生兒乳汁一碗二味和勻銅鐵盛之重湯

煮三炷香取出冷定和藥搗千下不可間斷一時

如服藥時忌猪羊蘿蔔豆腐不可用服至二十

日鬚髮從根發黑至一月陽物雄壯須當謹慎効

鼻病

治紅糟鼻

升麻 牡丹皮 生地黄 大黃錢各一 黃連

當歸 葛根錢各一 生甘草 白芍錢各七 薄荷五分

每帖加紅小豆麴一撮

右剉水一鍾半煎至一鍾去粗渣徐徐服之忌蒜

椒酒

亦鼻久不瘥

用大黃芒硝橘榔等分為末調敷患處三四次洗

淨却用銀杏嚼爛敷之

羌鼻塞肉乃肺氣盛

用枯礬研為末綿裹塞鼻中數日自消矣

鼻瘡久患不已膿極臭者

用百草霜研細每服三錢冷水調卧服

鼻中時時流臭黃水甚者腦亦時痛俗名控腦砂有

垂食腦中

用絲瓜藤近根三尺許燒存性為末酒調服

治鼻瘡

杏仁去皮尖 用乳汁和之搽瘡處

口舌

治口舌生瘡方

黃連 細辛各等分

右為末乾摻之効

治口瘡方

黃連二錢 乾薑二錢 甘草三分

右為末搽患處良久數吐涎出再搽再吐涎愈

治舌腫方

用百草霜醋和敷舌上下脫皮須臾立消

舌長過寸研冰片敷之即收

舌出血如泉炒槐花為末摻之立止

面病

治汗斑經驗方

官粉二錢 輕粉五分 硫黃三分 珍珠五厘 砂鍋內煨

右為末以生薑擦之次日即去其斑

點痣

好醃 礦灰 各等分 入鐵杓內炒良久以草葉放
入藥上即起焰可用離火臨用以清水調和以鐵
條蘸塗瘰上極妙每日三次待五日自落

牙瘡

立止牙疼方

好雄黃 為末

蒜一瓣 搗爛麻布扭汁

令患人先齋水一口將布包蒜扭汁滴鼻中男左
女右彈上雄末一指甲些須患人提氣一口將藥
吸上即吐水疼止

治牙疼方

雄黃 五分

礦灰 五分

麝香 一分

右為細末用黃蠟溶化入藥為丸入疼處立効

又方

全蠍 一箇

胡椒 三分

共為末搽疼牙立止

治虫牙疼方

蟾酥 硃砂 雄黃 各一分

右為細末麝糊為丸如米粒大每用一丸咬疼處
立止

治牙瘡

用梔子不拘多少以水潤每箇鑽眼三五箇入明
礬小豆大填在眼內以火燒烟微盡為末先以水
漱淨乾擦之

治牙瘡

用明礬五錢枯雞肫黃五箇燒存性為末擦之

治牙瘡

枯白礬 五倍子燒存性共為末擦患處

治牙疼

荊種不拘多少半生半熟醋浸漱口三五

次痛止吐去効

又方

巴豆一粒去殼用鉄絲針注燈火燒半熟用

綿裹咬在疼處有涎水任流即愈

固齒明目散

牙痛胃火厚味所起齒動腎虛房事過矣補腎牙牢

清火痛止即愈甘淡何疾不愈經驗秘方擦牙固齒

明目烏鬚香口潤脉每早晚用藥蘸指頻擦牙銀

良久方已吐在手心再將眼洗久用勿間其妙無比

用槐枝葉柳枝葉二味不拘多少切碎水浸三日熬出

濃汁去枝葉入青鹽一斤白鹽二斤同汁熬乾研末聽用

擦牙散 固腎牢牙用久齒不動搖鬚髮不白是其驗也

熟地黃 當歸 青鹽各一錢 川芎 八錢 細辛

荷蒂 葛花 各五錢

右七味共研細末逐日早晨用藥少許擦牙上不許吐只要漱嚥之

固齒明目方

赤芍藥 荊芥穗 香白芷 當歸尾 防風 青鹽

右用青鹽一斤搗碎以井花水五碗先煎潔淨為

末然後將咀成片五件藥用水八升煎至四升用

馬尾羅內薄綿一葉濾去滓垢將青鹽入在藥水

內用文武火煎乾為度每日早晨洗面時用手指

蘸水濕擦於牙上下周遍却嚥半口水漱三十六

次吐水在手洗面眼最明如覺牙齦微痛晚亦照

前擦之便愈常行腫卧擦之亦効如無青鹽白鹽

飛過者亦可用水一升即一茶盞也又或添細辛

五錢尤妙

治牙疼

麝香五分 胡椒 甘松各一分 雄黃半分

右為細末研勻煉蜜為丸如桐子大用新綿裹一丸安在患處咬定立効

眼目

治暴發眼赤腫痛眵淚隱澁難開

黃連五錢 南薄荷二錢半

右為末用雞子清調和隔紙塗眼上良久乾則以水潤之即効一方用大黃末新汲水調塗兩眉正上頭兩腦水潤之即愈

洗法 治火眼赤眼暴發腫痛不可忍者

黃連 黃柏各一錢 白礬二錢 膠棗一枚

水煎半鍾洗之即消

拜堂散

白礬二錢 銅綠二錢 泡水洗之即愈

風眼赤爛

黃連 黃芩 黃柏 荊芥 防風 薄荷各等

先將各味共切有半碗洗淨晒裏帶濕入碗加朝腦五六錢散在上以一碗合着紙數重糊嚴慢

火在碗下三釘支烘升靈藥些少點眼

治紅爛眼

銅綠五錢瑪瑙二錢

右為極細末用秋時熟天茄不拘多少換水五七次絞取汁九如桐子大每用一丸乳汁化開搽患處勿着睛三日好

治雀目昏暗方

乾菊花 黃連各三錢 夜明砂七錢

右三味為末并花水為丸桐子大每服五七丸鹽

湯送下

治暴發腫痛方

先將青布一塊水浸洗令乾另用生姜汁白礬末將布蘸搭眼胞上閉目須臾淚出而痛止

咽喉

吹喉散 治咽喉腫痛

臘八日猪膽一二箇用枯礬五錢茄柴灰五錢共入膽裝滿陰乾吹受須臾即愈

治咽瘡腫方

雞內金倒淨勿洗一箇用壁錢十箇共焙焦為末吹腫處即消如成瘡則愈多少量用

治諸喉風

用猪牙皂角一兩去黑皮并弦剉碎水二鍾煎至一鍾去滓加蜜一匙如無以雞清半箇和勻服之隨即吐出風痰如牙關緊急用巴豆三五粒去殼研油於紙上作攤量兩鼻中點矣

治乳蛾氣絕者即時送活

單蛾用巴豆一粒打碎入綿裹敷內塞鼻在左塞

左在右塞右若雙蛾者用二粒塞兩竅立効

吹喉散 治咽喉腫痛如神

牙硝二兩 硼砂五錢 雄黃 薑黃 各二錢 冰片二分

右為末每少許吹患處立已

針急喉閉法

於大指外邊指甲下根不問男女左右用布針針之令血出即効如大段危急兩手大指俱針之其効尤捷

治喉痺雙單蛾風腫痛涎嚥不下死在須臾

真山豆根為細末用雄膽和為丸用雞脰皮陰乾
為末為衣如粟豆大每月一丸放舌根下徐徐嚥
下立已

瘰癧

海藻清聖丸 治瘰癧太盛久不消

海藻 海帶 海昆布 廣茂 青鹽各五錢

右為細末煉蜜為丸龍眼大每用一丸食後嚥化
治瘰癧方

猪氣眼一兩壁土乾
通光結乾 明礬一錢二分
生用八分 急性子十五粒
焙乾

右為細末均作五服臨卧燒酒調服遠近大小

治瘰癧方

木香 當歸 海藻各一兩 川山甲五片 海納子錢五

猪棗肉三兩

右用燒酒二壺煮二炷香每服一小鍾酒盡見効

南星膏 治頭面皮膚手足生瘡大如拳小者如

粟或軟或硬而不痛

大生南星一枚研細稠粘用好醋五七滴為膏如

無生以乾者為末醋調作膏先將小針刺瘰癧上令

氣透貼之痒則頻貼一方加草烏細辛白芷
治瘰癧神方

用金鳳花草煎水頻洗夏用鮮者秋冬用乾
者

結核

治頂後側少陽經中疔瘡不變肉色不問大小及月
深淺遠或有赤硬腫痛

生山藥一塊 草麻子三錢 研勻攤帛上貼之即消

敷法 治痰核

南星 淮烏各等 為細末薑汁調如膏敷核上

立消

治結核腫痛

夏枯草一味水煎頻服

肺癰

治肺癰

薏苡仁各炒 為末糯米飲調服或入粥內煮吃亦
可或水煎服當下膿血而安

錫肺丹 凡治肺癰必以此藥開而服之以護腸膜

不致潰透心肺最為切當

白礬 三兩 土 黃臘 二兩

右為末溶蠟為丸梧子大每二十九粒蜜湯送下臨
卧服

心痛

紅玉散

生白礬 九錢 朱砂 一錢 共研細每服錢抄一
字溫水調下即止

六合金針散 點眼治蝎肚疼心疾轉筋

雄黃 朱砂 乳香 沒藥 火硝 各一 麝香 少許

共為極細末點眼

文聖散 治急心疾

舊筆頭三箇燒灰作一服白滾湯調下立止

獨安散 治心腹暴痛不可忍神効

紫色香附三錢為末熟黃酒調下

治心疾方

用兔血和蕎麥為丸如彈子大每服一丸搥碎熟
黃酒送下立止

碧玉丸 治心胃刺痛其効如神

生白礬 枯白礬

右等分為末稀糊丸如櫻桃大每四九燒酒下
立止

拈痛丸 治九種心疾神効

五靈脂 蓬朮 煨 木香 當歸 各半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九粒食前
橘皮煎湯下

治心疾

柳瓢 用蕎麥麵包裏燒乾 磁石 少許 青鹽 少許

右共研為細末每服七分或一錢黃酒調下

心疾方

槐子 炒黃色一兩 古石灰 炒黃色一兩

右共為細末每服一錢黃酒或溫水送下効

治虫咬心疾

用練根去粗皮用白皮水煎去渣服

清肝順氣湯 治心胃刺痛及兩脇作疼吐嘔大
便硬六脉急數

柴胡 黃芩 赤芍藥 厚朴 大黃 芒硝
枳實 枝子炒 黃連 半夏 青皮 甘草
生薑煎服

拔去病根丸 治男婦常懷心腹疼痛終身不
愈者服此一料除根

香附 山梔姜炒 川芎 蒼朮米泔炒 神麴炒
山查肉 陳皮帶白 半夏麴 草豆蔻要兩頭尖的可月如無
以白豆蔻代之以上各三兩

右九味共為細末薑汁打稀糊為丸如梧子大
每服七十丸臨卧白水送下

灸心疼神法

兩手肘後陷出酸痛是穴先用香油半鍾重
湯煮溫服即用艾葉入粉揉爛為炷每處灸
五壯立止

腹痛

調氣散 治氣滯於內胸膈痞腹中刺痛

木香 紫蘇各五分 檳榔七分 青皮麴炒 香附各一錢
陳皮 半夏各八分 甘草 乳香 沒藥各三

右判生薑三片水煎服

平肝散 治七情不順鬱火攻冲腹痛時發時止
痛無定處者是也

陳皮 青皮麴炒 香附 白芍 山梔炒 黃連炒
黃芩炒 半夏麴炒 生薑製八分 甘草五分

生薑三片水煎服

椒礬散 治心腹刺痛

胡椒 白礬各一錢

右為末每服五分黃酒調服

治肚疼

用明礬不拘多少為細末以葱白搗爛和丸如彈
子大每用一丸研爛滾白水調下

腰痛

治腎虛腰痛久則寒冷此藥壯筋骨補元氣利小

水養丹田

杜仲從蓉巴戟天 茴香故紙 共青益

猪羊腰子將來吃 八十公公也少年

杜仲酒洗去絲一兩 肉從蓉五錢 川巴戟酒洗去 小茴一兩

青鹽五錢 故紙一兩 鹽水浸

右為細末將腰子分開入藥在內縫住紙包煨熟
每一箇一服用黃酒送下

治腰痛服疾烏鬚黑髮

蘇麻子去殼 白軍薑四兩

共為細末蒸餅糊為丸如梧子大每服二十五丸
空心黃酒送下以乾物壓之

如神散 治閃到一切腰痛甚者不過三服

當歸 肉桂 玄胡索

右等分為末每服二錢黃酒調下

脇痛

開氣散 治脇間痛如有物刺是氣實也

枳殼去穢炒 甘草炙七錢半

右為末每服二錢濃煎葱白湯下不拘時服

疎肝飲 治左脇下痛者肝積屬血或因怒氣所

傷或跌閃所致或為痛

黃連吳茱萸汁 當歸 柴胡各一錢 青皮一錢

桃仁研如泥 川芎 白芍酒炒各七 紅花五分

水煎食遠溫服

痛風

治一切筋骨痛

陳皮 青皮 甘草 白芷 良姜 麻黃

罌殼 洛陽花 無灰酒一瓶

右為細末入壺內煮三炷香取出溫服汗出為度
如木香三分白花蛇三錢尤妙

治一切遍身骨節流注作痛

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 赤芍藥

生地黄 防風 羌活 獨活 天麻 南星

陳皮 黃芩 甘草

右對生薑煎服

遍身疼痛丸

當歸全身 羌活 木香各一兩 木通 陳皮

青皮 枳殼錢七 川芎 白朮各六錢 肉桂

獨活 香附 桔梗 沉香 枳殼錢五 甘草錢三

右共為細末神麴糊為丸如粟豆大每服五七十

丸不拘時熱酒送下

和血止疼如聖散

鹿角燒灰一兩 芫蔚草小者前取除乾為末三錢 乳香二錢

沒藥一錢 當歸二錢 麻黃一錢去節

右六味為細每服一二錢重者三錢好黃酒調下有汗避風立効

治筋骨疼神驗方

大猪膽一箇用熱燒酒調下服不過二三箇即安

治遍身骨節疼痛久不愈者木通不拘多酒煎服之立止

脚氣

治風濕腿痛難行

當歸一錢酒洗 白芍藥八分 陳皮八分 川芎八分

白茯苓八分 白朮一錢 肉桂六分 防風一錢

蒼朮一錢五分 枳殼八分 烏藥一錢 獨活八分 半夏二錢

羌活八分 南星一錢二 白芷八分 知母八分 黃蘗八分

甘草五分

右作一服水二鍾薑三片煎服

治寒濕氣作脚腿痛此藥服後竟投痛處出汗如

神

番木鱉子一兩用牛油燂黃色炒乾 兩頭尖三錢 火炮

右共為細末每服四分空心燒酒調下未止次日再加二分三服覺有汗即効

治寒濕氣脚腿疼痛

乳香 沒藥各一錢 綿子仁三錢炒 白糖一兩 右為末黃酒調下

癩症

小腸氣墜偏痛

以猪毛燒灰為末每服二錢空心熱黃酒下一服立止一人加茴香服

小腸疝氣方

荔枝核不拘多少炒過為末每服二錢空心熱酒送下

治偏墜氣方

猪懸蹄燒存性為末每服三錢黃酒調下
治陰囊腎莖肛門癢痒不可忍者抓破出血好了又痒抓

人言用醱醋二碗熬至一碗洗患處立止

消渴

黃連猪肚丸

黃連五兩 麥門冬 知母 天花粉 各四兩

加葛根 生地黃 各二兩

右為末入雄猪肚內縫定置甑中蒸極爛取出藥搗肚成膏和藥如乾加煉蜜杵勻如梧桐子大每服五十九米飲下加至百丸

治三消如神用蚕繭殼或絲綿煎湯服之皆可無時服

濁證

清濁鎖精丹 治白濁大能化痰如神

白礬 二兩 飛過滑石 二兩

右為末早米糊為丸梧子大每服五十九米飲

空心下

治白濁淋瀝痛因房慾不節或精未施泄而將成

下疳者神効

菜豆不拘多少搗并花水澄清空心服

洗法用花椒三錢葱白七根煎水先薰後洗

治遺精白濁

山藥 一兩 黃柏 二兩 酒炒 牡蠣 五錢 火煨 白茯苓 一兩

右共研細末酒糊為丸如梧桐子大每四十丸空

心水酒送下

遺精

滋補丹 治夜夢遺精或滑精虛損

人參 白朮 茯苓 去皮 當歸 酒洗 川芎 熟地

白芍 酒炒 枸杞子 杜中 去皮 酒炒 牛膝 酒洗

天門冬 心法 麥門冬 心法 破故紙 炒 遠志 甘草 水丸

牡蠣 煨 龍骨 煨 金櫻子 去毛 蓮蕊 甘草 各等

右為末乾山藥末打糊為丸如梧桐子大每百丸

空心酒下

石蓮散 治遺精

蓮蕊 石蓮肉 芡實 人參 麥門冬 茯苓

遠志 甘草

右剉水煎空心服

神龍丹 治遺精

文蛤 炒 二錢 白龍骨 煨 三錢 白茯苓 神 去皮 木五

右為細末醋糊為丸梧子大每服三十丸空心溫水送下

淋症

治淋方

車前子草 葵花根 二味煎湯服之

又方

木通五錢 甘草二錢 二味煎湯服之立効

青龍銀杏酒 專治五淋白濁疼痛苦楚神驗

天棚草即无松嫩者
去根葉三錢 銀杏即白果去
殼七個

右二味共一處順研極爛滾黃酒調飲一服即愈

愈

治血淋方

亂髮燒灰存性為末每服一錢空心白滾湯調服

調服

治久淋不止

當歸 川芎 白芍 熟地 陳皮 半夏

茯苓 甘草各五分 升麻 柴胡 牛膝

黃柏 知母 白朮 蒼朮 水煎露一宿空心服

驚風散 治淋血

公雞一隻用二腿骨共六節燒灰存性研為末每服一錢黃酒送下

小便出血方

用葛苳菜搗爛貼臍上立止

加味滋腎丸 治熱淋管痛并兩腿足熱宜服

黃柏八兩酒拌炒 知母八兩酒拌炒 五味四兩 青鹽五錢

右為細末糊糊為丸如桐子大每服五七十丸空心米飲白湯任下

小便閉

小便閉

治小便不通樊建忠經驗

用蟋蟀一名促織大者三箇焙乾為末煎竹葉湯調服神驗

調服神驗

治小便不通

麝香 半夏末填臍中上用葱白田螺搗成餅封

臍上用布帶縛住下用皂角烟薰入馬口自通水

人用皂角煎湯洗陰戶內

治小便不通

用皮硝一合連鬚葱一根搗為一處用青布攤在
上似膏藥樣用熱瓦熨之即出

治小便不通腹脹疼痛欲死

野地茨菰子不拘多少焙黃色為末溫黃酒調服
立通

神灰散 治小便不通發時見効

用蘇麻燒灰黃酒調服

大便閉

通腸飲 治大便不通經驗

皮硝提過淨連鬚葱白五枚搗爛

用黃酒調飲即通

大便不通

皮硝五錢熱酒化開澄去渣加香油三四茶匙溫

服須臾即通

大便不通

大黃 皮硝 牙皂 三味等分水煎一服立通

治大便不通

大黃一兩 皮硝一兩 細茶一兩 蜂蜜三匙

右用水煎去渣溫服忌生冷之物

大便不通

大麥芽不拘多少搗碎入黃酒壺煮一沸服之立
通

大小便閉

顛倒散 治臟腑實熱或小便不通或大便不通

或大小便俱不通

大黃六錢 滑石三錢 皂角三錢

右為末黃酒送下如大便不通依前分兩服如小

便不通黃三錢石六錢角如前如大小便俱不通

黃石均分角亦如前

痔漏

痔腫痛

葱頭共蜜搗點一指頭腫處冰冷即消散

點痔漏方

熊膽 量大小捻進瘡孔內自化日一次不過數

次神効

洗痔漏方

以環眼馬糞入油篋置倍子薰之一兩次有一桶落下長短不等瘡永不發

治漏方

熟棗一大枚 水銀一錢 共揉不見星隨漏眼大小作條塞入虫死瘡即漸愈矣

槐殼丸 專治痔瘡

槐花 揀淨微炒 枳殼 去穢三四

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心白滾湯送下

洗痔神方

曲曲菜 小虫卧單 馬藍菜 猪牙草

花椒 槐條 茄根 煎水先薰後洗後

用 珍珠 琥珀 各一錢 片腦 二錢 為末搽上

治痔漏

地骨皮 炒 金銀花 槐角子 煎熟去皮炒 當歸 酒浸炒

刺蝟針 炒黃色各等分

右為細末江米飯搗為丸如梧子大每服三錢一日三服米湯送下忌食氣物再加皮硝五

倍子煎水薰洗

腸癖

大便秘下血大腸痛不可忍肛門腫起

大黃 黃芩 黃連 梔子 黃柏 赤芍

連翹 枳殼 防風 甘草

右水煎空心服外用金鳳花煎水頻洗腫消痛止

治大便秘下血

槐子不拘多少炒為末雄猪膽為丸梧子大每

服五十丸空心白滾水送下

大便秘下血秘方

茅根不拘多少煎湯服之立止

大便秘下血如流水不止者

用黃連一兩金華酒煎服一服立止

大便秘下血方

當歸 川芎 白芍 熟地 各一錢 阿膠 炒

槐花 條芩 各八分 梔子 六分 酒煎空心服

大便秘下血秘方用乾柿餅燒存性為末每二錢空心米湯調下

脫肛

脫肛方

蟾脫焙黃為末點即上

洗法 治脫肛

用五倍子三錢白礬一塊水煎溫洗以芭蕉葉或荷葉緩緩托上

又宜蜘蛛七箇燒存性為末每少許香油調服

又宜生蜘蛛搗搭臍上即收効

又宜死蟹頭一枚燒令烟盡搗末付肛上以手接

援之

又宜烏龍尾即帶上塵灰同鼠糞和之燒烟於

桶內令坐其上薰之數遍即上不脫為効

諸虫

追虫取積丸

黑牽牛一斤取頭擗榔六兩取頭巴豆二兩去殼

大皂角半寸長二十錠

右用水三碗將巴豆皂角入鍋內煮之一碗去渣

將水和前藥末為丸如梧桐子大晒乾用水下

碗酒之再晒乾又水酒之又晒光亮如水晶相似

每服三錢四更時調沙糖送下如不行飲熱水

一口催之行十一二次忌口五七日為妙此藥有

虫取虫有積取積効

殺蛇丸 宣虫疾當時取効消痞塊即除根

擗榔 牽牛各一兩錦文大黃四錢木香八分

雷丸 蕪荑 錫灰 使君子肉各一錢

右為細末用連鬚葱煎湯露一宿為丸如小豆大

每服四錢連根葱湯送下

補長春丹 養心滋腎興陽固精為諸字牙聰耳明目返老還童

補骨脂去麻肉苁蓉酒洗去鹹甲揀參 甘枸杞子

葶澄茄 乾山藥 川已戟本藥金墨煨青藍細辛去土

何首烏去粗皮入黑豆同煮山茱萸酒蒸益智去殼川椒去目

陳艾 木鱉子去殼當歸身酒洗遠志甘草水熟地黃酒蒸

牛膝去芦川續斷水洗去白茯苓去皮各三兩

右忌鉄器為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五

七十九空心黃酒送下

新刊魯府禁方卷之二 壽集 畢

魯府秘方目錄

康集

婦人

經閉

血崩

帶下

求嗣

妊娠

產育

產後

乳病

雜症

小兒

驚風

疳疾

癖疾

吐瀉

痢疾

瘡疾

咳嗽

牙疳

口瘡

胎毒

痘瘡

雜症

目錄

目錄畢

新刊魯府秘方卷之三

康集

魯府良醫正臣劉應泰編輯

醫官臣段 燧校正

醫生臣陳時務

臣王 璽同校

婦人

加減四物湯治諸病神効

驅風四物湯 治血虛頭目眩暈頭風頭痛或時頭

面作痒或肌膚痒皆治

生地黃酒洗一錢

川芎一錢

赤芍八分

當歸酒洗一錢

荊 芥七分

防風去蘆七分

羌活八分

獨活八分

白 芷七分

藥本八分

右剉水煎量疾食前後溫服

除寒四物湯 治氣血虛身體怯冷但逢時少寒為

之聳肩

熟地黃

南芎

白芍酒炒

白茯苓去皮

當歸身酒洗各一錢

乾薑五分

石菖蒲七分

黃芪蜜炒

人 參各七分

甘草三分

右剉水煎不拘時服或寒戰加官桂

清暑四物湯 治盛暑身熱頭疼目昏

生地黃 赤芍 赤茯苓 白扁豆 當歸

川芎 香薷 柴胡 黃芩 桔梗 甘草

右剉水煎服

除濕四物湯 治感濕氣遍身骨節疼痛四肢困倦

當歸 川芎 赤芍 生地黃 赤茯苓

蒼朮 猪苓 澤瀉 木通 防風

羌活 甘草

右剉水煎不拘時服

明目四物湯 治血虛目暗生花

當歸 木通 南芎 白芍 熟地黃 肉蓯蓉

酸棗仁 石菖蒲 甘枸杞子

甘菊花

右剉水煎服

聰耳四物湯 治耳閉

當歸 川芎 赤芍 生地黃 石菖蒲

酸棗仁 白芷 木通 枳殼 青皮

荊芥 薄荷 藁本 甘草

右剉水煎食後服

除眩四物湯 治頭目昏眩

當歸 川芎 赤芍 生地黃 羌活

細辛 藁本 蔓荊子 白芷 甘草

右剉水煎服

清暈四物湯 治血虛時時昏暈不得清爽

當歸 川芎 白芍 熟地黃 蔓荊子

細辛 半夏 金沸草 荊芥 防風

羌活 獨活 甘草

右剉散生薑三片水煎服

止嘔四物湯 胃氣不和時或嘔吐有物吐出

當歸 白芍 川芎 半夏

陳皮 人參 白朮 白茯苓

枳殼 檳榔

右剉生薑三片煎不拘時服

除穢四物湯 胃氣不和生嘔不進飲食無物吐出

者

<p>當歸身<small>酒洗</small> 南芳<small>五分</small> 白芍<small>二錢</small> 枳榔<small>七</small> 半夏<small>一錢</small></p>	<p>乾薑<small>炒</small> 桔梗<small>各五分</small> 枳殼<small>去核</small> 青皮<small>去核</small> 金沸草<small>五分</small></p>	<p>陳皮<small>一錢</small> 青木香<small>五分</small></p>	<p>右剉生薑三片水煎不拘時服</p>	<p>散痞四物湯 脾胃虛胸中不特痞悶不寬</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 川芎<small>五分</small> 白芍<small>一錢</small> 枳殼<small>去核</small> 枳實<small>炒</small></p>	<p>青皮<small>去核</small> 香附米<small>炒</small> 烏藥 枳榔<small>各七分</small> 青木香<small>五分</small></p>	<p>陳皮<small>一錢</small></p>	<p>右剉生薑三片水煎服</p>	<p>消脹四物湯 治氣塊時時膨脹</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 南芳<small>八分</small> 枳殼<small>去核</small> 赤芍<small>八分</small> 枳實<small>炒</small></p>	<p>青皮<small>去核</small> 陳皮 枳榔<small>各一錢</small> 半夏<small>湯泡切</small> 大腹皮<small>各一錢</small></p>	<p>青木香<small>五分</small></p>	<p>右剉生薑三片水煎溫服</p>	<p>清熱四物湯 血虛津液乾燥肌體煩熱手足心熱</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 川芎<small>八分</small> 生地黄 熟地黄 赤芍<small>各一錢</small></p>	<p>天花粉 地骨皮 柴胡 前胡 黃芩</p>	<p>桔梗 百合 麥門冬<small>去心</small></p>
--	---	---	---------------------	--------------------------	---	---	----------------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------------------

<p>右剉水煎不拘時服</p>	<p>除煩四物湯 虛損面上心中時或煩熱</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 川芎 赤芍 生地黄 天花粉<small>各二錢</small></p>	<p>五味子 麥門冬<small>志</small> 前胡 乾葛<small>各八分</small> 淡竹葉<small>十</small></p>	<p>人參<small>七分</small> 石膏<small>一錢</small></p>	<p>右剉水煎不拘時服</p>	<p>止渴四物湯 血虛心火旺津液少故生渴也</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 川芎 白芍<small>酒炒</small> 生地黄<small>各錢</small> 柴胡</p>	<p>前胡<small>各七分</small> 五味子<small>十箇</small> 麥門冬<small>各錢</small> 乾葛<small>七分</small> 人參<small>各一錢</small></p>	<p>天花粉<small>一錢</small> 知母<small>一錢</small> 石膏<small>一錢</small> 烏梅<small>一箇</small></p>	<p>右剉水煎不拘時服</p>	<p>止痛四物湯 血虛筋渾身四肢疼痛</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 川芎 白芍<small>酒炒</small> 熟地黄<small>各一錢</small> 秦艽</p>	<p>丹參 羌活 骨碎補 木瓜 良薑</p>	<p>均薑<small>各五分</small> 五加皮 玄胡索<small>各七分</small></p>	<p>右剉水煎服</p>	<p>除痿四物湯 治身虛四肢痿弱倦怠</p>	<p>當歸<small>酒洗</small> 川芎 白芍<small>酒炒</small> 熟地黄 桑絲子<small>酒洗</small></p>
-----------------	-------------------------	--	--	--	-----------------	---------------------------	---	--	---	-----------------	------------------------	--	------------------------	---	--------------	------------------------	--

肉苁蓉 <small>酒洗</small>	白朮 <small>各一錢 去蘆</small>	五味子 <small>十箇</small>	陳皮	香附子
骨碎補 <small>各八分</small>	鹿茸 <small>酥炙</small>	破故紙 <small>酒炒各七分</small>		
右剉水煎空心服				
健步四物湯 血虛不榮于下部故令足痿弱不能行步				
當歸 <small>酒洗</small>	川芎	白芍 <small>酒炒</small>	熟地黄 <small>各二錢</small>	牛膝 <small>酒洗 去蘆</small>
木瓜	川續斷 <small>各一錢</small>			
右剉水煎空心服				
和解四物湯 傷風感冒四肢倦怠頭目昏痛身熱				
當歸 <small>酒洗</small>	川芎	赤芍	生地黄 <small>各八分</small>	黨參 <small>各一錢</small>
羌活	前胡	防風	白芷 <small>各一錢</small>	甘草 <small>三分</small>
右剉生薑三片葱二根水煎熱服				
上散四物湯 肺熱上壅痰嗽				
當歸 <small>酒洗</small>	川芎	赤芍	生地黄	前胡
桔梗 <small>去蘆</small>	紫蘇	杏仁 <small>去皮</small>	金沸草	黃芩
知母	貝母	桑白皮 <small>各等分</small>	甘草 <small>減半</small>	
右剉生薑三片水煎溫服				
化痰四物湯 痰壅不利胸膈不寬				

當歸 <small>酒洗</small>	川芎	赤芍	陳皮	半夏 <small>湯洗</small>
白茯苓 <small>去皮</small>	桔梗 <small>去蘆</small>	枳實	青皮 <small>去蘆</small>	香附米 <small>各等分</small>
右剉生薑五片水煎溫服				
順氣四物湯 時覺心中氣不下降痞塞不通或有積塊				
當歸 <small>酒洗</small>	川芎 <small>各一錢</small>	赤芍	枳殼 <small>麩炒</small>	烏藥 <small>各八分</small>
三稜 <small>醋浸炒</small>	義木 <small>醋浸炒</small>	枳榔	遠志 <small>蜜水</small>	青木香
砂仁 <small>各五分</small>	青皮 <small>去蘆</small>	陳皮	香附米 <small>各一錢</small>	辰砂 <small>另研 五分</small>
麥門冬 <small>去心一錢</small>				
右剉水煎服				
定喘四物湯 肺氣不利故令喘促				
當歸 <small>酒洗</small>	川芎 <small>六分</small>	白芍 <small>酒炒 六分</small>	生地黄 <small>七分</small>	白茯苓 <small>去皮</small>
前胡	桔梗 <small>去蘆</small>	杏仁 <small>去皮</small>	葶藶	紫蘇
桑白皮	金沸草	枳殼 <small>麩炒</small>	枳實 <small>麩炒 各八分</small>	甘草 <small>三分</small>
右剉水煎服				
消腫四物湯 治遍身浮腫				
當歸 <small>酒洗</small>	川芎	赤芍 <small>各六分</small>	車前子 <small>一錢</small>	青木香 <small>五分</small>
赤茯苓	猪苓	澤瀉	大腹皮	葶藶 <small>一錢</small>

防風 木通 檳榔 各一錢

右剉葱三根水煎食前服

治淋四物湯 膀胱熱結小便難

當歸 酒洗 川芎 赤芍 生地黄 厚蘆

木通 車前子 防風 山梔 條芩 各五分

右剉葱白三根水煎空心服

止瀉痢四物湯 治腸腹虛滑或瀉或痢不停虛寒

久者宜服

當歸 酒洗 川芎 五分 蒼朮 米泔洗 白朮 去蘆 木香

丁香 乾薑 官桂 各五分 香附子 厚朴 姜炒

車前子 訶子肉 肉豆寇 大腹去油 各一錢

治痢乾薑要炮 裏急後重加檳榔木香

右剉生薑二片水煎服

除痢四物湯 治痢赤白日久虛寒者可服

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 乾薑 炒五分 阿膠 炒

厚朴 姜炒 青木香 艾葉 各五分

熱盛加黃連黃芩 裏急後重加檳榔

右剉水煎空心服

通經四物湯 經脉不通不可一例用藥有血壅盛

而不通者用破血之藥以通之有血不行者非是

不行乃血虛之若用破血之藥以通之非不通行

經後愈損人矣血虛血旺俱在兩尺脉中試之有

力無力辨之耳庶獲不差

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 熟地黄 各一錢 人參

黃芪 蜜炒 肉蓯蓉 酒洗 五味子 紅花 蘇木 各一錢

右剉葱白三莖酒水煎空心服

清血四物湯 血壅過不行

當歸 酒洗 川芎 赤芍 生地黄 各一錢 鬼箭

三稜 醋浸炒 玄胡索 各七 紅花 姜黃 蘇木 各一錢

白朮 去蘆 牡丹皮 各一錢

右剉水煎入酒同服

安胎四物湯 胎氣不安腰疼重墜

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 熟地黄 各一錢 地榆

續斷 木香 前胡 丹參 紫蘇

阿膠 砂仁 艾葉 醋炒各五分

右剉葱白二根水煎空心服

催生四物湯 胎連日不下死子腹中

當歸^{酒洗} 南芳^{二錢} 桂枝 鬼箭 白芷

蘇木 紅花 乾薑 牛膝^{去蘗} 牡丹皮

玄胡索^各 麝香^{另研三分胎服入湯藥內攪勻服之}

右剉一劑水酒煎服即下

保產四物湯 治產後虛損諸病

當歸^{酒洗} 南芳 白芍^{酒炒} 熟地黃^{各一錢} 白朮^{去蘗}

白茯苓^{一錢} 陳皮^{八分} 乾薑^{炒黑五分} 益母草^{一錢} 香附^{炒一錢}

甘草^{炙三分}

昏憤加荆芥穗 口乾加麥門冬盜汗加黃芪^炒

不寐加酸棗仁^炒 惡露不行加桃仁紅花

有痰加貝母 咳嗽加桑皮五味子

右剉生薑三片棗一枚水煎溫服發熱加重便一

蓋同服

化積四物湯 因飲酒中毒或時胸中痞悶腹中膨

脹者有妨飲食

當歸^{酒洗} 川芎 赤芍^{醋浸炒} 三稜^{醋浸炒} 我朮^{醋浸炒}

青皮^{去蘗} 陳皮 枳殼^炒 枳實^炒 檳榔 砂仁

香附米 蓮肉^{各七分} 烏梅^{二兩} 青木香^{五分} 白豆蔻^{五分}

右剉水煎服

進食四物湯 脾氣不和胸中飽悶

白芍^{酒炒} 川芎^{七分} 香附^{一錢} 砂仁^{八分} 陳皮^{八分} 枳實^炒

檳榔 烏藥 青皮^{去蘗} 蓮肉^{各七分} 白豆蔻^{五分} 青木香^{五分}

右剉生薑三片水煎溫服

化氣四物湯 氣逆上攻胸脇作痛

川芎 赤芍 青皮^{去蘗} 陳皮 香附

檳榔 木香 烏藥 我朮^{醋炒} 川烏^{去蘗}

三稜^{醋炒} 石菖蒲 良薑^{各等分}

右剉水煎服

扶勞四物湯 血虛成勞遍身骨節酸痛五心煩熱

盜汗不進飲食

當歸^{酒洗} 川芎 白芍^{酒炒} 熟地黃 黃芪^炙

麥門冬^{去心} 柴胡 地骨皮 秦艽 丹參

天花粉^{各七分} 陳皮 香附 砂仁 枳殼^炒

前胡^{各七分}

右剉水煎服

調經四物湯 血氣不調或前或後或多或必但調氣經脉自勻

當歸

川芎

白芍

熟地黄 各一錢 青皮 各一錢

陳皮

丹參

川烏

紅花

桃仁

紫蘇

香附

砂仁

右剉水酒煎服

清帶四物湯

治血淋赤白帶下

當歸

川芎

熟地黄

枳殼

香附

白附子

防風

橘紅

良薑

荊芥

甘草

右剉棗三枚酒一鍾煎七分入白麴一撮入淨肉

汁再煎二三沸空心服如白帶多加均薑炮吳茱萸

胎產四物湯

胎前產後腰膝疼痛胎前數服胎滑

易產產後數服能去敗血

白芍

川芎

枳殼

陳皮

義木

香附

大腹皮

當歸

紫蘇

甘草

右剉生薑三片葱白三根水煎空心服忌生冷

四時增損四物湯

調理婦人女子諸症

春倍川芎

夏倍芍藥

秋倍地黃

冬倍當歸

經閉

治婦人經脉不通方

大黃

頭紅花

肉桂

吳茱萸

當歸

右五味為細末每服二三錢好黃酒調下量入虛

實加減一方加香附米一兩義木枳殼各五錢尤佳

治女人乾血氣

海金沙

川山甲

大附子

皂角

苦丁香

巴豆

麝香

紅花

桃頭

葱白三枝

丁香

右共為末凡如彈子絲包入內用每藥三分麝香半

萬花膏 治日久經閉不行神効

真香油

酒五

蜂蜜

一小酒五

右共合一處入磁碗內盛之重湯煮一炷香空心

熱服即通

養血調經丸 治婦女經閉或二三年不通者齊吞

一塊如碗大間或吐血或便血餘無恙此血虛氣

盛脾弱對用後二方一消一補即効

當歸

酒洗二兩

南芎

酒洗二兩

白芍

酒洗二兩

熟地

酒洗四兩

山茱萸

酒洗二兩

白茯苓

酒洗二兩

山藥

牡丹皮

酒洗二兩

澤瀉

酒洗二兩

梔子

酒洗二兩

益母草

酒洗二兩

生地

香附

酒洗二兩

陳皮

酒洗二兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三錢空心淡薑湯下

消積通經丸

南香附

酒洗二兩

艾葉

當歸

南芎

赤芍

生地

酒洗二兩

桃仁

去皮二兩

紅花

三棱

莪朮

乾漆

酒洗二兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服八十九臨卧淡醋湯下

血崩

治血山崩不止

按挑連龜皮以黃酒煮數滾取出嚼食仍用酒送

下即止

治血山崩漏

治血山崩神効

固經散

大薊根

不拘多少燒灰存性為末空心好熱黃酒調下即止

治婦人血崩如泉流不止

棉花子

銅絲炒盡烟為末每服二錢空心黃酒調下

傅金散

治婦人血崩下血不止

香附子

酒洗二兩

五靈脂

酒洗二兩

當歸尾

酒洗二兩

右為細末每服二錢空心黃酒送下一方米糊丸

空心五十丸用醋湯下

治血山崩如泉湧不止

乾鹽糞為粗末入罈內燒烟令崩婦坐其上烟熏

久久自止

治血山崩

棉花子仁

炒黃

黃芩

甘草

右等分為末每服二錢空心黃酒送下

治血崩

腥腥草剉一劑水煎服之立止

婦人血崩方

蒲黃

五靈脂

官桂

雄黃

甘草

各二錢

右為末每服一錢薑湯調下

血山崩

當歸

龍骨

各一兩

香附子

酒洗二兩

棕毛灰

半兩

右為細末空心米飲調下四錢忌油膩

帶下

治女人赤白帶下男子白濁

硫黃二兩 七次 官桂三錢 陳皮二錢 二分 白芷二錢 當歸二錢 二分

甘草二錢

右共為末每服一錢空心黃酒送下

劉刺史丸 治赤白帶下此藥不寒不熱得其平和

助陰生子神効

肉從蓉三錢 酒洗二兩 覆盆子去蒂一兩 二錢 蛇床子一兩 二錢 兔絲子酒洗一兩 二錢

烏賊骨八錢 五味子六錢 當歸酒洗二兩 一錢 川芎一兩 二錢 白芍一兩 二錢

防風二錢 黃芩五錢 艾葉三錢 牡蠣八錢 用鹽水漬過 去泥研

右焙乾為末煉蜜為丸每服三十或四十九早晚

青鹽湯送下

二白丸 治白帶如神

石灰二兩 茯苓二兩

右為末水丸每服三十丸空心白水下

火龍丹 專治男婦下元久冷赤白帶下如神効

硫黃 丁香 甘松 三柰各二錢

右共為細末煉蜜為丸如菜豆大每服七丸或九丸空心熱黃酒送下

求嗣

神仙種子奇方

巴戟肉二兩 兔絲子酒洗二兩 鹿茸酥炙去毛二兩 吳茱萸

白芨 白茯苓各一兩 大附子重者三兩 切片乾炙 牛膝酒洗去蘆 細辛各五錢

菖蒲 厚朴各一兩 桂心 人參 白蘇

沒藥各四錢 當歸三錢 乳香二錢

右共為細末鹿髓和丸如梧桐子大每服五七十

丸空心黃酒送下或鹽湯亦可壬子日修合男女

每日服之無男子婦人不可服亦不可過服恐致發胎

金蓮種子方

附子生用 去白 白茯苓去皮炒 杜仲去皮炒 桂心 秦艽

防風各三錢 乾薑一錢 生用 牛膝一錢 砂仁一錢 細辛二錢

人參二錢 何首烏二錢 兔絲子二錢 益母草二錢 大黃二錢

右共為細末煉蜜為丸如黃豆大每服三十九茶

酒送下効

仙傳種子藥酒方

白茯苓 去皮 大紅棗 去皮核 胡桃肉 去壳泡去粗皮六兩

白蜂蜜 一斤入鍋內煮入前三味攪勻再用微火熬深傾入磁罐內入酒高燒

黃芪 人參 白木 當歸 川芎

白芍 生地 熟地 小茴 枸杞子

覆盆子 陳皮 沉香 木香 官桂

砂仁 甘草 乳香 沒藥 五寶子 各三錢

右為細末共入蜜罈內扣勻并葉封口麵外固入錫

肉大柴火煮二炷香取出埋於土中三日去火氣

每日早午晚三時男女各飲數盃勿令大醉安魂

定魄改易容顏添髓駐精補虛益氣滋陰降火保

元調經壯筋骨潤肌膚髮白再黑虛落更生目視

有光心力無倦行步如飛寒暑不侵能除百病交

媾而後生子也神祕不可傳與非人寶之寶之

種子方

人參 五味子 各三錢 白芨 吳茱萸 白朮 各二兩

白附子 二兩 細辛 五錢 乳香 五錢 當歸 三錢 酒洗

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸

空心溫黃酒送下

先難丸 治男子陽道痿軟久無子息服之旬日見

効

肉苁蓉 酒洗 遠志 酒洗 甘草 水泡 蛇床子 酒洗 山藥 酒洗

木香 一兩 兔絲子 酒洗 細辛 一兩 五味子 一兩 蓮蕊 一兩

沉香 一兩 益智仁 一兩 木鱉 一兩 五寶子 各三錢

右為細末煉蜜為丸梧桐子大空心五十丸溫酒

下大壯陽道無妻不可服

詩 活人曾不受黃金 紅杏枝成春滿林

曰 石室丹爐藏世域 青囊後發復全生

姙娠

安胎方

半產多者有胎先於兩月半後即服此藥十數劑

四月六月之後各服數劑以防此患至九箇月內

服連生散數服可保無虞至十箇月可服瘦胎散

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎

白芍藥 熟地黃 陳皮 阿膠 艾葉

條苓 多氣加香附砂仁有痰加薑 半夏

右味薑水煎服為丸亦可

紫蘇飲 治胎氣不和 奏上心腹脹滿 疼痛兼治臨

產驚恐氣結連日不下

當歸 川芎 白芍藥 人參 紫蘇

陳皮 大伏皮 甘草

右對生薑五片葱白七寸煎服 腹痛加香附米

咳嗽加枳殼桑白皮 熱加黃芩 嘔加砂仁

瀉加白朮茯苓胎前諸病用此加減有效

產育

催生方 呪曰

九天玄女下界來 身穿羅衣脚撒鞋

揚子江河一點水 產婦喫了產門開

謹請 南斗六星 北斗七星 吾奉

太上老君急急如律令 勅 點念七遍吹在水內

產婦喫之即下

治婦人難產及橫生逆產如神

蛇退皮焙乾一條為末每服五分黃酒調下効

治橫生逆產胎死腹中

先用伏龍肝三錢為末黃酒調服即用平胃散

加皮硝 麝香 水煎溫服立効

治難產方

用魚鱈三寸燈焰上燒過為末每一分用好黃酒

調服橫生直下者服五分

治胎衣不下

當歸 蘇木 麝香

右用水一鍾半煎至一鍾入童便一鍾并麝香末

調勻服之立下

產後

婦人產後十八症論

第一論產前母遭熱病歿死者何也答曰因母淹熱

病六七日臟腑極熱蒸其胎是妨子死在母腹

中何以治之但服烏金散須臾自然兒生其狀臍

下疼痛指甲青口邊沫出用滑石榆皮酒三味同

煎三五沸溫服

又經熱病近子宮

臍下疼時有頃刻

唇青面黑推三命

壯熱蒸胎不可禁

口中沫出命遂巡

手腿抽換四隣

試看烏金功力効

酒調三服便安寧

第二論難產者何也緣已成就食母血十月滿足自
有餘血遂結成塊名為兒枕凡生產之時兒枕先
破敗血散入囊中故難產急服烏金散鮮逼去敗
血自然兒生若胎衣未下用燕窩炒黃色同滑
石榆皮酒四味同煎溫服

腹痛連時至夜半

醫人無路按災危

千斛湯藥施無計

萬種書符效驗遲

痛楚徹心何路去

昏迷忽听認人知

試將酒調烏金散

必定平安效莫疑

第三論產後胎衣不下者何也緣母子生訖腹中敗
血流入衣中被血所脹故衣難下但服烏金散去
衣中敗血則衣帶自斷須臾自然衣下用棕樹燒
灰燕窩炒黃童子小便酒同煎溫服

子落衣留在腹中

居家慈闕一心同

須知血逆衣中聚

結脹衣根在產宮

莫信凡醫行取次

無過此藥有神功

連將溫酒調三服

須臾逐血自然通

第四論產後三五日以來起坐不得眼見黑花及昏
迷或極冷不識人者何也答曰緣產後三五日血
氣未定敗血流入渾身五臟奔注於肝腸醫人不
識多作暗風治之百無一存用榆皮燒灰生鐵燒
紅酒浸三次玄胡索童便四味同煎溫服

血套肝時眼見花

隣人都道是風邪

狂言似鬼安知次

亂語如神莫測涯

恍惚精神看不定

驚慌愁慮恐悲嗟

若喫三服烏金散

管保全安喜氣除

第五論產後口乾心悶多煩渴者何也答曰緣生產
三五日血氣未定因食腥酸熱物瘀血結住在心
臟故有此疾醫人不識多作膏復膨悶治之非也
宜用當歸酒童便三味同煎溫服

因傷熱物口生乾

積聚心頭逆不安

迷悶昏沉增敗血

驚忙困渴又生寒

唇乾口瘡咽喉急

恍惚精神語數難

性命不安看頃刻

烏金試服立安痊

第六論產後寒熱往來腰背疼痛者何也答曰緣產

後寒於風穴邪氣入腹敗血不盡上連心肺下逐肝臟故令寒熱如瘡疾或腹脇疼痛醫人不識作瘡疾治之百無一存但服烏金散童便酒當歸同煎溫服

敗血流來似瘡者

肺臟氣變多端

喘殘壅盛連心肺

緊逐風邪即入肝

頭疼腰痛身壯熱

口乾體戰更增寒

神功自有烏金散

入口逡巡命自安

第七論產後逆熱遍身四肢寒熱者何也答曰緣五

臟敗血攻注流于四肢停滯日久不能還原仍化

作膿血故四肢俱腫時人不識多作水氣治之百

無一存夫生氣不固何以治之水氣種則喘小便

澀滯血氣種則四肢寒熱先服烏金散去却敗血

次服局方通寶散立効用桂枝紅花酒煎服

血氣腫溼入四肢

皮膚腫悶欲何醫

還因擁作三焦出

積惡攻心五臟衰

氣粗喘息如刺溢

血傷疼痛莫能知

神仙自有烏金散

能救臨危果不虛

第八論產後眼見鬼神顛狂言語者何也答曰蓋因

產後敗血攻心受之適憂觸被敗血蒸熏其心遂

乃言語顛狂如見鬼神醫人不識多作風魔治之

悞也但服烏金散去邪敗血其病自痊用當歸童

便酒煎服

言語無休豈可輕

親眷來看認不通

物無事見言作怪

眼中須更鬼神驚

時時喘息心煩悶

往往增寒敗血冲

熱似風魔緣血氣

烏金服了便安寧

第九論產後失音不語者何也答曰人心有七孔九

竅三毛却被敗血上冲心臟閉七孔遂乃言語不

得時人不識多作失音治之但服烏金散去却心

中敗血其病即愈用玄胡索棕皮燒灰酒三味煎服

失音不語有何因

敗血冲心悞損人

竅弱既過知本意

參差性命必沉淪

滿背奔注冲七孔

流塞心中悶五魂

莫言中風邪氣作

烏金三服得安寧

第十論產後腹疼兼瀉痢或腹脹虛滿者何也答曰

緣產後未滿月誤食冷水或食熱物餘血相投結聚日久漸漸腹脹疼痛米谷不消或膿血不止腹脹虛滿若水氣入腹因冷疼痛或泄瀉或痢或五臟不安血入小腸變赤白帶下先服烏金散去却敗血後調中痢即安用葛根童便酒同煎溫服

腹中疼痛有千般

呼吸精神語不安

冷水熱湯為疾病

分明相擊血流殘

朝朝米谷難消化

日日虛盈五臟寒

自有烏金散取治

何愁此病不安痊

第十一論產後百節疼痛者何也緣產後被敗血流入關節中傷注日久結聚虛脹不能還原因此疼痛用牛膝童便酒煎服

百節疼痛時腦腸排

血流無處不經來

或時腫痛人難辨

發作疼時似刃推

回轉番身無可忍

四肢疼痛叫聲雷

只因五臟皆虛弱

服取烏金散不衰

第十二論產後崩中敗血有如鷄肝者何也答曰緣產後敗血惡露自下未定久而不治或食腥酸之

物變作崩中敗血如鷄肝發熱昏悶難治萬無一存先服烏金散用樟柳根杏膠酒煎服

腹中疼痛如刀割

因食腥酸惹病愆

頻頻落似鷄肝色

虛羸四體熱煎寒

有時奔注急煩燥

恍惚昏沉命轉難

但取烏金三二服

當時神効得安痊

第十三論產後血氣不通上氣咳嗽昏迷驚恐者何也答曰緣產後未經滿月血未還原不能填補因食熱物濕麪聖結成病積聚成塊即上氣咳嗽四肢寒熱口乾心悶背脊疼痛腰多驚恐腹中疼痛日久月經不通多致腰疼透擠下面帶黃色忽亦因此不治變成骨蒸但服烏金散用樟柳根杏膠酒煎服

膠酒煎服

氣凌血敗中心積

性命行看悞殺人

還因熱面相牽繫

往來增寒喘息頻

盡令昏沉常在地

形骸常被痛來臨

如何不用烏金散

便着身亡做鬼魂

第十四論產後胸膈氣滿嘔逆頭疼者何也答曰緣

產後血氣未定心中有惡物是以肺氣既否不安

自然吐逆胸膈脹勿作返食症治之須服烏金

散去却心中惡物其病自愈用樟柳根杏膠酒煎

腹中凝血氣喘呵

又添嘔逆吐涎沫

遍躰敗血冲胸膈

遠心虛氣汗流

增寒頸疼無口苦

兩脇膨脹怎奈何

若要氣順心不悶

服取烏金見効多

第十五論產後小便赤色大便澀滯者何也答曰緣

產後敗血流入小腸中閉却水門故小腸閉澀或

攻產門腫時人不識多作下淋治之但服烏金散

去却敗血用樟柳根杏膠酒煎服

血入腸中推不知

小便淋澀大便遲

乍寒乍熱頭流汗

恰似姜羹向日葵

花向日前如綾錦

孔悲手足亂粘衣

須臾誠驗烏金散

莫信凡愚取次醫

第十六論產後舌乾鼻衄逸項生瘰癧不除者答曰

緣產敗血後流入五臟故有疾但服烏金散用當

歸童便酒同煎溫服

逸項血瘰癧不除 漸凝殘血道流餘

敗血流通傷七孔

口鼻經過以次衝

通結四肢黃似赤

不然如面上皮膏

早早尋醫忙救治

取服烏金病自無

第十七論產後中風腰疼眼澀腿脚如弓者何也答

曰緣產後未滿月之時或百日之內傷行房事或

因子及瘡肉中風初時眼澀體腰脊渾身如急有

如角弓牙關緊閉用河馬蝦野麻子草酒煎服

眼澀腰疼困後眠

多因房事致如然

此壯為因邪血入

昏沉恍惚病牽連

牙關緊閉動還急

腰脊彎時腿亦彎

母蹄見風兼血氣

烏金三服得身安

第十八論咽喉如蟬聲者何也答曰產後有熱血相

兼或宿食熱敗血攻注喘息不定上下往來於頑

涎相結故令喉中有此聲時人難救遂言語不得

五臟未實用乳香酒煎服

血冲心膈熱相兼

喘息喉中不可堪

頑涎瘀血相纏紫

往來徐徐漸加添

富貴此時何不樂

姻親滿室不相勝

但服烏金三二服

常教身病即時安

乳病

治吹乳

蒲公英 金銀花 共一處煎濃加黃酒服

一方

入患家門房上或牆頭地下稻草四指長以手捺

默念 我佛面前一抖蓮 結下子來獻西方金

頭娘子等吹妳明問左邊右邊患者應人實告者

再說吹口氣來醫即出不可回頭將草子心緊捺

出放在牆縫以上厚蓋不可透風即能止痛消也

下乳方

半夏炮三粒為末酒調服即有乳

吹乳咒

咒曰上方王女吹妳疼下方王女吹妳疼一口吹

在金簪上按下金簪再不疼謹請南斗六星北斗

七星吾奉太上老君急急如律令

朝太陽念咒七遍即消

治吹乳腫痛不可忍

用半隻一箇蔥白二寸搗一餅如左吹塞入右鼻

乳右吹塞入左鼻孔經宿愈

治吹乳乳癰神方

用葱根搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛火蓋蔥上一

時煎熱汗出即愈

婦人雜症

神效萬靈丹

專治婦人一切胎前產後諸般病症三十六種冷

血風八十二種風症病氣乳中風淋血聚婦人胎孕

不安死胎不下不過二三丸胎水不下只一丸產後

腹攪痛臍下如刀刺者只服一丸胎前產後皆示

白帶下嘔逆填塞心氣煩滿懷胎近產一旦臨

產不覺疼苦經脈不通或來頻併或赤白帶下飲

食無味面赤唇焦手足頑麻遍身生黑點血癰者

一切諸疾但服一丸細嚼溫酒送下又治產後傷

寒中風體如板者用麻黃湯下

何首烏

去皮用黑豆九蒸

川當歸酒浸

兩頭尖

各五錢

川烏 去毒

草烏 去毒

大茴香

川芎 人參

防風 去毒

白芷

荊芥穗

桔梗 桑白皮

升草

天麻 十二味

白朮 桑白皮

木香 細辛

血竭 五錢

蒼朮 半斤

白朮 桑白皮

木香 細辛

右共二十味俱為細末煉蜜為丸如彈子大每服

一九細嚼黃酒送下

紫霞杯

硫黃 一斤

丁香 一錢

木香 一錢

右共為細末將硫黃化開入藥攪勻傾於模內即成

杯矣如有下元虛寒酌酒服之甚妙後有西江月

傳得仙方妙訣

煉成紫霞金盃

暖宮種子世無極

善破胸中積滯

男子下元久冷

婦人白帶淋漓

空心酌酒飲三盃

勝服丹藥良劑

玉免散 治婦人產後除下脫似腸者

用鮮芫頭一箇燒灰存性敷之即縮上此藥雖平

有殊効

小兒

驚風

金箔鎮心丸

治風痰胸膈積熱心神恍惚驚悸急

風如神効

朱砂

馬牙硝

片腦

麝香 各一錢

人參 五錢

白茯苓 六錢

紫蘇 一兩

右為細末煉蜜為丸如圓眼大金箔為衣每服一

丸不拘時薄荷湯化下

保命丹

治驚風發熱痰嗽神効

朱砂

鬱金

天麻 各一錢

萬風

白附子

青黛

薄荷

南星 各一錢

麝香 少許

全蝎 去尾尖一錢

右為末煉蜜為丸如皂角大每服一丸灯心薄荷

湯化下

保童丹

專治小兒急慢驚風痰咳喘滿不進乳

食虫疳積熱膨脹等病亦皆治之

陳枳殼

五錢

三棱

莪朮 各五錢

金箔十片朱砂

各一錢

右為細末以前醋過糊為丸如棗豆大朱砂為衣小

兒未及一周一丸已上三九三歲以下七丸用薄荷

燈心金銀環同煎湯下如不能吞者磨化與服大効

大紅末子

烏藥順氣散一貼加朱砂五錢為細末

治小兒發熱驚風及痘疹諸疾量大小與服黃酒或米湯調下多則一錢或幾分

驟風驚風

一粒朱砂一片雪

此方治小兒驚風

七箇僅錢三箇竭

不論急風與慢風

只用原母身上血

右為細末乳汁調一分敷乳頭兒口噤吃下即愈

痲疾

蘆薈丸

治小兒痲疾食積面黃或青或白小便如

淋大便溏瀉腹有青筋肚大如鼓足瘦如柴不時發熱皆治

胡黃連

乳山查肉

鷄乳

蕪荑

蘆薈

乳浸

川練子肉

陳皮

白朮

三棱

莪朮

醋炒各八分

史君子肉

失按柳

蝦蟆頭

何魏

八錢

右為末加飛羅麵入阿魏為糊丸如菜豆太母服三十

九米湯下

消積丸 治小兒肚大青筋黃瘦

白茯苓

史君子

芡實

白芍

酒炒各一兩

白朮

薏苡仁

山藥

神麴

麥芽

蓮肉

扁豆

桔梗

三棱

山查

井草

右為末白麴四兩入藥末一兩半白蜜一兩香油少

許略為焦餅食之

痲疾

治小兒痲疾

水紅花子

白朮

木香

枳殼

山查

神麴

史君子

去心

右為末入黃蠟麴水和煎焦餅食之

治小兒痲疾痞塊及婦癥瘕

雷丸

白朮

黑丑

大黃

槐子

黃芩

天竺黃

右俱生用各為細末共合一處重羅挫細每服一

分半五更時用熱茶水調服出汗退熱重者不過

二服忌腥羶猪肉百日外不思
治小兒癖疾如神

烟砂 烟砂 白滑石

右共一重為末用鮑魚一尾去腸屎淨將藥入肚
內用小銅毛合住鹽泥固濟入炭火煨紅去魚取
出藥為末每先用一分漸加至四五分為止入雞
子攪勻蒸熟與兒食之癖即愈矣

神仙化癖丸

蘆薈 青黛 木香 厚朴 陳皮 煨榔

史君子 明黃連 山查肉 香附 三棱

我求 人參 白朮 水紅卷子 神翅

變芽 阿魏 甘草

右為末將阿魏一錢水研開和麪糊為丸菴豆大每

服四五十丸米飲白湯任下

小兒癖疾并男婦一切積塊

核桃 煨榔 烟砂 大黃

右三味為細末入挑仁水煮一炷香水滾時塗積
入皮硝半斤煮盡硝亦盡止食挑仁亦好

牛黃散 治癖神効

牛黃 蘆薈 薑香 孩兒茶 阿魏

甘草 大黃 穿山甲

右為細末每服五分蜜水或黃酒調空心服忌生
痞疾丸

阿魏 天竺黃 蘆薈 沉香 胡黃連

烟砂 雄黃 沒藥 川山甲 草烏

三棱 莪朮

右共為末將阿魏用黃酒放入白磁鍾內再坐砂

鍋內溶化取出入群藥攪勻丸如豆大每服二丸

黃酒送下忌生冷油膩熱物不可食

化癖膏

黃狗腦子 皮硝 蘇香 珍珠

共搗成餅分作三次用先令病者飲食稍飽令仰

卧綿塊之大小用筆圈定以篋作圈圍住另用

麪作圈放篋圈裏以草紙貼塊上將藥攤貼紙上

用火慢慢熨之熨之盡藥枯為妙次日又如此三

次熨盡用挑仁承氣湯一劑服之即下血塊神効其

麻膏出不治其塊收上心去不治

貼神應膏

皮硝 山挑子 蜂巢 酒糟 猪脂

水蘚皮 各一斤 烟砂 一錢 鷄子清 膏 大慈 根

水紅 各一斤 何魏 各一錢

右各為細末搗葱同酒相和諸藥攤布上貼患之

處或用油紙裹住頻潤之如今日午時貼起至

來日午時去之再貼甚者不過三五貼神効

千金不換過痞膏

血竭 各一斤 乳香 各一斤 沒藥 各一斤 阿魏 各一斤 大黃 雄黃

米穀 各一斤 巴豆 各一斤 人言 各一斤 川山甲 各一斤 芥子 各一斤

馬鼻 各一斤 皮硝 野葡萄 各一斤 鳳仙草 草麻子 各一斤

右為末用小黃米做成粉子炒胡四兩研細用陳

醋和成膏貼患處每貼如麝香五分獨蒜一頭搗

千下紅絹一方將藥攤工如乾用醋潤之三炷香

盡去藥三日一次貼二次即好

經驗化癰千槌膏 治小兒大人肉有積塊發熱口臭

皮硝 各一斤 川椒 各一斤 草麻仁 各一斤 黃香 各一斤

菴豆

先將菴豆半斤川椒六兩用水二瓢熬成濃汁瀝

去椒豆止存淨汁再煎一炷香入黃香在汁內再

熬二炷香離火入皮硝攪勻取出入石臼內加華

麻子仁陸續搗成膏為一塊臨用時量積塊大小

以熱水浴軟捏成一塊先用麝香少許擦皮膚使

引氣透方覆藥仍以狗皮蓋貼隨將有火熨斗

在膏藥上熨三五次再用絹帛勒之三日一換可

除病根此藥能醫大人小兒積塊忌食苦菜薑

腐有椿黃瓜茄子雞魚醋猪首肉

黃閣化癰膏

專貼癰積氣塊身軀發熱口内生疔此藥用狗皮

攤貼患處每箇重七錢貼三日止熱七日覺腹

微疼十日大便下膿血為驗大有神効忌生冷

及腥羶發物百日

秦允 三枝 黃柏 莪朮 蜈蚣 各五錢

當歸 大黃 各一斤 真香油 各四兩 黃丹 一斤二兩水飛過

川山甲 各一斤 全竭 各一斤 木賊 各一斤

右將藥入油內煎黃色為度濾去滓搗爛待用油
冷入黃丹用文武火熬槐柳條不住手攪黑煙起
滴水成珠手拭軟應方可離火次下四味細藥並
入搗爛粗滓於內 真阿魏二兩乳香五錢沒藥五錢
麝香一錢皮硝三錢攪勻以磁器內盛之如用坐水
中溶化開不可火上化如有馬刀墜子瘡琥珀一
兩在內無不効驗

明目化積丸 點痞疾熱甚眼瞤神効

牛黃 冰片 各一分 熊胆 二分 麝香 一分

右為細末入乳為丸米大每服三丸入眼合久自化
有奇効

治大人小兒辟積方

黑礬 三錢 皮硝 三錢

右用金花燒酒一碗調二味勻麪一升和塊團病
上以麪斗如火三日一壓十日癖軟忌醋醬魚犬
肉荳等物宜牛肉白米粥加小棗三箇入飯煮先
喫棗後用飯日三服

吐瀉

治小兒吐瀉方

寒水石 二兩 硫黃

右為末蜜香黃水打糊為丸如鷄頭子大每服一
九針扎燈上燒紅研末米湯送下

治小兒泄瀉

赤石脂為末麪糊為丸黍粒大每服十九米湯引
送下

治久瀉不止及脫肛

五倍子 二兩 枯白礬 三錢

右為末水糊為丸如梧桐子大每服五七丸空心
米湯送下

治小兒水瀉

白礬 黃丹

右各五錢用葱白同搗爛塗臍上即止

貼小兒驚癇水瀉

巴豆 二箇 皮硝 黃礬

右三味各等分搗成膏攤在紙上貼額上顙門
下是也有小泡起即止其泄

痢疾

治小兒瘰癧口痢

甜梨一箇取出子入蜜填紙包火煨熟喫之立止

治小兒水瀉痢疾

蜂窠三茶匙 飛礬 三錢為細末

白蘿蔔搗爛加水半酒鍾調在一處飲之溫處出

微汗即好忌酸冷三日

治小兒

一切痢疾并瘰癧七八日乃可服

五倍子不拘多少炒黑色存性為末葱汁為丸

菽豆大每服一二九生薑湯送下一服不已再

進一服甘草湯送下即愈

治痢疾口瘡神効

紅麻子百粒 巴豆四九箇 桂黃 朱砂各二錢 煨礬如鹽

共搗爛小兒痢貼印堂榆錢大二炷香即起久痢

貼三日一日一換男女五七歲貼三炷香

口瘡貼裏尖久貼音 如少合二麻子豆桂朱各一分

瘰癧瘡疾

治小兒瘰癧瘡疾

用芫花根為末每用一二分三歲兒三分用以雞

子一箇去頂入末攪勻紙糊頂口外用紙裹瘰癧灰

火煨熟嚼喫

治瘰癧秘方

天靈蓋燒存性為末每服五錢黃酒調下効

咳嗽

小兒咳嗽方

用生薑四兩煎濃湯沐浴即愈

治小兒瘰癧

甜梨一箇入硼砂一分紙包水濕火煨熟喫之立愈

治咳嗽

杏仁上尖大 胡桃仁四錢 冬青子

石二味為膏入蜜少許每一匙臨卧薑湯下

牙疳

治小兒牙疳搽上即生肌肉

輕粉一分 孩兒茶一分 射香一分 校花二分

右共為細末照瘡大小粘藥貼患處即効

薑黃散 治小兒走馬牙疳

太上老君急急如律令 効一氣念七遍

痘瘡

痘瘡

升麻 川芎

乾葛 各五錢

當歸 各四兩

甘草 一

天麻

共六味剉如豆東流水五瓢於砂鍋煮米砂四兩
細絹袋盛之懸於鍋內盤覆之文武火煮水乾為
度水續添勿令太沸亦不可不沸待莫水盡取出
將乾收貯聽用量兒一服六七分炒過糯米三分

同研為細末白蜜一匙熱水同調下初發熱者服
之毒氣即散見苗者服之則拂亦穩早回者服之
便起

九味神功散 治痘出太盛血紅一片七日以前諸
症可服

黃芪 人參 白芍 生地 紫草 紅花

牛旁子 前胡 牛草

右剉水煎服熱甚加黃連黃芩各一錢有驚加
蟬退去翅足若頭拉淡黑色者有寒乘之加官

挂一錢

內托散

治氣血重損或風邪穢毒冲觸使瘡毒內
陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻氣調胃
補虛內托瘡毒使之盡出易收易愈

黃芪

人參 當歸 各二

川芎 防風 桔梗

厚朴

白芷 甘草 各一

木香 肉桂 各三分

泄瀉加丁有乾薑肉豆蔻

右方於紅紫黑陷屬熱毒者去桂如紫草紅花黃

芩若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官

挂攻表當貫膿而不貫膿者倍參芪歸煎熱入人

乳好酒溫服

起死回生散

治痘瘡至七八日忽然變黑收入通

身抓破吃喘喘亂死在洵吏服此送新另出立可

回生趙神仙傳

當歸

川芎 白芍 生地黃 升麻 紅花

上陷加白芷

下陷加牛膝

遍身黑陷加麻黃

象鼻

右剉一劑半水半酒煎服後新發出脚下有黑疔

至七八日用針挑去以太乙膏貼之即拔去毒須
史連進二三服

復生丸 治痘疹不起脹

當歸身 西芎 升麻 乾葛 白芍

人參 黃芪 甘草 辰砂 紫草茸

右為末糯米糊為丸每服一丸河水煎
添入黃酒少許送下

獨參湯 治出痘至貫膿收靨之時倒壩陷伏心慌
悶亂死在須臾

人參一兩水煎濃汁灌下即省

小兒標症

碧葉膏 治小兒遍身丹毒神效

菠菜葉不拘多少搗極爛取汁搽敷在患處二三
次即愈

上黃消毒膏 治小兒一切丹毒神效

雄黃 膏半 大黃末

右共研為一處用鐵杵水調搽患處

一即二子散 治諸虫

按柳 櫃子 史君子

右共為細末每服大人二錢小兒一錢或五分空
心用滾水調下每月初一日起至十五日止可服

虫頭向上如十六日虫頭向下不可服

夜安一粒金 治小兒夜啼不安

牛黃 研極細用乳汁調灌嚥下仍將小兒臍
下寫一田字妙驗

神仙萬應丸 初封通微顯化真人

珠砂 巴豆 寒食 延壽 延壽 延壽

初將重湯煮爛用已上三味拌勻不粘

右先將朱砂研極細即將巴豆同研極細却以寒
食過付酒打散調入藥中仍同研百餘下丸如黍

米大每服三五丸七九有痛加減服後引下

此丸專治小兒驚風發熱等症
凡小兒患此症者服此丸一二丸即愈

新刊魯府集方卷之三

康集畢十

新刊魯府秘方目錄

寧集

癰疽	疥瘡	楊梅瘡	下疳	疔瘡	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽
癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽	癰疽

目錄畢

新刊魯府秘方卷之四

寧集

魯府良醫正日劉應泰編輯

醫官日段 燈校正

醫生日陳時務

王 璽同校

癰疽

一技箭 治諸般腫毒惡痛不可忍者

白芨 天花粉 知母 牙皂 乳香

金銀花 半夏 川山甲 貝母

右判每一劑各一錢五分酒二鍾煎一鍾溫服汗

出即愈

感寒失於表解流成便毒癰疽往來寒熱甚艱危獨

活土黃歸尾要真金銀花穗大黃酒紋甚奇川山

中要妙成珠利下膿血即愈

黑白散 專治一切癰疽發背無名腫毒醫所不識

者並皆治之神效

牛乳黑白者各一合用布包槌碎好酒一碗煎至

八分零一宿溫熱服大便膿血為度

硃砂鮮毒丸

治一切惡瘡走亂無形並皆治之若

人不能服藥心中霍亂不省人事撥開牙關舌尖

貼一丸汗出為度其效不能盡述

硃砂膏

龍骨

雄黃

石三味蟾酥丸如菜豆大輕者五七丸重者九

丸或十一丸冷水送下或舌尖上貼之汗出為度

大有神效

消腫散

治貼骨癰無名腫毒

當歸

川山

大黃

白芷

乳香

沒藥

各一

薑黃 甘草

共為細末每張三錢好酒送下行一二次腫毒消

治一切無名腫毒癰疽發背等瘡

用蒜搗碎擦患處立消

治癰疽發背已潰未潰如神

芝蔴一兩炒胡入枯礬七錢再炒搗成餅敷患處

三日一換

夾紙膏 治發背潰爛者

百草霜 壯人血餘灰

右各等分研細臘月油燭淚化開調為膏攤舊棉

油傘紙上夾住周圍線縫涼水浸之先以濕淘米

泔洗瘡淨貼藥勒住次日再洗瘡洗藥翻過貼之

三次照前洗換新藥貼漸愈

千槌膏

治無名腫毒及發背初起者效如神

赤打草麻子

杏仁

黃丹

軟黃香

沒藥

乳香

輕粉

麝香

右以端午日午時搗千槌收磁器攤貼

追毒五香丸

治發背疔瘡

丁香 木香

沉香

乳香

沒藥

血竭

巴豆

右為末然後入巴豆同研極細重羅過以磁器盛

之黃蠟塞口臨用時以生蜜調一丸如小黃豆大

新汲井水送下行三次瘡即愈又者瘡勢大小藥

之多寡若瘡日久勢大藥丸不過大黃豆大若瘡

勢新起則丸藥但如小豆大即可若病勢已急口

禁不能開但得藥下無不愈乃用一大丸分作三

五小丸灌之此藥雖可用能元不可過九指久而無用矣神切

瘰癧

治遠近瘰癧

麝香 黃丹 輕粉 乳香 班毛 五錢半炒 去油足則

右為末每服一錢雞清調勻入雞蛋殼內飯上蒸熟雞鴨時湯稅上噓熟細嚼飲湯送下患自小便出淺者見小便疼澁下血塊如小指患深者下如鼠已潰者用敷貼旬日自乾永不發忌三日不得用冷水洗面手腳不許踏冷地忌生冷魚鷄動風之物

治瘰癧

用猪肚去淨勿洗刮膚上極細嫩油一層以葱蜜搗爛上磨即消鍾當乾生新肉

又方已破未破皆可

以男左女右搗拳後絨盡處豌豆大艾炷灸三壯

三四日愈

又方

五倍子末醋調貼數如已破以蜜調敷硬處消腫軟堅

治瘰癧老鼠瘡

諸懸蹄坑存性為末每服三錢黃酒送下一服立消

治項瘰癧

班毛 四十九箇去頭 足翅枯米炒 山豆 五錢半炒 白栴榔 一箇 麝香 五錢 硃砂 錢
右為末用雞清二箇調前藥入殼內綿紙封固坐飯蒸熟取出晒乾為末平明酒送下七分覺小腹疼炒蘇麻子末五分沒藥五分茶三口送下服藥後打下忌物如豆如鼠癰盡忌生冷

琥珀散 治瘰癧

滑石 兩 白丑 兩 班貓 三錢 琥珀 二錢 薑蚕 兩 枳殼 錢
甘草 錢 赤芍 錢 黃芩 兩 木通 錢 熟胡 錢 連翹 錢
右剉一兩水煎服

疔瘡

治疔腫

柏頭去白水以葱白共蜜搗貼効又以此貼無名腫毒有効惟要偏枯

又方治疔

門樞下土取米多令人知以獨蒜切煎擦瘡頂立消腫

治疔

雄黃 硃砂 棺釘秀 各等分

右為末將瘡挑破量上藥揅口綿紙貼留頂有効

治誤食鹽牛肉生疔毒瘡

白頭蚯蚓八九條搗酒濾食其渣貼在四圍患處

可留頭出氣

治疔瘡如神

用杏仁切去下少許令半煎瀹鷄羹安坐於疔頭

上痛即止

奪命丹 治無名腫毒疔瘡發背小兒急慢驚風及

痘瘡傷寒陰症

硃砂 雄黃 五錢

右為末以蟾酥為丸如菜子大每服三九葱酒下

取汗為効

又方 治疔

取芭蕉根研生酒服

便毒

神異散 治魚口便毒瘡

金銀花 天花粉 木鱉子 甘草 連翹

黃芩 各八分 山梔子 七分 川山甲 二錢 皂角刺 三錢 木香 五分

大黃 三錢

右剉水酒煎空心溫服

治便毒極効方

當歸尾 金銀花 赤芍藥 天花粉 白芷 各二錢

川山甲 二斤 木鱉子 十枚 薑 五錢 大黃 三錢 芒硝 二錢

好酒二鍾煎一鍾連藥攤露一宿五更熟服厚蓋

出汗利一二次即愈硝黃待羣藥煎將熟入一沸用

下疳

治下疳如神

官粉 煨三錢 冰片 三厘

右研末搽上立已

治下疳潰爛立効

珍珠 煨存 片腦 人指甲 指甲炒成灰 血餘燒成灰

右各等分為末搽患處

治下疳

皮硝二碗 乳香 雄黃 孩兒茶 各五分
右入小罈內外用牛盡火煨熟罈其硝自化薰之
晚上使以心口涼為度

治疳瘡方

輕粉 五分 蜜佗僧 五分 沒藥 五分 川黃連 二錢 川黃柏 二錢
飛過黃丹 五分

右六味研細末和均先將米泔水務要洗淨膿血
水見肉將後用藥末微微薄薄散上一日洗二次
上藥二次神効

魚口

金蟾膏 治未成魚口橫眼疔瘡痛難忍

用大蠟 一兩 刺去皮 方後用 大蔥白 二根

右將蠟身連腸及葱搗一處如泥敷在腫處却
用蠟蓋皮蓋覆膏上經宿即消神驗

子花煎 治魚口瘡

槐子 五錢 川山甲 微炒 三錢

右用無灰黃酒半碗水半碗煎至半碗空心熱服即愈

治魚口瘡方

大黃 二兩 芒硝 三錢 川山甲 黃土炒 五錢 靈脂
右四味各等分共為細末每服三錢黃酒送下即
時喫二三服便膿血即退効

楊梅瘡

楊梅瘡 已發未發者皆可服之

土茯苓 二兩 金銀花 皂角刺 歸尾 白芷 防風
白鮮皮 荊芥 木爪 木通 薏苡仁 連翹
羌活 各一錢

右用白酒二碗水二鍾煎至一半去渣不拘時服
服五七日効

治楊梅瘡

土茯苓 四兩 金銀花 五錢 雄豬肉 半斤

右用水五碗入藥全煮爛去藥時肉同湯喫飯一
服食七服七日効忌醋牛肉燒酒茶房事

治頑瘡

乳香 沒藥 各二錢 雄黃 一錢 牙皂 五錢 苦參 五錢 土茯苓 五錢
右用好黃酒十斤入罈下鍋煮三炷香每日三服各

二三鍾如能飲一醉即止疼
治筋骨疼 用過煙粉者

黑鉛化開以好麻二錢作劑研鉛汁務要鉛汁乾為
度取土羅細末 川山甲五分 乳香五分 沒藥五分
水銀二分

石共研生蜜和成一丸以麻黃煎酒送下出汗愈

治天庖瘡疼痛三五日即好

輕粉錢三 硃砂 雄黃 乳香 沒藥以上各五分 孩茶五分

右為細末每服一錢八分共分三貼黃酒送下忌酒

膩物三七日

玉粉散 治天庖頑瘡効

南京官粉一兩火燒黃色研細末每服二三錢溫

燒酒調下

五寶仙丹 治楊梅天庖頑瘡潰爛經年不愈者

珍珠一分 琥珀一分 片腦一分 硃砂一分 滴乳石三分 飛越三分

土茯苓二斤 每二日用一斤煎湯三晚一日早晚盡不可用別湯水日

右為細末分作十二帖每服一分土茯苓湯調下

空心服治病於後

一種腹內受惠口臭不能飲食

二種流穿爛肉骨出痛甚

三種皮不損自然肉痛年久眠床誤作瘋氣疾爛

四種發牛皮癬連肉遍身不識錯認作大麻瘋治

五種發手足癬千重萬重或好或發

六種發黑紫色遍身頭痛四肢及水道谷道爛

七種紅色滿面及面各旺處發瘡

八種發白色斑癬及手足四肢等處

九種原生疳瘡未服藥尚存餘毒及延小兒原產

胎毒多人不識誤作異瘡治不應驗

治筋骨疼痛頑瘡不愈甚効

烏藥二錢 當歸 細辛 陳皮 麻黃 甘草

荊芥五分 川芎 良薑 青皮 枳殼 薄荷

白芷 知母 桔梗各四 川烏 草烏 乳香

沒藥各三分

右對一割酒水煎生薑三片葱一椀煎服忌生冷油膩之物

治楊梅瘡妙方

輕粉錢二 炒黃色 麝香五分 槐花末 烏藥八分 煎酒服過

右共為細末杵飯為丸均作六十三丸每服三丸
日進二次水酒送下忌茄子牛肉

腫瘡

治腫瘡膏 腫瘡神口風効

香油半斤 黃蠟二兩五分 定粉一兩六錢 桑皮紙厚者三張

用銅器將香油入內以火煨熱下蠟慢火熬如桐

油色入粉末以筋頻攪沫起熬至沫落攪視微清

沫不粘筋將紙剪成方用紙釘錠了後入鍋內煎

乾油去火毒三二日將瘡用葱椒搗條茄根煎湯

淨洗用穰筒拭乾將藥紙貼患處上用油單紙挂

蓋着瘡處藥貼一日揭去一張不十張痊矣極効

神効腫瘡方

黃香 黃蠟 猪脂油

先用黑碗火上將油化開後入蠟香溶勻取出連

碗坐涼水內待冷听用將瘡米泔水洗淨用油拿

紙攤藥與瘡一般大小火上烘熱貼於患處每日

換三遍以絹帛扎住二十日痊執義及一切發物忌

疥瘡

擦疥方

用鷄子清同香油入鐵杓內煎三沸冷定火烤抓
破塗上土坑上睡即好

又方

蛇床子大風子同為末油調擦一宿即瘥忌發物

呂祖苦參散 專治風癬疥瘡

石菖蒲兩錢 苦參兩錢 威靈仙 胡麻炒 川芎

荆芥 甘草 各一兩

右七味共為細末每服三錢好黃酒調服三次愈

天棚散 治疥癬諸瘡神効

乾九松經霜者燒灰研末不拘多少用鷄蛋黃煎

取自然油調患處

治疥癬坐板血風痛痒神方

大風子去後四 蛇床子三錢 木鱉子去殼三錢 川椒二錢 枯礬二錢

輕粉二錢 水銀二錢 朝腦二錢

右為細末柏油搗勻先將椒艾湯洗令淨待瘡抓

破擦藥大効

治疥內消散

硫黃一二錢細嚼燒酒送下
煎齊如神

銀味 雄黃各一 木鱉子 好揮香 艾葉
石五味為末以紙捲條陰陽九盛薰兩腿腕以被
蓋之兩頭而在外先以布包裹二便

治疥癬癩瘡
人言 放鍋內入硫黃一兩化開取出為末用香
油炒急拌前藥入絹帛包擦患處次日又入油又擦

癬瘡

治風癬

巴豆 草烏 皂角 人信
石其為細末乾則香油調敷濕則乾修之

治牛皮癬癩瘡

牛角灰燒存性為末香油調搽立效

治疥癬風癬癩血諸瘡要煎藥

歸尾 赤芍 黃芩 黃連 黃柏 各一錢 大黃 三錢
防風 八木鱉子 苦參 金銀花 各一錢 二分
右剉用酒水各一鍾煎至一鍾後下大黃煎三

四沸取起露一宿五更服腸風臟毒下血去木鱉
加槐花一錢

治癬疥 老鼠瘡 螻蛄等瘡

水銀 鉛 各一錢 將鉛化開入 木香 錢一 歸尾 梔子
黃芩 硃砂 各一 阿膠 五 安息香 三 連翹 二

右為末和勻加熟紅棗搗丸彈子大每用一丸无
上開火將藥放火上燒烟起口吹以待烟盡為度
重五丸輕三丸

治癬方

枯礬 狼毒 各一 硫黃 半 斑貓 錢三

共為末之蘇炒烟色口嚼成膏黃瘡大小貼上用
布絹包住膿癰去毒

川槿散 專治一切頑癬

大斑貓 七箇或十箇 已豆 五箇 川槿皮 三錢

右三味共為細末一處用醃醋調搽稍時作癢起
泡泡落即愈

癩瘡

治虎瘡

苦葶蘆 芫花搗為末杏仁四十五箇燒存性搗

一處香油調搽

治瘡瘡

白礬在杓內化入信一錢一并在內滾礬枯乾取

出用礬研細洗瘡淨散即乾幾全好

烏龍膏 專治頭髮內生白頂瘡

伏龍肝研末五錢 飛過白晉礬五錢

共研極細用燈窩香油調敷患處搽不過三五次

其髮復生如黑漆

瘡瘡方

用猪外腎搗爛去筋渣用先用花椒細茶熬水洗

淨後將搽上封固一七日自愈

治瘡瘡

用香油 黃香 輕粉 頭髮

右入鍋熬得不稀不稠將瘡甲苦練根水洗淨只

搽一遍除根

癰風

治紫癰風

硫黃二兩醋 海螵蛸二箇

右同研為末先浴後以生薑煎藥熱搽患處須謹

風少持數度斷根 又以知母磨醋搽亦妙

治白癰風

茄子一箇破開入人言一錢於中煨熟取出去人

言以熱茄搽之即消

厲風

厲風瘡

乳香 沒藥 丁香 攪香 嬰水花末 麝香

蜈蚣 白花蛇 脊谷老各一錢

右九味為細末黃蠟二兩化汁為丸化作十九男

左女右握之未用之先早服天花粉湯或柴胡湯

晚喫羊肉燒酒發之或次日早用羊肉酒亦可方

以藥握之三炷香出汗

諸瘡

綿花膏 治諸瘡

香油四兩 鷄子五箇煮熟去白留黃 黃柏五錢去粗皮入油燻枯色深

內生水盞一 乳香 沒藥 孩茶 輕粉 雄黃 蟾酥

片腦 血竭 任意再加

治腫毒

鷄子油加頭髮黃蠟些須量用黃丹試熬貼膏二兩

治暴起瘡腫如燒半日串身

雄黃五分 沒藥五分

共研極細入油熬一二滾取下放將冷下鷄子清

調勻治熱瘡神効

治風瘡各樣爛瘡

香油四兩

鷄子二兩清黃俱用熬乾

硫黃一兩

雄黃三錢

共油攪勻搽瘡鷄毛掃

吹腫毒方

一根柱 兩根柱 北方真武玄天柱 疼也住

腫也住 謹請 南斗六星 北斗七星吾奉

太上老君急急如律令

吹瘡法

日出東方 赤亦央央 金童盛水 玉女焚香

先請

天神 次請 先王 來禁惡瘡 謹請

南斗六星 北斗七星吾奉 太上老君急急如律令

治頭瘡 黃水瘡

細茶二錢 銀朱一錢 水銀五分

先將茶搗次加二味搗研不見星散搽一宿風淨

瘡自然好

龍鳳膏 治一切惡瘡

鳳凰散 即出鷄蛋殼不拘多少微火炒黃色為細末入紅州糞末

二味等分用臘月猪脂油調膏敷瘡即愈

紅玉散 專治頭面黃水到處生瘡

官粉二錢 黃丹五錢 校過松香五錢

共為極細末乾揅患處如瘡結痂用香油調敷神効

二仙掃癩湯 治伏熱遍身癩痒

棗葉一升 好滑石末二兩

用水數碗共合一處熬二炷香承熱浴洗二三次即愈

點瘡頂方 治無名腫毒日久不破者

用葛條燒灰點在瘡頂上就破奇効

治惡瘡出汗方

飛過白堊一錢 乾薑一錢

共在一處為細末每服二錢黃酒下汗出有效
治無名腫毒

大黃^{五錢} 枯礬^{各二錢} 皮硝^{各二錢} 榆皮^{四兩}

右為細末凉水調敷患處

治諸毒瘡

大黃^{二兩} 薑蘇^{五錢} 皮硝^{二錢或五錢}

右共為細末每服三錢半空心用滾白湯送下

治諸般腫毒瘡癰

凡大人小兒婦女偶生腫毒於未成膿之先剉鹿

角末一錢用滾白酒調服量瘡上下服之經宿即

成膿無膿則腫自消毒自解神功

杖瘡

棒瘡 疔了用此藥貼

黃蠟^{二兩} 猪脂油^{二兩} 工本^{二錢}

三味共搗一處作餅覆疔處以油紙綁住鮮血出

為度去此藥洗淨收之仍可用另貼棒瘡膏^{生肌}

又方貼棒瘡

黃蠟 猪脂^{各二兩} 汞^{二錢} 孩茶^{一錢} 大麻子^{一錢} 腦^{一錢}

共搗成膏作一搏臨用置油紙於刀鍬乘熱將藥
一擦即攤成膏貼

肉紅膏 貼棒瘡起疔止疼

猪脂油^{二兩煉} 黃蠟^{二兩入} 銀朱^{五分} 花椒末^{一錢}

右調勻用紙攤貼

折傷

接骨方

用糞尿內瓦子^{煨紅醋浸以此} 甜瓜子^{三錢炒過為末}

共一處勻每服三錢好酒送下立止

接骨方

天花粉 瓜蒌仁^{各五錢}

共為細末三服用點香一炷先以黃酒熱調三錢

三分香盡三分之一再張一服如前香點餘三分

之一服盡第三服亦如前至一炷香盡覺接患處

有聲其痛止次日全好如常

又方

古文錢^{大者} 乳香 沒藥^{各五錢} 輕粉^{一分}

右為末酒糊丸服酒調亦可

又方

鮮焙焦黃為末黃酒調服接骨時覺響出汗止疼
接骨方

土鱉二兩巴豆二兩半夏二兩乳香一分馬包即灰包燒存性一錢

共為末每服一二釐黃酒送下日三服出微汗其骨止

抵金丹 治跌撲傷損閃扭骨竅等証

黍沙 萊豆粉炒黃各四兩枯礬二兩四錢

右為末醃醋調敷患處厚紙貼之絹布縛之換

敷三四次効忌產婦房事常飲黃酒通和血脈妙

筋斷骨折痛不可忍

研砂二錢水粉 當歸各二錢

右為末每服二錢蘇木湯調服仍時飲蘇木水効立

當歸補血湯 專治打傷血氣不足神効

紅花五錢黃芪 當歸 獨活 有風菴活以上各二兩分作三劑

水一鍾煎服忌風

神仙接骨丹 治跌打傷損皮爛骨折疼痛不可忍

十分危急此仙傳方也秘之

小兒胎骨火燒醋淬七次為末聽用

上部末藥

小川芎 白芷 升麻 當歸 蔓荊子 茯苓

右切片焙乾共為細末秤服七分

外加黃荊子炒烏色研為細末三分二樣共一錢

再加接骨丹五分和均用老酒調食後送下一日

服二次葱頭過口

中部藥方

當歸 芍藥 茯苓 黃芪 甘草 生地黄

秦艽 白芷 陳皮 白朮 血裡梗

右切片焙乾共為細末加黃荊子末五分再加接

骨丹八分過毒和均老酒調食後送下一日服二次

下部藥方

當歸 芍藥 牛膝 木瓜 防己 菴活

獨活 白芷 陳皮 防風 秦艽 海桐皮

片薑黃 鉄線藤 千年矮 血裡梗

右切片焙乾共為細末服一錢五分加接骨丹一

錢和均老酒調食前送下一日二次葱頭過口

打傷疼痛

用久尿處磚瓦洗淨燒紅放在醋內五七次取出
為末每服三錢黃酒送下

破傷風

治破傷風

一對蜈蚣半兩茅_{草馬}

三錢白芷共天麻

七箇全蝎一處研

死在陰司也還家

先嚼葱頭二指嚥下以藥一字黃酒一鍾送下

治破傷風

手指甲用壯盛人者灰水蘸水洗淨香油燻黃為

末每服三錢黃酒調下

治破傷風及風犬傷

用胡桃殼半箇填人糞滿用槐白皮襯扣傷處上

用艾灸之若遍身臭汗出其人大困即愈_{連年瘡刺}

立効散 治破傷風 槐花酒亦妙

雄黃 香白芷_{各等分}

右剉黃酒濃煎服之如牙關緊急者灌之即活

腋臭

治陰汗鷄臭兩腋下臭不可與人共行

白礬 蜜陀僧 黃丹_{各分} 麝香一珠

右於乳鉢內研如飛塵以醋於手心調藥末搽腋
下經兩時辰許却以香白芷煎湯洗之一日用_火

治腋臭神効

蜜陀僧_{四兩}

枯白礬_{二兩}

輕粉_{三錢}

右為細末頻擦兩腋下擦至半月見効半年全愈

治腋氣神妙不可盡述

用活田螺一箇以好麝香少許放于田螺內却埋
放於露地上不可雨打七十四十九日取出看患

處洗淨拭乾用墨塗之却再洗看有黑處是瘻子

用田螺汁點兩度即愈

治體氣

用蠟胭脂搽在腋下待一時看黃處灸二十一炷

過三日食乾薑湯神効

湯火

治湯盪火燒

栢葉為末搽患處如瘡乾者香油調敷

又方 大黃為末凉水調敷或梔子為末鷄子清_{調敷}

又方 大黃為末凉水調敷三錢有效

又方 無名異為末鷄子清調敷

治火瘡止痛

乳香為末鷄子清調敷

治火瘡流水

犬油搽上即止

綠白散 治湯火燒疼痛難忍

若參不拘多少為末香油調搽

治油火瘡 麝和梔子末油調敷

虫獸

蟾酥丸 專治蝎子牙痛疼

麝香 雄黃 蟾酥 草烏 黃蠟 胡椒各二錢

右六味共一處將蠟化為丸菜豆大牙疼咬蝎之

如聖散 專治蝎螫眼病

片腦 白礬各五分 火硝三錢 胆礬二錢半

右四味為細末點眼効

又方

朝腦錢 蝸牛不拘 共為細末塗之神効

又方

用青黛 飛白礬各等分

共為細末男左女右點眼淚出即愈

胆礬錠子 專治蝎螫疼痛

白礬二錢 雄黃 蟾酥 胆礬 乳香各一錢

右五味共為細末用水化皮膠為錠子若蝎螫

風犬方

黎花班猫七箇去翅足微焙黃色溫黃酒送下汗

出即愈忌見風及人驚

治風狗傷人方

班猫七箇去翅 鍛礬五臟用江米一撮砂鍋片上炒黃

色令乾各另研收用時方合一處黃酒送下

凡風狗咬傷人

本人散髮眠在板凳上用井中凉水泡髮如水溫

時再換水泡三箇時辰人髮上尋有紅髮者去之

自然無毒即好

禁蝎子法

上方金鷄呼下方叫金鷄我會錯蝎法錯了便不

疼青州有青蝎便把吾郎螫螫一螫化成一點血
謹請 南斗六星 北斗七星
太上老君急急如律令正月初一日半夜受法休
令人知人知則不驗

金瘡

撮合山 治破傷刀刃傷箭鏃

降香^{片腦} 珍珠^{龍骨} 白芷 孩兒茶^全

用臘脚醋調合加陳石灰四兩陰乾為末上患處

冰片散 治傷手瘡如神

片腦^分 孩兒^錢 參

共為細末摻於患處

治金瘡止血速瘡

炒石灰和鷄子白丸彈子大炭火煨赤研末敷之

金瘡血不止

以血竭末敷之立止

骨髓

治魚刺方

山查一味煎滾先入魚刺化之即溫服速化如神

治刺在肉中不出

研蟾蜍汁敷立出

治醫人折針肉中

以鼠腦塗之出

治魚鞭

取橄欖核為末流水調服愈

咒骨鞭

吾從西來 鉄背夜叉 入吾喉中 化為粉碎

謹請 南斗六星 北斗七星急急如律令^{指到快氣七通}

治骨髓

用香椿樹子不拘多少陰乾每用半碗許搗碎熱

酒衝調服之良久即連骨吐出

救急

救急方 治縊死額下筋脉猶動者

半夏 南星 珍珠

為末吹鼻內口出痰涎即甦溺死以尿包吹起以

一管節口入肛門運氣入攻出水來用幾次可甦

救死方

半夏細辛為細末 虛鼻時下遇神仙
救溺死方

凡人溺死者以鴨血灌之可活

通治

雄黃解毒丸 治諸症神効

雄黃 麝金各一兩 巴豆去油炒 乳香 沒藥各五錢

右為細末醋糊丸如菉豆大朱砂為衣每服五七

丸隨引下疔瘡數日毒氣入內服之即効

心下疼艾醋湯送下 急心疼艾湯送下

纏喉風茶湯下吐痰為妙不吐者再服

人暴死但心頭有熱灌下即活 發熱白湯送下

氣不順木香湯送下 蛇傷雄黃水送下

諸般腫毒癰疽小兒急慢驚風黃酒下無不取効

風火傷斑貓七箇炒防風湯送下

身浮腫荊芥艾湯送下 喉痺薄荷湯送下

遍身疼乳香湯送下 婦人經脉不行紅花湯下

頭風疼川芎湯送下 口眼喎斜麻黃湯送下

肚腹膨脹香附湯下 疝氣芍藥湯送下

痢疾甘草湯送下 瘡疾井花水送下

產後諸疾皂角湯送下 湯傷食傷鹽湯送下

赤白帶下好酒送下 腰脚痛當歸酒送下

半身不遂風證用薑十片棗十枚葱十根絹袋盛

入罐內煮酒下日三次緩即浸酒亦可春三夏一

秋五冬七日小兒亦可用

一粒金丹

沉香 木香 血竭 雄牛黃 狗寶 雄鴉片 犀角

麝香 朱砂 烏梅

右共為末用頭生小兒乳汁為丸如黃豆大朱砂

為衣每服一丸古裏押之先嚼梨汁送下

一粒金丹太上留 能醫萬病解人愁

吐血吐膿如捏去 咳嗽氣喘當時休

胸膈膨悶立寬快 噎食蠱症即時瘳

婦人室女月經閉 胎前產後不須憂

十仙奪命丹 治梅核氣 鼓脹氣塊 冷心疼

經脉不通 食積 氣積 冷積

三棱 莪朮 木香 沉香 丁香 沒藥

川芎 苦葶藶 皂角 巴豆捷去油

右各等分爲細末棗肉爲丸如櫻桃大每服一丸空心涼水送下

膏藥

神仙太乙膏 專貼打撲傷損遍身疼痛一切癰疽

惡瘡疥癬及筋骨疼痛如神

黃柏 防風 玄參 赤芍 白芷 生地黃

大黃以各錢 血竭三錢 當歸錢 肉桂三錢 槐枝三寸 柳枝三寸

桃枝三寸

共合一處用真麻油四斤浸藥春五夏三秋七冬

十日用桑柴火熬令油褐色濾去渣再熬油滴水

成珠下淘炒過黃丹二斤攪千餘遍待冷入地埋

三日去火毒攤貼

雜方

喻化上清丸 香口生津止痰清熱寧嗽清頭目

五倍子打碎去內末淨一斤爲細末用水白酒麴

二兩亦爲細末二味合一處令勻却將細茶煎酒

冷和二味如烙餅麴樣放磁盆內上用磁拌蓋嚴

放木桶內上下週圍俱鋪穰草口間上用草拍蓋

住次日驗看發動作熱用棍動仍舊蓋住看蓋上

有水擦淨如此一日二次看攪擦水至二七日嘗

之其味涼甜爲止後合法前製中煎乘濕加南薄

荷三兩白礪砂二兩砂仁焙甘松焙玄明粉各爲

末各五錢將前共爲一處用梨汁熬膏搗和爲丸

任意喻化加片腦尤妙如無梨汁用柿霜白糖和

之亦可

鷄蘇餅子

柿霜 白水糖各五錢 水片三錢 南薄荷二錢 白官礪五錢

白葛粉二兩 烏梅肉二兩 好檀香三錢 白官礪五錢

右爲細末入好片腦三分再研末煉蜜爲丸如櫻

桃大捏成餅子每一丸喻化

香茶餅

細辛四兩 葛花 沉香 白檀 石膏 礪砂各兩

薄荷二兩 孩茶 烏梅 百藥煎各五錢 白豆蔻二兩 片腦一錢

右爲細末甘草膏爲丸捏餅喻化

沉檀香茶餅

檀香兩五錢 沉香兩五錢 芽茶 甘草 孩茶各一錢 百藥煎錢 龍腦量加

右用甘草膏為丸豌豆大每用一九噲化捏作餅亦可以模印花樣亦可任意為之

香身丸 入酒壺名共殿香又一座香

白豆蔻兩 木香兩 檀香 甘松各一錢 廣陵零香兩半

丁香七錢半 白芷 當歸 附子 檳榔 三奈

甘草五錢 益智 桂心以上各一錢 廉射香少許

右為極細末煉蜜同酥油或羊尾油於石臼搗千

餘下為丸如黃豆大每用一九噲化當日口香後

身亦香久服治男女穢氣心腹疼痛胸膈不利痰

症諸疾又用一九投酒中自然香美又名共殿香

礪砂丸 治口臭口乾口舌生瘡

礪砂兩 風化馬牙硝兩 片腦 廉射香錢 寒水石飛段

右為極細末熬甘草膏和丸如桐子大不拘時含

一丸嚥津妙

透頂香

片腦錢 廉射香錢 礪砂錢 薄荷錢

右為極細末熬甘草膏為丸如桐子大朱砂為長年 沉香丸一錢噲化

孩兒茶兩一錢 上好細茶兩 砂仁兩 白豆蔻三錢 沉香七分 片腦分 麝香五分

右為細末甘草膏為丸如豌豆大每用一九噲化

法製芽茶 清熱化痰消食止渴

芽茶斤煉淨冷 白檀香末五錢 白豆蔻末五錢 片腦一錢 牙粉

用甘草膏拌勻茶將前三味散為衣晒乾不拘時

嚼嚥亦能解酒

法製枸杞子 治虛煩生津益壽延年

枸杞子甘州乾者 白檀香末五錢 白豆蔻末五錢 片腦一錢 牙粉

亦用甘草膏同前為衣

法製人參 補益元氣輕身延年

人參清酒明大 白檀香末二錢 白豆蔻末二錢 片腦三分 牙粉

用甘草膏同前為衣

瑩肌如玉散

楮實為 白芨肥者 升麻白者 甘松七錢 白丁香一錢 糯米一錢 糯米一錢

連皮砂仁半兩 三奈子五錢 菜豆八合 另用雞子一打 用升麻可

皂角 三升水溫燒乾再入水中再燒乾去皮雜子可得二升半為末另用

八白散

右俱為末入糯米菜豆皂角末一處攪勻如常用之

白芨 白丁香 白薑 白芷 杜蒺藜

新升麻 內白者食 三奈子 白欽 白芷 各二兩

白茯苓 白附子 各五錢

右為末至夜津唾面上明旦以瑩肌如玉散洗之洗面濕子

茅香 藿香 陵零香 朝腦 以上為粗末小奈盛之 如梨核

紅棗 享糖 量加

小磁罐盛滾黃酒浸之旋添旋用

香肥皂

藿香 甘松 朝腦 細辛 各一兩 猪胰 白芷 各二兩

肥皂 去皮雜子半斤

右俱為末搗熟棗一兩為膏和丸如乾少加棗棗

汁丸如彈子晒收用

孫仙少女膏

黃柏皮 三寸 土瓜根 三寸 大棗 七箇

右同研細為膏常早起化湯洗面旬日後容如少女以之洗浴尤為神妙

楊太真紅玉膏

杏仁 去皮 滑石 輕粉

右三味等分為細末蒸過入腦麝香少許以雞子

清調勻早起洗面後付之旬日後色如紅玉

省頭香

茅香 三奈 荊芥 川芎 檀香 細辛

沉香 防風 川椒 樟腦 各一兩 白芷 甘松

廣陵零 香附子 各三兩

右為細末搗頭髮內

乾洗頭

甘松 川芎 百藥煎 薄荷 白芷 五倍子

藿香 茅香 草烏 小半斤

右為末不拘多少乾洗頭髮

永香方

茅香 切碎 陵零香 各三兩 香白芷 甘松 各一兩 檀香 五錢

三奈 七錢 地黃根

右為細末入麝少許和勻以絹袋盛之

造仙酒方

細麵四斤乾後稱

胡椒良姜三兩等

肥母杏仁五百粒

諸藥將米一處用

用紙家封瓮口上

春夏七日冬半月

取出爛搗三千杵

每九煎水二大碗

不待一時便為酒

造蜜林禽酒方

用糯米一斗煮米湯三五碗止用米湯飯喫之又

用好燒酒三五碗入米湯次用木香檀香沉香霍

香白芷砂仁茴香各三分入酒米湯內用大壺盛

之水煮一二時再入蜂蜜半斤箬葉封口一時取

開澄清就味異亦能去疾永為仙酒頃刻

而成

詩曰

此酒至神至聖

留傳世上與人嘗

善能調治五臟

曾將此酒獻皇王

號為王母仙漿

服了神清氣爽

又治滿目睜光

萬兩黃金陪賞

黃酒省麵方

糯米一斗

官桂兩

石為細末搜和乾濕得宜露葉包外用故紙再包

麥楷埋一七日取出日曬夜露成熟听用每斗米

春秋八兩夏六兩冬十兩

金盤露

白酒麴

將米泡淘淨蒸熟冷定時麴康四味和勻用絹袋

盛之懸在燒酒罈內封固三七日取出若有渾脚

澄清可飲

蘭陵酒方

白麴

糯米麴

沉香

木香

砂仁

當歸二兩 陳皮二兩 杏仁四兩 鮮薑二兩 鬱金五錢 花椒二兩 白芷二兩

右為末和做麴二十一日下吊香覆如常法

香茶餅子

甘松 乳香 大茴 砂仁 官桂 白豆蔻

細茶 葉豆粉 薄荷 藿香 陳香 川芎

兒茶 三奈 木香 細辛 白芷 朝腦

柿霜 麝香

大甘草一斤剉熬成膏俱為細末煉蜜和膏為丸

如葉豆大每用一丸噙化

玉露霜

薄荷葉 葉豆粉 白沙糖 天門冬

麥門冬 天花粉 白茯苓 柿霜

硼砂 冰片

用新盆二箇將薄荷等藥層相間隔着實於盆內二盆合封固如法不許透氣蒸五炷香取出晒乾拌去羣藥止用豆粉復加白糖柿霜硼砂冰片隨用此藥諸疾瘕飲宿滯噎塞氣痞奔豚膨

脹上喘下墜乍寒乍熱頭目暈脹咽喉腫痛不拘老少並皆治之不用引子諸物不忌

上清丸 化痰止咳清火生津止渴

烏梅肉 薄荷 柿霜 沙糖 石膏

粉草 冰片

右為末烏梅搗為丸如桐子大每服一丸噙化

透體異香丸 專治五膈五噎痞塞諸虛百損五勞

七傷體氣口氣賴氣等症初服一七百體通香若常服身體康健壯陽滋腎補益丹田不可盡述

沉香 木香 丁香 藿香 沒藥 甘松

縮砂 丁皮 官桂 白芷 陵零香 細茶

香附 兒茶 白蔻 檳榔 人參 乳香

檀香 三奈 細辛 益智 當歸 川芎

烏藥 麝香 朝腦 薄荷

先將大粉草半斤剉片水煮汁去渣將汁熬成膏

將前藥為末煉蜜共膏搗和為丸如芡實大清晨

噙化一丸用黃酒送下忌生冷毒物解之

肥皂方 專治粉刺花斑雀子班及面上黑靨皮膚

燥痒此藥去垢潤肌駐顏如年高得之轉老色如童子似玉之光潤乃奇方也

角子糯米皂一斤十二兩 真排草一斤五錢 綠非麻四兩 白芨五錢

猪寶子二兩 白芷五錢 砂仁五錢 糯米五斤 菜豆五錢 天花粉五錢

白丁香二兩 杏仁二兩 猪胰子五兩 甘菊五錢

紅棗肉一斤 陵零香五錢 大片腦五錢 藿香五錢 廣木香三兩

官粉二兩 梅桂五錢 南桂二兩

右為宋加蜂蜜半斤金酒一鍾量末均調得所搗為丸龍服大照常洗面潤開搽臉火用班滯自消面如玉色

人有百病

喜怒偏執是一病 忘義取利是一病 好色壞德是一病
專心係愛是一病 憎欲無理是一病 縱貪蔽過是一病
毀人自譽是一病 擅變自可是病 輕口喜言是一病
快意逐非是一病 以智輕人是一病 乘權縱橫是一病
非人自是是一病 侮易孤寡是一病 以力勝人是一病
威勢自憎是一病 語欲勝人是一病 貨不念價是一病
曲人自直是一病 以直傷人是一病 與惡人交是一病

喜怒自伐是一病	惡人自賢是一病	以功自矜是一病
誹議名賢是一病	以勞自怨是一病	以虛為實是一病
喜說人過是一病	以富驕人是一病	以賤訕貴是一病
誇人求婚是一病	以德自顯是一病	以貴輕人是一病
以貧妬富是一病	敗人成功是一病	以私亂公是一病
好自揄飾是一病	危人自安是一病	陰陽嫉妬是一病
激厲旁僚是一病	多憎少愛是一病	堅執爭鬭是一病
推負首以是一病	文拒勸錫是一病	持人長短是一病
假人自信是一病	施人望報是一病	無施責人是一病
與人追悔是一病	好自怨憎是一病	好殺害畜是一病
盡道厭人是一病	毀譽高才是病	憎人勝己是病
必樂耽飲是一病	心不平等是一病	以賢噴噓是一病
逆念舊惡是一病	不受謀諭是一病	內疎外親是一病
摘徒無理是一病	好自作正是病	多疑少信是一病
笑顛狂人是一病	尊踞無理是一病	醜言惡語是一病
輕慢老少是一病	惡態醜對是一病	了戾自用是一病
投書敗人是一病	笑罵痴人是一病	煩苛輕躁是一病
好喜啼笑是一病	當權任性是一病	詭譎諛諂是一病

嗜得懷詐是一病	兩舌無信是一病	乘酒凶橫是一病
罵詈風雨是一病	惡言好殺是一病	教人墮胎是一病
干預人事是一病	鑽穴窺人是一病	不借懷慈是一病
負債逃走是一病	背向異詞是一病	喜抵得戾是一病
調戲必固是一病	故迷悞人是一病	探菜破卵是一病
驚胎損形是一病	水火賒傷是一病	笑盲聾啞是一病
亂人嫁娶是一病	教人播擻是一病	教人作惡是一病
含禍離愛是一病	唱禍道非是一病	見貨欲得是一病
據奪人物是一病		

右為百病也人能一念除此百病日逐點檢病不作矣無
空言痛切煩惱危不惟自己保命延子孫百世永受其福矣

醫百藥

思無邪僻是一藥	行寬心和是一藥	動靜有禮是一藥
起居有度是一藥	逆德速已是一藥	清心寡慾是一藥
推分引義是一藥	不取非分是一藥	雖憎猶愛是一藥
心無嫉妬是一藥	教化愚頑是一藥	諫正邪亂是一藥
戒勅惡慝是一藥	開導迷誤是一藥	扶接老幼是一藥
心無狡詐是一藥	校補濟難是一藥	常行方便是一藥

憐孤惜寡是一藥	矜貧救厄是一藥	位高下士是一藥
語言謙遜是一藥	不負宿債是一藥	惡慰為信是一藥
敬愛卑微是一藥	語言端慤是一藥	推直引曲是一藥
不爭是非是一藥	逢侵不鄙是一藥	受辱不忍是一藥
揚善隱惡是一藥	推好取醜是一藥	與多取少是一藥
稱嘆賢良是一藥	見賢內省是一藥	不自誇彰是一藥
推功引善是一藥	不自伐善是一藥	不掩人功是一藥
勞苦不報是一藥	懷誠抱信是一藥	覆轍法惡是一藥
崇尚勝己是一藥	安貧自樂是一藥	不自尊大是一藥

好成人功是一藥	不好陰謀是一藥	得失不形是一藥
積德樹恩是一藥	主不罵詈是一藥	不評論人是藥
甜言美語是一藥	災病自咎是一藥	惡不歸人是藥
施不望報是一藥	不殺生命是一藥	心平氣和是一藥
不忌人美是一藥	心靜意定是一藥	不念舊惡是一藥
臣邪弼惡是一藥	听教伏善是一藥	忿怒制制是一藥
不干求人是藥	無思無慮是一藥	尊奉高年是藥
對人恭肅是一藥	內修孝悌是一藥	性靜守分是一藥
和悅妻孥是一藥	以食飲人是一藥	助修善事是一藥

樂天和命是藥	遠嫌避疑是藥	寬舒大量是藥
教信經典是藥	息心抱道是藥	為善不倦是藥
清度貧窮是藥	捨藥救疾是藥	信和神佛是藥
知識知足是藥	清閑無慾是藥	仁慈謙讓是藥
好生惡殺是藥	不實厚藏是藥	不犯禁忌是藥
節儉守中是藥	謙已下人是藥	隨事不慢是藥
喜談人德是藥	不造妄語是藥	貴能授人是藥
富能救人是一藥	不尚爭鬭是一藥	不淫妓青是一藥
不生奸盜是一藥	不懷仇厭是一藥	不樂詞訟是一藥

扶老幫幼是一藥

古之聖人其為善也無小而不容其於惡也無微而不改改惡崇善是樂餌也錄所謂百藥以治之

延年廿歲

四時順攝是藥	可以延年	三光知敬雷而知畏可以延年
孝友無間是藥	可以延年	謙光辭讓損己利人可以延年
物未順應事過心寧可以延年		人我兩忘勿親炎熱可以延年
口勿妄言意勿忘想可以延年		勿為無益常慎有損可以延年
行住量力勿為形勞可以延年		坐卧順時勿令身怠可以延年

悲喜樂勿令過情可以延年

愛憎得失接之以義可以延年

勸世百歲

動止有常言談有節可以延年

靜習達宗敬禮具訓可以延年

兒孫孝養僮僕順承可以延年

積有善功常存陰德可以延年

父要嚴莫過	母要慈莫溺	子要孝莫忤	媳要順莫逆
夫要綱莫懦	妻要賢莫妬	兄要友莫傲	弟要恭莫慢
內要和莫謗	家要富莫分	長要寬莫躁	幼要謙莫狂
親要顧莫疎	友要益莫損	隣要睦莫爭	人要良莫短
臣要忠莫佞	官要廉莫貪	吏要良莫欺	刑要減莫加
東要收莫荒	客要禮莫失	師要嚴莫墮	學要勤莫荒
士要志莫怠	農要時莫違	工要巧莫拙	商要面莫流
主要恩莫刻	僕要勤莫怠	天要所莫怨	命要安莫恨
身要惜莫輕	心要良莫喪	志要大莫小	量要洪莫窄
時要遇莫望	名要揚莫隱	功要成莫廢	道要明莫晦
德要修莫損	恩要報莫辜	體要志莫記	節要守莫壞
義要尚莫負	賢要重莫輕	愚要化莫棄	富要仁莫驕

貧要甘莫甜	貴要平莫嚴	賤要屈莫強	好要除莫容
盜要誅莫放	詐要去莫學	冤要解莫結	訟要息莫起
惡要珍莫縱	善要珍莫欺	寡要惜莫辱	難要救莫論
饑要賑莫吝	危要理莫露	債要償莫騙	借要還莫昧
勢要去莫倚	法要畏莫犯	舟要濟莫難	路要通莫塞
橋要修莫毀	婚要擇莫輕	喪要哀莫忘	祭要誠莫褻
神要敬莫媚	邪要正莫信	銀要真莫假	交要平莫欺
斗要官莫小	科要平莫偏	物要惜莫枉	禮要有莫無
席要中莫貴	用要儉莫奢	家要公莫私	事要忍莫生
言要謹莫妄	信要全莫爽	行要顧莫短	氣要忍莫喪
理要順莫越	性要直莫偏	情要厚莫薄	酒要節莫奢
慾要寡莫縱	財要明莫苟	食要淡莫濃	衣要簡莫華
樂要易莫極	福要享莫盡	祿要重莫輕	壽要長莫戕

右勸世百篇乃人生日用之事不論貧富貴賤均而有
並倘能味而行之則惡者善而善者愈善愚者賢而
賢者愈賢矣未必無小補云



天不言自高
地不言自厚

魯府秘方四卷

兩淮鹽政
採進本

明劉應泰編應泰嘗爲魯王府侍醫其里貫未詳
是書分福壽康寧四集首載五言贊一首以頌魯
王其餘皆分類隸方亦罕奇秘末載延生勸世等
箴尤與醫藥無關前有萬厯甲午魯王序考明史
諸王傳魯荒王檀八世至敬王壽鎰於萬厯二十
二年嗣封是年歲在甲午蓋卽壽鎰故其序自稱
魯王八代孫也